

BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA *)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca **ANDRAU MIRCEA- SEBASTIAN**, nascut la data de **07.05.2004**, CNP / cod unic de asigurare **5040507125788**, Adresa: **Jud.CLUJ Loc.Cluj Napoca Str.BUCIUM Nr.17-19 Ap.6** a fost internat in serviciul nostru in perioada: **18.08.2020 09:07 - 27.08.2020 16:00**, FO: **19967 F.O.** / nr. din Registrul de consultatii **BOLI INFECTIOASE V-COPII** si se externeaza: **AMELIORAT**

Diagnostic:

INFECTIE SARS COV-2 FORMA USOARA
COVID-19 CU VIRUS IDENTIFICAT

Motivele prezentarii

Anamneza

- factori de risc

Examen clinic

- general

- local

Examen de laborator:

18.08.2020

Acid Uric - 5.8 [3.4 - 7], **APTT** - APTT (sec) 23.6 [22.1 - 28.1], - APTT (%) [-], **Calciu total** - 9.79 [8.4 - 10.6], **Colesterol Total** - 76 [109 - 200], **Creatinina** - 0.87 [0.7 - 1.2], **D-Dimeri** - 0.27 [0 - 0.55], **Feritina** - 34.6 [23.9 - 336.2], **Fibrinogen** - 219 [180 - 400], **Fier** - 184 [33 - 193], **Glicemie** - 79 [60 - 100], **GOT** - 21 [0 - 45], **GPT** - 19 [0 - 45], **HDL-Colesterol** - 25 [35 - 65], **Hemoleucograma completa** - Leucocite 4.0 [3.7 - 9.5], - Hematii 5.11 [4.32 - 5.66], - Hemoglobina 15.0 [13.3 - 17.6], - Hematocrit 43.8 [39.0 - 51.0], - VEM 85.8 [82.0 - 98.0], - HEM 29.4 [25.0 - 33.0], - CHEM 34.2 [31.6 - 35.8], - RDW-CV% 13.7 [9.9 - 15.5], - Trombocite 205 [150 - 450], - MPV 8.3 [6.5 - 14.0], - NEUT% 53.63 [40 - 70], - LYMPH% 33.08 [20 - 40], - MONO% 11.78 [3.0 - 10.0], - EO% 1.36 [0 - 5], - BASO% 0.15 [0 - 2], - NEUT# 2.139 [1.5 - 6.6], - LYMPH# 1.319 [1.1 - 3.5], - MONO# 0.470 [0.21 - 0.92], - EO# 0.054 [0.00 - 0.67], - BASO# 0.006 [0 - 0.13], **K** - 4.3 [3.5 - 5.1], **LDH** - 138 [0 - 250], **LDL - Cholesterol** - 36 [10 - 150], **Lipide Totale** - 335 [375 - 750], **Magneziu** - 1.94 [1.7 - 2.6], **Na** - 140 [136 - 146], **Proteina C reactiva** - 0.32 [0 - 1], **Timp de protrombina** - PT (sec) (plasma) 13.2 [9.4 - 13.6], - PT (%) (plasma) 72.6 [70 - 130], - INR (plasma) 1.17 [0.8 - 1.2], **Trigliceride** - 74 [0 - 150], **Uree** - 30 [0 - 50], **VSH** - 2 [1 - 15]

24.08.2020

Covid-19 (SARS-CoV-2) - Detectabil [Nedetectabil -], **Acid Uric** - 5.5 [3.4 - 7], **APTT** - APTT (sec) 24.0 [22.1 - 28.1], - APTT (%) [-], **Calciu total** - 9.80 [8.4 - 10.6], **Colesterol Total** - 82 [109 - 200], **Creatinina** - 0.81 [0.7 - 1.2], **D-Dimeri** - 0.29 [0 - 0.55], **Feritina** - 42.7 [23.9 - 336.2], **Fibrinogen** - 155 [180 - 400], **Fier** - 96 [33 - 193], **Glicemie** - 85 [60 - 100], **GOT** - 16 [0 - 45], **GPT** - 21 [0 - 45], **HDL-Colesterol** - 31 [35 - 65], **Hemoleucograma completa** - Leucocite 5.89 [3.7 - 9.5], - Hematii 5.12 [4.32 - 5.66], - Hemoglobina 15.2 [13.3 - 17.6], - Hematocrit 43.1 [39.0 - 51.0], - VEM 84.2 [82.0 - 98.0], - HEM 29.7 [25.0 - 33.0], - CHEM 35.3 [31.6 - 35.8], - Trombocite 291 [150 - 450], -

NEUT% 53.9 [40 - 70] , - LYMPH% 34.8 [20 - 40] , - MONO% 8.7 [3.0 - 10.0] , - EO% 2.4 [0 - 5] , - BASO% 0.2 [0 - 2] , - NEUT# 3.18 [1.5 - 6.6] , - LYMPH# 2.05 [1.1 - 3.5] , - MONO# 0.51 [0.21 - 0.92] , - EO# 0.14 [0.00 - 0.67] , - BASO# 0.01 [0 - 0.13] , - RDW-CV 12.1 [9.9 - 15.5] , - PDW* 12.7 [10 - 16.5] , - MPV 10.7 [6.5 - 14.0] , **K** - 4.3 [3.5 - 5.1] , **LDH** - 151 [0 - 250] , **LDL - Colesterol** - 44 [10 - 150] , **Lipide Totale** - 315 [375 - 750] , **Magneziu** - 1.91 [1.7 - 2.6] , **Na** - 140 [136 - 146] , **Proteina C reactiva** - 0.09 [0 - 1] , **Timp de protrombina** - PT (sec) (plasma) 11.7 [9.4 - 13.6] , - PT (%) (plasma) 95.4 [70 - 130] , - INR (plasma) 1.02 [0.8 - 1.2] , **Trigliceride** - 39 [0 - 150] , **Uree** - 23 [0 - 50] , **VSH** - 2 [1 - 15]

Examene paraclinice:

EKG

ECO

Rx

T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 18.08.2020 RG.PULM. D=4.2 Gym2Radiografie pulmonara PAFara leziuni pulmonare focale sau infiltrative evidente RGR.SCD libere. Cord aorta radiologic normale.

Altele

Tratament efectuat

ACETILCISTEINA 200MG LAROPHARM || PARACETAMOL 500MG ZENTIVA*20CPR || PLAQUENIL 200MG*60 compr.film. || RINO SUN SPRAY 20ML || VITAMINA C 1000mg*30cpr BERES

Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului:

EPICRIZA

Pacient in varsta de 16 ani, fara APP semnificative, se interneaza impreuna cu mama si fratele, cu test rt-PCR-SARS-COV-2(realizat prin DSP) pozitiv din data de 15.08.2020, in urma unui contact pozitiv COVID-19 (total). Pacientul a prezentat din data de 11.08.2020 subfebrilitati 37,5°C, disfagie, anosmie si tuse seaca.

La internare, pacientul este cu stare generala relativ buna, afebril, cooperant, constient, stabil hemodinamic si respirator, SarO2=98%, AV=51 b/min, TA=120/75mmHg. Facies necaracteristic, tegumente si mucoase normal colorate, MV prezent bilateral, fara raluri supraadaugate, Abdomen liber, suplu, mobil cu respiratia, tranzit intestinal prezent. Loje renale libere, Giordano absent bilateral, diureza prezenta. Fara semne de iritatie meningeana sau de focar neurologic.

Biologic : colesterol total scazut, HDL colesterol scazut, lipide totale scazute.

PCR SARS CoV-2 (proba 2 in 25.08.) : DETECTABIL

Radiografie pulmonara (18.08.2020)- Fara leziuni pleuro-pulmonare active decelabile radiografic.

Pe parcursul internarii, pacientul a fost afebril, cu evolutie favorabila si a urmat tratament cu Plaquenil 200mg (2x2tb/zi timp 1 zi apoi 2x1tb/zi timp de 7 zile), antitusiv, antioxidant si simptomatic cu Paracetamol.

Se externeaza cu stare generala buna, afebril, stabi hemodinamic si respirator cu recomandari:

Tratament recomandat

Conform Ordinului 1321/22.07.2020 se indica izolare la domiciliu/locatia declarata pe o perioada de 4 zile de la externare. In aceasta perioada nu se va parasi domiciliul/locatia declarata.

Acestia pot desfasura activitatile curente si profesionale cu pastrarea distantarii si purtarea mastii acasa si la locul de munca pentru inca 10 zile, dupa incheierea perioadei de izolare.

Dupa ce ajungeti acasa se recomanda efectuarea dusului, hainele cu care ati plecat acasa se vor pune intr-un sac impermeabil (fara a fi scuturate). Hainele (inclusiv hainele care pe care le-ati folosit in spital) se vor pastra in sac intr-un loc separat (preferabil pe balcon) timp de 5 zile, ulterior vor fi

spalate la masina de spalat haine (la cea mai mare temperatura permisa de producator) cu dezinfectant pentru haine si calcate ulterior. Se vor folosi manusi pentru manipularea hainelor, care ulterior vor fi aruncate si va veti spala pe mca apa si sapun. Telefonul, ceasul si alte obiecte electronice se vor dezinfecta cu servetele impregnate cu alcool.

Masuri de igiena individuala de respectat la domiciliu:

Sa se evite contactul apropiat cu celelalte persoane din locuinta si, daca este posibil, sa se izoleze camera separata, cu baie separata.

- Daca se foloseste aceeasi baie, aceasta va fi dezinfectata dupa folosire, se va dezinfecta toaleta si toate obiectele atinse (inclusiv clante, intrerupatoare). Dezinfectarea se va face cu solutii pe baza de clor (ex. Domestos) sau alcool (min 70 %).

Sa nu primeascvizitatori in perioada de izolare la domiciliu/locatia declarata.

Sa se spele pe maini cu apa si sapun, timp de cel putin 20 de secunde, ori de cate ori este necesar (dupa utilizarea toaletei, inaintea pregatirii mesei, etc).

Sa curate si sa dezinfecteze zilnic toate suprafetele pe care le atinge frecvent (ex: mese, clante, obiecte de mobilier, bateria/robinetele de la chiuveta, alte obiecte care pot fi atinse si de alte persoane).

Sa isi acopere gura si nasul cu servetel de unica folosinta sau cu o tesatura atunci cand stranuta sau tuseste,sau sa stranute si sa tuseasca in plica cotului. Batista se arunca imediat la gunoi, in sac de plastic, dupa care se spala pe maini cu apa si sapun timp de 20 de secunde.

Sa pastreze distanta de minim 1,5 m atunci cand se intalneste cu alte persoane.

Sa poarte masca cand se intalneste cu alte persoane. Masca trebuie sa acopere nasul si gura.

Purtarea mastii este una dintre masurile de prevenire si limitare pentru raspandirea anumitor boli respiratorii, inclusiv cea determinata de noul coronavirus. Cu toate acestea, doar utilizarea unei masti nu este suficienta pentru a asigura un nivel adecvat de protectie si ar trebui adoptate si alte masuri la fel de relevante. Folosirea mastii trebuie combinata cu igiena adecvata a mainilor si cu alte masuri de prevenire si control a transmiterii noului coronavirus de la om la om.

-in timpul utiliztrebuie sa evitati atingerea mastii;

-sa indepartati masca folosind tehnica adecvata (nu atingeti partea din fata, ci indepartati snururile din spate), actiune urmata de spalarea IMEDIATA a mainilor cu apa si sapun;

-sa nu reutilizati mastile de unica folosinta. Masca se schimba la maxim 4 ore sau mai repede caz de umezire.

Monitorizarea dupa externare:

Monitorizarea starii de sanatate a pacientului pe perioada izolarii la domiciliu se face de catre medicul de familie zilnic, prin sistemul de telemedicina. Pacientii care nu sunt inscrisi pe lista unui medic de familie vor fi monitorizati zilnic de catre DSP judeteană.In cazul aparitiei unor probleme de sanatate se va lua legatura telefonica cu medicul de familie sau se va suna la 112

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

Indicatie pentru revenire la internare

X Nu, nu este necesara revenirea pentru internare

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat prescriptie medicală, caz în care se va înscrie seria si numarul acesteia
- ☐ Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu a fost necesar
- ☒ Nu s-a eliberat prescriptie medicala

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat concediu medical la externare, caz în care se va înscrie seria si numarul acestuia
- ☐ Nu s-a eliberat concediu medical la externare deoarece nu a fost necesar
- ☒ Nu s-a eliberat concediu medical la externare

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu
- ☒ Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu, deoarece nu a fost necesar

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

Un exemplar se constituie scrisoare medicala si se inmaneaza in termen de 72 de ore medicului de familie.

*conform contractului cadru/2014 - model scrisoare medicala/Bilet de iesire - anexa 43

- ☐ S-a eliberat prescripție medicală pentru dispozitive medicale în ambulatoriu
- ☒ Nu s-a eliberat prescripție medicală pentru dispozitive medicale în ambulatoriu deoarece nu a fost necesar

(cu viza Unității județene de implementare a programului, pentru diabet)

Unitate județeană de diabet zaharat:	
Nr. înregistrare al asiguratului:	

Data 27.08.2020

Sef sectie:

Dr. IUBU ROXANA

Medic primar

Dr. ROXANA IUBU
medic primar boli infecțioase
medic specialist pediatrie
cod D51627

Medic curant:

RUS MIHAI ARONEL

Dr. RUS MIHAI-ARONEL
medic specialist Boli Infecțioase
cod F20348

Medic rezident:

Calea de transmitere:

- prin asigurat
- prin posta

*) Scrisoarea medicală se întocmește în două exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultația/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicală sau biletul de ieșire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externării, într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;