

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca Str. Iuliu Moldovan Nr. 23, 400348 Tel: +40-264-594655/565758; 593105. Fax: +40-264-593105;

E-mail: infectioasecj@yahoo.com web:

PROCES DE ACREDITARE

BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA *)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca PRECUP RADU-DUMITRU, nascut la data de 14.02.1977, CNP / cod unic de asigurare 1770214124039, Adresa: Jud.CLUJ Loc.Feleacu Nr.627B a fost internat in serviciul nostru in perioada: 15.07.2020 02:50 - 20.07.2020 15:12, FO: 17514 F.O. / nr. din Registrul de consultatii BOLI INFECTIOASE III-ADULTI si se externeaza: AMELIORAT

Diagnostice:

LARINGOTRAHEITA ACUTA INFECTIE SARS-COV-2 FORMA USOARA

Motivele prezentarii		
Anamneza		
factori de risc		
Examen clinic - general		
<u> </u>		
- local		
Examene de laborator:		
15.07.2020		
APTT - APTT (sec) 25.2 [22.1 - 28.1] , - APTT (%) [-], Creatinina - 0.90 [0.7 - 1.2],		
D-Dimeri - 0.20 [0 - 0.55], Fibrinogen - 284 [180 - 400], Glicemie - 83 [70 - 105], GOT -		
31 [0 - 45], GPT - 34 [0 - 45], Hemoleucograma completa - Leucocite 4.90 [3.7 - 9.5] , -		
Hematii 5.48 [4.32 - 5.66] , - Hemoglobina 16.5 [13.3 - 17.6] , - Hematocrit 46.7 [39.0 - 51.0		
], - VEM 85.2 [82.0 - 98.0], - HEM 30.1 [25.0 - 33.0], - CHEM 35.3 [31.6 - 35.8], -		
Trombocite 192 [150 - 450] , - NEUT% 42.4 [40 - 70] , - LYMPH% 48.0 [20 - 40] , -		
MONO% 8.2 [3.0 - 10.0] , - EO% 1.2 [0 - 5] , - BASO% 0.2 [0 - 2] , - NEUT# 2.08 [1.5 -		
6.6], - LYMPH# 2.35 [1.1 - 3.5], - MONO# 0.40 [0.21 - 0.92], - EO# 0.06 [0.00 - 0.67], -		
BASO# 0.01 [0 - 0.13] , - RDW-CV 12.0 [9.9 - 15.5] , - PDW* 17.8 [10 - 16.5] , - MPV		
12.5 [6.5 - 14.0], LDH - 162 [0 - 250], Proteina C reactiva - 0.21 [0 - 1], Timp de		
protrombina - PT (sec) (plasma) 10.9 [9.4 - 13.6] , - PT (%) (plasma) 112.0 [70 - 130] , -		
INR (plasma) 0.95 [0.8 - 1.2], Uree - 43 [0 - 50], VSH - 9 [1 - 15]		
16.07.2020		
APTT - APTT (sec) 24.5 [22.1 - 28.1] , - APTT (%) [-], Creatinina - 0.95 [0.7 - 1.2],		
Fibrinogen - 271 [180 - 400], Glicemie - 94 [70 - 105], GOT - 29 [0 - 45], GPT - 30 [0 -		
45], Hemoleucograma completa - Leucocite 5.4 [3.7 - 9.5] , - Hematii 5.22 [4.32 - 5.66] , -		
Hemoglobina 15.7 [13.3 - 17.6], - Hematocrit 44.5 [39.0 - 51.0], - VEM 85.3 [82.0 - 98.0],		
- HEM 30.1 [25.0 - 33.0] , - CHEM 35.3 [31.6 - 35.8] , - RDW-CV% 13.0 [9.9 - 15.5] , -		
Trombocite 165 [150 - 450] , - MPV 10.9 [6.5 - 14.0] , - NEUT% 46.74 [40 - 70] , -		
LYMPH% 44.62 [20 - 40] , - MONO% 7.67 [3.0 - 10.0] , - EO% 0.74 [0 - 5] , - BASO%		
0.23 [0 - 2] , - NEUT# 2.516 [1.5 - 6.6] , - LYMPH# 2.402 [1.1 - 3.5] , - MONO# 0.413 [
0.21 - 0.92], - EO# 0.040 [0.00 - 0.67], - BASO# 0.012 [0 - 0.13], Proteina C reactiva -		
0.20 [0 - 1], Timp de protrombina - PT (sec) (plasma) 10.5 [9.4 - 13.6], - PT (%) (plasma)		
121.9 [70 - 130] , - INR (plasma) 0.90 [0.8 - 1.2], Uree - 24 [0 - 50], VSH - 10 [1 - 15] 17.07.2020		
Covid-19 (SARS-CoV-2) - Detectabil [Nedetectabil -], Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgG -		
COVID-19 (SANS-COV-2) - Detectaon Neuetectaon - , Andcorpt and SANS-COV-2 IgG -		

Examo	ene paraclinice:
EKG	
ECO	
Rx	
	T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 15.07.2020RGR.PULM.D=4.6 Gym2Fara leziuni pleuro-pulmonare
	evidente rgr. T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 16.07.2020RG PULM D= 4.6 Gym2Fara leziuni
	pleuro-pulmonare evidente rgr.
Altele	

Nonreactiv (Index=0.504) [Index < 0.8 Nonreactiv>= 0.8 - < 1.2 Incert > =1.2 Reactiv -], **Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgM** - Nonreactiv (Index=0.246) [Index < 0.8 Nonreactiv>= 0.8 -

Tratament efectuat

ALGOZONE 500MG X 20 CPR LABORMED \parallel DIAZEPAM 10MG*20cpr GEDEON R. \parallel ERIDIAROM \parallel HIDRASEC 100MG*20CPS. \parallel KALETRA 200mg/50mg*120cpr.filmate \parallel NITRAZEPAM 2,5 MG LPH X 30 CPR \parallel PARACETAMOL 500MG ZENTIVA*20CPR \parallel PLAQUENIL 200MG*60 compr.film. \parallel SARGENOR 1G \parallel VITAMINA C 1000mg*30cpr BERES

Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului:

EPICRIZA

Pacient in varsta de 43 de ani, fara APP semnificative, se prezinta in serviciul nostru acuzand cefalee, mialgii, astenie, subfebrilitati (37.6 grade C), dureri toracice posterioare, debutate in 12.07.2020. Mentionam ca pacientul are un test RT PCR SARS-CoV-2 pozitiv (efectuat in clinica privata ProVitam in 14.07.2020), si prezinta contact cu caz confirmat de infectie SARS-CoV-2 (pacienta Timis Elena).

Obiectiv, la internare: pacient afebril, cu usoara congestie conjunctivala bilaterala, congestie faringiana moderata, adenopatii laterocervicale, mobile, elastice, nedureroase la palpare, fara modificari auscultatoric pulmonare, manevra Giordano (-) bilateral, fara semne de iritatie meningeana sau de focar, reflex de deglutitie pastrat, reflex oculo-fotomotor pastrat, TA= 125/90 mmHg, AV= 76 bpm, Sat. O2= 99% in aa.

Biologic: discreta limfocitoza.

RT PCR SARS-CoV-2, proba 1 (14.07.2020 - ProVitam): Detectabil

RT PCR SARS-CoV-2, proba 2 (20.07.2020): Detectabil. Anticorpi anti-SARS-CoV-2 IgM/IgG: Nonreactivi.

Rx. pulmonara (15.07.2020): "Fara leziuni pleuro-pulmonare evidente rgr."

Pe parcursul internarii, pacientul a urmat tratament antiviral (Plaquenil 200mg 2x2 tb/zi in ziua 1 (15.07.2020), apoi 2x1 tb/zi timp de inca 4 zile, Kaletra 200mg 2x2 tb/zi timp de 5 zile), simptomatice, antitusive, antialgice, cu remiterea simptomatologiei.

Pacientul se externeaza ameliorat, stabil hemodinamic si respirator (TA= 108/81 mmHg, AV= 87 bpm, Sat.O2= 97% in aa), la cerere (declaratia pe proprie raspundere completata), cu recomandari.

Tratament recomandat

Conform Ordinului 1.137 din 23 iunie 2020 se indica izolare la domicliu pe o perioada de 8 zile de la externare. In aceasta perioada nu se va parasi domiciliul declarat si transmis catre ISU.

Dupa ce ajungeti acasa se recomanda efectuarea dusului, hainele cu care ati plecat acasa se vor pune intr-un sac impermeabil (fara a fi scuturate). Hainele (inclusiv hainele care pe care le-ati folosit in spital) se vor pastra in sac intr-un loc separat (preferabil pe balcon) timp de 5 zile, ulterior vor fi spalate la masina de spalat haine (la cea mai mare temperatura permisa de producator) cu dezinfectant pentru haine si calcate ulterior. Se vor folosi manusi pentru manipularea hainelor, care ulterior vor fi aruncate si va veti spala pe mcu apa si sapun. Telefonul, ceasul si alte obiecte electronice se vor dezinfecta cu servetele impregnate cu alcool.

Masuri de igiena individuala de respectat la domiciliu:

Sa se evite contactul apropiat cu celelalte persoane din locuinta si, daca este posibil, sa se izoleze

camera separata, cu baie separata.

Daca se foloseste aceeasi baie, aceasta va fi dezinfectata dupa folosire, se va dezinfecta toaleta si toate obiectele atinse (inclusiv clante, intrerupatoare). Dezinfectarea se va face cu solutii pe baza de clor (ex. Domestos) sau alcool (min 70 %).

Sa nu primeascvizitatori in perioada de autoizolare la domiciliu.

Sa se spele pe maini cu apa si sapun, timp de cel putin 20 de secunde, ori de cate ori este necesar (dupa utilizarea toaletei, inaintea pregatirii mesei, etc).

Sa curate si sa dezinfecteze zilnic toate suprafetele pe care le atinge frecvent (ex: mese, clante, obiecte de mobilier, bateria/robinetele de la chiuveta, alte obiecte care pot fi atinse si de alte persoane).

Sa isi acopere gura si nasul cu servetel de unica folosinta sau cu o tesatura atunci cand stranuta sau tuseste, sau sa stranute si sa tuseasca in plica cotului. Batista se arunca imediat la gunoi, in sac de plastic, dupa care se spala pe maini cu apa si sapun timp de 20 de secunde.

Sa pastreze distanta de minim 1,5 m atunci cand se intalneste cu alte persoane.

Sa poarte masca cand se intalneste cu alte persoane. Masca trebuie sa acopere nasul si gura.

Purtarea mastii este una dintre masurile de prevenire si limitare pentru raspandirea anumitor boli respiratorii, inclusiv cea determinata de noul coronavirus. Cu toate acestea, doar utilizarea unei masti nu este suficienta pentru a asigura un nivel adecvat de protectie si ar trebui adoptate si alte masuri la fel de relevante. Folosirea mastii trebuie combinata cu igiena adecvata a mainilor si cu alte masuri de prevenire si control a transmiterii noului coronavirus de la om la om.

- -in timpul utiliztrebuie sa evitati atingerea mastii;
- -sa indepartati masca folosind tehnica adecvata (nu atingeti partea din fata, ci indepartati snururile din spate), actiune urmata de spalarea IMEDIATA a mainilor cu apa si sapun;
- -sa nu reutilizati mastile de unica folosinta. Masca se schimba la maxim 4 ore sau mai repede caz de umezire.

S-a eliberat concediu medical pe perioada 15.07.2020 - 31.07.2020.

Monitorizarea dupa externare:

Monitorizarea starii de sanatate a pacientului pe perioada izolarii la domicliu se face de catre medicul de familie zilnic, prin sistemul de telemedicina. Pacientii care nu sunt inscrisi pe lista unui medic de familie vor fi monitorizati zilnic de catre DSP judeteana. In cazul aparitiei unor probleme de sanatate se va lua legatura telefonica cu medicul de familie sau se va suna la 112.

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

Indicatie pentru revenire la internare

marcuse penera revenue a meeriare		
X Nu, nu este necesara revenirea pentru internare		
Se completează obligatoriu una din cele două informatii:		
- S-a eliberat prescriptie medicalã, caz în care se va înscrie seria si numarul acesteia		
- Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu a fost necesar		
- X Nu s-a eliberat prescriptie medicala		
Se completeazã obligatoriu una din cele douã informatii: CCMAM 4169634		
- X S-a eliberat concediu medical la externare, caz în care se va înscrie seria si numarul acestuia		
- Nu s-a eliberat concediu medical la externare deoarece nu a fost necesar		
- Nu s-a eliberat concediu medical la externare		
Se completeazã obligatoriu una din cele douã informatii:		
- S-a eliberat recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu		
- X Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu,		
deoarece nu a fost necesar		
Se completeazã obligatoriu una din cele douã informatii:		
- S-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu		
- 🗓 Nu s-a eliberat prescriptie medicalã pentru dispozitive medicale in ambulatoriu deoarece		
nu a fost necesar		

Un exemplar se constituie scrisoare medicala si se inmaneaza in termen de 72 de ore medicului de familie.

(cu viza Unitatii judetene de implementare a programului, pentru diabet)

Unitate judeteana de diabet zaharat:	
Nr. inregistrare al asiguratului:	

Data 20.07.2020

Sef sectie:

Conf. Dr. RADULESCU AMANDA

Medic primar

Dr. AMANDA PADULESCU medic primar belienjestioase și epidențiologie cod 048773 **Medic curant:**

Medic rezident:

Dr. BRAN ALINA

Dr. BRAN ALINA medic primar boli infectioase competență ecografie pogoraiă. cod/2/23//

Calea de transmitere:

- prin asigurat
- prin posta

*) Scrisoarea medicala se intocmeste în doua exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii , într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;