

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca Str. Iuliu Moldovan Nr. 23, 400348 Tel: +40-264-594655/565758; 593105. Fax: +40-264-593105; E-mail: infectioaseci@vahoo.com. web:

E-mail: infectioasecj@yahoo.com web: www.infectioasecluj.ro



## BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA \*)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca SUMANDEA DENISA-MARIA, nascut la data de 11.06.2008, CNP / cod unic de asigurare 6080611125785, Adresa: Jud.CLUJ Loc.Cluj Napoca Str.FABRICII Nr.4 Ap.31 a fost internat in serviciul nostru in perioada: 06.08.2020 13:28 - 17.08.2020 14:30, FO: 19061 F.O. / nr. din Registrul de consultatii BOLI INFECTIOASE VI-COPII si se externeaza: AMELIORAT

### Diagnostice:

COVID-19 CONFIRMAT FORMA USOARA ANGINA ACUTA ERITEMATOASA VULVO-VAGINITA ACUTA

Motivele prezentarii	
Anamneza	
- factori de risc	
Examen clinic	
- general	
- local	
Examene de laborator:	
06.08.2020	
<b>APTT</b> - APTT (sec) 28.3 [ 22.1 - 28.1 ] , - APTT (%) [ - ], <b>Creatinina</b> - 0.47 [ 0.53 - 0.79 ],	
<b>D-Dimeri</b> - 0.31 [ 0 - 0.55 ], <b>Feritina</b> - 29.2 [ 9.0 - 306.8 ], <b>Fibrinogen</b> - 219 [ 180 - 400 ],	
<b>Glicemie</b> - 96 [ 60 - 100 ], <b>GOT</b> - 19 [ 0 - 35 ], <b>GPT</b> - 10 [ 0 - 35 ], <b>Hemoleucograma</b>	
<b>completa</b> - Leucocite 5.4 [ 3.9 - 11.1 ] , - Hematii 4.57 [ 3.88 - 4.99 ] , - Hemoglobina 13.1 [	
11.5 - 15.4], - Hematocrit 37.7 [ 36.0 - 48.0], - VEM 82.5 [ 81.0 - 99.0], - HEM 28.7 [ 25.0 -	
33.0], - CHEM 34.8 [ 31.0 - 35.0], - RDW-CV% 12.7 [ 9.9 - 15.5], - Trombocite 210 [ 150 -	
450], - MPV 7.8 [ 6.5 - 14.0 ], - NEUT% 55.85 [ 40 - 70 ], - LYMPH% 30.01 [ 20 - 40 ], -	
MONO% 12.53 [ 3.0 - 10.0 ] , - EO% 1.05 [ 0 - 5 ] , - BASO% 0.56 [ 0 - 2 ] , - NEUT# 3.042 [	
1.8 - 7.4 ] , - LYMPH# 1.634 [ 1.1 - 3.5 ] , - MONO# 0.682 [ 0.21 - 0.92 ] , - EO# 0.057 [ 0.00 -	
0.67], - BASO# 0.030[0-0.13], <b>K</b> -4.3[3.5-5.1], <b>LDH</b> -136[120-300], <b>Na</b> -137[136	
- 146], <b>Proteina C reactiva</b> - 0.07 [ 0 - 1 ], <b>Timp de protrombina</b> - PT (sec) (plasma) 11.2 [	
9.4 - 13.6], - PT (%) (plasma) 105.3 [ 70 - 130], - INR (plasma) 0.97 [ 0.8 - 1.2],	
<b>Trigliceride</b> - 90 [ 0 - 150 ], <b>Uree</b> - 25.9 [ 0 - 50 ], <b>VSH</b> - 5 [ 1 - 20 ], <b>Covid-19</b> ( <b>SARS-CoV-2</b> ) - Detectabil [ Nedetectabil - ]	
13.08.2020	
Covid-19 (SARS-CoV-2) - Detectabil [ Nedetectabil - ]	
Examene paraclinice:	
EKG	
ECO	
Rx	
T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 07.08.2020RG. PULMD=4.5 Gym2Fara leziuni active	
pleuro-pulmonare.Sinusuri costo-diafragmatice libere.Cord, aorta normale.	

Altele

#### Tratament efectuat

AZITROX 500MG ZENTIVA\*3CPR  $\parallel$  ERIDIAROM  $\parallel$  FLUCORIC 150MG\*1CPS.  $\parallel$  KALETRA 200mg/50mg\*120cpr.filmate  $\parallel$  LOPINAVIR AND RITONAVIR (KALETRA) 200MG/50MG  $\parallel$  PARACETAMOL 500MG ZENTIVA\*20CPR  $\parallel$  REFFLOR FORTE ADULTI \* 10 CPS  $\parallel$  RINO SUN SPRAY 20ML  $\parallel$  VITAMINA C 1000mg\*30cpr BERES  $\parallel$  VITAMINA C 1000MG+D3 2000UI\*30CPR. FILM/ BERES  $\parallel$  XYLO-NASAL PIC.NAZ.0.1% 10ML

# Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului: EPICRIZA

Pacienta in varsta de 12 ani, fara boli asociate, se interneaza in clinica noastra in data de 06.08.2020, cu urmatoarele acuze: disfagie, mialgii, cefalee, simptomatologie debutata cu 1 zi anterior internarii.

Din ancheta epidemiologica retinem faptul ca pacienta a avut contact direct cu mama si tata, amandoi fiind cazuri confirmate SARS COV-2.

Obiectiv la internare: stare generala buna, constienta, cooperanta, afebrila, apetenta, T- 165 cm, G-56 kg, congestie faringiana difuza, torace normal conformat, fara raluri supraadaugate, Sa O2- 97% aa TA - 98/69, AV 64/min, zgomote cardiace ritmice, bine batute, fara sufluri supraadaugate auscultatoric, abdomen mobil cu respiratia, liber, nedureros la palparea superficiala si profunda, tranzit intestinal prezent, diureza prezenta, fara semne de iritatie meningeana sau de focar neurologic.

Biologic la internare: usoara monocitoza, fara alte modificari patologice ale parametrilor.

Examen virusologic: rt-PCR SARS COV-2 (06.08.2020): DETECTABIL (proba 1) (cod caz: CJ 35728/2020).

rt-PCR SARS COV-2 (14.08.2020): DETECTABIL (proba 2) (cod

caz: CJ 35728/2020).

Radiologic la momentul internarii nu se observa modificari patologice.

Pe parcursul internarii acuza prurit vaginal si leucoree, pentru care s-a administrat 150 mg Flucoric, cu ameliorarea simptomatologiei.

S-a interpretat cazul cu diagnosticele sus mentionate si s-a administrat tratament conform protocolului cu: Kaletra per os 2x2 tb/zi timp de7 zile, Azitromicina per os 1 tb/zi timp de 5 zile, vitamina C, probiotic, antidiareic, antimicotic, cu evolutie clinic favorabila.

Se externeaza ameliorata, afebrila, apetenta, echilibrata hemodinamic si respirator, cu recomandari.

### Tratament recomandat

Conform Ordinului 1321/22.07.2020 se indica izolare la domicliu/locatia declarata pe o perioada de 2 zile de la externare (pana la implinirea a 14 zile de la momentul confirmarii ). In aceasta perioada nu se va parasi domiciliul/locatia declarata.

Acestia pot desfasura activitatile curente si profesionale cu pastrarea distantarii si purtarea mastii acasa si la locul de munca pentru inca 10 zile, dupa incheierea perioadei de izolare.

Dupa ce ajungeti acasa se recomanda efectuarea dusului, hainele cu care ati plecat acasa se vor pune intr-un sac impermeabil (fara a fi scuturate). Hainele (inclusiv hainele care pe care le-ati folosit in spital) se vor pastra in sac intr-un loc separat (preferabil pe balcon) timp de 5 zile, ulterior vor fi spalate la masina de spalat haine (la cea mai mare temperatura permisa de producator) cu dezinfectant pentru haine si calcate ulterior. Se vor folosi manusi pentru manipularea hainelor, care ulterior vor fi aruncate si va veti spala pe mcu apa si sapun. Telefonul, ceasul si alte obiecte electronice se vor dezinfecta cu servetele impregnate cu alcool.

Masuri de igiena individuala de respectat la domiciliu:

Sa se evite contactul apropiat cu celelalte persoane din locuinta si, daca este posibil, sa se izoleze camera separata, cu baie separata.

Daca se foloseste aceeasi baie, aceasta va fi dezinfectata dupa folosire, se va dezinfecta toaleta si toate obiectele atinse (inclusiv clante, intrerupatoare). Dezinfectarea se va face cu solutii pe baza de clor (ex. Domestos) sau alcool (min 70 %).

Sa nu primeascvizitatori in perioada de izolare la domiciliu/locatia declarata.

Sa se spele pe maini cu apa si sapun, timp de cel putin 20 de secunde, ori de cate ori este necesar (dupa utilizarea toaletei, inaintea pregatirii mesei, etc).

Sa curate si sa dezinfecteze zilnic toate suprafetele pe care le atinge frecvent (ex: mese, clante, obiecte de mobilier, bateria/robinetele de la chiuveta, alte obiecte care pot fi atinse si de alte persoane).

Sa isi acopere gura si nasul cu servetel de unica folosinta sau cu o tesatura atunci cand stranuta sau tuseste, sau sa stranute si sa tuseasca in plica cotului. Batista se arunca imediat la gunoi, in sac de plastic, dupa care se spala pe maini cu apa si sapun timp de 20 de secunde.

Sa pastreze distanta de minim 1,5 m atunci cand se intalneste cu alte persoane.

Sa poarte masca cand se intalneste cu alte persoane. Masca trebuie sa acopere nasul si gura.

Purtarea mastii este una dintre masurile de prevenire si limitare pentru raspandirea anumitor boli respiratorii, inclusiv cea determinata de noul coronavirus. Cu toate acestea, doar utilizarea unei masti nu este suficienta pentru a asigura un nivel adecvat de protectie si ar trebui adoptate si alte masuri la fel de relevante. Folosirea mastii trebuie combinata cu igiena adecvata a mainilor si cu alte masuri de prevenire si control a transmiterii noului coronavirus de la om la om.

- -in timpul utiliztrebuie sa evitati atingerea mastii;
- -sa indepartati masca folosind tehnica adecvata (nu atingeti partea din fata, ci indepartati snururile din spate), actiune urmata de spalarea IMEDIATA a mainilor cu apa si sapun;
- -sa nu reutilizati mastile de unica folosinta. Masca se schimba la maxim 4 ore sau mai repede caz de umezire.

### Monitorizarea dupa externare:

Monitorizarea starii de sanatate a pacientului pe perioada izolarii la domicliu se face de catre medicul de familie zilnic, prin sistemul de telemedicina. Pacientii care nu sunt inscrisi pe lista unui medic de familie vor fi monitorizati zilnic de catre DSP judeteana. In cazul aparitiei unor probleme de sanatate se va lua legatura telefonica cu medicul de familie sau se va suna la 112.

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

Indicatie pentru revenire la internare
X Nu, nu este necesara revenirea pentru internare
Se completează obligatoriu una din cele două informatii:  -
- S-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu
- X Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu deoarece nu a fost necesar
cu viza Unitatii judetene de implementare a programului, pentru diabet)
Unitate judeteana de diabet zaharat:

Un exemplar se constituie scrisoare medicala si se inmaneaza in termen de 72 de ore medicului de familie.

\*conform contractului cadru/2014 - model scrisoare medicala/Bilet de iesire - anexa 43

Nr. inregistrare al asiguratului:

Data 17.08.2020

**Sef sectie:** 

Dr. SABOU MIHAELA

Medic primar

Dr. MIHAELA SABOU medic prima boli infectional A71371 Medic curant:

**Medic rezident:** 

Dr. IUBU ROXANA Medic primar

Dr. ROXANA IUBU medic primar boli-infectioase medic specially pediatrie cod D51627

Calea de transmitere:

- prin asigurat
- prin posta .....

-----

\*) Scrisoarea medicala se intocmeste în doua exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii , într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;