

BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA *)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca **BARCSA MARCO**, nascut la data de **01.01.2013**, CNP / cod unic de asigurare **5130101267395**, Adresa: **Jud.CLUJ Loc.Dej Str.1 MAI Nr.182 Bl.E Ap.35** a fost internat in serviciul nostru in perioada: **02.05.2020 01:44 - 15.05.2020 11:16**, FO: **14306 F.O.** / nr. din Registrul de consultatii **BOLI INFECTIOASE VI-COPII** si se externeaza: **VINDECAT**

Diagnostic:

INFECTIE COVID-19 FORMA USOARA. TRAHEITA ACUTA. ABCES DENTAR.
HIPEREOZINOFILIE

Motivale prezentarii

Anamneza

- factori de risc

Examen clinic

- general

- local

Examene de laborator:

02.05.2020

APTT - APTT (sec) 23.9 [22.1 - 28.1], - APTT (%) [-], **Creatinina** - 0.58 [0.4 - 0.6],
Feritina - 28.4 [9.0 - 306.8], **Fibrinogen** - 295 [180 - 400], **Glicemie** - 91 [60 - 100], **GOT**
- 31 [0 - 45], **GPT** - 19 [0 - 45], **Hemoleucograma completa** - Leucocite 8.00 [4.0 - 10.0], -
Hematii 4.99 [3.9 - 5.7], - Hemoglobina 13.2 [11.3 - 15.3], - Hematocrit 38.2 [33.0 - 45.0],
- VEM 76.6 [72.0 - 99.6], - HEM 26.5 [24.0 - 34.0], - CHEM 34.6 [31.0 - 35.0], -
Trombocite 310 [150 - 450], - NEUT% 51.0 [37 - 65], - LYMPH% 32.9 [27 - 50], -
MONO% 8.3 [3.0 - 10.0], - EO% 7.0 [0 - 5], - BASO% 0.8 [0 - 2], - NEUT# 4.09 [1.5 - 6
], - LYMPH# 2.63 [1.5 - 4.0], - MONO# 0.66 [0.15 - 1.3], - EO# 0.56 [0.00 - 0.67], -
BASO# 0.06 [0 - 0.13], - RDW-CV 13.7 [9.9 - 15.5], - PDW* 13.1 [10 - 16.5], - MPV
10.4 [6.5 - 14.0], **K** - 4.4 [3.5 - 5.1], **LDH** - 211 [120 - 300], **Na** - 141 [136 - 146],
Proteina C reactiva - 0.19 [0 - 1], **Timp de protrombina** - PT (sec) (plasma) 11.7 [8.9 - 13.1
], - PT (%) (plasma) 86.7 [70 - 130], - INR (plasma) 1.06 [0.8 - 1.2], **Trigliceride** - 128 [0 -
150], **Uree** - 49.5 [0 - 50], **VSH** - 16 [1 - 15], **D-Dimeri** - 0.29 [0 - 0.55]

06.05.2020

APTT - APTT (sec) 24.1 [22.1 - 28.1], - APTT (%) [-], **Creatinina** - 0.66 [0.4 - 0.6],
Feritina - 40.1 [9.0 - 306.8], **Fibrinogen** - 366 [180 - 400], **Glicemie** - 78 [60 - 100], **GOT**
- 27 [0 - 45], **GPT** - 16 [0 - 45], **Hemoleucograma completa** - Leucocite 9.25 [4.0 - 10.0], -
Hematii 5.10 [3.9 - 5.7], - Hemoglobina 13.5 [11.3 - 15.3], - Hematocrit 39.1 [33.0 - 45.0],
- VEM 76.7 [72.0 - 99.6], - HEM 26.5 [24.0 - 34.0], - CHEM 34.5 [31.0 - 35.0], -
Trombocite 262 [150 - 450], - NEUT% 52.7 [37 - 65], - LYMPH% 28.6 [27 - 50], -
MONO% 8.1 [3.0 - 10.0], - EO% 10.3 [0 - 5], - BASO% 0.3 [0 - 2], - NEUT# 4.87 [1.5 - 6
], - LYMPH# 2.65 [1.5 - 4.0], - MONO# 0.75 [0.15 - 1.3], - EO# 0.95 [0.00 - 0.67], -
BASO# 0.03 [0 - 0.13], - RDW-CV 13.3 [9.9 - 15.5], - PDW* 12.7 [10 - 16.5], - MPV
10.9 [6.5 - 14.0], **K** - 4.7 [3.5 - 5.1], **LDH** - 222 [120 - 300], **Na** - 139 [136 - 146],
Proteina C reactiva - 0.59 [0 - 1], **Timp de protrombina** - PT (sec) (plasma) 11.3 [8.9 - 13.1
], - PT (%) (plasma) 93.5 [70 - 130], - INR (plasma) 1.03 [0.8 - 1.2], **Trigliceride** - 109 [0 -

150], Uree - 62 [0 - 50], VSH - 17 [1 - 15], D-Dimeri - 0.40 [0 - 0.55]

13.05.2020

Covid-19 (SARS-CoV-2) - Nedetectabil [Nedetectabil -]

14.05.2020

Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgG - Incert (Index=0.801) [Index < 0.8 Nonreactiv >= 0.8 - < 1.2 Incert > =1.2 Reactiv -], **Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgM** - Nonreactiv (Index=0.381) [Index < 0.8 Nonreactiv >= 0.8 - < 1.2 Incert > =1.2 Reactiv -], **Covid-19 (SARS-CoV-2)** - Nedetectabil [Nedetectabil -]

Examene paraclinice:

EKG

ECO

Rx

T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 2.05.2020RGR PULM D=1.6 Gym2Fara leziuni pulmonare focale sau infiltrative vizibile rgr.Fara colectii pleurale.Cord, aorta radiologic normale. || T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 10.05.2020RG PULM D= 2.6 Gym2Fara leziuni pulmonare evidente rgr.

Altele

Tratament efectuat

ALGOZONE 500MG X 20 CPR LABORMED || HEPIFLOR BABY*10PL || PARACETAMOL 500MG - MAGISTRA || PARACETAMOL SUP. 125MG*10buc || PARACETAMOL SUPOZ. 125MG*6SUP. SINTOFARM. || PARACETAMOL SUPOZ.125mg Antibiotica || SIROP PATLAGINA*100ML VTL || SOL. CONTRA AFTELOR || SUNLYTE 8 PLICURI/CUT || ZINNAT 125MG/5ML SUSP.

Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului:

EPICRIZA

Pacient in varsta de 7 ani, afirmativ cu operatie pe cord efectuata la varsta de 4 luni (nu detinem documente in acest sens iar parintii nu pot preciza afectiunea ptr care a fost operat), este internat in serviciul nostru ptr confirmarea infectiei cu Sars-Cov 2 (COVID-19, cod CJ 5963/2020). Din ancheta epidemiologica retinem ca este contact cu alti 5 membrii ai famniliei, confirmati si ei cu aceeasi infectie, nu a fost vaccinat antigripal, dar afirmativ este vaccinat cu restul vaccinurilor obligatorii.

Obiectiv la internare : pacient afebril, G=21 kg, cu stare generala buna, carii dentare multiple, fara congestie faringo-amigdaliana, stetacustic pulmonar : murmur vezicular prezent bilateral, cu raluri bronsice diseminate, FR = 15/min, Sat O2 = 97%, cicatrice postoperatorie anterioara, zgomote cardiace ritmice AV = 81/min, TA = 96/51 mmHg, fara sufluri adaugate, abdomen suplu, nedureros la palpare, fara organomegalii, tranzit intestinal normal, diureza normala, fara semne de iritatie meningeana.

Paraclinic : fara sindrom inflamator, hipereozinofilie, feritina si D-dimerii in limite normale. S-a efectuat in dinamica radiografie pulmonara ce nu a relevat modificari patologice.

Testul rt Sars-Cov 2: Nedetectabil!! (14.05.20)

Testul rt Sars-CoV 2: Nedetectabil!! (15.05.20)

Anticorpii IgM Sars-Cov 2 au fost non-reactivi. Anticorpii anti Sars Cov-2 IgG au avut valoare incerta.

Se instituie tratament cu sirop expectorant Patlagina (3x5 ml/zi), Sunlyte, simptomatic, antialgic. A prezentat pe parcursul internarii, dureri la nivelul arcadei dentare inferioare cu usoara tumefiere la acest nivel, ridicandu-se suspiciunea unui abces dentar, motiv ptr care se introduce in schema de tratament Zinnat sirop 125 mg/5 ml (3 x 7 ml/zi), Hepiflor 1 plic/zi, sub care evolutia clinica ulterioara a fost favorabila. Se externeaza cu recomandarile :

Tratament recomandat

Recomandari la externare:

Avand in vedere ca la acest moment nu se poate face dovada imunitatii protectoare dupa vindecarea infectiei cu SARS-CoV-2 se recomanda repaus relativ la domiciliu 14 zile dupa externare. Dupa ce

ajungeti acasa se recomanda efectuarea dusului, hainele cu care ati plecat acasa se vor pune sac de gunoi (fara a fi scuturate). Hainele (inclusiv hainele care pe care le-ati folosit spital) se vor pastra sac loc separat (balcon) timp de 5 zile, ulterior vor fi spalate la masina de spalat haine (la cea mai mare temperatura permisa de producator) cu dezinfectant pentru haine si calcate ulterior. Se vor folosi manusi pentru manipularea hainelor, care ulterior vor fi aruncate si va veti spala pe maini cu apa si sapun. Telefonul, ceasul si alte obiecte electronice se vor dezinfecta cu servetele impregnate cu alcool.

Ce masuri de igiena individuala trebuie sa respecte persoanele izolate la domiciliu?

- Sa evite contactul apropiat cu celelalte persoane din locuinta si, daca este posibil, sa se izoleze camera separata, cu baie separata.
- Daca se foloseste aceeasi baie, aceasta va fi dezinfectata dupa folosire, se va dezinfecta toaleta si toate obiectele atinse (inclusiv clante, Dezinfectarea se va face cu solutii pe baza de clor (Domestos) sau alcool (min 70 %).
- Sa nu primeasca vizitatori perioada de autoizolare la domiciliu.
- Sa se spele pe maini cu apa si sapun, timp de cel putin 20 de secunde, ori de cate ori este necesar (dupa utilizarea toaletei, pregatirii mesei, etc).
- Sa curate si sa dezinfecteze zilnic toate suprafetele pe care le atinge frecvent (ex: mese, clante, obiecte de mobilier, bateria/robinetele de la chiuveta, alte obiecte care pot fi atinse si de alte persoane).
- Sa si acopere gura si nasul cu servetel de unica folosinta sau cu o tesatura atunci cand stranuta sau tuseste, sau sa stranute si sa tuseasca plica cotului. Batista se arunca imediat la gunoi, sac de plastic, dupa care se spala pe maini cu apa si sapun timp de 20 de secunde.
- Sa poarte masca cand se intalneste cu alte persoane.
- Purtarea mastii este una dintre masurile de prevenire si limitare pentru raspandirea anumitor boli respiratorii, inclusiv cea determinata de noul coronavirus. Cu toate acestea, doar utilizarea unei masti nu este suficienta pentru a asigura un nivel adecvat de protectie si ar trebui adoptate si alte masuri la fel de relevante. Folosirea mastii trebuie combinata cu igiena adecvata a mainilor si cu alte masuri de prevenire si control a transmiterii noului coronavirus de la om la om.
- In timpul utilizarii, trebuie sa evitati atingerea mastii
- Sa indepartati masca folosind tehnica adecvata (nu atingeti partea din fata, ci ti snururile din spate), actiune urmata de spalarea IMEDIATA a mainilor cu apa si sapun;
- Sa nu reutilizati mastile de unica folosinta!!!! Masca se schimba la maxim 4 ore sau mai repede in caz de umezire.
- In cazul aparitiei unor probleme de sanatate se va lua legatura telefonica cu medicul de familie sau se va suna la 112.

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

Indicatie pentru revenire la internare

☒ Nu, nu este necesara revenirea pentru internare

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat prescriptie medicală, caz în care se va înscrie seria si numarul acesteia
- ☐ Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu a fost necesar
- ☒ Nu s-a eliberat prescriptie medicala

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat concediu medical la externare, caz în care se va înscrie seria si numarul acestuia
- ☐ Nu s-a eliberat concediu medical la externare deoarece nu a fost necesar
- ☒ Nu s-a eliberat concediu medical la externare

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu
- ☒ Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu, deoarece nu a fost necesar

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

Un exemplar se constituie scrisoare medicala si se inmaneaza in termen de 72 de ore medicului de familie.

*conform contractului cadru/2014 - model scrisoare medicala/Bilet de iesire - anexa 43

- ☐ S-a eliberat prescripție medicală pentru dispozitive medicale în ambulatoriu
- ☒ Nu s-a eliberat prescripție medicală pentru dispozitive medicale în ambulatoriu deoarece nu a fost necesar

(cu viza Unității județene de implementare a programului, pentru diabet)

Unitate județeană de diabet zaharat:	
Nr. înregistrare al asiguratului:	

Data 15.05.2020

Sef secție:

Dr. SABOU MIHAELA

Medic primar

Dr. MIHAELA SABOU
medic primar
boli infecțioase
A71373

Medic curant:

Dr. MOSUTIU LAURA

Medic rezident:

Dr. Laura Moșuțiu
medic primar boli infecțioase
cod: 945657

Calea de transmitere:

- prin asigurat
- prin posta

*) Scrisoarea medicală se întocmește în două exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultația/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicală sau biletul de ieșire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externării, într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;

Un exemplar se constituie scrisoarea medicală și se înmânează în termen de 72 de ore medicului de familie.

*conform contractului cadru/2014 - model scrisoarea medicală/Bilet de ieșire - anexa 43