

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca Str. Iuliu Moldovan Nr. 23, 400348 Tel: +40-264-594655/565758; 593105. Fax: +40-264-593105;

E-mail: infectioasecj@yahoo.com web:



BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA *)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca BERESKI INOKE, nascut la data de 22.11.2014, CNP / cod unic de asigurare 6141122125819, Adresa: Jud.CLUJ Loc.Gherla Str.L. REBREANU Nr.8 a fost internat in serviciul nostru in perioada: 28.07.2020 16:02 - 05.08.2020 15:45, FO: 18400 F.O. / nr. din Registrul de consultatii BOLI INFECTIOASE VI-COPII si se externeaza: AMELIORAT

Diagnostice:

INFECTIE COVID-19 FORMA ASIMPTOMATICA

Motivele prezentarii			
Anamneza			
- factori de risc			
Examen clinic			
- general			
- local			
04.08.2020			
	ARS-CoV-2) - Detectabil [Nedetectabil -], APTT - APTT (sec) 21.8 [22.1 - 28.1		
,) [-], ASLO - 15 [0.0 - 200.0], Creatinina - 0.44 [0.32 - 0.59], D-Dimeri -		
=	5], Fibrinogen - 345 [180 - 400], Glicemie - 95 [60 - 100], GOT - 37 [0 - 35],		
_	- 35], Hemoleucograma completa - Leucocite 8.7 [5.0 - 13.0] , - Hematii 5.53 [
3.5 - 5.3] , -]	Hemoglobina 15.2 [10.0 - 14.8] , - Hematocrit 43.9 [31.0 - 45.0] , - VEM 79.4 [
72.0 - 100.0]	, - HEM 27.4 [24.0 - 34.0] , - CHEM 34.5 [31.0 - 35.0] , - RDW-CV% 12.7 [
9.9 - 15.5] , -	Trombocite 272 [150 - 450] , - MPV 8.1 [6.5 - 14.0] , - NEUT% 27.42 [30 - 55		
], - LYMPH9	% 61.43 [38 - 60] , - MONO% 8.25 [3.0 - 10.0] , - EO% 2.30 [0 - 5] , -		
BASO% 0.60	[0 - 2] , - NEUT# 2.395 [1.5 - 8.5] , - LYMPH# 5.366 [1.5 - 5.5] , - MONO#		
0.720 [0.15 -	1.3] , - EO# 0.201 [0.00 - 0.67] , - BASO# 0.052 [0 - 0.13], K - 5.0 [3.5 - 5.1		
], Na - 144 [1	36 - 146], Proteina C reactiva - 0.01 [0 - 1], Timp de protrombina - PT (sec)		
(plasma) 10.2	[9.4 - 13.6] , - PT (%) (plasma) 130.0 [70 - 130] , - INR (plasma) 0.88 [0.8 -		
	eride - 105 [0 - 150], Uree - 34 [0 - 50], VSH - 4 [1 - 20], Anticorpi anti		
	2 IgG - Nonreactiv(Index=0,575) [Index < 0.8 Nonreactiv>= 0.8 - < 1.2 Incert >		
	-], Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgM - Nonreactiv(Index=0,173) [Index < 0.8		
	0.8 - < 1.2 Incert > = 1.2 Reactiv -]		
28.07.2020			
	ARS-CoV-2) - Detectabil [Nedetectabil -], APTT - APTT (sec) 22.6 [22.1 - 28.1		
=) [-], Creatinina - 0.38 [0.32 - 0.59], Feritina - 40.5 [9.0 - 306.8], Fibrinogen		
_	400], Glicemie - 96 [60 - 100], GOT - 30 [0 - 35], GPT - 18 [0 - 35],		
U	rama completa - Leucocite 6.5 [5.0 - 13.0] , - Hematii 5.25 [3.5 - 5.3] , -		
-	14.7 [10.0 - 14.8] , - Hematocrit 41.6 [31.0 - 45.0] , - VEM 79.3 [72.0 - 100.0]		
	[24.0 - 34.0] , - CHEM 35.3 [31.0 - 35.0] , - RDW-CV% 12.8 [9.9 - 15.5] , -		
	54 [150 - 450] , - MPV 8.5 [6.5 - 14.0] , - NEUT% 27.25 [30 - 55] , -		
	.48 [38 - 60] , - MONO% 11.05 [3.0 - 10.0] , - EO% 6.46 [0 - 5] , - BASO%		
0.7610-21.	- NEUT# 1.773 [1.5 - 8.5] LYMPH# 3.546 [1.5 - 5.5] MONO# 0.719 [

0.15 - 1.3], - EO# 0.420 [0.00 - 0.67], - BASO# 0.050 [0 - 0.13], **K** - 5.1 [3.5 - 5.1], **LDH**

- 270 [120 - 300], Na - 140 [136 - 146], Proteina C reactiva - 0.01 [0 - 1], Timp de
protrombina - PT (sec) (plasma) 10.0 [9.4 - 13.6] , - PT (%) (plasma) 130.0 [70 - 130] , -
INR (plasma) 0.86 [0.8 - 1.2], Trigliceride - 104 [0 - 150], Uree - 31 [0 - 50], VSH - 2 [1 -
20], D-Dimeri - 0.35 [0 - 0.55]
29.07.2020
Exudat faringian-Cultura - Fara streptococ beta hemolitic [-]

Exame	ene paraclinice:
EKG	
ECO	
Rx	
	T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 29.07.2020RGR.PULM.D=2.6 Gym2Fara leziuni pleuro-pulmonare evidente rgr.Cord de aspect rgr normal. T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 05.08.2020RGR.PULM.D=1.4

Altele

Tratament efectuat

BIOFLU BABY 120mg/5ml sirop*100ml

Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului: EPICRIZA

Gym2Fara leziuni active pleuro-pulmonare decelabile rgr.

Pacienta in varsta de 5 ani, al doilea copil provenit din sarcina la termen, nastere prin sectiune cezariana, GN=3400gr, IN=55cm, vaccinata conform BMS, cunoscuta cu dermatita atopica, posibil alergica la Penicilina- dar fara documentatie medicala, se interneaza ptr confirmarea infectiei SARS-CoV2. Pacienta prezinta contact cu caz confirmat COVID-19 - mama, tatal si bunica, care sunt internati in serviciul nostru. Pacienta este afirmativ asimptomatica, ulterior fiind confirmata infectia COVID-19 in 29.07.2020.

Obiectiv: stare generala buna, afebrila, mucoase si tegumente normal colorate, hidratate, stabila cardio-respirator, MV fiziologic bilateral, fara raluri supraadaugate, SpO2=98%aa, zgomote cardiace ritmice, bine batute, fara sufluri audibile, AV=112bpm, abdomen liber, fara sensibilitate la palpare, fara organomegalii, fara semne de iritatie meningeana sau de focar neurologic.

Biologic nu se deceleaza modificari patologice, probe renale si hepatice in limite normale, fara diselectrolitemii, indici ai coagularii in limite normale, D-dimeri in limite normale. Cultura din exsudatul faringian este fara streptococ B-hemolitic.

Radiografia pulmonara (29.07 si 05.08) nu descrie leziuni active pleuro-pulmonare.

Proba nr.1/rt PCR SARS CoV2/29.07.2020: DETECTABIL

Proba nr.2/ rt PCR SARS CoV2/05.08.2020: DETECTABIL

Ac Ig M si Ig G SARS-CoV2: in lucru la momentul externarii.

Sub repaus, regim igieno-dietetic, evolutia a fost favorabila. Pacienta nu a primit tratament conform Protocolului National, fiind asimptomatica. Se externeaza conform Ordinului nr 1321/22.07.2020, cu stare generala buna, afebrila, apetenta, fara acuze, cu recomandarile ulterioare.

Tratament recomandat

Pacientii asimptomatici cu factori de risc/forme usoare cu test de control pozitiv externati la 10 zile:

- Conform Ordinului 1321/22.07.2020 se indica izolare la domicliu/locatia declarata pe o perioada de 6 zile de la externare. In aceasta perioada nu se va parasi domiciliul/locatia declarata.
- Acestia pot desfasura activitatile curente si profesionale cu pastrarea distantarii si purtarea mastii acasa si la locul de munca pentru inca 10 zile, dupa incheierea perioadei de izolare.
- daca in urmatoarele 3-4 saptamani dupa externare se constata aparitia febrei, eruptiei cutanate, dureri articulare sau alte manifestari insotite de febra sau dificultati de respiratie va solicita consultul medicului de familie sau, dupa caz, medicul pediatru.

Dupa ce ajungeti acasa se recomanda efectuarea dusului, hainele cu care ati plecat acasa se vor pune intr-un sac impermeabil (fara a fi scuturate). Hainele (inclusiv hainele care pe care le-ati folosit in spital) se vor pastra in sac intr-un loc separat (preferabil pe balcon) timp de 5 zile, ulterior vor fi spalate la masina de spalat haine (la cea mai mare temperatura permisa de producator) cu dezinfectant pentru haine si calcate ulterior. Se vor folosi manusi pentru manipularea hainelor, care ulterior vor fi aruncate si va veti spala pe mcu apa si sapun. Telefonul, ceasul si alte obiecte electronice se vor dezinfecta cu servetele impregnate cu alcool.

Masuri de igiena individuala de respectat la domiciliu:

Sa se evite contactul apropiat cu celelalte persoane din locuinta si, daca este posibil, sa se izoleze camera separata, cu baie separata.

Daca se foloseste aceeasi baie, aceasta va fi dezinfectata dupa folosire, se va dezinfecta toaleta si toate obiectele atinse (inclusiv clante, intrerupatoare). Dezinfectarea se va face cu solutii pe baza de clor (ex. Domestos) sau alcool (min 70 %).

Sa nu primeascvizitatori in perioada de izolare la domiciliu/locatia declarata.

Sa se spele pe maini cu apa si sapun, timp de cel putin 20 de secunde, ori de cate ori este necesar (dupa utilizarea toaletei, inaintea pregatirii mesei, etc).

Sa curate si sa dezinfecteze zilnic toate suprafetele pe care le atinge frecvent (ex: mese, clante, obiecte de mobilier, bateria/robinetele de la chiuveta, alte obiecte care pot fi atinse si de alte persoane).

Sa isi acopere gura si nasul cu servetel de unica folosinta sau cu o tesatura atunci cand stranuta sau tuseste, sau sa stranute si sa tuseasca in plica cotului. Batista se arunca imediat la gunoi, in sac de plastic, dupa care se spala pe maini cu apa si sapun timp de 20 de secunde.

Sa pastreze distanta de minim 1,5 m atunci cand se intalneste cu alte persoane.

Sa poarte masca cand se intalneste cu alte persoane. Masca trebuie sa acopere nasul si gura.

Purtarea mastii este una dintre masurile de prevenire si limitare pentru raspandirea anumitor boli respiratorii, inclusiv cea determinata de noul coronavirus. Cu toate acestea, doar utilizarea unei masti nu este suficienta pentru a asigura un nivel adecvat de protectie si ar trebui adoptate si alte masuri la fel de relevante. Folosirea mastii trebuie combinata cu igiena adecvata a mainilor si cu alte masuri de prevenire si control a transmiterii noului coronavirus de la om la om.

- -in timpul utiliztrebuie sa evitati atingerea mastii;
- -sa indepartati masca folosind tehnica adecvata (nu atingeti partea din fata, ci indepartati snururile din spate), actiune urmata de spalarea IMEDIATA a mainilor cu apa si sapun;
- -sa nu reutilizati mastile de unica folosinta. Masca se schimba la maxim 4 ore sau mai repede caz de umezire.

Monitorizarea dupa externare:

Monitorizarea starii de sanatate a pacientului pe perioada izolarii la domicliu se face de catre medicul de familie zilnic, prin sistemul de telemedicina. Pacientii care nu sunt inscrisi pe lista unui medic de familie vor fi monitorizati zilnic de catre DSP judeteana. In cazul aparitiei unor probleme de sanatate se va lua legatura telefonica cu medicul de familie sau se va suna la 112.

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

Indicatie pentru revenire la internare

x Nu, nu este necesara revenirea pentru internare

Se completează obligatoriu una din cele două informati	i:					
- S-a eliberat prescriptie medicalã, caz în care se v	va înscrie seria si numarul acesteia					
- Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu a fost necesar						
- X Nu s-a eliberat prescriptie medicala						
Se completează obligatoriu una din cele două informati	i:					
- S-a eliberat concediu medical la externare, caz în care se va înscrie seria si numarul acestuia						
- Nu s-a eliberat concediu medical la externare deoarece nu a fost necesar						
- X Nu s-a eliberat concediu medical la externare						
Se completeazã obligatoriu una din cele douã informatii:						
- S-a eliberat recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu						
- X Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri med	- X Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu,					
deoarece nu a fost necesar						
Se completeazã obligatoriu una din cele douã informati	i:					
- S-a eliberat prescriptie medicalã pentru dispozitive medicale in ambulatoriu						
- X Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu deoarece						
nu a fost necesar						
Z - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -						
(cu viza Unitatii judetene de implementare a programului, p	bentru diabet)					
Unitate judeteana de diabet zaharat:						
Nr. inregistrare al asiguratului:						
Data 05.08.2020						
Sef sectie:	Medic curant:	Medic rezident:				
Dr. SABOU MIHAELA	Dr. MOSUTIU LAURA					
Medic primar						
medic prima boli infections A71373	Dr. Laura Moșuțiu medic primar boli Infecțioase cod: 945657					
Calea de transmitere:						
- prin asigurat						
- prin posta						

*) Scrisoarea medicala se intocmeste în doua exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii , într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;