

BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA *)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca **POPOVICI ALEXANDRU-TUDOR**, nascut la data de **05.02.1988**, CNP / cod unic de asigurare **1880205125771**, Adresa: **Jud.CLUJ Loc.Cluj Napoca Str.AUREL VLAICU Nr.48 Ap.54** a fost internat in serviciul nostru in perioada: **05.08.2020 16:54 - 12.08.2020 13:30**, FO: **18951 F.O.** / nr. din Registrul de consultatii **BOLI INFECTIOASE III-ADULTI** si se externeaza: **AMELIORAT**

Diagnostic:

INFECTIE CU SARS-COV-2 FORMA USOARA
ENTEROCOLITA ACUTA REMISA

Motivale prezentarii

Anamneza

- factori de risc

Examen clinic

- general

- local

Examen de laborator:

05.08.2020

APTT - APTT (sec) 24.0 [22.1 - 28.1], - **APTT (%)** [-], **Creatinina** - 0.99 [0.7 - 1.2], **D-Dimeri** - 0.19 [0 - 0.55], **Fibrinogen** - 328 [180 - 400], **Glicemie** - 88 [70 - 105], **GOT** - 24 [0 - 45], **GPT** - 29 [0 - 45], **Hemoleucograma completa** - Leucocite 4.0 [3.7 - 9.5], - Hematii 4.83 [4.32 - 5.66], - Hemoglobina 14.7 [13.3 - 17.6], - Hematocrit 43.2 [39.0 - 51.0], - VEM 89.3 [82.0 - 98.0], - HEM 30.3 [25.0 - 33.0], - CHEM 33.9 [31.6 - 35.8], - RDW-CV% 13.5 [9.9 - 15.5], - Trombocite 206 [150 - 450], - MPV 9.4 [6.5 - 14.0], - NEUT% 33.82 [40 - 70], - LYMPH% 51.31 [20 - 40], - MONO% 8.80 [3.0 - 10.0], - EO% 4.77 [0 - 5], - BASO% 1.30 [0 - 2], - NEUT# 1.337 [1.5 - 6.6], - LYMPH# 2.030 [1.1 - 3.5], - MONO# 0.348 [0.21 - 0.92], - EO# 0.188 [0.00 - 0.67], - BASO# 0.052 [0 - 0.13], **K** - 4 [3.5 - 5.1], **LDH** - 152 [0 - 250], **Na** - 139 [136 - 146], **Proteina C reactiva** - 0.58 [0 - 1], **Timp de protrombina** - PT (sec) (plasma) 10.6 [9.4 - 13.6], - PT (%) (plasma) 119.3 [70 - 130], - INR (plasma) 0.91 [0.8 - 1.2], **Uree** - 28.8 [0 - 50], **VSH** - 9 [1 - 15]

10.08.2020

Covid-19 (SARS-CoV-2) - Detectabil [Nedetectabil -], **Creatinina** - 0.94 [0.7 - 1.2], **Gama GT** - 15 [0 - 60], **GOT** - 17 [0 - 45], **GPT** - 22 [0 - 45], **Hemoleucograma completa** - Leucocite 5.2 [3.7 - 9.5], - Hematii 4.65 [4.32 - 5.66], - Hemoglobina 14.0 [13.3 - 17.6], - Hematocrit 40.9 [39.0 - 51.0], - VEM 88.0 [82.0 - 98.0], - HEM 30.1 [25.0 - 33.0], - CHEM 34.2 [31.6 - 35.8], - RDW-CV% 13.6 [9.9 - 15.5], - Trombocite 226 [150 - 450], - MPV 9.1 [6.5 - 14.0], - NEUT% 42.48 [40 - 70], - LYMPH% 40.20 [20 - 40], - MONO% 9.26 [3.0 - 10.0], - EO% 7.43 [0 - 5], - BASO% 0.63 [0 - 2], - NEUT# 2.215 [1.5 - 6.6], - LYMPH# 2.097 [1.1 - 3.5], - MONO# 0.483 [0.21 - 0.92], - EO# 0.388 [0.00 - 0.67], - BASO# 0.033 [0 - 0.13], **Proteina C reactiva** - 0.24 [0 - 1], **Uree** - 34 [0 - 50], **Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgG** - Nonreactiv (Index=0.635) [Index < 0.8 Nonreactiv >= 0.8 - < 1.2 Incert >= 1.2 Reactiv -], **Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgM** - Nonreactiv (Index=0.260) [Index < 0.8 Nonreactiv >= 0.8 - < 1.2 Incert >= 1.2 Reactiv -]

Examenen paraclinice:

EKG

ECO

Rx

T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 12.08.2020RG. PULM.D= Gym2Fara leziuni pleuro-pulmonare vizibile rgr. || T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 06.08.2020RG. PULM.-D=4.5 Gym2Fara leziuni active pleuro-pulmonare decelabile rgr.

Altele

Tratament efectuat

CLEXANE 6000UI (60MG)/ 0,6ML * 10 SER. PRE. || DESLORATADINA AUROBINDO 5MG*30CPR.FILM. || DIOSMECTITA *10 plicuri (REMEDIA) || ERIDIAROM || FRAXIPARINE 0.4ML 3800 UI || KALETRA 200mg/50mg*120cpr.filmate || PARACETAMOL 500MG ZENTIVA*20CPR || PLAQUENIL 200MG*60 compr.film. || RINGER 500 ML - BRAUN || VITAMINA C 1000mg*30cpr BERES || XYLO-NASAL PIC.NAZ.0.1% 10ML

Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului:

EPICRIZA

Pacient in varsta de 32 de ani cunoscut cu astm bronsic in APP, fara tratament de mai multi ani, se prezinta in serviciul nostru pentru febra (38 C), frisoane, astenie marcata, mialgii si disfagie debutate in data 31.07, disgeuzie, diaree apoasa, motiv pentru care se testeaza pentru infectie cu SARS-CoV-2 in serviciul IOCN, proba pozitiva in data de 03.08.2020.

Obiectiv la internare pacient cu stare generala minim influentata, constient, cooperant, cu tegumente si mucoase normal colorate si hidratate, murmur vezicular prezent bilateral, fara raluri (SatO2 98% in a.a., FR 16-18 resp/min), zgomote cardiace ritmice, sincrone cu pulsul, fara sufluri perceptibile auscultatoric (TA 110/70 mmHg, AV 80 bpm), abdomen crescut de volum pe seama adipozitatii, elastic, mobil cu respiratia, fara sensibilitate sau durere, fara organomegalii decelabile, Giordano negativ bilateral, fara semne de iritatie meningeana sau de focar neurologic.

Biologic RT PCR SARS-CoV-2 03.08.2020 - DETECTABIL - Proba nr 1

RT PCR SARS-CoV-2 11.08.2020 - DETECTABIL - Proba nr 2

Fara alte modificari biologice cu semnificatie patologica.

Pe perioada internarii pacientul a urmat tratament conform protocolului national cu Plaquenil 200mg (2-0-2 cp in prima zi, apoi 1-0-1 cp/zi timp de 7 zile), antiviral cu Kaletra 200mg/50mg 2-0-2 cp/zi timp de 7 zile, anticoagulant cu Clexane in doza profilactica timp de 7 zile si medicatie simptomatica cu evolutie favorabila in afebrilitate. Sindromul diareic a cedat rapid sub regim alimentar si probiotice. Se externeaza (ameliorat), fara acuze, stabil hemodinamic si respirator, radiografic fara modificari pulmonare si examinari de laborator in limite normale.

Tratament recomandat

Conform Ordinului 1321/22.07.2020 se indica izolare la domiciliu/locatia declarata pe o perioada de 4 zile de la externare. In aceasta perioada nu se va parasi domiciliul/locatia declarata.

Acestia pot desfasura activitatile curente si profesionale cu pastrarea distantarii si purtarea mastii acasa si la locul de munca pentru inca 10 zile, dupa incheierea perioadei de izolare.

Dupa ce ajungeti acasa se recomanda efectuarea dusului, hainele cu care ati plecat acasa se vor pune intr-un sac impermeabil (fara a fi scuturate). Hainele (inclusiv hainele care pe care le-ati folosit in spital) se vor pastra in sac intr-un loc separat (preferabil pe balcon) timp de 5 zile, ulterior vor fi spalate la masina de spalat haine (la cea mai mare temperatura permisa de producator) cu dezinfectant pentru haine si calcate ulterior. Se vor folosi manusi pentru manipularea hainelor, care ulterior vor fi aruncate si va veti spala pe mcu apa si sapun. Telefonul, ceasul si alte obiecte electronice se vor dezinfecta cu servetele impregnate cu alcool.

Masuri de igiena individuala de respectat la domiciliu:

Sa se evite contactul apropiat cu celelalte persoane din locuinta si, daca este posibil, sa se izoleze camera separata, cu baie separata.

Daca se foloseste aceeasi baie, aceasta va fi dezinfectata dupa folosire, se va dezinfecta toaleta si toate

obiectele atinse (inclusiv clante, intrerupatoare). Dezinfectarea se va face cu solutii pe baza de clor (ex. Domestos) sau alcool (min 70 %).

Sa nu primeascavizitatori in perioada de izolare la domiciliu/locatia declarata.

Sa se spele pe maini cu apa si sapun, timp de cel putin 20 de secunde, ori de cate ori este necesar (dupa utilizarea toaletei, inaintea pregatirii mesei, etc).

Sa curate si sa dezinfecteze zilnic toate suprafetele pe care le atinge frecvent (ex: mese, clante, obiecte de mobilier, bateria/robinetele de la chiuveta, alte obiecte care pot fi atinse si de alte persoane).

Sa isi acopere gura si nasul cu servetel de unica folosinta sau cu o tesatura atunci cand stranuta sau tuseste,sau sa stranute si sa tuseasca in plica cotului. Batista se arunca imediat la gunoi, in sac de plastic, dupa care se spala pe maini cu apa si sapun timp de 20 de secunde.

Sa pastreze distanta de minim 1,5 m atunci cand se intalneste cu alte persoane.

Sa poarte masca cand se intalneste cu alte persoane. Masca trebuie sa acopere nasul si gura.

Purtarea mastii este una dintre masurile de prevenire si limitare pentru raspandirea anumitor boli respiratorii, inclusiv cea determinata de noul coronavirus. Cu toate acestea, doar utilizarea unei masti nu este suficienta pentru a asigura un nivel adecvat de protectie si ar trebui adoptate si alte masuri la fel de relevante. Folosirea mastii trebuie combinata cu igiena adecvata a mainilor si cu alte masuri de prevenire si control a transmiterii noului coronavirus de la om la om.

-in timpul utiliztrebuie sa evitati atingerea mastii;

-sa indepartati masca folosind tehnica adecvata (nu atingeti partea din fata, ci indepartati snururile din spate), actiune urmata de spalarea IMEDIATA a mainilor cu apa si sapun;

-sa nu reutilizati mastile de unica folosinta. Masca se schimba la maxim 4 ore sau mai repede caz de umezire.

S-a eliberat concediu medical pe perioada 5-16 august 2020.

Monitorizarea dupa externare:

Monitorizarea starii de sanatate a pacientului pe perioada izolarii la domiciliu se face de catre medicul de familie zilnic, prin sistemul de telemedicina. Pacientii care nu sunt inscrisi pe lista unui medic de familie vor fi monitorizati zilnic de catre DSP judeteană.In cazul aparitiei unor probleme de sanatate se va lua legatura telefonica cu medicul de familie sau se va suna la 112.

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

Indicatie pentru revenire la internare

X Nu, nu este necesara revenirea pentru internare

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat prescriptie medicală, caz în care se va înscrie seria si numarul acesteia
- ☐ Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu a fost necesar
- ☒ Nu s-a eliberat prescriptie medicala

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

CCMAM 4945299

- ☒ S-a eliberat concediu medical la externare, caz în care se va înscrie seria si numarul acestuia
- ☐ Nu s-a eliberat concediu medical la externare deoarece nu a fost necesar
- ☐ Nu s-a eliberat concediu medical la externare

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu
- ☒ Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu, deoarece nu a fost necesar

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu
- ☒ Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu deoarece nu a fost necesar

(cu viza Unitatii judetene de implementare a programului, pentru diabet)

--	--

Un exemplar se constituie scrisoare medicala si se inmaneaza in termen de 72 de ore medicului de familie.

*conform contractului cadru/2014 - model scrisoare medicala/Bilet de iesire - anexa 43

Unitate judeteana de diabet zaharat:	
Nr. inregistrare al asiguratului:	

Data 12.08.2020

Sef sectie:

Conf. Dr. RADULESCU AMANDA

Medic primar

Dr. AMANDA RADULESCU
medic primar boli infecțioase
și epidemiologie
cod 063773

Medic curant:

Conf. Dr. RADULESCU AMANDA

Medic primar

Dr. AMANDA RADULESCU
medic primar boli infecțioase
și epidemiologie
cod 063773

Medic rezident:

Calea de transmitere:

- prin asigurat
- prin posta

*) Scrisoarea medicala se intocmeste în doua exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii , într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;