

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca Str. Iuliu Moldovan Nr. 23, 400348 Tel: +40-264-594655/565758; 593105. Fax: +40-264-593105;

E-mail: infectioasecj@yahoo.com web: www.infectioasecluj.ro



BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA *)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca **TAUT IOAN**, nascut la data de **25.07.1958**, CNP / cod unic de asigurare **1580725120682**, Adresa: **Jud.CLUJ Loc.Cluj Napoca Str.HATEG Nr.26 Ap.16** a fost internat in serviciul nostru in perioada: **12.08.2020 08:54 - 14.08.2020 13:30**, FO: **19502** F.O. / nr. din Registrul de consultatii **BOLI INFECTIOASE V-COPII** si se externeaza: **STATIONAR**

n:	agı	•	4:0	
IJ	agi	108	uc	е:

INFECTIE SARS-COV-2, FORMA ASIMPTOMATICA COVID-19 CU VIRUS IDENTIFICAT HTA

Motivele prezentarii	
Anamneza	
factori de risc	
Examen clinic	
general	
· local	
Examene de laborator:	
12.08.2020	
Acid Uric - 3.82 [3.4 - 7], APTT - APTT (sec) 21.9 [22.1 - 28.1] , - APTT (%) [-], Calciu	
total - 9.25 [8.4 - 10.6], Colesterol Total - 186 [109 - 200], Creatinina - 0.81 [0.7 - 1.2],	
D-Dimeri - 0.32 [0 - 0.55], Feritina - 149.6 [23.9 - 336.2], Fibrinogen - 209 [180 - 400],	
Fier - 124.4 [33 - 193], Glicemie - 97 [70 - 105], GOT - 26 [0 - 45], GPT - 37 [0 - 45],	
HDL-Colesterol - 37.9 [35 - 65], Hemoleucograma completa - Leucocite 7.3 [3.7 - 9.5] , -	
Hematii 4.77 [4.32 - 5.66] , - Hemoglobina 15.1 [13.3 - 17.6] , - Hematocrit 43.5 [39.0 - 51.0	
], - VEM 91.2 [82.0 - 98.0], - HEM 31.7 [25.0 - 33.0], - CHEM 34.7 [31.6 - 35.8], -	
RDW-CV% 13.2 [9.9 - 15.5], - Trombocite 208 [150 - 450], - MPV 8.7 [6.5 - 14.0], -	
NEUT% 71.33 [40 - 70] , - LYMPH% 21.87 [20 - 40] , - MONO% 5.79 [3.0 - 10.0] , - EO%	
0.26 [0 - 5] , - BASO% 0.75 [0 - 2] , - NEUT# 5.215 [1.5 - 6.6] , - LYMPH# 1.599 [1.1 -	
3.5], - MONO# 0.423 [0.21 - 0.92], - EO# 0.019 [0.00 - 0.67], - BASO# 0.055 [0 - 0.13],	
K - 4 [3.5 - 5.1], LDH - 198 [0 - 250], LDL - Colesterol - 130 [10 - 150], Lipide Totale -	
599 [375 - 750], Magneziu - 2.3 [1.7 - 2.6], Na - 139 [136 - 146], Proteina C reactiva -	
0.07 [0 - 1], Timp de protrombina - PT (sec) (plasma) 11.4 [9.4 - 13.6] , - PT (%) (plasma)	
101.2 [70 - 130] , - INR (plasma) 0.99 [0.8 - 1.2], Trigliceride - 90 [0 - 150], Uree - 47 [0 -	
50], VSH - 4 [1 - 15]	
Examene paraclinice:	
EKG	
ECO	

 $\mathbf{R}\mathbf{x}$

T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 12.08.2020RG. PULM.D=6 Gym2Exista voalare prin suprapuneri de parti moi in dreptul pectoralilor bilateral .SCD stg. opacifiat- posibila colectie pleurala in cantitate mica sau simfiza costo diafragmatica. La reevaluare rec. si incidenta LL stg. In rest fara leziuni pulmonare evidente rgr. Cord cu ICt normal.

Tratament efectuat

PARACETAMOL 500MG ZENTIVA*20CPR || VITAMINA C 1000mg*30cpr BERES

Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului: EPICRIZA

Pacient in varsta de 62 ani, cunoscut cu HTA in tratament cu Prestarium, se interneaza in serviciul nostru cu diagnosticul COVID-19. Mentionam faptul ca pacientul este asimptomatic, a avut contact cu un caz confirmat COVID-19 la locul de munca, a efectuat testare PCR SARS-COV-2 in data de 07.08, cu rezultat pozitiv. Internarea este temporizata din cauza lipsei de locuri.

Obiectiv la internare: pacient afebril, cu stare generala buna, tegumente normal colorate, mucoase uscate, limba saburala, stabil hemodinamic si respirator (TA= 160/100 mmHg, AV= 85/min, SpO2= 97% aa), MV prezent bilateral, fara raluri supraadaugate, zgomote cardiace ritmice, fara sufluri decelabile, abdomen liber, mobil cu respiratia, fara sensibilitate la plapare, tranzit intestinal prezent, diureza prezenta, fara semne de iritaie meningeana sau de focar neurologic.

Biologic: in limite normale

Radiografie toracica: se ridica suspiciunea unei posibile pleurezii stangi, insa in contextul suprapunerii de parti moi, mai probabil o simfiza costo-diafragmatica veche (confirmata de pacient in urma unei pneumonii vechi).

Pe parcursul internarii pacient a fost izolat, a urmat tratament medicamentos cu vitamina C si simptomatice la nevoie.

Se externeaza in afebrilitate, stabil hemodinamic si respirator, cu recomandari:

Tratament recomandat

Conform Ordinului 1321/22.07.2020 se indica izolare la domicliu/locatia declarata pana in 21.08 (pana la implinirea a 14 zile de la momentul primului test pozitiv). In aceasta perioada nu se va parasi domiciliul/locatia declarata.

Acestia pot desfasura activitatile curente si profesionale cu pastrarea distantarii si purtarea mastii acasa si la locul de munca pentru inca 10 zile, dupa incheierea perioadei de izolare.

Dupa ce ajungeti acasa se recomanda efectuarea dusului, hainele cu care ati plecat acasa se vor pune intr-un sac impermeabil (fara a fi scuturate). Hainele (inclusiv hainele care pe care le-ati folosit in spital) se vor pastra in sac intr-un loc separat (preferabil pe balcon) timp de 5 zile, ulterior vor fi spalate la masina de spalat haine (la cea mai mare temperatura permisa de producator) cu dezinfectant pentru haine si calcate ulterior. Se vor folosi manusi pentru manipularea hainelor, care ulterior vor fi aruncate si va veti spala pe mcu apa si sapun. Telefonul, ceasul si alte obiecte electronice se vor dezinfecta cu servetele impregnate cu alcool.

Masuri de igiena individuala de respectat la domiciliu:

Sa se evite contactul apropiat cu celelalte persoane din locuinta si, daca este posibil, sa se izoleze camera separata, cu baie separata.

? Daca se foloseste aceeasi baie, aceasta va fi dezinfectata dupa folosire, se va dezinfecta toaleta si toate obiectele atinse (inclusiv clante, intrerupatoare). Dezinfectarea se va face cu solutii pe baza de clor (ex. Domestos) sau alcool (min 70 %).

Sa nu primeasca vizitatori in perioada de izolare la domiciliu/locatia declarata.

Sa se spele pe maini cu apa si sapun, timp de cel putin 20 de secunde, ori de cate ori este necesar (dupa utilizarea toaletei, inaintea pregatirii mesei, etc).

Sa curate si sa dezinfecteze zilnic toate suprafetele pe care le atinge frecvent (ex: mese, clante, obiecte de mobilier, bateria/robinetele de la chiuveta, alte obiecte care pot fi atinse si de alte persoane).

Sa isi acopere gura si nasul cu servetel de unica folosinta sau cu o tesatura atunci cand stranuta sau tuseste, sau sa stranute si sa tuseasca in plica cotului. Batista se arunca imediat la gunoi, in sac de plastic, dupa care se spala pe maini cu apa si sapun timp de 20 de secunde.

Sa pastreze distanta de minim 1,5 m atunci cand se intalneste cu alte persoane.

Sa poarte masca cand se intalneste cu alte persoane. Masca trebuie sa acopere nasul si gura.

Purtarea mastii este una dintre masurile de prevenire si limitare pentru raspandirea anumitor boli respiratorii, inclusiv cea determinata de noul coronavirus. Cu toate acestea, doar utilizarea unei masti nu este suficienta pentru a asigura un nivel adecvat de protectie si ar trebui adoptate si alte masuri la fel de relevante. Folosirea mastii trebuie combinata cu igiena adecvata a mainilor si cu alte masuri de prevenire si control a transmiterii noului coronavirus de la om la om.

in timpul utilizarii, trebuie sa evitati atingerea mastii;

sa indepartati masca folosind tehnica adecvata (nu atingeti partea din fata, ci indepartati snururile din spate), actiune urmata de spalarea IMEDIATA a mainilor cu apa si sapun;

sa nu reutilizati mastile de unica folosinta. Masca se schimba la maxim 4 ore sau mai repede caz de umezire.

S-a eliberat concediu medical pe perioada 12-21.08.2020.

Monitorizarea dupa externare:

Monitorizarea starii de sanatate a pacientului pe perioada izolarii la domicliu se face de catre medicul de familie zilnic, prin sistemul de telemedicina. Pacientii care nu sunt inscrisi pe lista unui medic de familie vor fi monitorizati zilnic de catre DSP judeteana. In cazul aparitiei unor probleme de sanatate se va lua legatura telefonica cu medicul de familie sau se va suna la 112.

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

maicade pentru revenire la internare	
X Nu, nu este necesara revenirea pentru internare	
Se completează obligatoriu una din cele două informatii: - S-a eliberat prescriptie medicală, caz în care se va înscrie seria si numarul acesteia - Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu a fost necesar - Nu s-a eliberat prescriptie medicala	
Se completeazã obligatoriu una din cele douã informatii: CCMAM 4945620	
- X S-a eliberat concediu medical la externare, caz în care se va înscrie seria si numarul acest	uia
- Nu s-a eliberat concediu medical la externare deoarece nu a fost necesar	
- Nu s-a eliberat concediu medical la externare	
Se completeazã obligatoriu una din cele douã informatii:	
- S-a eliberat recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu	
- X Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu,	
deoarece nu a fost necesar	
Se completeazã obligatoriu una din cele douã informatii:	
- S-a eliberat prescriptie medicalã pentru dispozitive medicale in ambulatoriu	
- X Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu deoarece	
nu a fost necesar	
viza Unitatii judetene de implementare a programului, pentru diahet)	

Unitate judeteana de diabet zaharat:	
Nr. inregistrare al asiguratului:	

Data 14.08.2020

Sef sectie:

Dr. IUBU ROXANA

Medic primar

Dr. ROXANA IUBU medic primar bolt infectioase medic specialist pediatrie cod D51627

Medic curant:

Medic rezident:

Dr. MARCU CRISTIAN

Medic primar

Dr. MARCU CRISTIAN medic pri

Calea de transmitere:	
prin asigurat	
prin posta	

*) Scrisoarea medicala se intocmeste în doua exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii , într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;