

BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA *)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca **MOISIL ILINCA**, nascut la data de **10.06.2018**, CNP / cod unic de asigurare **6180610125789**, Adresa: **Jud.CLUJ Loc.Cluj Napoca Str.VALENTIN BIBESCU Nr.39-43 Ap.5** a fost internat in serviciul nostru in perioada: **13.06.2020 18:12 - 25.06.2020 18:00**, FO: **16011 F.O.** / nr. din Registrul de consultatii **BOLI INFECTIOASE VI-COPII** si se externeaza: **AMELIORAT**

Diagnostic:

INFECTIE COVID-19 FORMA USOARA. PNEUMONIE ACUTA STANGA. ANGINA ACUTA ERITEMATOASA. DIFICULTATI ALIMENTARE

Motivele prezentarii

Anamneza

- factori de risc

Examen clinic

- general

- local

Examen de laborator:

13.06.2020

APTT - APTT (sec) 27.1 [22.1 - 28.1], - APTT (%) [-], **Creatinina** - 0.32 [0.2 - 0.4], **D-Dimeri** - 0.49 [0 - 0.55], **Feritina** - 26.2 [9.0 - 306.8], **Fibrinogen** - 327 [180 - 400], **Glicemie** - 69 [60 - 100], **GOT** - 45 [0 - 35], **GPT** - 15 [0 - 35], **Hemoleucograma completa** - Leucocite 3.95 [5.0 - 13.0], - Hematii 4.89 [3.5 - 5.3], - Hemoglobina 12.4 [9.6 - 14.8], - Hematocrit 35.4 [31.0 - 45.0], - VEM 72.4 [72.0 - 100.0], - HEM 25.4 [23.8 - 34.2], - CHEM 35.0 [31.0 - 35.0], - Trombocite 247 [150 - 450], - NEUT% 18.9 [20 - 50], - LYMPH% 66.1 [46 - 70], - MONO% 12.2 [3.0 - 10.0], - EO% 2.5 [0 - 5], - BASO% 0.3 [0 - 2], - NEUT# 0.75 [1.5 - 8.5], - LYMPH# 2.61 [1.5 - 5.5], - MONO# 0.48 [0.15 - 1.3], - EO# 0.10 [0.00 - 0.67], - BASO# 0.01 [0 - 0.13], - RDW-CV 15.0 [9.9 - 15.5], - PDW* 9.7 [10 - 16.5], - MPV 9.1 [6.5 - 14.0], **K** - 4.4 [3.5 - 5.1], **LDH** - 341 [120 - 300], **Na** - 141 [136 - 146], **Proteina C reactiva** - 0.79 [0 - 1], **Timp de protrombina** - PT (sec) (plasma) 11.4 [9.4 - 13.6], - PT (%) (plasma) 101.2 [70 - 130], - INR (plasma) 0.99 [0.8 - 1.2], **Trigliceride** - 70 [0 - 150], **Uree** - 33 [0 - 50], **VSH** - 2 [1 - 20]

22.06.2020

APTT - APTT (sec) 26.4 [22.1 - 28.1], - APTT (%) [-], **Creatinina** - 0.36 [0.2 - 0.4], **Feritina** - 15.2 [9.0 - 306.8], **Fibrinogen** - 327 [180 - 400], **Glicemie** - 85 [60 - 100], **GOT** - 31 [0 - 35], **GPT** - 14 [0 - 35], **Hemoleucograma completa** - Leucocite 6.22 [5.0 - 13.0], - Hematii 4.92 [3.5 - 5.3], - Hemoglobina 12.5 [9.6 - 14.8], - Hematocrit 35.3 [31.0 - 45.0], - VEM 71.7 [72.0 - 100.0], - HEM 25.4 [23.8 - 34.2], - CHEM 35.4 [31.0 - 35.0], - Trombocite 342 [150 - 450], - NEUT% 26.2 [20 - 50], - LYMPH% 58.8 [46 - 70], - MONO% 12.4 [3.0 - 10.0], - EO% 2.3 [0 - 5], - BASO% 0.3 [0 - 2], - NEUT# 1.63 [1.5 - 8.5], - LYMPH# 3.66 [1.5 - 5.5], - MONO# 0.77 [0.15 - 1.3], - EO# 0.14 [0.00 - 0.67], - BASO# 0.02 [0 - 0.13], - RDW-CV 14.6 [9.9 - 15.5], - PDW* 11.0 [10 - 16.5], - MPV 9.7 [6.5 - 14.0], **K** - 5.0 [3.5 - 5.1], **LDH** - 280 [120 - 300], **Na** - 139 [136 - 146], **Proteina C**

reactiva - 0.11 [0 - 1], **Timp de protrombina** - PT (sec) (plasma) 10.4 [9.4 - 13.6] , - PT (%) (plasma) 124.6 [70 - 130] , - INR (plasma) 0.89 [0.8 - 1.2], **Trigliceride** - 126 [0 - 150], **Uree** - 41 [0 - 50], **VSH** - 3 [1 - 20], **D-Dimeri** - 0.32 [0 - 0.55]

24.06.2020

Covid-19 (SARS-CoV-2) - Detectabil [Nedetectabil -], **Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgG** - Nonreactiv (Index=0.724) [Index < 0.8 Nonreactiv >= 0.8 - < 1.2 Incert > =1.2 Reactiv -], **Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgM** - Incert (Index=1.040) [Index < 0.8 Nonreactiv >= 0.8 - < 1.2 Incert > =1.2 Reactiv -]

Examene paraclinice:

EKG

ECO

Rx

T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 15.06.2020RG. PULM.- D= 1.8 Gym2Fara leziuni focale sau infiltrative pulmonar bilateral.Fara colectii pleurale bilateral. || T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 24.06.2020RG. PULM.-D=1.4 Gym2Aspect radiologic stationar: fara leziuni pulmonare evidente rgr. SCD libere

Altele

Tratament efectuat

BIOFLU BABY 120mg/5ml sirop*100ml || ERIDIAROM || HEPIFLOR BABY*10PL || KALETRA 80MG/ML+20MG/ML SOL ORALA*60ML || PARACETAMOL SUPOZ. 125MG*6SUP. SINTOFARM. || SIROP PATLAGINA*100ML VTL || TALC FARM. SUBSTANTA

Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului:

EPICRIZA

Pacienta in varsta de 2 ani, fara APP semnificative, este transferata in serviciul nostru din Clinica Pneumologie Pediatrie cu diagnosticul de infectie confirmata cu Covid-19. Boala actuala a debutat in data de 11.06.20 prin febra (39.4 C), rinoree apoasa si obstructie nazala, motiv pentru care mama se adreseaza serviciului UPU Pediatrie. In urma anamnezei, consultului si a examenelor paraclinice efectuate (minima limfopenie, radiologic - usoara hiperinflatie pulmonara bilaterala, microopacitati infrahilare bilateral) se ridica suspiciunea de infectie Covid-19 si se recolteaza proba pentru determinarea RT-PCR a virusului SARS-COV-2, pacienta fiind redirectionata in Clinica Pneumologie Pediatrie. Rezultatul testarii este detectabil (primit in data de 13.06.20), motiv pentru care cazul este redirectionat in clinica noastra in vederea internarii si a instituirii tratamentului de specialitate.

Mentionam faptul ca pacienta a intrat in contact mai multe cazuri confirmate de infectie cu Covid-19 - total, internat in serviciul nostru din data de 12.06.20 (cod caz: CJ.16162.2020) si cu bunicii paterni si o matusa (toti internati in Spit. Jud. Bistrita).

Examenul obiectiv la internare a relevat stare generala usor influentata, afebrilitate, tegumente si mucoase normal colorate, tesut celular subcutanat normal reprezentat global, G=12.4 kg, torace normal conformat, murmur vezicular, raluri sibilante rare supraadaugate, SaO2=99%, FR=21/min, zgomote cardiace ritmice, fara zgomote sau sufluri supraadaugate, AV=100/min, abdomen normal conformat, suplu, elastic, mobil cu respiratia, nedureros la palpare, fara organomegalii palpabile, fara semne clinice de iritatie meningeana.

Examinarile paraclinice efectuate in serviciul nostru au relevat leucopenie usoara, monocitoza, valori crescute ale LDH-ului (U/L), discreta citoliza pe seama GOT (45 U/L), restul parametrilor fiind in limite normale. Radiografia toracica efectuata in serviciul nostru nu a relevat nici initial si nici in dinamica modificari patologice.

Examinarile paraclinice de control au relevat ameliorarea modificarilor.

Testul RT-PCR Covid-19 proba nr 2: Detectabil !!! (25.06.2020)

Ac Ig M si Ac Ig G Sars Cov-2 sunt incert IgM si negativ Ig G.

Pe parcursul internarii a urmat terapie antiretrovirală conform protocolului cu Kaletra (2x1.8 ml/zi, per os, timp de 10 zile), antitermic (Paracetamol), probiotic (Hepiflor), sub care evolutia a fost favorabila.

Tratament recomandat

Recomandari la externare:

- Conform Ordinului 1.137 din 23 iunie 2020 se indica izolare la domiciliu pe o perioada de 2 zile de la externare. In aceasta perioada nu se va parasi domiciliul declarat si transmis catre ISU.
- Monitorizarea starii de sanatate a pacientului pe perioada izolarii la domiciliu se face de catre medicul de familie zilnic, prin sistemul de telemedicina. Pacientii care nu sunt inscrisi pe lista unui medic de familie vor fi monitorizati zilnic de catre DSP judeteană. In cazul aparitiei unor probleme de sanatate se va lua legatura telefonica cu medicul de familie sau se va suna la 112.
- dupa ce ajungeti acasa se recomanda efectuarea dusului, hainele cu care ati plecat acasa se vor pune sac de gunoi (fara a fi scuturate). Hainele (inclusiv hainele care pe care le-ati folosit spital) se vor pastra sac loc separat (balcon) timp de 5 zile, ulterior vor fi spalate la masina de spalat haine (la cea mai mare temperatura permisa de producator) cu dezinfectant pentru haine si calcate ulterior. Se vor folosi manusi pentru manipularea hainelor, care ulterior vor fi aruncate si va veti spala pe maini cu apa si sapun. Telefonul, ceasul si alte obiecte electronice se vor dezinfecta cu servetele impregnate cu alcool.
- daca in urmatoarele 3-4 saptamani dupa externare se constata aparitia febrei, eruptiei cutanate, dureri articulare sau alte manifestari insotite de febra sau dificultati de respiratie va solicita consultul medicului de familie sau dupa caz medicul pediatru.

Ce masuri de igiena individuala trebuie sa respecte persoanele externate la domiciliu?

- Sa evite contactul apropiat cu celelalte persoane din locuinta si, daca este posibil, sa se izoleze camera separata, cu baie separata.
- Daca se foloseste aceeasi baie, aceasta va fi dezinfectata dupa folosire, se va dezinfecta toaleta si toate obiectele atinse (inclusiv clante, Dezinfectarea se va face cu solutii pe baza de clor (Domestos) sau alcool (min 70 %).
- Sa nu primeasca vizitatori perioada de izolare la domiciliu.
- Sa se spele pe maini cu apa si sapun, timp de cel putin 20 de secunde, ori de cate ori este necesar (dupa utilizarea toaletei, pregatirii mesei, etc).
- Sa curate si sa dezinfecteze zilnic toate suprafetele pe care le atinge frecvent (ex: mese, clante, obiecte de mobilier, bateria/robinetele de la chiuveta, alte obiecte care pot fi atinse si de alte persoane).
- Sa si acopere gura si nasul cu servetel de unica folosinta sau cu o tesatura atunci cand stranut sau tuse, sau sa stranute si sa tuseasca plica cotului. Batista se arunca imediat la gunoi, sac de plastic, dupa care se spala pe maini cu apa si sapun timp de 20 de secunde.
- Sa poarte masca cand se intalneste cu alte persoane.
- Purtarea mastii este una dintre masurile de prevenire si limitare pentru raspandirea anumitor boli respiratorii, inclusiv cea determinata de noul coronavirus. Cu toate acestea, doar utilizarea unei masti nu este suficienta pentru a asigura un nivel adecvat de protectie si ar trebui adoptate si alte masuri la fel de relevante. Folosirea mastii trebuie combinata cu igiena adecvata a mainilor si cu alte masuri de prevenire si control a transmiterii noului coronavirus de la om la om.
- In timpul utilizarii, trebuie sa evitati atingerea mastii
- Sa indepartati masca folosind tehnica adecvata (nu atingeti partea din fata, ci ti snururile din spate), actiune urmata de spalarea IMEDIATA a mainilor cu apa si sapun;
- Sa nu reutilizati mastile de unica folosinta!!!! Masca se schimba la maxim 4 ore sau mai repede in caz de umezire.

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

Indicatie pentru revenire la internare

X Nu, nu este necesara revenirea pentru internare

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat prescriptie medicală, caz în care se va înscrie seria si numarul acesteia
- ☐ Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu a fost necesar
- ☒ Nu s-a eliberat prescriptie medicala

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat concediu medical la externare, caz în care se va înscrie seria si numarul acestuia
- ☐ Nu s-a eliberat concediu medical la externare deoarece nu a fost necesar
- ☒ Nu s-a eliberat concediu medical la externare

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu
- ☒ Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu, deoarece nu a fost necesar

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu
- ☒ Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu deoarece nu a fost necesar

(cu viza Unitatii judetene de implementare a programului, pentru diabet)

Unitate judeteana de diabet zaharat:	
Nr. inregistrare al asiguratului:	

Data 25.06.2020

Sef sectie:

Dr. SABOU MIHAELA

Medic primar

Dr. MIHAELA SABOU
medic primar
boli infectioase
A71373

Medic curant:

Dr. MOSUTIU LAURA

Medic rezident:

Dr. Laura Moșuțiu
medic primar boli infecțioase
cod: 945657

Calea de transmitere:

- prin asigurat
- prin posta

*) Scrisoarea medicala se intocmeste în doua exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii , într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;

Un exemplar se constituie scrisoare medicala si se inmaneaza in termen de 72 de ore medicului de familie.

*conform contractului cadru/2014 - model scrisoare medicala/Bilet de iesire - anexa 43