

Diagnostice:

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca Str. Iuliu Moldovan Nr. 23, 400348 Tel: +40-264-594655/565758; 593105. Fax: +40-264-593105;

E-mail: infectioasecj@yahoo.com web: www.infectioasecluj.ro

105;

unitate aflată în PROCES DE ACREDITARE

BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA *)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca BALHA LIVIU-IONUT, nascut la data de 21.06.1987, CNP / cod unic de asigurare 1870621125784, Adresa: Jud.CLUJ Loc.Campia Turzii Str.GHEORGHE BARITIU Nr.36 Ap.82 a fost internat in serviciul nostru in perioada: 14.08.2020 14:34 - 19.08.2020 13:40, FO: 19786 F.O. / nr. din Registrul de consultatii BOLI INFECTIOASE II-ADULTI si se externeaza: AMELIORAT

INFECTIE SARS COV2 FORMA USOARA

HIPERTENSIUNE ARTERIALA					
TRAHEO-BRONSITA ACUTA					
Motivele prezentarii					
Anamneza					
factori de risc					
Examen clinic - general					
- local					
Examene de laborator: 14.08.2020					
APTT - APTT (sec) 22.3 [22.1 - 28.1] , - APTT (%) [-], Creatinina - 0.69 [0.7 - 1.2],					
D-Dimeri - 0.34 [0 - 0.55], Feritina - 292.2 [23.9 - 336.2], Glicemie - 94 [70 - 105], GOT -					
26 [0 - 45], GPT - 46 [0 - 45], Hemoleucograma completa - Leucocite 9.23 [3.7 - 9.5] , -					
Hematii 5.45 [4.32 - 5.66] , - Hemoglobina 15.4 [13.3 - 17.6] , - Hematocrit 44.1 [39.0 - 51.0					
], - VEM 80.9 [82.0 - 98.0], - HEM 28.3 [25.0 - 33.0], - CHEM 34.9 [31.6 - 35.8], -					
Trombocite 267 [150 - 450] , - NEUT% 42.7 [40 - 70] , - LYMPH% 46.2 [20 - 40] , -					
MONO% 7.9 [3.0 - 10.0] , - EO% 3.0 [0 - 5] , - BASO% 0.2 [0 - 2] , - NEUT# 3.94 [1.5 -					
6.6], - LYMPH# 4.26[1.1 - 3.5], - MONO# 0.73[0.21 - 0.92], - EO# 0.28[0.00 - 0.67], -					
BASO# 0.02 [0 - 0.13] , - RDW-CV 12.4 [9.9 - 15.5] , - PDW* 11.9 [10 - 16.5] , - MPV					
10.3 [6.5 - 14.0], K - 4.3 [3.5 - 5.1], LDH - 197 [0 - 250], Na - 140 [136 - 146], Proteina					
C reactiva - 0.41 [0 - 1], Timp de protrombina - PT (sec) (plasma) 10.6 [9.4 - 13.6] , - PT					
(%) (plasma) 119.3 [70 - 130] , - INR (plasma) 0.91 [0.8 - 1.2], Uree - 24 [0 - 50], VSH - 17 [1 - 15]					
16.08.2020					
Covid-19 (SARS-CoV-2) - Detectabil [Nedetectabil -]					
Examene paraclinice:					
EKG					
ECO					
Rx					

T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 15.08.2020 RGR.PULM. D=8.1 Gym2Fara leziuni focale sau infiltrative evidente rgr. Cord aorta radiologic normale. SCD libere || T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 19.08.2020 RG. PULM.D=8.3 Gym2RADIOGRAFIE PULMONARA PAComparativ cu radiografia anterioara din 15.08 nu se constata aspecte evolutive pulmonare bilateral.Fara leziuni focale sau infiltrative pulmonare. SCD libere. Cord aorta radiologic normale.

Altele	

Tratament efectuat

ACETILCISTEINA 200MG LAROPHARM || AMLODIPINA LPH 10 MG X 30 || PARACETAMOL 500MG ZENTIVA*20CPR || PLAQUENIL 200MG*60 compr.film. || RAWEL (INDAPAMID) 1.5 MG || SOBYC 5 MG(BISOPROLOL) X30CPR.FILM. || VITAMINA C 1000mg*30cpr BERES

Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului: EPICRIZA

Se preia pe sectia Adulti II, pacient in varsta de 33 de ani, fara APP cunoscute, pentru infectie SARS CoV2. Boala actuala a debutat in 03.08.20 prin rinoree si tuse seaca rara care au remis spontan. Avand in vedere ca a fost contact cu un caz confirmat, a efectuat test PCR SARS CoV2 (06.08), acesta fiind pozitiv. Se interneaza pentru investigatii suplimentare si tratament.

Din ancheta epidemiologica retinem ca a fost contact apropiat cu caz confirmat COVID-19 - la locul de munca (seful).

Obiectiv: stare generala buna, afebril, obezitate grad I (IMC=31.25), tesut conjuctiv-adipos reprezentat in exces, MV prezent bilateral, fara raluri supraadaugate, SpO2=96%; zgomote cardiace ritmice, sincrone cu pulsul, TA=140/80mmHg, AV=89/min, in rest fara alte modificari patologice la EO.

Paraclinic: limfocitoza, GPT minim reactionat.

RT PCR SARS CoV2 (proba 2) efectuat in 17.08.10: DETECTABIL

Radiografia pulmonara este fara modificari patologice. Radiografia de control din 19.08 este tot cu aspect normal.

S-a interpretat cazul ca: infectie SARS CoV2 forma usoara.

Pe parcursul internarii a urmat tratament cu Plaquenil 200mg, 2-0-2 cpr/zi doza de incarcare timp de 1 zi apoi 1-0-1 cpr/zi (timp de 6 zile), mucolitic, vitamina C.

A pezentat valori crescute ale tensiunii arteriala, maxim pana la 162/112 mmHg, AV pana la 93/minut; am solicitat consult cardiaologic telefonic (dr. Turca Svetlana), care a recomandat tratament cu: Bisoprolol 5mg 1/2-0-1/2, Indapamid 1,5mg 1-0-0 si Amplodipina 10mg 1-0-0/zi.

Se externeaza ameliorat cu recomandari.

Tratament recomandat

- se recomanda consult cardiologic; pana atunci va mentine tratamentul cu: Bisoprolol 5mg 1/2-0-1/2, Indapamid 1,5mg 1-0-0 si Amlodipina 10mg 1-0-0/zi

Conform Ordinului 1321/22.07.2020 nu se indica izolare la domicliu/locatia . Pacientul a fost izolat 8 zile anterior internarii + 6 zile de internare.

Acestia pot desfasura activitatile curente si profesionale cu pastrarea distantarii si purtarea mastii acasa si la locul de munca pentru inca 10 zile, dupa incheierea perioadei de izolare.

Dupa ce ajungeti acasa se recomanda efectuarea dusului, hainele cu care ati plecat acasa se vor pune intr-un sac impermeabil (fara a fi scuturate). Hainele (inclusiv hainele care pe care le-ati folosit in spital) se vor pastra in sac intr-un loc separat (preferabil pe balcon) timp de 5 zile, ulterior vor fi spalate la masina de spalat haine (la cea mai mare temperatura permisa de producator) cu dezinfectant pentru haine si calcate ulterior. Se vor folosi manusi pentru manipularea hainelor, care ulterior vor fi aruncate si va veti spala pe mcu apa si sapun. Telefonul, ceasul si alte obiecte electronice se vor

dezinfecta cu servetele impregnate cu alcool.

Masuri de igiena individuala de respectat la domiciliu:

Sa se evite contactul apropiat cu celelalte persoane din locuinta si, daca este posibil, sa se izoleze camera separata, cu baie separata.

Daca se foloseste aceeasi baie, aceasta va fi dezinfectata dupa folosire, se va dezinfecta toaleta si toate obiectele atinse (inclusiv clante, intrerupatoare). Dezinfectarea se va face cu solutii pe baza de clor (ex. Domestos) sau alcool (min 70 %).

Sa nu primeasca vizitatori in perioada de izolare la domiciliu/locatia declarata.

Sa se spele pe maini cu apa si sapun, timp de cel putin 20 de secunde, ori de cate ori este necesar (dupa utilizarea toaletei, inaintea pregatirii mesei, etc).

Sa curate si sa dezinfecteze zilnic toate suprafetele pe care le atinge frecvent (ex: mese, clante, obiecte de mobilier, bateria/robinetele de la chiuveta, alte obiecte care pot fi atinse si de alte persoane).

Sa isi acopere gura si nasul cu servetel de unica folosinta sau cu o tesatura atunci cand stranuta sau tuseste, sau sa stranute si sa tuseasca in plica cotului. Batista se arunca imediat la gunoi, in sac de plastic, dupa care se spala pe maini cu apa si sapun timp de 20 de secunde.

Sa pastreze distanta de minim 1,5 m atunci cand se intalneste cu alte persoane.

Sa poarte masca cand se intalneste cu alte persoane. Masca trebuie sa acopere nasul si gura.

Purtarea mastii este una dintre masurile de prevenire si limitare pentru raspandirea anumitor boli respiratorii, inclusiv cea determinata de noul coronavirus. Cu toate acestea, doar utilizarea unei masti nu este suficienta pentru a asigura un nivel adecvat de protectie si ar trebui adoptate si alte masuri la fel de relevante. Folosirea mastii trebuie combinata cu igiena adecvata a mainilor si cu alte masuri de prevenire si control a transmiterii noului coronavirus de la om la om.

in timpul utilizarii, trebuie sa evitati atingerea mastii;

sa indepartati masca folosind tehnica adecvata (nu atingeti partea din fata, ci indepartati snururile din spate), actiune urmata de spalarea IMEDIATA a mainilor cu apa si sapun;

sa nu reutilizati mastile de unica folosinta. Masca se schimba la maxim 4 ore sau mai repede caz de umezire.

S-a eliberat concediu medical 6 zile pe perioada internarii (14-19. august) si 7 zile la externare (20-26 august).

Monitorizarea dupa externare:

In cazul aparitiei unor probleme de sanatate se va lua legatura telefonica cu medicul de familie sau se va suna la 112.

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

Indicatie pentru revenire la internare

X Nu, nu este necesara revenirea pentru internare

Se	completeazã obligatoriu una din cele douã informatii:
-	S-a eliberat prescriptie medicalã, caz în care se va înscrie seria si numarul acesteia
-	☐ Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu a fost necesar
-	X Nu s-a eliberat prescriptie medicala
Se	completeazã obligatoriu una din cele douã informatii: CCMAM 4945320,CCMAM 4945321
-	X S-a eliberat concediu medical la externare, caz în care se va înscrie seria si numarul acestuia
-	Nu s-a eliberat concediu medical la externare deoarece nu a fost necesar
_	Nu s-a eliberat concediu medical la externare

Se completeazã obligatoriu una din cele douã informatii:

- S-a eliberat recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu
- Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu, deoarece nu a fost necesar

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

Un exemplar se constituie scrisoare medicala si se inmaneaza in termen de 72 de ore medicului de familie.

 S-a eliberat prescriptie medicală pentru disp Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dinu a fost necesar 		arece
(cu viza Unitatii judetene de implementare a programul	lui, pentru diabet)	
Unitate judeteana de diabet zaharat:		
Nr. inregistrare al asiguratului:		
Data 19.08.2020		
Sef sectie:	Medic curant:	Medic rezident:
Sef Lucrari Dr. MUNTEAN MONICA	SZOLGA BLANCA PAULA	
Dr. MONICA MUNTEAN medic primar holi insectionse cod 828242	Dr. MONICA MUNTEAN medic primar boll injectiouse cod 828242	
Calea de transmitere:		

*) Scrisoarea medicala se intocmeste în doua exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

- prin posta

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii, într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;