

Diagnostice:

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca Str. Iuliu Moldovan Nr. 23, 400348 Tel: +40-264-594655/565758; 593105. Fax: +40-264-593105;

 $\hbox{$E$-mail: infectioasecj@yahoo.com web:} \\$ 

www.infectioasecluj.ro

INFECTIE COVID 19 FORMA ASIMPTOMATICA



## BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA \*)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca DANCIU VLAD VASILE, nascut la data de 06.10.1991, CNP / cod unic de asigurare 1911006125476, Adresa: Jud.CLUJ Loc.Cluj Napoca Str.EUGEN IONESCU Nr.67 Ap.73 a fost internat in serviciul nostru in perioada: 10.08.2020 19:12 - 11.08.2020 10:37, FO: 19313 F.O. / nr. din Registrul de consultatii BOLI INFECTIOASE II-ADULTI si se externeaza: AMELIORAT

Motivele prezentarii  Anamneza - factori de risc  Examen clinic - general - local	
Anamneza - factori de risc  Examen clinic - general - local	
factori de risc  Examen clinic - general - local	
Examen clinic - general - local	
- local	
Examene de laborator:	
10.08.2020	
<b>APTT</b> - APTT (sec) 23.5 [ 22.1 - 28.1 ] , - APTT (%) [ - ], <b>Creatinina</b> - 0.92 [ 0.7 - 1.2 ],	
<b>D-Dimeri</b> - 0.21 [ 0 - 0.55 ], <b>Feritina</b> - 202.2 [ 23.9 - 336.2 ], <b>Glicemie</b> - 83 [ 70 - 105 ], <b>GOT</b> -	
28 [ 0 - 45 ], <b>GPT</b> - 40 [ 0 - 45 ], <b>Hemoleucograma completa</b> - Leucocite 6.88 [ 3.7 - 9.5 ] , -	
Hematii 5.22 [ 4.32 - 5.66 ] , - Hemoglobina 15.6 [ 13.3 - 17.6 ] , - Hematocrit 43.6 [ 39.0 - 51.0	
], - VEM 83.5 [ 82.0 - 98.0 ], - HEM 29.9 [ 25.0 - 33.0 ], - CHEM 35.8 [ 31.6 - 35.8 ], -	
Trombocite 210 [ 150 - 450 ] , - NEUT% 58.8 [ 40 - 70 ] , - LYMPH% 32.1 [ 20 - 40 ] , -	
MONO% 8.1 [ 3.0 - 10.0 ] , - EO% 0.9 [ 0 - 5 ] , - BASO% 0.1 [ 0 - 2 ] , - NEUT# 4.04 [ 1.5 -	
6.6], - LYMPH# 2.21 [ 1.1 - 3.5 ], - MONO# 0.56 [ 0.21 - 0.92 ], - EO# 0.06 [ 0.00 - 0.67 ], -	
BASO# 0.01 [ 0 - 0.13 ] , - RDW-CV 11.9 [ 9.9 - 15.5 ] , - PDW* 13.0 [ 10 - 16.5 ] , - MPV	
10.9 [ 6.5 - 14.0 ], <b>K</b> - 4 [ 3.5 - 5.1 ], <b>LDH</b> - 242 [ 0 - 250 ], <b>Na</b> - 140 [ 136 - 146 ], <b>Proteina C</b>	
reactiva - 0.13 [ 0 - 1 ], Timp de protrombina - PT (sec) (plasma) 11.4 [ 9.4 - 13.6 ] , - PT (%)	
(plasma) 101.2 [ 70 - 130 ] , - INR (plasma) 0.99 [ 0.8 - 1.2 ], <b>Uree</b> - 41 [ 0 - 50 ], <b>VSH</b> - 3 [ 1 - 15 ]	
11.08.2020	
Covid-19 (SARS-CoV-2) - Incert [ Nedetectabil - ]	
Examene paraclinice:	
EKG	
ECO	
Rx	
T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 11.08.2020RGR.PULM.D=5.3 Gym2Fara leziuni pleuro-pulmonare evidente rgr.	
Altele	
Tratament efectuat	

# Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului: EPICRIZA

Pacient in varsta de 28 ani fara APP semnificative se interneaza in serviciul nostru pentru investigatii clinice si paraclinice.

Mentionam ca din 28.07.2020 pacientul a prezentat febra 37,9 care a remis la antipiretice , asociat a prezentat dureri muscuare, frisoane si transpiratii ulterior anosmie si agenezie. In 29.07.2020 si-a efectuat ,un test RT -PCR care a fost pozitiv, motiv pentru care pacientul se autoizoleaza la domciciliu.

Din ancheta epidemiologica , mentionam contact pozitiv cu , caz confirmat ( colega de la birou). Obiectiv la internare pacient cu stare generala buna,IMC=28, afebril, tegumente si mucoase palide, stetacustic pulmonar si cardiac fara modificari patologice, echilibrat hemodinamic (TA= 160/80mmHg, AV= 133 bpm, SaO2=97% aa ), abdomen moale, mobil cu respiratia,nedureros spontan si la palpare, tranzit intestinal prezent, fara organomegalii, loje renale libere, Giordano negativ bilateral, mictiuni fiziologice, fara semne de iritatie meningeana, fara semne de focar neurologic.

Paraclinic: fara modificari patologice semnificative

Radiografia pulmonara la internare fara modificari patologice

Proba 1: RT PCR SARS CoV (29.07.2020): DETECTABIL.

Proba 2: RT PCR SARS Cov 2(11.08.2020): in lucru la momentul externarii.

S-a interpretat cazul: COVID -19 forma asimptomatica

Pe parcursul internarii pacientul a fost in afebrilitate, fara simptomatologie clinic si paraclinic,motiv pentru care se decide intreruperea spitalizarii si continuarea izolarii la domiciliul cu supravegherea prin medicul de familie.

Se externeaza cu recomandarile din epicriza. A luat la cunostiinta si a semnat formularul de consimtamant conform protocolului.

#### Tratament recomandat

Acestia pot desfasura activitatile curente si profesionale cu pastrarea distantarii si purtarea mastii acasa si la locul de munca pentru inca 10 zile, dupa incheierea perioadei de izolare.

Dupa ce ajungeti acasa se recomanda efectuarea dusului, hainele cu care ati plecat acasa se vor pune intr-un sac impermeabil (fara a fi scuturate). Hainele (inclusiv hainele care pe care le-ati folosit in spital) se vor pastra in sac intr-un loc separat (preferabil pe balcon) timp de 5 zile, ulterior vor fi spalate la masina de spalat haine (la cea mai mare temperatura permisa de producator) cu dezinfectant pentru haine si calcate ulterior. Se vor folosi manusi pentru manipularea hainelor, care ulterior vor fi aruncate si va veti spala pe mcu apa si sapun. Telefonul, ceasul si alte obiecte electronice se vor dezinfecta cu servetele impregnate cu alcool.

Masuri de igiena individuala de respectat la domiciliu:

Sa se evite contactul apropiat cu celelalte persoane din locuinta si, daca este posibil, sa se izoleze camera separata, cu baie separata.

Daca se foloseste aceeasi baie, aceasta va fi dezinfectata dupa folosire, se va dezinfecta toaleta si toate obiectele atinse (inclusiv clante, intrerupatoare). Dezinfectarea se va face cu solutii pe baza de clor (ex. Domestos) sau alcool (min 70 %).

Sa nu primeascvizitatori in perioada de izolare la domiciliu/locatia declarata.

Sa se spele pe maini cu apa si sapun, timp de cel putin 20 de secunde, ori de cate ori este necesar (dupa utilizarea toaletei, inaintea pregatirii mesei, etc).

Sa curate si sa dezinfecteze zilnic toate suprafetele pe care le atinge frecvent (ex: mese, clante, obiecte de mobilier, bateria/robinetele de la chiuveta, alte obiecte care pot fi atinse si de alte persoane).

Sa isi acopere gura si nasul cu servetel de unica folosinta sau cu o tesatura atunci cand stranuta sau

tuseste, sau sa stranute si sa tuseasca in plica cotului. Batista se arunca imediat la gunoi, in sac de plastic, dupa care se spala pe maini cu apa si sapun timp de 20 de secunde.

Sa pastreze distanta de minim 1,5 m atunci cand se intalneste cu alte persoane.

Sa poarte masca cand se intalneste cu alte persoane. Masca trebuie sa acopere nasul si gura.

Purtarea mastii este una dintre masurile de prevenire si limitare pentru raspandirea anumitor boli respiratorii, inclusiv cea determinata de noul coronavirus. Cu toate acestea, doar utilizarea unei masti nu este suficienta pentru a asigura un nivel adecvat de protectie si ar trebui adoptate si alte masuri la fel de relevante. Folosirea mastii trebuie combinata cu igiena adecvata a mainilor si cu alte masuri de prevenire si control a transmiterii noului coronavirus de la om la om.

- -in timpul utiliztrebuie sa evitati atingerea mastii;
- -sa indepartati masca folosind tehnica adecvata (nu atingeti partea din fata, ci indepartati snururile din spate), actiune urmata de spalarea IMEDIATA a mainilor cu apa si sapun;
- -sa nu reutilizati mastile de unica folosinta. Masca se schimba la maxim 4 ore sau mai repede caz de umezire.

### Monitorizarea dupa externare:

Monitorizarea starii de sanatate a pacientului pe perioada izolarii la domicliu se face de catre medicul de familie zilnic, prin sistemul de telemedicina. Pacientii care nu sunt inscrisi pe lista unui medic de familie vor fi monitorizati zilnic de catre DSP judeteana. In cazul aparitiei unor probleme de sanatate se va lua legatura telefonica cu medicul de familie sau se va suna la 112.

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

Indicatie pentru revenire la internare
X Nu, nu este necesara revenirea pentru internare
Se completează obligatoriu una din cele două informatii:
- S-a eliberat prescriptie medicală, caz în care se va înscrie seria si numarul acesteia
- Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu a fost necesar
- X Nu s-a eliberat prescriptie medicala
Se completeazã obligatoriu una din cele douã informatii: CCMAM 4169095,CCMAM 4169096  - ▼ S-a eliberat concediu medical la externare, caz în care se va înscrie seria si numarul acestuia
- Nu s-a eliberat concediu medical la externare deoarece nu a fost necesar
- Nu s-a eliberat concediu medical la externare
Se completeazã obligatoriu una din cele douã informatii:
- S-a eliberat recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu
- X Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu,
deoarece nu a fost necesar
Se completeazã obligatoriu una din cele douã informatii:
- S-a eliberat prescriptie medicalã pentru dispozitive medicale in ambulatoriu
- X Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu deoarece
nu a fost necesar
(cu viza Unitatii judetene de implementare a programului, pentru diabet)
Unitate judeteana de diabet zaharat:
Nr. inregistrare al asiguratului:

Sef Lucrari Dr. MUNTEAN MONICA Coordonator imunodepresie Dr. JIANU CRIST

**Medic curant:** 

**Medic rezident:** 

Data 11.08.2020

**Sef sectie:** 

Dr. MONICA MUNTBAN medic primar boli infectioase cod 828242 Medic primar

Dr. JIANU CRISTIAN

Medic Primar

Medic Primar

Medic Primar

#### Calea de transmitere:

- prin asigurat
- prin posta .....

-----

\*) Scrisoarea medicala se intocmeste în doua exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii, într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;