

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca Str. Iuliu Moldovan Nr. 23, 400348 Tel: +40-264-594655/565758; 593105. Fax: +40-264-593105; E-mail: infectioasecj@yahoo.com web:

unitate affată în

BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA *)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca **NAGY TIBOR**, nascut la data de **05.10.1970**, CNP / cod unic de asigurare **1701005123153**, Adresa: **Jud.CLUJ Loc.Gilau Str.GRADINII Nr.549K Ap.2** a fost internat in serviciul nostru in perioada: **27.07.2020 21:44 - 04.08.2020 14:00**, FO: **18322** F.O. / nr. din Registrul de consultatii **BOLI INFECTIOASE V-COPII** si se externeaza: **AMELIORAT**

Diagnostice:

INFECTIE COVID-19 FORMA USOARA HIPERTENSIUNE ARTERIALA ESENTIALA

Motivele prezentarii		
Anamneza		
- factori de risc		
Examen clinic		
- general		
- local		
Examene de laborator:		
03.08.2020		
Covid-19 (SARS-CoV-2) - Detectabil [Nedetectabil -]		
27.07.2020		
APTT - APTT (sec) 19.5 [22.1 - 28.1] , - APTT (%) [-], Creatinina - 1.08 [0.7 - 1.2],		
D-Dimeri - 0.41 [0 - 0.55], Feritina - 185.6 [23.9 - 336.2], Glicemie - 104 [70 - 105], GO 7	Γ	
- 29 [0 - 45], GPT - 48 [0 - 45], Hemoleucograma completa - Leucocite 2.63 [3.7 - 9.5] ,	-	
Hematii 4.49 [4.32 - 5.66] , - Hemoglobina 14.6 [13.3 - 17.6] , - Hematocrit 39.8 [39.0 - 51.0	0	
], - VEM 88.6 [82.0 - 98.0], - HEM 32.5 [25.0 - 33.0], - CHEM 36.7 [31.6 - 35.8], -		
Trombocite 135 [150 - 450], - NEUT% 34.2 [40 - 70], - LYMPH% 52.1 [20 - 40], -		
MONO% 12.5 [3.0 - 10.0] , - EO% 0.8 [0 - 5] , - BASO% 0.4 [0 - 2] , - NEUT# 0.90 [1.5 -		
6.6], - LYMPH# 1.37 [1.1 - 3.5], - MONO# 0.33 [0.21 - 0.92], - EO# 0.02 [0.00 - 0.67],	-	
BASO# 0.01 [0 - 0.13] , - RDW-CV 11.7 [9.9 - 15.5] , - PDW* 14.2 [10 - 16.5] , - MPV		
11.3 [6.5 - 14.0], LDH - 193 [0 - 250], Proteina C reactiva - 0.34 [0 - 1], Timp de		
protrombina - PT (sec) (plasma) 10.0 [9.4 - 13.6] , - PT (%) (plasma) 130.0 [70 - 130]		
INR (plasma) 0.86 [0.8 - 1.2], Uree - 51 [0 - 50], VSH - 8 [1 - 15]		
29.07.2020		
APTT - APTT (sec) 19.9 [22.1 - 28.1] , - APTT (%) [-], Creatinina - 0.93 [0.7 - 1.2],		
D-Dimeri - 0.38 [0 - 0.55], Feritina - 211.4 [23.9 - 336.2], Glicemie - 94 [70 - 105], GOT	-	
23 [0 - 45], GPT - 44 [0 - 45], Hemoleucograma completa - Leucocite 3.5 [3.7 - 9.5] , -		
Hematii 4.65 [4.32 - 5.66] , - Hemoglobina 15.0 [13.3 - 17.6] , - Hematocrit 42.0 [39.0 - 51.0	0	
], - VEM 90.3 [82.0 - 98.0], - HEM 32.3 [25.0 - 33.0], - CHEM 35.8 [31.6 - 35.8], -		
RDW-CV% 12.9 [9.9 - 15.5] , - Trombocite 123 [150 - 450] , - MPV 9.8 [6.5 - 14.0] , -		
NEUT% 42.02 [40 - 70] , - LYMPH% 44.93 [20 - 40] , - MONO% 11.30 [3.0 - 10.0] , -		
EO% 1.40 [0 - 5] , - BASO% 0.35 [0 - 2] , - NEUT# 1.478 [1.5 - 6.6] , - LYMPH# 1.580 [
1.1 - 3.5] , - MONO# 0.397 [0.21 - 0.92] , - EO# 0.049 [0.00 - 0.67] , - BASO# 0.012 [0 -		
0.13], K - 3.4 [3.5 - 5.1], LDH - 189 [0 - 250], Na - 141 [136 - 146], Proteina C reactiva	-	
0.30 [0 - 1], Timp de protrombina - PT (sec) (plasma) 10.3 [9.4 - 13.6] , - PT (%) (plasma)		

Exame	ene paraclinice:
EKG	
ECO	
Rx	
	T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 28.07.2020RGR.PULM.D=5 Gym2Fara leziuni pleuro-pulmonare
	evidente rgr. Cord cu ICT normal. T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 31.07.2020RGR.PULM.D=5
	Gym2Desen pulmonar usor accentuat infrahilar drept, de tip peribronho-vascular. Fara alte leziuni evidente rgr.
Altele	

127.3 [70 - 130] , - INR (plasma) 0.89 [0.8 - 1.2], Uree - 42 [0 - 50], VSH - 16 [1 - 15]

Tratament efectuat

ASPAVIM 36.2 MG/11.8MG (VIM SPECTRUM) \parallel CLEXANE 6000UI (60MG)/ 0,6ML * 10 SER. PRE. \parallel PARACETAMOL 500MG ZENTIVA*20CPR \parallel PLAQUENIL 200MG*60 compr.film. \parallel RINO SUN SPRAY 20ML \parallel SARGENOR 1G \parallel STOPTOXIN FORTE 3BLS*10CPS \parallel VITAMINA C 1000mg*30cpr BERES \parallel VITAMINA C 1000MG+D3 2000UI*30CPR. FILM/ BERES

Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului: EPICRIZA

Pacient in varsta de 49 ani in APP cunoscut cu hipertensiune arteriala sub tratament antihipertensiv (Betaloc zok si Noliterax) se prezinta in serviciul nostru pentru febra, (37,9), constrictie toracica mialgii si astenie debutate brusc in data de 19.07.2020 in urma contactului cu o persoana infectata cu SARS CoV 2. RT PCR SARS CoV 2 - detectabil in data de 27.07.2020.

Obiectiv la internare pacient cu stare generala mediu alterata, constient, cooperant, afebril, tegumente normla colorate , discreta congestie faringiana , stabil hemodianmic si respirator, SaO2=99 % in aaerul atmosferic, torace normal conformat , murmur vezicular inasprit la baze bilateral, fara raluri supraadaugate, TA=120/80mm Hg, Av=65bpm, zgomote cardiace ritmice bine batute fara sufluri audibile, abdomen marit in volum pe seama tesutului adipos, fara sensibilitate la palpare, fara orgnomegalii decelabile, Giordano negativ bilateral, fara semne de iritatie meningeana sau de focar neurologic.

Examinarile paraclinice de la internare au evidentiat usoara leucopenie cu neutropenie, discreta tromocitopenie, coagulograma usor reactionata, iar radiografia pulmonara a fost fara modificari patologice.

Pe parcursul internarii pacientul a prezentat evolutie clinica favorabila, iar biologic la 48 h cu ameliorarea probelor

PROBA NR1./ RT- PCR- SARS -COV2: DETECTABIL (27.07.2020) PROBA NR2. /RT -PCR-SARS-COV2 (in 04.08.2020): DETECTABIL.

Pe perioada internarii pacientul a urmat tratament cu Plaquenil 200mg cu doza de incarcare (2x2tb/zi) in primele 24h, ulterior Plaquenil 200mg (2x1tb/zi) asociat cu simptomatice, antipiretice si antialgice, anticoagulant in doza profilactica/conform protocolului, Vitamina C+D3.

Sub tratament evolutia clinica si paraclinica a pacientului a fost favorabila cu ameliorarea simptomatologiei si a modificarilor biologice.

Din 31.07.2020 monitorizarea pacientului s-a realizat in sectia externa a Spitalului Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca, in Clinica de Medicina Muncii.

Se externeaza in ziua a 9a de spitalizare ameliorata, la cerere; va continua izolarea la domiciliu pana la un total de 14 zile. Se transporta la domiciliu cu ambulanta SCBI.

Tratament recomandat

Se ataseaza recomandarile Ministerului Sanatatii:

Conform Ordinului 1321/22.07.2020 se indica izolare la domicliu/locatia declarata pe o perioada de 6 zile de la externare. In aceasta perioada nu se va parasi domiciliul/locatia declarata. Acestia pot desfasura activitatile curente si profesionale cu pastrarea distantarii si purtarea mastii

Acestia pot desfasura activitatile curente si profesionale cu pastrarea distantarii si purtarea mastii acasa si la locul de munca pentru inca 10 zile, dupa incheierea perioadei de izolare.

Dupa ce ajungeti acasa se recomanda efectuarea dusului, hainele cu care ati plecat acasa se vor pune intr-un sac impermeabil (fara a fi scuturate). Hainele (inclusiv hainele care pe care le-ati folosit in spital) se vor pastra in sac intr-un loc separat (preferabil pe balcon) timp de 5 zile, ulterior vor fi spalate la masina de spalat haine (la cea mai mare temperatura permisa de producator) cu dezinfectant pentru haine si calcate ulterior. Se vor folosi manusi pentru manipularea hainelor, care ulterior vor fi aruncate si va veti spala pe mcu apa si sapun. Telefonul, ceasul si alte obiecte electronice se vor dezinfecta cu servetele impregnate cu alcool.

Masuri de igiena individuala de respectat la domiciliu:

Sa se evite contactul apropiat cu celelalte persoane din locuinta si, daca este posibil, sa se izoleze camera separata, cu baie separata.

Daca se foloseste aceeasi baie, aceasta va fi dezinfectata dupa folosire, se va dezinfecta toaleta si toate obiectele atinse (inclusiv clante, intrerupatoare). Dezinfectarea se va face cu solutii pe baza de clor (ex. Domestos) sau alcool (min 70 %).

Sa nu primeascvizitatori in perioada de izolare la domiciliu/locatia declarata.

Sa se spele pe maini cu apa si sapun, timp de cel putin 20 de secunde, ori de cate ori este necesar (dupa utilizarea toaletei, inaintea pregatirii mesei, etc).

Sa curate si sa dezinfecteze zilnic toate suprafetele pe care le atinge frecvent (ex: mese, clante, obiecte de mobilier, bateria/robinetele de la chiuveta, alte obiecte care pot fi atinse si de alte persoane).

Sa isi acopere gura si nasul cu servetel de unica folosinta sau cu o tesatura atunci cand stranuta sau tuseste, sau sa stranute si sa tuseasca in plica cotului. Batista se arunca imediat la gunoi, in sac de plastic, dupa care se spala pe maini cu apa si sapun timp de 20 de secunde.

Sa pastreze distanta de minim 1,5 m atunci cand se intalneste cu alte persoane.

Sa poarte masca cand se intalneste cu alte persoane. Masca trebuie sa acopere nasul si gura.

Purtarea mastii este una dintre masurile de prevenire si limitare pentru raspandirea anumitor boli respiratorii, inclusiv cea determinata de noul coronavirus. Cu toate acestea, doar utilizarea unei masti nu este suficienta pentru a asigura un nivel adecvat de protectie si ar trebui adoptate si alte masuri la fel de relevante. Folosirea mastii trebuie combinata cu igiena adecvata a mainilor si cu alte masuri de prevenire si control a transmiterii noului coronavirus de la om la om.

- -in timpul utiliztrebuie sa evitati atingerea mastii;
- -sa indepartati masca folosind tehnica adecvata (nu atingeti partea din fata, ci indepartati snururile din spate), actiune urmata de spalarea IMEDIATA a mainilor cu apa si sapun;
- -sa nu reutilizati mastile de unica folosinta. Masca se schimba la maxim 4 ore sau mai repede caz de umezire.

S-a eliberat concediu medical pe perioada 27.07-0-09.08.2020

Monitorizarea dupa externare:

Monitorizarea starii de sanatate a pacientului pe perioada izolarii la domicliu se face de catre medicul de familie zilnic, prin sistemul de telemedicina. Pacientii care nu sunt inscrisi pe lista unui medic de familie vor fi monitorizati zilnic de catre DSP judeteana. In cazul aparitiei unor probleme de sanatate se va lua legatura telefonica cu medicul de familie sau se va suna la 112.

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

Indicatie pentru revenire la internare

x Nu, nu este necesara revenirea pentru internare

	Se completează obligatoriu una din cele două information de la S-a eliberat prescriptie medicală, caz în care se					
	 Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece X Nu s-a eliberat prescriptie medicala 	iu a fost fiecesai				
	Se completeazã obligatoriu una din cele douã informa	atii: CCMAM 4945303				
	·		a a a stuia			
 S-a eliberat concediu medical la externare, caz în care se va înscrie seria si numarul acestuia Nu s-a eliberat concediu medical la externare deoarece nu a fost necesar 						
Se completează obligatoriu una din cele două informatii: - - S-a eliberat recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu						
deoarece nu a fost necesar Se completeazã obligatoriu una din cele douã informatii:						
						- S-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu
	- X Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dis	pozitive medicale in ambulatoriu deoa	rece			
	nu a fost necesar					
(cr	viza Unitatii judetene de implementare a programului	nentru diahet)				
Г	viza emati judetene de implementare a programara	, pentru diabet)				
	Unitate judeteana de diabet zaharat:					
	Nr. inregistrare al asiguratului:					
	Data 04.08.2020					
	Sef sectie:	Medic curant:	Medic rezident:			
	Dr. IUBU ROXANA	RUS MIHAI ARONEL				
	Medic primar					
	Dr. ROXANA IUBU medic primar boli infecțioase medic specialist pediatrie cod D51027	Dr. RUS MIHAI-ARONEL medic specialist-Bolt Infecțioase cod F20348				
	Calea de transmitere:	/ 600 L50240				
	- prin asigurat					
	- prin posta					

*) Scrisoarea medicala se intocmeste în doua exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii , într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;