

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca Str. Iuliu Moldovan Nr. 23, 400348 Tel: +40-264-594655/565758; 593105. Fax: +40-264-593105;

 $\hbox{$E$-mail: infectioasecj @yahoo.com web:} \\$

www.infectioasecluj.ro



BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA *)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca MILER TEODORA, nascut la data de 05.09.1999, CNP / cod unic de asigurare 2990905261997, Adresa: Jud.MURES Loc.Reghin Str.BRANDUSEI Nr.7 Ap.1 a fost internat in serviciul nostru in perioada: 12.08.2020 10:22 - 13.08.2020 14:00, FO: 19519 F.O. / nr. din Registrul de consultatii BOLI INFECTIOASE V-COPII si se externeaza: STATIONAR

Diagnostice:

INFECTIE SARS-COV-2, FORMA ASIMPTOMATICA COVID-19 CU VIRUS IDENTIFICAT

Motivele prezentarii		
Anamr	neza	
- factori	de risc	
	n clinic	
- gener	al ······	
- local		
Exame	ne de laborator:	
	12.08.2020	
	Acid Uric - 3.48 [2.5 - 6], APTT - APTT (sec) 23.7 [22.1 - 28.1] , - APTT (%) [-], Calciu	
	total - 8.88 [8.4 - 10.6], Colesterol Total - 103 [109 - 200], Creatinina - 0.46 [0.5 - 0.9],	
	D-Dimeri - 0.19 [0 - 0.55], Feritina - 25.5 [11.0 - 306.8], Fibrinogen - 138 [180 - 400],	
	Fier - 132.4 [33 - 193], Glicemie - 78 [70 - 105], GOT - 19 [0 - 35], GPT - 22 [0 - 35],	
	HDL-Colesterol - 36.1 [45 - 65], Hemoleucograma completa - Leucocite 8.3 [3.9 - 11.1] , -	
	Hematii 4.24 [3.88 - 4.99] , - Hemoglobina 13.0 [11.5 - 15.4] , - Hematocrit 37.9 [36.0 - 48.0	
], - VEM 89.2 [81.0 - 99.0], - HEM 30.6 [25.0 - 33.0], - CHEM 34.3 [31.6 - 35.8], -	
	RDW-CV% 12.7 [9.9 - 15.5] , - Trombocite 242 [150 - 450] , - MPV 9.3 [6.5 - 14.0] , -	
	NEUT% 62.99 [40 - 70] , - LYMPH% 27.36 [20 - 40] , - MONO% 8.43 [3.0 - 10.0] , - EO%	
	0.84 [0 - 5] , - BASO% 0.38 [0 - 2] , - NEUT# 5.210 [1.8 - 7.4] , - LYMPH# 2.264 [1.1 -	
	3.5], - MONO# 0.698 [0.21 - 0.92], - EO# 0.069 [0.00 - 0.67], - BASO# 0.031 [0 - 0.13],	
	K - 4 [3.5 - 5.1], LDH - 158 [0 - 250], LDL - Colesterol - 53 [10 - 150], Lipide Totale -	
	394 [375 - 750], Magneziu - 1.87 [1.7 - 2.6], Na - 138 [136 - 146], Proteina C reactiva -	
	0.02 [0 - 1], Timp de protrombina - PT (sec) (plasma) 13.4 [9.4 - 13.6] , - PT (%) (plasma)	
	70.2 [70 - 130] , - INR (plasma) 1.19 [0.8 - 1.2], Trigliceride - 72 [0 - 150], Uree - 17.9 [0 - 50], VSH - 2 [1 - 20]	
Exame	ne paraclinice:	
EKG		
ECO		
Rx		
	T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 12.08.2020RG. PULM.D=2.5 Gym2Fara leziuni pleuro-pulmonare vizibile rgr.	
Altele		

Tratament efectuat

PARACETAMOL 500MG ZENTIVA*20CPR || VITAMINA C 1000mg*30cpr BERES

Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului: EPICRIZA

Pacienta in varsta de 20 ani, fara APP cunoscute, se interneaza in serviciul nostru cu diagnosticul COVID-19. Afirmativ a prezentat in 27.07 un episod de frisonete, astenie, mialgii, care cedeaza la administrarea de Paracetamol. Dupa 2 zile se asociaza anosmie. Se prezinta in UPU, unde se recolteaza test PCR SARS-COV-2 in 06.07, cu rezultat pozitiv, insa se temporizeaza internarea din lipsa de locuri. Mentionam faptul ca actualmente pacienta este asimptomatica.

Obiectiv la internare: stare generala buna, afebrila, tegumente normal colorate, mucoase uscate, stabila hemodinamic si respirator (TA=99/64 mmHg, AV= 90/min, SpO2= 98% aa), stetacustic pulmonar si cardiac fara modificari, abdomen liber, fara sensibilitate la palpare, tranzit intestinal prezent, diureza prezenta, fara semn de iritatie meningeana sau de focar neurologic.

Biologic: fibrinogen usor scazut

Radiografie toracica: fara leziuni active pleuro-pulmonare.

Pe parcursul internarii, pacienta a fost izolata, a urmat tratament medicamentos cu vitamina C si simptoamtice la nevoie.

Se externeaza in afebrilitate, stabila hemodinamic si respirator, cu recomandari:

Tratament recomandat

Conform Ordinului 1321/22.07.2020 se indica izolare la domicliu/locatia declarata pe o perioada de 7 zile de la externare. In aceasta perioada nu se va parasi domiciliul/locatia declarata.

Acestia pot desfasura activitatile curente si profesionale cu pastrarea distantarii si purtarea mastii acasa si la locul de munca pentru inca 10 zile, dupa incheierea perioadei de izolare.

Dupa ce ajungeti acasa se recomanda efectuarea dusului, hainele cu care ati plecat acasa se vor pune intr-un sac impermeabil (fara a fi scuturate). Hainele (inclusiv hainele care pe care le-ati folosit in spital) se vor pastra in sac intr-un loc separat (preferabil pe balcon) timp de 5 zile, ulterior vor fi spalate la masina de spalat haine (la cea mai mare temperatura permisa de producator) cu dezinfectant pentru haine si calcate ulterior. Se vor folosi manusi pentru manipularea hainelor, care ulterior vor fi aruncate si va veti spala pe mcu apa si sapun. Telefonul, ceasul si alte obiecte electronice se vor dezinfecta cu servetele impregnate cu alcool.

Masuri de igiena individuala de respectat la domiciliu:

Sa se evite contactul apropiat cu celelalte persoane din locuinta si, daca este posibil, sa se izoleze camera separata, cu baie separata.

- Daca se foloseste aceeasi baie, aceasta va fi dezinfectata dupa folosire, se va dezinfecta toaleta si toate obiectele atinse (inclusiv clante, intrerupatoare). Dezinfectarea se va face cu solutii pe baza de clor (ex. Domestos) sau alcool (min 70 %).

Sa nu primeasca vizitatori in perioada de izolare la domiciliu/locatia declarata.

Sa se spele pe maini cu apa si sapun, timp de cel putin 20 de secunde, ori de cate ori este necesar (dupa utilizarea toaletei, inaintea pregatirii mesei, etc).

Sa curate si sa dezinfecteze zilnic toate suprafetele pe care le atinge frecvent (ex: mese, clante, obiecte de mobilier, bateria/robinetele de la chiuveta, alte obiecte care pot fi atinse si de alte persoane).

Sa isi acopere gura si nasul cu servetel de unica folosinta sau cu o tesatura atunci cand stranuta sau tuseste, sau sa stranute si sa tuseasca in plica cotului. Batista se arunca imediat la gunoi, in sac de plastic, dupa care se spala pe maini cu apa si sapun timp de 20 de secunde.

Sa pastreze distanta de minim 1,5 m atunci cand se intalneste cu alte persoane.

Sa poarte masca cand se intalneste cu alte persoane. Masca trebuie sa acopere nasul si gura. Purtarea mastii este una dintre masurile de prevenire si limitare pentru raspandirea anumitor boli respiratorii, inclusiv cea determinata de noul coronavirus. Cu toate acestea, doar utilizarea unei masti nu este suficienta pentru a asigura un nivel adecvat de protectie si ar trebui adoptate si alte masuri la fel de relevante. Folosirea mastii trebuie combinata cu igiena adecvata a mainilor si cu alte masuri de

prevenire si control a transmiterii noului coronavirus de la om la om.

in timpul utilizarii, trebuie sa evitati atingerea mastii;

sa indepartati masca folosind tehnica adecvata (nu atingeti partea din fata, ci indepartati snururile din spate), actiune urmata de spalarea IMEDIATA a mainilor cu apa si sapun;

sa nu reutilizati mastile de unica folosinta. Masca se schimba la maxim 4 ore sau mai repede caz de umezire.

Monitorizarea dupa externare:

Monitorizarea starii de sanatate a pacientului pe perioada izolarii la domicliu se face de catre medicul de familie zilnic, prin sistemul de telemedicina. Pacientii care nu sunt inscrisi pe lista unui medic de familie vor fi monitorizati zilnic de catre DSP judeteana. In cazul aparitiei unor probleme de sanatate se va lua legatura telefonica cu medicul de familie sau se va suna la 112.

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

mme, necare unitre medicamentere recomandate				
Indicatie pentru revenire la internare				
X Nu, nu este necesara revenirea pentru internare				
Se completează obligatoriu una din cele două inform - S-a eliberat prescriptie medicală, caz în care s - Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece - X Nu s-a eliberat prescriptie medicala Se completează obligatoriu una din cele două inform - S-a eliberat concediu medical la externare, ca - Nu s-a eliberat concediu medical la externare - X Nu s-a eliberat concediu medical la externare Se completează obligatoriu una din cele două inform - S-a eliberat recomandare pentru ingrijiri med - X Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri n deoarece nu a fost necesar Se completează obligatoriu una din cele două inform - S-a eliberat prescriptie medicală pentru dispo - X Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispo - X Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispo - X Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispo - X Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispo - X Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispo - X Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispo - X Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispo - X Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispo - X Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispo	se va înscrie seria si numarul acesteia nu a fost necesar natii: z în care se va înscrie seria si numaru deoarece nu a fost necesar natii: icale la domiciliu/paliative la domicil nedicale la domiciliu/paliative la dom natii: zitive medicale in ambulatoriu spozitive medicale in ambulatoriu deo	il acestuia iu iciliu,		
Unitate judeteana de diabet zaharat:				
Nr. inregistrare al asiguratului:				
Data 13.08.2020 Sef sectie:	Medic curant:	Medic rezident:		
Dr. IUBU ROXANA	Dr. MARCU CRISTIAN	TYTOGREE TELEVISION		
Medic primar Dr. ROXANA IUBU medic primar boli infecțioase medic specialist pediatrie cod D51027	Medic primar Dr. MARCU CRISTIAN medic primar boli infectioase 647932			
Calea de transmitere: - prin asigurat				

Un exemplar se constituie scrisoare medicala si se inmaneaza in termen de 72 de ore medicului de familie.

- prin posta

*) Scrisoarea medicala se intocmeste în doua exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii , într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;