

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca Str. Iuliu Moldovan Nr. 23, 400348 Tel: +40-264-594655/565758; 593105. Fax: +40-264-593105; E-mail: infectioaseci@vahoo.com_web:

E-mail: infectioasecj@yahoo.com web: www.infectioasecluj.ro



BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA *)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca TITU ADRIANA-MEDA, nascut la data de 25.03.1970, CNP / cod unic de asigurare 2700325024663, Adresa: Jud.CLUJ Loc.Cluj Napoca Str.CAMPULUI Nr.42 Ap.24 a fost internat in serviciul nostru in perioada: 14.07.2020 23:14 - 21.07.2020 13:16, FO: 17510 F.O. / nr. din Registrul de consultatii BOLI INFECTIOASE I-ADULTI si se externeaza: AMELIORAT

Diagnostice:

INFECTIE SARS-COV-2 FORMA USOARA. ANGINA ACUTA ERITEMATOASA.

Motive	le prezentarii
Anamr	neza
factori	de risc
Exame	n clinic al
- local	
Exame	ne de laborator:
	14.07.2020
	APTT - APTT (sec) 22.0 [22.1 - 28.1] , - APTT (%) [-], Creatinina - 0.72 [0.5 - 0.9],
	Glicemie - 87 [70 - 105], GOT - 16 [0 - 35], GPT - 14 [0 - 35], Hemoleucograma
	completa - Leucocite 4.35 [3.9 - 11.1] , - Hematii 4.64 [3.88 - 4.99] , - Hemoglobina 14.0 [
	11.5 - 15.4], - Hematocrit 42.5 [36.0 - 48.0], - VEM 91.6 [81.0 - 99.0], - HEM 30.2 [25.0 -
	33.0], - CHEM 32.9 [31.6 - 35.8], - Trombocite 238 [150 - 450], - NEUT% 30.8 [40 - 70]
	, - LYMPH% 55.6 [20 - 40] , - MONO% 12.6 [3.0 - 10.0] , - EO% 0.5 [0 - 5] , - BASO% 0.5
	[0-2], - NEUT# 1.34 [1.8 - 7.4], - LYMPH# 2.42 [1.1 - 3.5], - MONO# 0.55 [0.21 - 0.92
], - EO# 0.02 [0.00 - 0.67], - BASO# 0.02 [0 - 0.13], - RDW-CV 13.4 [9.9 - 15.5], -
	PDW* 15.4 [10 - 16.5] , - MPV 11.7 [6.5 - 14.0], LDH - 158 [0 - 250], Proteina C reactiva
	- 0.16 [0 - 1], Timp de protrombina - PT (sec) (plasma) 10.3 [9.4 - 13.6] , - PT (%) (plasma) 127.3 [70 - 130] , - INR (plasma) 0.89 [0.8 - 1.2], Uree - 25 [0 - 50], VSH - 7 [1 - 20]
	20.07.2020
	Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgG - Nonreactiv (Index=0.629) [Index < 0.8 Nonreactiv>= 0.8 -
	< 1.2 Incert > =1.2 Reactiv -], Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgM - Nonreactiv (Index=0.216) [
	Index < 0.8 Nonreactiv>= 0.8 - < 1.2 Incert > =1.2 Reactiv -], Covid-19 (SARS-CoV-2) - Detectabil [Nedetectabil -]
	Detectabil [Nedetectabil -]
Exame EKG	ne paraclinice:
ECO	
Rx	
	$T03501 - radiografia \ toracica \sim Rezultat: 15.07.2020 RGR. PULM. D=3.3 \ Gym2 Fara \ leziuni \ pleuro-pulmonare evidente \ rgr.$

ACETILCISTEINA 200MG LAROPHARM || AZITROX 500MG ZENTIVA*3CPR || KALETRA 200mg/50mg*120cpr.filmate || NITRAZEPAM 2,5 MG LPH X 30 CPR || NITRAZEPAM 5MG*30CPR LPH || PARACETAMOL 500MG ZENTIVA*20CPR || PLAQUENIL 200MG*60 compr.film. || PRODIAL (ANTIACID) *100 cpr. || SIROP PATLAGINA*100ML VTL

Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului: EPICRIZA

Pacienta in varsta de 50 ani, cunoscuta cu histerectomie in antecedente, se prezinta in serviciul nostru pentru disfagie, tuse seaca, febra, cu debut brusc cu 2 zile anterior prezentarii. Afirmativ pacienta a intrat in contact cu un caz COVID-19 confirmat (colega de serviciu, confirmata in 09.07.2020), motiv pentru care efectueaza test PCR SARS-COV-2 in serviciu privat care se pozitiveaza in 14.07.2020. Anamnestic descrie discreta anosmie.

Obiectiv la internare: pacienta afebrila, constienta, cooperanta, OTS, cu stare generala buna, cu usoara congestie faringiana, auscultatoric pulmonar cu MV prezent bilateral, usor inasprit in stanga, fara raluri supraadaugate, SaO2=98% in aa; zgomote cardiace ritmice, bine batute, fara sufluri, TA=126/91 mmHg, AV=89 bpm; abdomen liber, fara sensibilitate la palpare; Giordanno negativ bilateral; fara semne de iritatie meningeana sau de focar neurologic.

Biologic: limfomonocitoza, fara alte modificari.

Radiografia pulmonara efectuata in 15.07.2020 nu evidentiaza modificari patologice.

Serologia Covid: in lucru in momentul externarii

Pe perioada internarii a urmat tratament cu Plaquenil 200 mg (2x2tb in prima zi, apoi 2x1tb/zi),

Kaletra 200/50 mg (2x2tb/zi2 zile, insa datorita intolerantei digestive se decide intreruperea acesteia), antibiotic cu Azitromicina 500 mg 1tb/zi, mucolitic, antiacid cu Prodial, simptomatic cu Paracetamol.

Pe parcursul internarii se mentine cu stare generala buna, afebrila, stabila hemodinamic si respirator.

Descrie ameliorarea anosmiei.

21.07.2020 PCR COVID-19: DETECTABIL

Se externeaza cu urmatoarele recomandari:

Tratament recomandat

Conform Ordinului 1.137 din 23 iunie 2020 se indica izolare la domiciliu pana la implinirea celor 14 zile din momentul debutului bolii. In aceasta perioada nu se va parasi domiciliul declarat si transmis catre ISU.

Dupa ce ajungeti acasa se recomanda efectuarea dusului, hainele cu care ati plecat acasa se vor pune intr-un sac impermeabil (fara a fi scuturate). Hainele (inclusiv hainele care pe care le-ati folosit in spital) se vor pastra in sac intr-un loc separat (preferabil pe balcon) timp de 5 zile, ulterior vor fi spalate la masina de spalat haine (la cea mai mare temperatura permisa de producator) cu dezinfectant pentru haine si calcate ulterior. Se vor folosi manusi pentru manipularea hainelor, care ulterior vor fi aruncate si va veti spala pe mcu apa si sapun. Telefonul, ceasul si alte obiecte electronice se vor dezinfecta cu servetele impregnate cu alcool.

Masuri de igiena individuala de respectat la domiciliu:

Sa se evite contactul apropiat cu celelalte persoane din locuinta si, daca este posibil, sa se izoleze camera separata, cu baie separata.

Daca se foloseste aceeasi baie, aceasta va fi dezinfectata dupa folosire, se va dezinfecta toaleta si toate obiectele atinse (inclusiv clante, intrerupatoare). Dezinfectarea se va face cu solutii pe baza de clor (ex. Domestos) sau alcool (min 70 %).

Sa nu primeascvizitatori in perioada de autoizolare la domiciliu.

Sa se spele pe maini cu apa si sapun, timp de cel putin 20 de secunde, ori de cate ori este necesar (dupa utilizarea toaletei, inaintea pregatirii mesei, etc).

Sa curate si sa dezinfecteze zilnic toate suprafetele pe care le atinge frecvent (ex: mese, clante, obiecte de mobilier, bateria/robinetele de la chiuveta, alte obiecte care pot fi atinse si de alte persoane).

Sa isi acopere gura si nasul cu servetel de unica folosinta sau cu o tesatura atunci cand stranuta sau tuseste, sau sa stranute si sa tuseasca in plica cotului. Batista se arunca imediat la gunoi, in sac de plastic, dupa care se spala pe maini cu apa si sapun timp de 20 de secunde.

Sa pastreze distanta de minim 1,5 m atunci cand se intalneste cu alte persoane.

Sa poarte masca cand se intalneste cu alte persoane. Masca trebuie sa acopere nasul si gura.

Purtarea mastii este una dintre masurile de prevenire si limitare pentru raspandirea anumitor boli respiratorii, inclusiv cea determinata de noul coronavirus. Cu toate acestea, doar utilizarea unei masti nu este suficienta pentru a asigura un nivel adecvat de protectie si ar trebui adoptate si alte masuri la fel de relevante. Folosirea mastii trebuie combinata cu igiena adecvata a mainilor si cu alte masuri de prevenire si control a transmiterii noului coronavirus de la om la om.

- -in timpul utiliztrebuie sa evitati atingerea mastii;
- -sa indepartati masca folosind tehnica adecvata (nu atingeti partea din fata, ci indepartati snururile din spate), actiune urmata de spalarea IMEDIATA a mainilor cu apa si sapun;
- -sa nu reutilizati mastile de unica folosinta. Masca se schimba la maxim 4 ore sau mai repede caz de umezire.

S-a eliberat concediu medical pe perioada 22.07-27.07.2020

Monitorizarea dupa externare:

Monitorizarea starii de sanatate a pacientului pe perioada izolarii la domicliu se face de catre medicul de familie zilnic, prin sistemul de telemedicina. Pacientii care nu sunt inscrisi pe lista unui medic de familie vor fi monitorizati zilnic de catre DSP judeteana. In cazul aparitiei unor probleme de sanatate se va lua legatura telefonica cu medicul de familie sau se va suna la 112.

https://www.cnscbt.ro/index.php/metodologii/infectia-2019-cu-ncov/1811-metodologia-de-supraveg here-a-covid-19-actualizare-19-06-2020-1/file

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

Indicatie pentru revenire la internare

(cu

mucane pentru revenue a mermare			
X Nu, nu este necesara revenirea pentru internare			
Se completează obligatoriu una din cele două informatii S-a eliberat prescriptie medicală, caz în care se v Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu X Nu s-a eliberat prescriptie medicala Se completează obligatoriu una din cele două informatii X S-a eliberat concediu medical la externare, caz în Nu s-a eliberat concediu medical la externare dec Nu s-a eliberat concediu medical la externare Se completează obligatoriu una din cele două informatii S-a eliberat recomandare pentru ingrijiri medical Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medical Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medical S-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitir Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitir Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitir Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitir	a înscrie seria si numarul acesteia a fost necesar : CCMAM 4945159 a care se va înscrie seria si numarul acestuia barece nu a fost necesar : e la domiciliu/paliative la domiciliu icale la domiciliu/paliative la domiciliu, : ve medicale in ambulatoriu		
viza Unitatii judetene de implementare a programului, pentru diabet)			
Unitate judeteana de diabet zaharat:			
Nr. inregistrare al asiguratului:			
Data 21.07.2020			
Sef sectie:	Medic curant: Medic	rezident:	

Asist, Univ. Dr. FILIPESCU IRINA

Un exemplar se constituie scrisoare medicala si se inmaneaza in termen de 72 de ore medicului de familie.

Conf.Dr. LUPSE MIHAELA

MEDIC PRIMAR





Calea de transmitere:

- prin asigurat

- prin posta

*) Scrisoarea medicala se intocmeste în doua exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii , într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;