

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca Str. Iuliu Moldovan Nr. 23, 400348 Tel: +40-264-594655/565758; 593105. Fax: +40-264-593105;

E-mail: infectioasecj@yahoo.com web: www.infectioasecluj.ro



BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA *)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca VITAN ZSUZSA , nascut la data de 23.10.1998, CNP / cod unic de asigurare 2981023260050 , Adresa: Jud.CLUJ Loc.Dej Str.M VITEAZU Nr.13 a fost internat in serviciul nostru in perioada: 02.05.2020 22:28 - 15.05.2020 16:00, FO: 14334 F.O. / nr. din Registrul de consultatii BOLI INFECTIOASE III-ADULTI si se externeaza: AMELIORAT

n	:	~			4:	ce	
IJ	ıa	ջլ	n(S	u	ce	:

PNEUMONIE INTERSTITIALA INFECTIE CU SARS-COV-2 CONFIRMATA SINDROM DIAREIC -REMIS

Motivele prezentarii						
Anamneza						
- factori de risc						
Examen clinic						
- general						
- local						
Examene de laborator:						
02.05.2020						
APTT - APTT (sec) 22.4 [22.1 - 28.1] , - APTT (%) [-], Creatinina - 0.54 [0.5 - 0.9],						
D-Dimeri - 0.37 [0 - 0.55], Fibrinogen - 396 [180 - 400], Glicemie - 85 [70 - 105], GOT -						
16 [0 - 35], GPT - 17 [0 - 35], Hemoleucograma completa - Leucocite 4.11 [3.9 - 11.1] , -						
Hematii 4.65 [3.88 - 4.99] , - Hemoglobina 14.3 [11.5 - 15.4] , - Hematocrit 42.0 [36.0 - 48.0						
], - VEM 90.3 [81.0 - 99.0], - HEM 30.8 [25.0 - 33.0], - CHEM 34.0 [31.6 - 35.8], -						
Trombocite 225 [150 - 450] , - NEUT% 44.6 [40 - 70] , - LYMPH% 46.2 [20 - 40] , -						
MONO% 9.0 [3.0 - 10.0] , - EO% 0.0 [0 - 5] , - BASO% 0.2 [0 - 2] , - NEUT# 1.83 [1.8 -						
7.4], - LYMPH# 1.90 [1.1 - 3.5], - MONO# 0.37 [0.21 - 0.92], - EO# 0.00 [0.00 - 0.67], -						
BASO# 0.01 [0 - 0.13] , - RDW-CV 12.5 [9.9 - 15.5] , - PDW* 13.0 [10 - 16.5] , - MPV						
11.0 [6.5 - 14.0], LDH - 181 [0 - 250], Proteina C reactiva - 1.67 [0 - 1], Timp de						
protrombina - PT (sec) (plasma) 12.2 [8.9 - 13.1] , - PT (%) (plasma) 79.2 [70 - 130] , - INR						
(plasma) 1.11 [0.8 - 1.2], Uree - 20.8 [0 - 50], VSH - 22 [1 - 20]						
09.05.2020						
Covid-19 (SARS-CoV-2) - Detectabil [Nedetectabil -], Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgG -						
Reactiv (Index=1.673) [Index < 0.8 Nonreactiv $>= 0.8 - < 1.2$ Incert $> = 1.2$ Reactiv -],						
Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgM - Reactiv (Index=4.279) [Index < 0.8 Nonreactiv>= 0.8 - <						
1.2 Incert > =1.2 Reactiv -]						
13.05.2020						
Covid-19 (SARS-CoV-2) - Detectabil [Nedetectabil -]						
Examene paraclinice:						
EKG						
ECO						

T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 03.05.2020RGR PULM D= 8.6 Gym2Accentuarea interstitiului peribronho-vasciular infrahilar in dreapta, in rest fara arii infiltrative sau focale evidente rgr. SCD libere. Cord, aorta radiologic normale. || T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 08.05.2020RGR PULM D= 6.6 Gym2Accentuarea interstitiului peribronho-vasciular infrahilar in dreapta.Fara arii infiltrative sau focale evidente rgr.SCD libere. Cord, aorta radiologic normale. || T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 05.05.2020RGR PULM D=6.5 Gym2Comparativ cu rgr din 3.05: aspectul este in evolutie cu aparitia unor mici infiltrate alveolare laterotoracic in dreapta.Se mentine accentuarea interstitiului peribronho-vascular infrahilar in dreapta. || T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 15.05.2020RGR PULM D=5.9 Gym2Accentuarea interstitiului peribronho-vascular infrahilar si parahilar in dreapta.Fara focare de condensare.SCD libere. Cord, aorta radiologic normale

Tratament efectuat

ALGOZONE 500MG X 20 CPR LABORMED \parallel CLEXANE 6000UI (60MG)/ 0,6ML * 10 SER. PRE. \parallel ERIDIAROM \parallel KALETRA 200mg/50mg*120cpr.filmate \parallel PARACETAMOL 500MG - MAGISTRA \parallel PLAQUENIL 200MG*60 compr.film. \parallel SOL. CONTRA AFTELOR

Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului: EPICRIZA

Pacienta in varsta de 21 de ani, fara APP semnificative, fara istoric de calatorie recenta. Se interneaza in serviciul nostru (via DSP, in urma testarii pozitive cu SARS-CoV-2), pacienta fiind asimptomatica. Mentionam ca pacienta este analfabeta, casnica, provine din focarul de infectie cu SARS-CoV-2 din Dej.

Din ancheta epidemiologica retinem ca nu a fost vaccinata antigripal, nu a avut contact apropiat cu persoane cu simptome caracteristice unei infectii respiratorii acute, in perioada de 14 zile anterioare debutului simptomelor. Mentionam ca pacienta nu a vizitat unitati sanitare in perioada de 14 zile anterioare debutului simptomelor. Nu poate preciza contactul cu un caz probabil sau confirmat in perioada 14 zile anterioare debutului simptomelor. Nu a vizitat in perioada de 14 zile anterioare debutului simptomelor vreun targ/piata de animale vii.

Obiectiv la internare: starea generala buna, subfebrila (37.5~grade C), constienta, orientata temporo-spatial, tegumente si mucoase: normal colorate, examen faringian: aspect normal, stabila hemodinamic si respirator (TA = 140/90~mmHg, AV = 100~b/min, SaO2 = 97~% in aa, FR = 16~resp/min, auscultatia cardio-pulmonara fara particularitati, abdomen liber, elastic, mobil cu miscarile respiratorii, tesut adipos in exces, nedureros la palpare superficiala/profunda, fara modificari de tranzit intestinal, mictiuni fiziologice, spontane, manevra Giordano (-) bilateral, fara semne de iritatie meningeana, fara semne de focar neurologic.

Biologic: discret sdr. inflamator (CRP, VSH usor crescute)

PCR SARS-CoV-2, proba 1 (01.05.2020): Detectabil. (COD CAZ CJ/6262/2020)

PCR SARS-CoV-2, proba 2 (10.05.2020): Detectabil. Anticorpi Anti-SARS-CoV-2 IgM/IgG REACTIVI.

PCR SARS-CoV-2, proba 3 (14.05.2020): Detectabil

RADIOGRAFIA TORACICA (03.05.2020): "Accentuarea interstitiului peribronho-vasciular infrahilar in dreapta, in rest fara arii infiltrative sau focale evidente rgr. SCD libere. Cord, aorta radiologic normale."

Rdg. pulmonara control (05.05.2020): "Comparativ cu rgr din 3.05: aspectul este in evolutie cu aparitia unor mici infiltrate alveolare laterotoracic in dreapta. Se mentine accentuarea interstitiului peribronho-vascular infrahilar in dreapta."

Rx. pulmonara control (08.05.2020): "Accentuarea interstitiului peribronho-vasciular infrahilar in dreapta. Fara arii infiltrative sau focale evidente rgr. SCD libere. Cord, aorta radiologic normale."

Rx. pulmonara control (15.05.2020): "Accentuarea interstitiului peribronho-vasciular infrahilar si parahilar in dreapta. Fara focare de condensare. SCD libere. Cord, aorta radiologic normale."

Pe parcursul internarii a urmat tratament cu antivirale (Kaletra 400mg/100mg 2x2tb/zi timp de 5 zile, Hidroxicloroquine 200mg 2x2tb/zi in prima zi, apoi 2x1tb/zi urmatoarele 9 zile), tratament anticoagulant cu Clexane 0.6ml (2x0.4 ml S.C./zi timp de 4 zile), simptomatice, antidiareice, cu

evolutie lent favorabila cu normalizarea probelor bioumorale (sdr. inflamator cu valori normale). Mentionam ca pacienta a fost izolata.

Se transfera la Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca, in afebrilitate, stabila hemodinamic si respirator (TA= 118/80 mmHg, AV= 89bpm, Sat.O2= 99% in aa), cu recomandarile:

Tratament recomandat

Pacienta va fi retestata RT-PCR SARS CoV2 (recomandam retestarea in data de 20.05.2020) (COD CAZ CJ/6262/2020) si va putea fi externata dupa obtinerea rezultatului "nedetectabil" la doua teste efectuate la interval de 24 ore.

Repaus la externare cu respectarea normelor de igiena personala dupa cum urmeaza :

- 1. Izolati-va singur(a) intr-o camera bine aerisita, de preferat cu baie proprie pe care sa nu o folositi in comun cu restul familiei. Daca este posibil, izolati-va intr-o locuinta separata de restul familiei.
- 2. Evitati complet contactul cu ceilalti membri ai familiei, cu alte persoane sau cu animale de companie. In cazul in care contactul nu poate fi sub nicio forma evitat complet, purtati intotdeauna masca atunci cand sunteti in preajma altor persoane (de exemplu, in aceeacamera, in aceeasi masina, etc.). Daca nu puteti purta masca, vor purta masca persoanele care intra in camera dumneavoastra. Masca de protectie trebuie sa acopere complet nasul si gura persoanei care o poarta. Atentie! Purtarea mastii nu recomandarea de a evita contactul cu alte persoane.
- 3. Nu mergeti la serviciu.
- 4. Nu folositi transportul in comun, taxi, uber sau alte mijloace de transport care sa presupuna un potential contact cu alte persoane.
- 5. Monitorizati-va starea de sanatate si contactati telefonic medicul in cazul in care este necesar.
- 6. Nu parasiti domiciliul in afara de motive medicale si asigurarea necesitatior alimentare si de igiena. In cazul in care aveti nevoie de ingrijire medicala urgenta, sunati la 112 si mentionati ca sunteti in izolare 14 zile dupa ce ati fost externat vindecat din spital dupa COVID-19, apoi mentionati care este urgenta medicala, astfel incat sa se poata lua masurile necesare, in conditii de siguranta.
- 7. Daca aveti nevoie de ingrijiri medicale care nu sunt urgente, de exemplu pentru o boala cronica stabila, luati legatura prin telefon cu medicul dumneavoastra, mentionand faptul ca sunteti in izolare 14 zile dupa ce ati fost externat din spital dupa COVID-19.
- 8. Daca stranutati sau tusiti acoperiti-va gura si nasul cu un servetel de unica folosinta, pe care aveti grija sa-l aruncati imediat intr-un cos de gunoi prevazut cu sac de gunoi de unica folosinta si inchis cu capac, apoi igienizati-va mainile.
- 9. Nu atingeti nimic cu mainile neigienizate dupa ce v-ati atins fata sau ati stranutat/tusit.
- 10. Spalati-va pe maini cu apa si sapun minimum 20 de secunde, frecvent, si neaparat dupa orice contact cu ochii, nasul sau gura, dupa stranut, tuse, sau suflarea nasului, precum si dupa utilizarea toaletei, si inainte de pregatirea sau servirea mesei.
- 11. Folositi prosoape de hartie, de preferat, pentru a va sterge mainile si fata.
- 12. Apa si sapunul timp de minimum 20 de secunde reprezinta varianta preferata de igienizare a mainilor. In cazul in care aceasta varianta nu este disponibila, folositi solutii anti-septice pentru maini, pe baza de alcool cu concentratie de minim 60%.
- 13. Dezinfectati frecvent, cel putin o data pe zi, cu solutie pe baza de alcool sau clor, suprafetele cu care intrati in contact, in special: mese, noptiere, blat de bucatarie, clante, obiecte sanitare, telefon, tableta, tastatura, sau alte suprafete. Utilizati solutiile dezinfectante conform instructiunilor producatorului.
- 14. Aerisiti de mai multe ori pe zi incaperea an care desfasurati activitati.
- 15. Serviti masa separat de restul familiei, in camera dumneavoastra, apoi spalati vesela si tacamurile cu detergent si apa din abundenta, sau folosind temperaturi inalte la masina de spalat vase, daca este posibil.
- 16. Nu beti lichide din aceeasi sticla/pahar cu alte persoane, nu mancati din aceeasi farfurie si nu folositi aceleasi tacamuri.

17. Nu folositi prosop sau asternut de pat comun cu restul familiei. Acestea, precum si hainele dumneavoastra, vor fi spalate si uscate separat de ale celorlalti membri ai familiei, la temperaturile cele mai inalte permise conform instructiunilor de pe eticheta.

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

Indicatie pentru revenire la internare		
X Nu, nu este necesara revenirea pentru internare		
Se completează obligatoriu una din cele două informatii S-a eliberat prescriptie medicală, caz în care se v Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu X Nu s-a eliberat prescriptie medicala Se completează obligatoriu una din cele două informatii S-a eliberat concediu medical la externare, caz îr Nu s-a eliberat concediu medical la externare dec X Nu s-a eliberat concediu medical la externare Se completează obligatoriu una din cele două informatii S-a eliberat recomandare pentru ingrijiri medical Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medical Se completează obligatoriu una din cele două informatii S-a eliberat prescriptie medicală pentru dispoziti Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispoziti Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru disponu a fost necesar	ra înscrie seria si numarul acesteia a fost necesar i: n care se va înscrie seria si numarul ace parece nu a fost necesar i: le la domiciliu/paliative la domiciliu icale la domiciliu/paliative la domiciliu icale medicale in ambulatoriu zitive medicale in ambulatoriu deoarec	1,
Unitate judeteana de diabet zaharat:		
Nr. inregistrare al asiguratului:		
Data 15.05.2020		
Sef sectie:	Medic curant:	Medic rezident:
Conf. Dr. RADULESCU AMANDA	Dr. BRAN ALINA	
Medic primar Dr. AMANDA PADULESCU medic primar belien estoase și epidem forest cod 048773	Dr. BRAN ALINA medic primar boli infectioase competență ecografia poporală cod/21281	
Calea de transmitere: - prin asigurat - prin posta *) Scrisoarea medicala se intocmeste în doua exemplare, di care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specia	•	
medicului de familie/medicului de specialitate din ambulator		

Un exemplar se constituie scrisoare medicala si se inmaneaza in termen de 72 de ore medicului de familie.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii , într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de

specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;

(cu