

BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA *)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca **VITAN DAVID**, nascut la data de **05.02.2019**, CNP / cod unic de asigurare **5190205125498**, Adresa: **Jud.CLUJ Loc.Dej Str.M. VITEAZU Nr.13** a fost internat in serviciul nostru in perioada: **03.05.2020 22:11 - 24.05.2020 16:30**, FO: **14349 F.O.** / nr. din Registrul de consultatii **BOLI INFECTIOASE V-COPII** si se externeaza: **VINDECAT**

Diagnostic:

RINOFARINGITA ACUTA
COVID-19 FORMA USOARA, VINDECATA
ANEMIE HIPOCROMA MICROCITARA
COVID-19 CU VIRUS IDENTIFICAT
HIPOTROFIE STATURO-PONDERALA
DIFICULTATI ALIMENTARE

Motivele prezentarii

Anamneza

- factori de risc

Examen clinic

- general

- local

Examine de laborator:

03.05.2020

Calciu total - 9.79 [9 - 11], **Creatinina** - 0.19 [0.2 - 0.4], **Feritina** - 5.3 [9.0 - 306.8], **Fier** - 20.5 [33 - 193], **Glicemie** - 72 [60 - 100], **GOT** - 38 [0 - 45], **GPT** - 16 [0 - 45],
Hemoleucograma completa - Leucocite 11.44 [5.0 - 13.0], - Hematii 4.90 [3.5 - 5.3], - Hemoglobina 9.6 [9.6 - 14.8], - Hematocrit 30.7 [31.0 - 45.0], - VEM 62.7 [72.0 - 100.0], - HEM 19.6 [23.8 - 34.2], - CHEM 31.3 [31.0 - 35.0], - Trombocite 400 [150 - 450], - NEUT% 27.6 [20 - 50], - LYMPH% 55.0 [46 - 70], - MONO% 8.8 [3.0 - 10.0], - EO% 8.3 [0 - 5], - BASO% 0.3 [0 - 2], - NEUT# 3.16 [1.5 - 8.5], - LYMPH# 6.29 [1.5 - 5.5], - MONO# 1.01 [0.15 - 1.3], - EO# 0.95 [0.00 - 0.67], - BASO# 0.03 [0 - 0.13], - RDW-CV 18.3 [9.9 - 15.5], - PDW* 14.7 [10 - 16.5], - MPV 10.6 [6.5 - 14.0], **K** - 4.5 [3.5 - 5.1], **LDH** - 333 [120 - 300], **Magneziu** - 2.25 [1.7 - 2.6], **Na** - 134 [136 - 146], **Proteina C reactiva** - 0.02 [0 - 1], **Trigliceride** - 61 [0 - 150], **Uree** - 21.8 [0 - 50], **VSH** - 13 [1 - 15], **APTT** - APTT (sec) 23.7 [22.1 - 28.1], - APTT (%) [-], **D-Dimeri** - 0.63 [0 - 0.55], **Fibrinogen** - 389 [180 - 400], **Timp de protrombina** - PT (sec) (plasma) 11.8 [8.9 - 13.1], - PT (%) (plasma) 85.1 [70 - 130], - INR (plasma) 1.07 [0.8 - 1.2]

08.05.2020

Creatinina - 0.20 [0.2 - 0.4], **Feritina** - 3.9 [9.0 - 306.8], **GOT** - 28 [0 - 45], **GPT** - 16 [0 - 45], **K** - 5.5 [3.5 - 5.1], **LDH** - 315 [120 - 300], **Na** - 136 [136 - 146], **Proteina C reactiva** - 0.04 [0 - 1], **Trigliceride** - 283 [0 - 150], **Uree** - 18 [0 - 50]

16.05.2020

Covid-19 (SARS-CoV-2) - Detectabil [Nedetectabil -]

19.05.2020

Covid-19 (SARS-CoV-2) - Detectabil [Nedetectabil -]

22.05.2020

Covid-19 (SARS-CoV-2) - Nedetectabil [Nedetectabil -]

23.05.2020

Covid-19 (SARS-CoV-2) - Nedetectabil [Nedetectabil -], Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgG - Nonreactiv (Index=0.649) [Index < 0.8 Nonreactiv>= 0.8 - < 1.2 Incert > =1.2 Reactiv -], Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgM - Reactiv (Index=1.323) [Index < 0.8 Nonreactiv>= 0.8 - < 1.2 Incert > =1.2 Reactiv -]

Examen paraclinice:

EKG

ECO

Rx

T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 04.05.2020RGR PULM D=1.3 Gym2Fara focare de condensare.Usoara accentuare a desenului interstitial infrahilar in dreapta.SCD libere.Cord, aorta in limite normale.

Altele

Tratament efectuat

BETABIOPTAL PIC.OFTA.*5ML || NIDOFLOL CREMA || NOVOCALMIN COPII X 12SUP ANTIBIOTICE || PARACETAMOL SUPOZ.125mg Antibiotica || SER FIZIOLOGIC 0.9% - 100ML || SIROP PATLAGINA*100ML VTL || SOL. CONTRA AFTELOR || SUNLYTE 8 PLICURI/CUT

Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului:

EPICRIZA

Pacientul in varsta de 1 ani si 2 luni, cunoscut cu broniolite repetitive, malformatie cardiaca (fara documentatie), vaccinat incomplet, se transfera din Spitalul Clinic de Copii, sectia Pneumologie, cu diagnosticul de COVID-19. Este fara simptomatologie la momentul internarii. Din ancheta epidemiologica, retinem ca nu a fost vaccinat antigripal si este contact apropiat cu caz confirmat infectie SARS CoV2 (tata).

Obiectiv la internare stare generala relativ buna, prezinta congestie faringiana moderata difuza, sistem ganglionar nepalpabil, torace normal conformat, MV fiziologic prezent bilateral, fara raluri supraadaugate, SatO2 98%, zgomote cardiace ritmice, suflu sistolic in focarul mitral gr. III, AV=110b/min. abdomen suplu, elastic, mobil cu miscarile respiratorii, liber, fara sensibilatate la palpare, tranzit intestinal prezent, diureza prezenta, exteriorizata spontan, fara semne de iritatie meningeana sau focare neurologice, lungime= 70 cm, G=9 kg.

Paraclinic(04.05.2020) se evidentiaza leucocite in limite normale, fara sindrom inflamator, eozinofilie usoara posibil in contextul unei parazitoze intestinale, limfocitoza, anemie microcitara hipocroma, sideremie scazuta, feritina scazuta, LDH crescut, d-dimeri minim crescuti, trigliceridemie. Radiografia pulmonara deceleaza o usoara accentuare a desenului interstitial infrahilar dreapta.

RT-PCR SARS-CoV-2 PROBA 1 (03.05.2020): DETECTABIL

PROBA 2 (17.05.2020): DETECTABIL

PROBA 3 (20.05.2020): DETECTABIL

PROBA 4 (23.05.2020): NEDETECTABIL

PROBA 5 (24.05.2020): NEDETECTABIL

Serologie SARS-COV-2: IgM- reactiv(index=1,323), IgG-nonreactiv(index=0,649).

Pe parcursul internarii a urmat tratament conform protocolului intern cu tratament antiviral cu Kaletra 80 mg/20 mg, 2x1.2ml/zi timp de 7zile, asociat cu simptomatice, cu evolutie favorabila. Mentionam ca pacientul a fost izolat.

Avand in vedere rezultatul negativ a doua probe consecutive rt-PCR SARS COV-2, pacientul se externeaza vindecat, cu stare generala buna, in afebrilitate, stabil hemodinamic si respirator.

Tratament recomandat

Recomandari la externare:

Se recomanda repaus relativ la domiciliu 14 zile dupa externare, in concediu medical, unde este cazul. Dupa ce ajungeti acasa se recomanda efectuarea dusului, hainele cu care ati plecat acasa se vor pune sac de gunoi (fara a fi scuturate). Hainele (inclusiv hainele care pe care le-ati folosit spital) se vor

pastră sac loc separat (balcon) timp de 5 zile, ulterior vor fi spalate la mașina de spălat haine (la cea mai mare temperatură permisă de producător) cu dezinfectant pentru haine și calcate ulterior. Se vor folosi mănuși pentru manipularea hainelor, care ulterior vor fi aruncate și va veti spala pe mâini cu apă și săpun. Telefonul, ceasul și alte obiecte electronice se vor dezinfecta cu servetele impregnate cu alcool.

Ce măsuri de igienă individuală trebuie să respecte persoanele izolate la domiciliu?

- Să evite contactul apropiat cu celelalte persoane din locuință și, dacă este posibil, să se izoleze camera separată, cu baie separată.
- Dacă se folosește aceeași baie, aceasta va fi dezinfectată după folosire, se va dezinfecta toaleta și toate obiectele atinse (inclusiv clante, Dezinfectarea se va face cu soluții pe bază de clor (Domestos) sau alcool (min 70 %).
- Să nu primească vizitatori perioada de autoizolare la domiciliu.
- Să se spele pe mâini cu apă și săpun, timp de cel puțin 20 de secunde, ori de câte ori este necesar (după utilizarea toaletei, pregătirii mesei, etc).
- Să curățe și să dezinfecteze zilnic toate suprafețele pe care le atinge frecvent (ex: mese, clante, obiecte de mobilier, bateria/robinetele de la chiuveta, alte obiecte care pot fi atinse și de alte persoane).
- Să acopere gura și nasul cu servetel de unică folosință sau cu o țesătură atunci când strănută sau tuse, sau să strănute și să tusească plica cotului. Bătăștia se aruncă imediat la gunoi, sac de plastic, după care se spală pe mâini cu apă și săpun timp de 20 de secunde.
- Să poarte mască când se întâlnește cu alte persoane.
- Purtarea măști este una dintre măsurile de prevenire și limitare pentru răspândirea anumitor boli respiratorii, inclusiv cea determinată de noul coronavirus. Cu toate acestea, doar utilizarea unei măști nu este suficientă pentru a asigura un nivel adecvat de protecție și ar trebui adoptate și alte măsuri la fel de relevante. Folosirea măști trebuie combinată cu igienă adecvată a mâinilor și cu alte măsuri de prevenire și control a transmiterii noului coronavirus de la om la om.
- În timpul utilizării, trebuie să evitați atingerea măști
- Să îndepărtați mască folosind tehnica adecvată (nu atingeți partea din față, ci snururile din spate), acțiune urmată de spălarea IMEDIATĂ a mâinilor cu apă și săpun;
 - Să nu reutilizați măștile de unică folosință!!!! Mască se schimbă la maxim 4 ore sau mai repede în caz de umezire.
- În cazul apariției unor probleme de sănătate se va lua legătura telefonică cu medicul de familie sau se va suna la 112.

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

Indicație pentru revenire la internare

☒ Nu, nu este necesară revenirea pentru internare

Se completează obligatoriu una din cele două informații:

- ☐ S-a eliberat prescripție medicală, caz în care se va înscrie seria și numărul acesteia
- ☐ Nu s-a eliberat prescripție medicală deoarece nu a fost necesar
- ☒ Nu s-a eliberat prescripție medicală

Se completează obligatoriu una din cele două informații:

- ☐ S-a eliberat concediu medical la externare, caz în care se va înscrie seria și numărul acestuia
- ☐ Nu s-a eliberat concediu medical la externare deoarece nu a fost necesar
- ☒ Nu s-a eliberat concediu medical la externare

Se completează obligatoriu una din cele două informații:

- ☐ S-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu
- ☒ Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu, deoarece nu a fost necesar

Se completează obligatoriu una din cele două informații:

Un exemplar se constituie scrisoare medicală și se înmânează în termen de 72 de ore medicului de familie.

*conform contractului cadru/2014 - model scrisoare medicală/Bilet de ieșire - anexa 43

- ☐ S-a eliberat prescripție medicală pentru dispozitive medicale în ambulatoriu
- ☒ Nu s-a eliberat prescripție medicală pentru dispozitive medicale în ambulatoriu deoarece nu a fost necesar

(cu viza Unității județene de implementare a programului, pentru diabet)

Unitate județeană de diabet zaharat:	
Nr. înregistrare al asiguratului:	

Data 24.05.2020

Sef sectie:

Dr. IUBU ROXANA

Medic primar

Dr. ROXANA IUBU
medic primar boli infecțioase
medic specialist pediatrie
cod D51027

Medic curant:

SZILAGYI TIMEA

Medic rezident:

Dr. SZILAGYI TIMEA
medic specialist
Boli Infecțioase
Cod R81881

Calea de transmitere:

- prin asigurat
- prin posta

*) Scrisoarea medicală se întocmește în două exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultația/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicală sau biletul de ieșire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externării, într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;