

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca Str. Iuliu Moldovan Nr. 23, 400348 Tel: +40-264-594655/565758; 593105. Fax: +40-264-593105; E-mail: infectioasecj@yahoo.com web:

ANMCS
unitate aflată în
PROCES DE ACREDITARE

BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA *)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca BLENCHE MIRELA DANIELA, nascut la data de 04.08.1977, CNP / cod unic de asigurare 2770804120654, Adresa: Jud.CLUJ Loc.Cluj Napoca Str.LACU ROSU Nr.6 Ap.13 a fost internat in serviciul nostru in perioada: 30.07.2020 23:00 - 07.08.2020 13:30, FO: 18501 F.O. / nr. din Registrul de consultatii BOLI INFECTIOASE II-ADULTI si se externeaza: AMELIORAT

Diagnostice:

INFECTIE COVID19 FORMA USOARA FARINGITA ACUTA ANEMIE NORMOCROMA NORMOCITARA FORMA USOARA

Motivele prezentarii
Anamneza
- factori de risc
Examen clinic - general
- local
Examene de laborator:
03.08.2020
APTT - APTT (sec) 22.4 [22.1 - 28.1] , - APTT (%) [-], Creatinina - 0.55 [0.5 - 0.9],
D-Dimeri - 0.32 [0 - 0.55], Feritina - 4.5 [11.0 - 306.8], Glicemie - 87 [70 - 105], GOT -
15 [0 - 35], GPT - 10 [0 - 35], Hemoleucograma completa - Leucocite 4.3 [3.9 - 11.1] , -
Hematii 3.34 [3.88 - 4.99] , - Hemoglobina 9.8 [11.5 - 15.4] , - Hematocrit 29.4 [36.0 - 48.0]
, - VEM 88.1 [81.0 - 99.0] , - HEM 29.3 [25.0 - 33.0] , - CHEM 33.3 [31.6 - 35.8] , -
RDW-CV% 14.9 [9.9 - 15.5], - Trombocite 274 [150 - 450], - MPV 8.7 [6.5 - 14.0], -
NEUT% 44.24 [40 - 70] , - LYMPH% 39.38 [20 - 40] , - MONO% 12.96 [3.0 - 10.0] , -
EO% 2.27 [0 - 5] , - BASO% 1.15 [0 - 2] , - NEUT# 1.916 [1.8 - 7.4] , - LYMPH# 1.705 [
1.1 - 3.5] , - MONO# 0.561 [0.21 - 0.92] , - EO# 0.098 [0.00 - 0.67] , - BASO# 0.050 [0 -
0.13], K - 4.9 [3.5 - 5.1], LDH - 155 [0 - 250], Na - 145 [136 - 146], Proteina C reactiva -
0.10 [0 - 1], Timp de protrombina - PT (sec) (plasma) 11.6 [9.4 - 13.6] , - PT (%) (plasma)
97.3 [70 - 130] , - INR (plasma) 1.01 [0.8 - 1.2], Uree - 25 [0 - 50], VSH - 19 [1 - 20]
04.08.2020
Covid-19 (SARS-CoV-2) - Detectabil [Nedetectabil -]
05.08.2020
APTT - APTT (sec) 22.6 [22.1 - 28.1] , - APTT (%) [-], Creatinina - 0.53 [0.5 - 0.9],
D-Dimeri - 0.38 [0 - 0.55], Feritina - 4.1 [11.0 - 306.8], Glicemie - 87 [70 - 105], GOT -
14 [0 - 35], GPT - 10 [0 - 35], Hemoleucograma completa - Leucocite 4.6 [3.9 - 11.1] , -
Hematii 3.55 [3.88 - 4.99] , - Hemoglobina 10.3 [11.5 - 15.4] , - Hematocrit 31.1 [36.0 - 48.0
], - VEM 87.5 [81.0 - 99.0], - HEM 29.0 [25.0 - 33.0], - CHEM 33.1 [31.6 - 35.8], -
RDW-CV% 14.4 [9.9 - 15.5] Trombocite 285 [150 - 450] MPV 8.5 [6.5 - 14.0]

NEUT% 54.91 [40 - 70] , - LYMPH% 33.51 [20 - 40] , - MONO% 8.50 [3.0 - 10.0] , - EO%

 $1.98 \ [\ 0-5\]\ , -\ BASO\%\ 1.10 \ [\ 0-2\]\ , -\ NEUT\#\ 2.526 \ [\ 1.8-7.4\]\ , -\ LYMPH\#\ 1.542 \ [\ 1.1-3.5\]\ , -\ MONO\#\ 0.391 \ [\ 0.21-0.92\]\ , -\ EO\#\ 0.091 \ [\ 0.00-0.67\]\ , -\ BASO\#\ 0.051 \ [\ 0-0.13\]\ , \\ \textbf{K}-4.3 \ [\ 3.5-5.1\]\ , \ \textbf{LDH}-149 \ [\ 0-250\]\ , \ \textbf{Na}-139 \ [\ 136-146\]\ , \ \textbf{Proteina}\ \textbf{C}\ \ \textbf{reactiva}-0.06 \ [\ 0-1\]\ , \ \textbf{Timp de protrombina}-PT\ (sec)\ (plasma)\ 11.9 \ [\ 9.4-13.6\]\ , -\ PT\ (\%)\ (plasma)\ 91.8 \ [\ 70-130\]\ , -\ INR\ (plasma)\ 1.03 \ [\ 0.8-1.2\]\ , \ \textbf{Uree}-28 \ [\ 0-50\]\ , \ \textbf{VSH}-10 \ [\ 1-20\]\ , \ \textbf{Anticorpi}\ \ \textbf{anti}\ \textbf{SARS-CoV-2}\ \textbf{IgG}-Nonreactiv} = 0.8-<1.2 \ Incert>=1.2\ Reactiv-]\ , \ \textbf{Anticorpi}\ \ \textbf{anti}\ \textbf{SARS-CoV-2}\ \textbf{IgM}-Nonreactiv}\ (Index=0.184)\ [\ Index<0.8\ Nonreactiv>=0.8-<1.2\ Incert>=1.2\ Reactiv-]\ \ \textbf{31.07.2020}$

APTT - APTT (sec) 23.6 [22.1 - 28.1] , - APTT (%) [-], **Creatinina** - 0.57 [0.5 - 0.9], **D-Dimeri** - 0.48 [0 - 0.55], **Feritina** - 8.8 [11.0 - 306.8], **Glicemie** - 83 [70 - 105], **GOT** - 19 [0 - 35], **GPT** - 10 [0 - 35], **Hemoleucograma completa** - Leucocite 5.04 [3.9 - 11.1] , - Hematii 3.75 [3.88 - 4.99] , - Hemoglobina 11.2 [11.5 - 15.4] , - Hematocrit 33.8 [36.0 - 48.0] , - VEM 90.1 [81.0 - 99.0] , - HEM 29.9 [25.0 - 33.0] , - CHEM 33.1 [31.6 - 35.8] , - Trombocite 373 [150 - 450] , - NEUT% 60.5 [40 - 70] , - LYMPH% 26.4 [20 - 40] , - MONO% 11.7 [3.0 - 10.0] , - EO% 0.8 [0 - 5] , - BASO% 0.6 [0 - 2] , - NEUT# 3.05 [1.8 - 7.4] , - LYMPH# 1.33 [1.1 - 3.5] , - MONO# 0.59 [0.21 - 0.92] , - EO# 0.04 [0.00 - 0.67] , - BASO# 0.03 [0 - 0.13] , - RDW-CV 13.8 [9.9 - 15.5] , - PDW* 11.1 [10 - 16.5] , - MPV 10.3 [6.5 - 14.0], **K** - 4.1 [3.5 - 5.1], **LDH** - 189 [0 - 250], **Na** - 139 [136 - 146], **Proteina C reactiva** - 1.57 [0 - 1], **Timp de protrombina** - PT (sec) (plasma) 12.5 [9.4 - 13.6] , - PT (%) (plasma) 82.1 [70 - 130] , - INR (plasma) 1.10 [0.8 - 1.2], **Uree** - 18 [0 - 50], **VSH** - 36 [1 - 20]

amene paraclinice:	
GG	
O	

Rx

T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 03.08.2020RGR.PULM.D= Gym2Fara leziuni pleuropulmonare evidente rgr.Cord cu ICT normal. || T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 31.07.2020RGR.PULM.D= Gym2Fara leziuni pleuro-pulmonare evidente rgr. Cord de aspect rgr.normal.

Altele

Tratament efectuat

ALGIFEN 5ML \parallel CLEXANE 6000UI (60MG)/ 0,6ML * 10 SER. PRE. \parallel CODEINA FOSFAT 15MG - LABORMED \parallel DESLORATADINA AUROBINDO 5MG*30CPR.FILM. \parallel DIAZEPAM 10MG*20cpr GEDEON R. \parallel KALETRA 200mg/50mg*120cpr.filmate \parallel LIVERPLUS 35MG - SILIMARINA BIOEEL \parallel METOCLOPRAMID 10MG LAROPHARM \parallel NITRAZEPAM 2,5 MG LPH X 30 CPR \parallel NITRAZEPAM 5MG*30CPR LPH \parallel OMEPRAZOL 20MG*28CPS -ZENTIVA \parallel PARACETAMOL 500MG ZENTIVA*20CPR \parallel PLAQUENIL 200MG*60 compr.film. \parallel SIROP PATLAGINA*100ML VTL \parallel VITAMINA C 1000MG+D3 2000UI*30CPR. FILM/ BERES

Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului: EPICRIZA

Pacienta in varsta de 42 de ani, cunoscuta cu prolaps de valva mitrala si litiaza renala, acuza incepand cu data de 26.07 frisoane, iar in urmatoarele zile se asociaza febra (38,7 C), disfagie cu odinofagie, tuse seaca si greturi. In 30.07 efectueaza in cadrul SCBI test RT-PCR-SARS-COV2 cu rezultat detectabil, motiv pentru care este internata in clinica noastra pentru investigatii suplimentare si conduita terapeutica de specialitate.

Ancheta epidemiologica este neconcludenta.

Obiectiv la internare prezinta stare generala usor influentata, constienta, cooperanta, afebrila, faringe discret congestionat, steto-acustic pulmonar (SpO2=96% aa) murmur vezicular fiziologic, transmis simetric bilateral, fara raluri supraadaugate, echilibrata cardiac (TA=135/75 mmHg, AV=75 bpm), abdomen moale, mobil cu respiratia, nedureros spontan si la palpare, tranzit intestinal fiziologic, fara organomegalii, loje renale libere, Giordano negativ bilateral, puncte ureterale nedureroase, fara semne de iritatie meningeana, fara semne de focar neurologic.

Biologic la internare prezinta usoara monocitoza, anemie normocroma normocitara, sindrom inflamator (VSH si CRP reactionate).

Radiografia toracica (31.07.2020) evidentiaza aspect normal, fara modificari pleuro-pulmonare active evidente rgr, iar la radiografia de control din 03.08 nu se constata modificari.

PROBA NR. 1/RT-PCR-SARS-COV2/30.07.2020 - DETECTABIL PROBA NR. 2/ RT-PCR-SARS-COV2/05.08.2020 - DETECTABIL

Pe perioada internarii a urmat tratament conform protocolului cu Plaquenil 200 mg (doza de incarcare 2x2 cpr/zi p.o, apoi 2x1 cpr/zi p.o timp de 7 zile), Kaletra (2x2 tb/zi p.o) timp de 4 zile, apoi se sisteaza terapia cu kaletra din cauza reactiilor adverse aparute (scaune diareice multiple), profilaxia TEP/TVP cu Clexane 0,4 ml s.c /zi, Paracetamol (1 cpr/zi p.o la nevoie), Vit C+D3 (p.o 1 cpr/zi), Liv 52 (3x1 cpr/zi p.o), Nitrazepam (1 tb/zi p.o, seara), cu evolutie clinico-biologica favorabila.

familie, fiecare dintre medicamentele recomandate	e de medicul din ambulatoriu, inclusiv n	nedicul de
Indicatie pentru revenire la internare		
X Nu, nu este necesara revenirea pentru internare		
Se completeazã obligatoriu una din cele douã inforr -	se va înscrie seria si numarul acesteia nu a fost necesar natii: nz în care se va înscrie seria si numarul e deoarece nu a fost necesar e natii: licale la domiciliu/paliative la domiciliu nedicale la domiciliu/paliative la domici	1
 S-a eliberat prescriptie medicală pentru disperture d	ozitive medicale in ambulatoriu spozitive medicale in ambulatoriu deoa	arece
- ☐ S-a eliberat prescriptie medicală pentru dispo - ☒ Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru di nu a fost necesar (cu viza Unitatii judetene de implementare a programulu	ozitive medicale in ambulatoriu spozitive medicale in ambulatoriu deoa	arece
- ☐ S-a eliberat prescriptie medicală pentru disporturulululululululululululululululululul	ozitive medicale in ambulatoriu spozitive medicale in ambulatoriu deoa	arece
- S-a eliberat prescriptie medicalã pentru disportante de la serie de la seri	ozitive medicale in ambulatoriu spozitive medicale in ambulatoriu deoa	arece
- S-a eliberat prescriptie medicalã pentru disported - Nu s-a eliberat prescriptie medicalã pentru de nu a fost necesar (cu viza Unitatii judetene de implementare a programulu Unitate judeteana de diabet zaharat: Nr. inregistrare al asiguratului: Data 07.08.2020	ozitive medicale in ambulatoriu spozitive medicale in ambulatoriu deoa ni, pentru diabet)	
- S-a eliberat prescriptie medicalã pentru disportante de la serie de la seri	ozitive medicale in ambulatoriu spozitive medicale in ambulatoriu deoa	Medic rezident:

- prin asigurat

- prin posta

Un exemplar se constituie scrisoare medicala si se inmaneaza in termen de 72 de ore medicului de familie.

*) Scrisoarea medicala se intocmeste în doua exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii, într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;