

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca Str. Iuliu Moldovan Nr. 23, 400348 Tel: +40-264-594655/565758; 593105. Fax: +40-264-593105;

E-mail: infectioasecj@yahoo.com web: www.infectioasecluj.ro



BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA *)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca ORHEANU VLAD ANDREI , nascut la data de 26.04.2006, CNP / cod unic de asigurare 5060426125801 , Adresa: Jud.CLUJ Loc.Campia Turzii Str.GRIVITEI Nr.12 Ap.33 a fost internat in serviciul nostru in perioada: 16.08.2020 12:09 - 23.08.2020 15:00, FO: 19842 F.O. / nr. din Registrul de consultatii BOLI INFECTIOASE V-COPII si se externeaza: AMELIORAT

Diagnostice:

TRAHEO-BRONSITA ACUTA INFECTIE SARS-COV-2, FORMA USOARA COVID-19 CU VIRUS IDENTIFICAT

Motivele prezentarii	
Anamneza	
- factori de risc	
Examen clinic	
- general	
- local	
Examene de laborator:	
16.08.2020	
APTT - APTT (sec) 24.5 [22.1 - 28.1] , - APTT (%) [-], Creatinina - 0.79 [0.57 - 0.87],	
D-Dimeri - 0.19 [0 - 0.55], Feritina - 50.9 [9.0 - 306.8], Fibrinogen - 252 [180 - 400],	
Glicemie - 81 [60 - 100], GOT - 24 [0 - 45], GPT - 17 [0 - 45], Hemoleucograma	
completa - Leucocite 4.8 [3.7 - 9.5] , - Hematii 5.44 [4.32 - 5.66] , - Hemoglobina 16.2 [13.3	
- 17.6], - Hematocrit 45.0 [39.0 - 51.0], - VEM 82.9 [82.0 - 98.0], - HEM 29.8 [25.0 - 33.0	
], - CHEM 36.0 [31.6 - 35.8], - RDW-CV% 13.7 [9.9 - 15.5], - Trombocite 167 [150 - 450	
], - MPV 9.2 [6.5 - 14.0], - NEUT% 32.01 [40 - 70], - LYMPH% 54.68 [20 - 40], -	
MONO% 10.78 [3.0 - 10.0] , - EO% 1.90 [0 - 5] , - BASO% 0.63 [0 - 2] , - NEUT# 1.549 [
1.5 - 6.6], - LYMPH# 2.645 [1.1 - 3.5], - MONO# 0.521 [0.21 - 0.92], - EO# 0.092 [0.00 -	
0.67], - BASO# 0.031 [0 - 0.13], K - 4.4 [3.5 - 5.1], LDH - 171 [120 - 300], Na - 143 [136 - 146], Proteina C reactiva - 0.08 [0 - 1], Timp de protrombina - PT (sec) (plasma) 12.7 [
9.4 - 13.6], - PT (%) (plasma) 79.2 [70 - 130], - INR (plasma) 1.11 [0.8 - 1.2], Uree - 33 [0	
- 50], VSH - 3[1 - 15]	
21.08.2020	
Covid-19 (SARS-CoV-2) - Incert [Nedetectabil -]	
Examene paraclinice:	
EKG	
ECO	
Rx	
T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 17.08.2020RG. PULMD=3 Gym2Fara leziuni pulmonare focale sau	
infiltrative evidente rgr. SCD libere.Cord, aorta radiologic in limite normale.	
Altele	

Tratament efectuat

ACETILCISTEINA 200MG LAROPHARM || ALGOZONE 500MG X 20 CPR LABORMED || ERIDIAROM || KALETRA 200mg/50mg*120cpr.filmate || LOPINAVIR AND RITONAVIR (KALETRA) 200MG/50MG || PARACETAMOL 500MG ZENTIVA*20CPR || PLAQUENIL 200MG*60 compr.film. || VITAMINA C 1000mg*30cpr BERES

Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului: EPICRIZA

Pacient in varsta de 14 ani, fara APP semnificative, se interneaza in serviciul nostru pentru anosmie, ageuzie, stare de subfebrilitate (37.5 gradeC), rinoree apoasa, scaune diareice(2 episoade), cu debut brusc, in urma cu 4 zile. S-a efectuat testare RT-PCR-COVID-19 - detectabil in 14.08.2020. Se interneaza in serviciul nostru pentru monitorizare, tratament de specialitate.

Din ancheta epidemiologica : fara istoric de calatorie in afara tarii, fara contact recent cu sectorul sanitar, fara contact cunoscut cu caz suspect/ confirmat de infectie COVID-19, fara contact recent cu persoane cu IACRS.

La examenul obiectiv: pacient afebril,constient, cooperant, cu tegumente normal colorate, rinoree apoasa, discreta congestie faringeana, stabil respirator, SpO2= 98% in a.a., la auscultatia pulmonara prezinta murmur vezicular fiziologic, fara raluri pulmonare supraadaugate, este stabil hemodinamic, A V= 92/min, zgomote cardiace ritmice, TA= 124/70 mmHg, abdomenul moale, fara sensibilitate la palpare, tranzit prezent, diureza exteriorizata spontan, fara semne de iritatie meningeana sau neurologice de focar, fara alte modificari la examenul obiectiv.

Paraclinic: fara modificari pe examinarile biologice uzuale.

Radiografia pulmonara la internare - fara leziuni pleuro-pulmonare active.

Se interpreteaza cazul cu diagnosticele de mai sus.

Pe durata internarii pacientul a fost izolat, a urmat tratament medicamentos cu Plaquenil 2x400 mg/zi po in ziua 1, ulterior 2x200 mg/zi po urmatoarele 6 zile, Kaletra 2x 400/100 mg/zi po timp de 7 zile, mucolitice, antidiareice si simptomatice la nevoie.

PCR SARS-COV-2-PROBA 2923.08.2020)-INCERT

Se externeaza in afebrilitate, stabil hemodinamic si respirator, cu recomandarile:

Tratament recomandat

Conform Ordinului 1321/22.07.2020 se indica izolare la domicliu/locatia declarata pe o perioada de 4 zile de la externare. In aceasta perioada nu se va parasi domiciliul/locatia declarata.

Acestia pot desfasura activitatile curente si profesionale cu pastrarea distantarii si purtarea mastii acasa si la locul de munca pentru inca 10 zile, dupa incheierea perioadei de izolare.

Dupa ce ajungeti acasa se recomanda efectuarea dusului, hainele cu care ati plecat acasa se vor pune intr-un sac impermeabil (fara a fi scuturate). Hainele (inclusiv hainele care pe care le-ati folosit in spital) se vor pastra in sac intr-un loc separat (preferabil pe balcon) timp de 5 zile, ulterior vor fi spalate la masina de spalat haine (la cea mai mare temperatura permisa de producator) cu dezinfectant pentru haine si calcate ulterior. Se vor folosi manusi pentru manipularea hainelor, care ulterior vor fi aruncate si va veti spala pe mcu apa si sapun. Telefonul, ceasul si alte obiecte electronice se vor dezinfecta cu servetele impregnate cu alcool.

Masuri de igiena individuala de respectat la domiciliu:

Sa se evite contactul apropiat cu celelalte persoane din locuinta si, daca este posibil, sa se izoleze camera separata, cu baie separata.

Daca se foloseste aceeasi baie, aceasta va fi dezinfectata dupa folosire, se va dezinfecta toaleta si toate obiectele atinse (inclusiv clante, intrerupatoare). Dezinfectarea se va face cu solutii pe baza de clor (ex. Domestos) sau alcool (min 70 %).

Sa nu primeascvizitatori in perioada de izolare la domiciliu/locatia declarata.

Sa se spele pe maini cu apa si sapun, timp de cel putin 20 de secunde, ori de cate ori este necesar (dupa utilizarea toaletei, inaintea pregatirii mesei, etc).

Sa curate si sa dezinfecteze zilnic toate suprafetele pe care le atinge frecvent (ex: mese, clante, obiecte de mobilier, bateria/robinetele de la chiuveta, alte obiecte care pot fi atinse si de alte persoane).

Sa isi acopere gura si nasul cu servetel de unica folosinta sau cu o tesatura atunci cand stranuta sau

tuseste, sau sa stranute si sa tuseasca in plica cotului. Batista se arunca imediat la gunoi, in sac de plastic, dupa care se spala pe maini cu apa si sapun timp de 20 de secunde.

Sa pastreze distanta de minim 1,5 m atunci cand se intalneste cu alte persoane.

Sa poarte masca cand se intalneste cu alte persoane. Masca trebuie sa acopere nasul si gura.

Purtarea mastii este una dintre masurile de prevenire si limitare pentru raspandirea anumitor boli respiratorii, inclusiv cea determinata de noul coronavirus. Cu toate acestea, doar utilizarea unei masti nu este suficienta pentru a asigura un nivel adecvat de protectie si ar trebui adoptate si alte masuri la fel de relevante. Folosirea mastii trebuie combinata cu igiena adecvata a mainilor si cu alte masuri de prevenire si control a transmiterii noului coronavirus de la om la om.

- -in timpul utiliztrebuie sa evitati atingerea mastii;
- -sa indepartati masca folosind tehnica adecvata (nu atingeti partea din fata, ci indepartati snururile din spate), actiune urmata de spalarea IMEDIATA a mainilor cu apa si sapun;
- -sa nu reutilizati mastile de unica folosinta. Masca se schimba la maxim 4 ore sau mai repede caz de umezire.

Monitorizarea dupa externare:

Monitorizarea starii de sanatate a pacientului pe perioada izolarii la domicliu se face de catre medicul de familie zilnic, prin sistemul de telemedicina. Pacientii care nu sunt inscrisi pe lista unui medic de familie vor fi monitorizati zilnic de catre DSP judeteana. In cazul aparitiei unor probleme de sanatate se va lua legatura telefonica cu medicul de familie sau se va suna la 112.

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

Indicatie pentru revenire la internare X Nu, nu este necesara revenirea pentru internare Se completează obligatoriu una din cele două informatii: - S-a eliberat prescriptie medicală, caz în care se va înscrie seria si numarul acesteia - Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu a fost necesar - X Nu s-a eliberat prescriptie medicala Se completează obligatoriu una din cele două informatii: - S-a eliberat concediu medical la externare, caz în care se va înscrie seria si numarul acestuia - Nu s-a eliberat concediu medical la externare deoarece nu a fost necesar X Nu s-a eliberat concediu medical la externare Se completează obligatoriu una din cele două informatii: - S-a eliberat recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu X Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu, deoarece nu a fost necesar Se completeazã obligatoriu una din cele douã informatii: - S-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu X Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu deoarece nu a fost necesar (cu viza Unitatii judetene de implementare a programului, pentru diabet)

Un exemplar se constituie scrisoare medicala si se inmaneaza in termen de 72 de ore medicului de familie.

Medic curant:

Dr. TOMESCU SERBAN

Medic rezident:

Unitate judeteana de diabet zaharat:

Nr. inregistrare al asiguratului:

Sef sectie:

Dr. IUBU ROXANA

Data 23.08.2020

Dr. ROXANA IUBU
medic primar boli infectioase
medic specialist pediatrie
cod D51027



Calea de transmitere:

- prin asigurat
- prin posta

*) Scrisoarea medicala se intocmeste în doua exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii , într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;