

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca Str. Iuliu Moldovan Nr. 23, 400348 Tel: +40-264-594655/565758; 593105. Fax: +40-264-593105; E-mail: infectioasecj@yahoo.com web:

unitate affată în
PROCES DE ACREDITARE

## BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA \*)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca BABA LARISA- ANTONIA, nascut la data de 06.06.2018, CNP / cod unic de asigurare 6180606124931, Adresa: Jud.CLUJ Loc.Turda Str.RAPSODIEI Nr.3B Ap.24 a fost internat in serviciul nostru in perioada: 17.08.2020 18:30 - 21.08.2020 15:00, FO: 19922 F.O. / nr. din Registrul de consultatii BOLI INFECTIOASE VI-COPII si se externeaza: AMELIORAT

www.infectioasecluj.ro

## Diagnostice:

COVID-19 CONFIRMAT FORMA USOARA RINOFARINGITA ACUTA ALERGIE LA PARACETAMOL

Motivele prezentarii
Anamneza
- factori de risc
Examen clinic
- general
- local
Examene de laborator:
17.08.2020
<b>APTT</b> - APTT (sec) 22.4 [ 22.1 - 28.1 ] , - APTT (%) [ - ], <b>Creatinina</b> - 0.29 [ 0.2 - 0.4 ],
<b>D-Dimeri</b> - 0.56 [ 0 - 0.55 ], <b>Feritina</b> - 29.5 [ 9.0 - 306.8 ], <b>Fibrinogen</b> - 243 [ 180 - 400 ],
Glicemie - 77 [ 60 - 100 ], GOT - 33 [ 0 - 35 ], GPT - 13 [ 0 - 35 ], Hemoleucograma
completa - Leucocite 5.7 [ 5.0 - 13.0 ] , - Hematii 4.90 [ 3.5 - 5.3 ] , - Hemoglobina 12.8 [ 9.6 -
14.8], - Hematocrit 37.1 [ 31.0 - 45.0], - VEM 75.8 [ 72.0 - 100.0], - HEM 26.1 [ 23.8 - 34.2
], - CHEM 34.4 [ 31.0 - 35.0 ], - RDW-CV% 13.9 [ 9.9 - 15.5 ], - Trombocite 314 [ 150 - 450
], - MPV 7.0 [ 6.5 - 14.0 ], - NEUT% 30.86 [ 20 - 50 ], - LYMPH% 56.79 [ 46 - 70 ], -
MONO% 9.51 [ 3.0 - 10.0 ] , - EO% 2.31 [ 0 - 5 ] , - BASO% 0.53 [ 0 - 2 ] , - NEUT# 1.765 [
1.5 - 8.5 ] , - LYMPH# 3.247 [ 1.5 - 5.5 ] , - MONO# 0.544 [ 0.15 - 1.3 ] , - EO# 0.132 [ 0.00 -
0.67], - BASO# 0.030[0 - 0.13], <b>K</b> - 4.6[3.5 - 5.1], <b>LDH</b> - 259[120 - 300], <b>Na</b> - 140[136
- 146], <b>Proteina C reactiva</b> - 0.05 [ 0 - 1 ], <b>Timp de protrombina</b> - PT (sec) (plasma) 12.5 [
9.4 - 13.6], - PT (%) (plasma) 82.1 [ 70 - 130 ], - INR (plasma) 1.10 [ 0.8 - 1.2 ], <b>Trigliceride</b>
- 52 [ 0 - 150 ], <b>Uree</b> - 22 [ 0 - 50 ], <b>VSH</b> - 5 [ 1 - 20 ]
Examene paraclinice:
EKG
ECO
Rx
T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 18.08.2020 RG.PULM. D= 1.5Gym2RADIOGRAFIE PULMONARA
PANu se vizualizeaza leziuni focale sau infiltrative evidente RGR pulmonar bilateral.SCD libere.
Altele
Tratament efectuat

ALGOCALMIN 1G/2 ML  $\parallel$  GLUCOZA 5%250ML BRAUN  $\parallel$  HEPIFLOR BABY\*10PL  $\parallel$  KALETRA 200mg/50mg\*120cpr.filmate  $\parallel$  KALETRA 80MG/ML+20MG/ML SOL ORALA\*60ML  $\parallel$  NIDOFLOR CREMA  $\parallel$  NOVOCALMIN COPII X 12SUP ANTIBIOTICE  $\parallel$  SER FIZIOLOGICO.9%250ML BRAUN RO

# Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului: EPICRIZA

Pacienta in varsta de 2 ani, cunoscuta cu alergie la Paracetamol, se interneaza in clinica noastra impreuna cu mama in data de 17.08.2020, cu urmatoarele acuze: subfebrilitati, inapetenta, rinoree, simptomatologie debutata cu aproximativ 2 zile anterior internarii. Mentionam ca mama pacientei a fost confirmata cu COVID-19 in data de 11.08.2020, motiv pentru care pacienta in data de 13.08.2020 a fost testata pentru infectie cu SARS-COV-2 cu rezultat nedetectabil (proba 1, cod caz CJ38672/2020). Ulterior deoarece dezvolta simptome, in data de 16.08.2020 se retesteaza cu rezultat detectabil (proba 2, cod caz CJ38672/2020).

Din ancheta epidemiologica retinem faptul ca pacienta a avut contact direct cu 2 persoane (mama si unchiul) confirmate SARS COV-2.

Obiectiv la internare: stare generala relativ buna, constienta, cooperanta, afebrila, inpetenta, T-98 cm, G-16 kg, congestie faringiana difuza, torace normal conformat, fara raluri supraadaugate, Sa O2-98% aa, zgomote cardiace ritmice, bine batute, fara sufluri supraadaugate auscultatoric, AV-111 b/min, abdomen mobil cu respiratia, liber, nedureros la palparea superficiala si profunda, tranzit intestinal prezent, diureza prezenta, fara semne de iritatie meningeana sau de focar neurologic.

Biologic la internare: hemoleucograma si parametrii biochimici in limite normale.

Radiologic la momentul internarii nu se descriu modificari patologice.

S-a interpretat cazul cu diagnosticele sus mentionate si s-a administrat tratament conform protocolului cu: Kaletra sirop 2x2,2 ml/zi timp de 4 zile, simptomatice, cu evolutie clinic favorabila.

Se externeaza ameliorata, la cerere, cu decizie din partea DSP Cluj de continuare a izolarii la domiciliu pana in data de 29.08.2020, cu recomandari.

#### Tratament recomandat

Conform Ordinului 1321/22.07.2020 se indica izolare la domicliu/locatia declarata pe o perioada de 9 zile de la externare (pana la implinirea a 14 zile de la momentul diagnosticului). In aceasta perioada nu se va parasi domiciliul/locatia declarata.

Acestia pot desfasura activitatile curente si profesionale cu pastrarea distantarii si purtarea mastii acasa si la locul de munca pentru inca 10 zile, dupa incheierea perioadei de izolare.

Dupa ce ajungeti acasa se recomanda efectuarea dusului, hainele cu care ati plecat acasa se vor pune intr-un sac impermeabil (fara a fi scuturate). Hainele (inclusiv hainele care pe care le-ati folosit in spital) se vor pastra in sac intr-un loc separat (preferabil pe balcon) timp de 5 zile, ulterior vor fi spalate la masina de spalat haine (la cea mai mare temperatura permisa de producator) cu dezinfectant pentru haine si calcate ulterior. Se vor folosi manusi pentru manipularea hainelor, care ulterior vor fi aruncate si va veti spala pe mcu apa si sapun. Telefonul, ceasul si alte obiecte electronice se vor dezinfecta cu servetele impregnate cu alcool.

Masuri de igiena individuala de respectat la domiciliu:

Sa se evite contactul apropiat cu celelalte persoane din locuinta si, daca este posibil, sa se izoleze camera separata, cu baie separata.

Daca se foloseste aceeasi baie, aceasta va fi dezinfectata dupa folosire, se va dezinfecta toaleta si toate obiectele atinse (inclusiv clante, intrerupatoare). Dezinfectarea se va face cu solutii pe baza de clor (ex. Domestos) sau alcool (min 70 %).

Sa nu primeascvizitatori in perioada de izolare la domiciliu/locatia declarata.

Sa se spele pe maini cu apa si sapun, timp de cel putin 20 de secunde, ori de cate ori este necesar (dupa utilizarea toaletei, inaintea pregatirii mesei, etc).

Sa curate si sa dezinfecteze zilnic toate suprafetele pe care le atinge frecvent (ex: mese, clante, obiecte de mobilier, bateria/robinetele de la chiuveta, alte obiecte care pot fi atinse si de alte persoane).

Sa isi acopere gura si nasul cu servetel de unica folosinta sau cu o tesatura atunci cand stranuta sau tuseste, sau sa stranute si sa tuseasca in plica cotului. Batista se arunca imediat la gunoi, in sac de plastic, dupa care se spala pe maini cu apa si sapun timp de 20 de secunde.

Sa pastreze distanta de minim 1,5 m atunci cand se intalneste cu alte persoane.

Sa poarte masca cand se intalneste cu alte persoane. Masca trebuie sa acopere nasul si gura.

Purtarea mastii este una dintre masurile de prevenire si limitare pentru raspandirea anumitor boli respiratorii, inclusiv cea determinata de noul coronavirus. Cu toate acestea, doar utilizarea unei masti nu este suficienta pentru a asigura un nivel adecvat de protectie si ar trebui adoptate si alte masuri la fel de relevante. Folosirea mastii trebuie combinata cu igiena adecvata a mainilor si cu alte masuri de prevenire si control a transmiterii noului coronavirus de la om la om.

- -in timpul utiliztrebuie sa evitati atingerea mastii;
- -sa indepartati masca folosind tehnica adecvata (nu atingeti partea din fata, ci indepartati snururile din spate), actiune urmata de spalarea IMEDIATA a mainilor cu apa si sapun;
- -sa nu reutilizati mastile de unica folosinta. Masca se schimba la maxim 4 ore sau mai repede caz de umezire.

## Monitorizarea dupa externare:

Monitorizarea starii de sanatate a pacientului pe perioada izolarii la domicliu se face de catre medicul de familie zilnic, prin sistemul de telemedicina. Pacientii care nu sunt inscrisi pe lista unui medic de familie vor fi monitorizati zilnic de catre DSP judeteana. In cazul aparitiei unor probleme de sanatate se va lua legatura telefonica cu medicul de familie sau se va suna la 112.

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

# Indicatie pentru revenire la internare X Nu, nu este necesara revenirea pentru internare Se completează obligatoriu una din cele două informatii: - US-a eliberat prescriptie medicală, caz în care se va înscrie seria si numarul acesteia - Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu a fost necesar - X Nu s-a eliberat prescriptie medicala Se completează obligatoriu una din cele două informatii: - S-a eliberat concediu medical la externare, caz în care se va înscrie seria si numarul acestuia - Nu s-a eliberat concediu medical la externare deoarece nu a fost necesar X Nu s-a eliberat concediu medical la externare Se completează obligatoriu una din cele două informatii: - S-a eliberat recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu X Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu, deoarece nu a fost necesar Se completeazã obligatoriu una din cele douã informatii: - S-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu X Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu deoarece nu a fost necesar

Unitate judeteana de diabet zaharat:

Nr. inregistrare al asiguratului:

Data 21.08.2020

Sef sectie:
Dr. SABOU MIHAELA

(cu viza Unitatii judetene de implementare a programului, pentru diabet)

**Medic curant:** 

**Medic rezident:** 

SABOU MIHAELA Dr. IUBU ROXANA

Medic primar

Dr. MIHAELA SABOU medic primay boli infections A71371 Medic primar

Dr. ROXANA IUBU
medic primar boli infectioase
medic specialist pediatrie
cod D51627

Calea de transmitere:

- prin asigurat
- prin posta .....

-----

\*) Scrisoarea medicala se intocmeste în doua exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii , într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;