

Motivala prozentarii

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca Str. Iuliu Moldovan Nr. 23, 400348 Tel: +40-264-594655/565758; 593105. Fax: +40-264-593105;

E-mail: infectioasecj@yahoo.com web:

PROCES DE ACREDITARE

BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA *)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca SZABO HILDA - SARA, nascut la data de 10.01.1992, CNP / cod unic de asigurare 2920110266887, Adresa: Jud.CLUJ Loc.Cluj Napoca Str.F - CII DE ZAHAR Nr.143 a fost internat in serviciul nostru in perioada: 22.07.2020 03:21 - 30.07.2020 10:00, FO: 17971 F.O. / nr. din Registrul de consultatii BOLI INFECTIOASE II-ADULTI si se externeaza: AMELIORAT

Diagnostice:

INFECTIE COVID19 FORMA USOARA ANGINA ACUTA ERITEMATOASA DIFICULTATI DE ALIMENTATIE

Anamneza			
- factori de risc			
Examen clinic - general			
- local			
Examene de laborator:			
22.07.2020			
Covid-19 (SARS-CoV-2) - Detectabil [Nedetectabil -], APTT - APTT (sec) 24.0 [22.1 - 28.1	L		
] , - APTT (%) [-], Creatinina - 0.66 [0.5 - 0.9], D-Dimeri - 0.40 [0 - 0.55], Feritina - 71.0)		
[11.0 - 306.8], Glicemie - 78 [70 - 105], GOT - 19 [0 - 35], GPT - 21 [0 - 35],			
Hemoleucograma completa - Leucocite 4.19 [3.9 - 11.1] , - Hematii 4.20 [3.88 - 4.99] , -			
Hemoglobina 13.6 [11.5 - 15.4], - Hematocrit 38.2 [36.0 - 48.0], - VEM 91.0 [81.0 - 99.0]	,		
- HEM 32.4 [25.0 - 33.0] , - CHEM 35.6 [31.6 - 35.8] , - Trombocite 209 [150 - 450] , -			
NEUT% 50.8 [40 - 70] , - LYMPH% 32.5 [20 - 40] , - MONO% 15.5 [3.0 - 10.0] , - EO%			
0.7 [0 - 5] , - BASO% 0.5 [0 - 2] , - NEUT# 2.13 [1.8 - 7.4] , - LYMPH# 1.36 [1.1 - 3.5] ,			
MONO# 0.65 [0.21 - 0.92] , - EO# 0.03 [0.00 - 0.67] , - BASO# 0.02 [0 - 0.13] , - RDW-CV			
11.7 [9.9 - 15.5] , - PDW* 11.8 [10 - 16.5] , - MPV 10.4 [6.5 - 14.0], LDH - 185 [0 - 250],			
Proteina C reactiva - 0.35 [0 - 1], Timp de protrombina - PT (sec) (plasma) 11.3 [9.4 - 13.6	6		
], - PT (%) (plasma) 103.2 [70 - 130], - INR (plasma) 0.98 [0.8 - 1.2], Uree - 16 [0 - 50],			
VSH - 4 [1 - 20]			
25.07.2020			
APTT - APTT (sec) 22.0 [22.1 - 28.1] , - APTT (%) [-], Creatinina - 0.64 [0.5 - 0.9],			
D-Dimeri - 0.39 [0 - 0.55], Eozinofile totale - Eozinofilie totala = 200/ microlitru [-],			
Feritina - 94.5 [11.0 - 306.8], Glicemie - 78 [70 - 105], GOT - 23 [0 - 35], GPT - 33 [0 -			
35], Hemoleucograma completa - Leucocite 4.63 [3.9 - 11.1] , - Hematii 3.95 [3.88 - 4.99]			
- Hemoglobina 12.5 [11.5 - 15.4] , - Hematocrit 35.4 [36.0 - 48.0] , - VEM 89.6 [81.0 - 99.0	J		
, - HEM 31.6 [25.0 - 33.0] , - CHEM 35.3 [31.6 - 35.8] , - Trombocite 210 [150 - 450] , - NEUT% 49.3 [40 - 70] , - LYMPH% 32.6 [20 - 40] , - MONO% 13.6 [3.0 - 10.0] , - EO%			
4.3 [0 - 5] , - BASO% 0.2 [0 - 2] , - NEUT# 2.28 [1.8 - 7.4] , - LYMPH# 1.51 [1.1 - 3.5] ,			
4.5 [0 - 5] , - BASO% 0.2 [0 - 2] , - NEO 1# 2.26 [1.6 - 7.4] , - L1MFH# 1.51 [1.1 - 5.5] , - MONO# 0.63 [0.21 - 0.92] , - EO# 0.20 [0.00 - 0.67] , - BASO# 0.01 [0 - 0.13] , - RDW-CV			
11.4 [9.9 - 15.5] , - PDW* 10.0 [10 - 16.5] , - MPV 10.2 [6.5 - 14.0], K - 4.9 [3.5 - 5.1],	*		
LDH - 167 [0 - 250], Na - 141 [136 - 146], Proteina C reactiva - 0.08 [0 - 1], Timp de			

	28.07.2020					
	Covid-19 (SARS-CoV-2) - Detectabil [Nedetectabil -]					
Exam	Examene paraclinice:					
EKG						
ECO						
Rx						
	T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 27.07.2020RG. PULMD=4.1 Gym2Fara leziuni pleuro-pulmonare evidente rgr.Cord de aspect rgr.normal.					
Altele						
	ment efectuat					
	ALGOZONE 500MG X 20 CPR LABORMED AZITROX 500MG ZENTIVA*3CPR DESLORATADINA					
	AMRING-5MG*30CPR DESLORATADINA AUROBINDO 5MG*30CPR.FILM. ERIDIAROM					

 $HIDRASEC\ 100MG*20CPS.\ \|\ PARACETAMOL\ 500MG\ ZENTIVA*20CPR\ \|\ PLAQUENIL\ 200MG*60\ compr.film.\ \|\ RINO\ SUN\ SPRAY\ 20ML\ \|\ SIROP\ PATLAGINA*100ML\ VTL\ \|\ VITAMINA\ C\ 1000MG+D3$

protrombina - PT (sec) (plasma) 10.3 [9.4 - 13.6], - PT (%) (plasma) 127.3 [70 - 130], -

INR (plasma) 0.89 [0.8 - 1.2], **Uree** - 24 [0 - 50], **VSH** - 2 [1 - 20]

2000UI*30CPR. FILM/ BERES

Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului:

EPICRIZA

de aproximativ 3 zile. Este investigata clinico-biologic (fara modificari) si radiologic pulmonar (aspect normal). Se ridica suspiciunea de infectie COVID19 si este directionata in clinica noastra unde se decide internarea pentru investigatii suplimentare si conduita terapeutica de specialitate.

Din ancheta epidemiologica retinem faptul ca pacienta a intrat in contact cu mama, care in urma cu aproximativ 10 zile afirmativ a prezentat febra si tuse, dar nu a fost testata. Sotul pacientei lucreaza in Piata Mihai Viteazul (Szabo Josep) si a fost plecat cu masina personala la parinti in judetul Mures in perioada 13.07-18.07.2020. In 18.07.2020 a participat la o nunta in Sangeorgiu de Padure. A intrat in contact cu sotul in perioada 18.07-20.07.2020.

Obiectiv la internare prezinta stare generala relativ buna, constienta, cooperanta, afebrila, eruptie de tip urticarian la nivelul membrelor superioare si inferioare si la nivelul flancurilor abdominale, congestie faringiana cu microvezicule, echilibrata cardio-dinamic (TA=110/83 mmHg AV=110 bpm) si respirator (SpO2=98% aa), murmur vezicular fiziologic transmis simetric bilateral, fara raluri supraadaugate, abdomen moale, mobil cu respiratia, nedureros spontan si la palpare, tranzit intestinal fiziologic, fara organomegalii, loje renale libere, Giordano negativ bilateral, mictiuni fiziologice, fara semne de iritatie meningeana, fara semne de focar neurologic.

Biologic la internare se evidentiaza monocitoza.

PROBA NR.1/RT-PCR-SARS-COV2/22.07.2020-DETECTABIL

PROBA NR.2/ RT-PCR-SARS-COV2/ 29 .07.2020-DETECTABIL

Pe perioada internarii a urmat tratament conform protocolului cu Plaquenil 200mg p.o (2x2 tb/zi doza de incarcare, apoi 2x1 tb/zi timp de 7 zile), Azitromicina 500 mg (1 tb/zi p.o) timp de o zi, antitermice si antialgice (Paracetamol 3x1 tb/zi p.o, Algocalmin 1 tb/zi la nevoie), Desloratadina 5mg (1 tb/zi p.o), Vit C 1g+Vit D (1 tb/zi p.o), Sirop de patlagina (3x10ml/zi p.o), cu evolutie favorabila. S-au finalizat cele 7 zile de tratament, simptomele s-au ameliorat treptat pina la disparitie in data de 29.07

S-a obtinut decizia de prelungire a izolarii la domiciul de la DSP, numarul 184 din data de 29.07, care a fost luata la cunostinta de catre pacient.

Tratament recomandat

Conform Ordinului 1.137 din 23 iunie 2020 se indica izolare la domiciliu pe o perioada de 10 zile de la externare. In aceasta perioada nu se va parasi domiciliul declarat si transmis catre ISU.

Dupa ce ajungeti acasa se recomanda efectuarea dusului, hainele cu care ati plecat acasa se vor pune intr-un sac impermeabil (fara a fi scuturate). Hainele (inclusiv hainele care pe care le-ati folosit in spital) se vor pastra in sac intr-un loc separat (preferabil pe balcon) timp de 5 zile, ulterior vor fi spalate la masina de spalat haine (la cea mai mare temperatura permisa de producator) cu dezinfectant pentru haine si calcate ulterior. Se vor folosi manusi pentru manipularea hainelor, care ulterior vor fi aruncate si va veti spala pe mcu apa si sapun. Telefonul, ceasul si alte obiecte electronice se vor dezinfecta cu servetele impregnate cu alcool.

Masuri de igiena individuala de respectat la domiciliu:

Sa se evite contactul apropiat cu celelalte persoane din locuinta si, daca este posibil, sa se izoleze camera separata, cu baie separata.

Daca se foloseste aceeasi baie, aceasta va fi dezinfectata dupa folosire, se va dezinfecta toaleta si toate obiectele atinse (inclusiv clante, intrerupatoare). Dezinfectarea se va face cu solutii pe baza de clor (ex. Domestos) sau alcool (min 70 %).

Sa nu primeascvizitatori in perioada de autoizolare la domiciliu.

Sa se spele pe maini cu apa si sapun, timp de cel putin 20 de secunde, ori de cate ori este necesar (dupa utilizarea toaletei, inaintea pregatirii mesei, etc).

Sa curate si sa dezinfecteze zilnic toate suprafetele pe care le atinge frecvent (ex: mese, clante, obiecte de mobilier, bateria/robinetele de la chiuveta, alte obiecte care pot fi atinse si de alte persoane).

Sa isi acopere gura si nasul cu servetel de unica folosinta sau cu o tesatura atunci cand stranuta sau tuseste, sau sa stranute si sa tuseasca in plica cotului. Batista se arunca imediat la gunoi, in sac de plastic, dupa care se spala pe maini cu apa si sapun timp de 20 de secunde.

Sa pastreze distanta de minim 1,5 m atunci cand se intalneste cu alte persoane.

Sa poarte masca cand se intalneste cu alte persoane. Masca trebuie sa acopere nasul si gura.

Purtarea mastii este una dintre masurile de prevenire si limitare pentru raspandirea anumitor boli

respiratorii, inclusiv cea determinata de noul coronavirus. Cu toate acestea, doar utilizarea unei masti nu este suficienta pentru a asigura un nivel adecvat de protectie si ar trebui adoptate si alte masuri la fel de relevante. Folosirea mastii trebuie combinata cu igiena adecvata a mainilor si cu alte masuri de prevenire si control a transmiterii noului coronavirus de la om la om.

- -in timpul utiliztrebuie sa evitati atingerea mastii;
- -sa indepartati masca folosind tehnica adecvata (nu atingeti partea din fata, ci indepartati snururile din spate), actiune urmata de spalarea IMEDIATA a mainilor cu apa si sapun;
- -sa nu reutilizati mastile de unica folosinta. Masca se schimba la maxim 4 ore sau mai repede caz de umezire.

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

Indicatie pentru revenire la internare				
X Nu, nu este necesara revenirea pentru internare				
Se completează obligatoriu una din cele două inform - S-a eliberat prescriptie medicală, caz în care - Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece - Nu s-a eliberat prescriptie medicala Se completează obligatoriu una din cele două inform - S-a eliberat concediu medical la externare, ca - Nu s-a eliberat concediu medical la externare - Nu s-a eliberat concediu medical la externare Se completează obligatoriu una din cele două inform - S-a eliberat recomandare pentru ingrijiri med - Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medeoarece nu a fost necesar Se completează obligatoriu una din cele două inform - S-a eliberat prescriptie medicală pentru disporm - Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dis	se va înscrie seria si numarul acesteia e nu a fost necesar matii: CCMAM 4169068, CCM az în care se va înscrie seria si numarul e deoarece nu a fost necesar e natii: dicale la domiciliu/paliative la domiciliu/medicale la domiciliu/paliative la domiciliu/paliative la domiciliu/paliative la domiciliu/paliative la domiciliu/paliative medicale in ambulatoriu deoarece nu a fost necesar e natii:	acestuia u ciliu,		
Unitate judeteana de diabet zaharat:	ui, pentru diabet)			
Nr. inregistrare al asiguratului:				
Data 30.07.2020				
Sef sectie:	Medic curant:	Medic rezident:		
Sef Lucrari Dr. MUNTEAN MONICA	Asist. Univ. Dr. TOPAN ADRIANA			
Dr. MONICA MUNTEAN medic primar boli injectiouse cod 828242	Dr. MONICA MUNTRAN medic primar bolt infectioase cod 822222			
Calea de transmitere:				
- prin asigurat - prin posta				

*) Scrisoarea medicala se intocmeste în doua exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii, într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;

Un exemplar se constituie scrisoare medicala si se inmaneaza in termen de 72 de ore medicului de familie.

*conform contractului cadru/2014 - model scrisoare medicala/Bilet de iesire - anexa 43