

BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA *)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca **AMARIE CONSTANTIN**, nascut la data de **09.01.1965**, CNP / cod unic de asigurare **1650109330785**, Adresa: **Jud.SUCEAVA Loc.Radasenii Str.BISERICII STIL VECHI Nr.16** a fost internat in serviciul nostru in perioada: **11.05.2020 14:42 - 24.06.2020 12:00**, FO: **14712 F.O.** / nr. din Registrul de consultatii **BOLI INFECTIOASE III-ADULTI** si se externeaza: **VINDECAT**

Diagnostic:

INFECTIE SARS-COV-2 FORMA ASIMPTOMATICA
COVID-19 CU VIRUS IDENTIFICAT
CONTACT CU CAZ CONFIRMAT
HIPERTENSIUNE ARTERIALA ESENTIALA GRAD II RISC ADITIONAL MODERAT
DIABET ZAHARAT TIP 2 ECHILIBRAT CU ADO
OBEZITATE GRAD I

Motivele prezentarii

Anamneza

- factori de risc

Examen clinic

- general

- local

Examen de laborator:

01.06.2020

Covid-19 (SARS-CoV-2) - Detectabil [Nedetectabil -]

03.06.2020

Covid-19 (SARS-CoV-2) - Detectabil [Nedetectabil -]

05.06.2020

Covid-19 (SARS-CoV-2) - Detectabil [Nedetectabil -]

09.06.2020

Covid-19 (SARS-CoV-2) - Detectabil [Nedetectabil -]

11.05.2020

Covid-19 (SARS-CoV-2) - Nedetectabil [Nedetectabil -], **APTT** - APTT (sec) 23.4 [22.1 - 28.1], - APTT (%) [-], **Creatinina** - 0.88 [0.7 - 1.2], **D-Dimeri** - 0.19 [0 - 0.55], **Feritina** - 136.1 [23.9 - 336.2], **Glicemie** - 93 [70 - 105], **GOT** - 45 [0 - 45], **GPT** - 47 [0 - 45], **Hemoleucograma completa** - Leucocite 8.12 [3.7 - 9.5], - Hematii 5.79 [4.32 - 5.66], - Hemoglobina 17.1 [13.3 - 17.6], - Hematocrit 50.4 [39.0 - 51.0], - VEM 87.0 [82.0 - 98.0], - HEM 29.5 [25.0 - 33.0], - CHEM 33.9 [31.6 - 35.8], - Trombocite 166 [150 - 450], - NEUT% 47.2 [40 - 70], - LYMPH% 37.6 [20 - 40], - MONO% 8.7 [3.0 - 10.0], - EO% 5.8 [0 - 5], - BASO% 0.7 [0 - 2], - NEUT# 3.83 [1.5 - 6.6], - LYMPH# 3.05 [1.1 - 3.5], - MONO# 0.71 [0.21 - 0.92], - EO# 0.47 [0.00 - 0.67], - BASO# 0.06 [0 - 0.13], - RDW-CV 13.3 [9.9 - 15.5], - PDW* 18.9 [10 - 16.5], - MPV 13.3 [6.5 - 14.0], **LDH** - 186 [0 - 250], **Proteina C reactiva** - 0.19 [0 - 1], **Timp de protrombina** - PT (sec) (plasma) 11.0 [9.4 - 13.6], - PT (%) (plasma) 109.7 [70 - 130], - INR (plasma) 0.96 [0.8 - 1.2], **Uree** - 44 [0 - 50], **VSH** - 13 [1 - 15]

11.06.2020

Covid-19 (SARS-CoV-2) - Detectabil [Nedetectabil -]

12.05.2020

Covid-19 (SARS-CoV-2) - Detectabil [Nedetectabil -], **Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgG** -

Nonreactiv (Index=0.770) [Index < 0.8 Nonreactiv >= 0.8 - < 1.2 Incert > =1.2 Reactiv -],

Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgM - Nonreactiv (Index=0.639) [Index < 0.8 Nonreactiv >= 0.8 - < 1.2 Incert > =1.2 Reactiv -]

14.06.2020

Covid-19 (SARS-CoV-2) - Detectabil [Nedetectabil -]

16.06.2020

Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgG - Reactiv (Index=2.170) [Index < 0.8 Nonreactiv >= 0.8 - <

1.2 Incert > =1.2 Reactiv -], **Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgM** - Reactiv (Index=1.229) [Index

< 0.8 Nonreactiv >= 0.8 - < 1.2 Incert > =1.2 Reactiv -], **Covid-19 (SARS-CoV-2)** - Detectabil [Nedetectabil -]

17.05.2020

Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgG - Nonreactiv (Index=0.799) [Index < 0.8 Nonreactiv >= 0.8 -

< 1.2 Incert > =1.2 Reactiv -], **Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgM** - Nonreactiv (Index=0.570) [

Index < 0.8 Nonreactiv >= 0.8 - < 1.2 Incert > =1.2 Reactiv -], **Covid-19 (SARS-CoV-2)** - Detectabil [Nedetectabil -]

18.06.2020

Covid-19 (SARS-CoV-2) - Detectabil [Nedetectabil -]

19.06.2020

Covid-19 (SARS-CoV-2) - Detectabil [Nedetectabil -]

20.05.2020

Covid-19 (SARS-CoV-2) - Detectabil [Nedetectabil -], **Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgG** -

Incert (Index=0.816) [Index < 0.8 Nonreactiv >= 0.8 - < 1.2 Incert > =1.2 Reactiv -], **Anticorpi**

anti SARS-CoV-2 IgM - Nonreactiv (Index=0.636) [Index < 0.8 Nonreactiv >= 0.8 - < 1.2

Incert > =1.2 Reactiv -]

22.05.2020

Covid-19 (SARS-CoV-2) - Detectabil [Nedetectabil -]

23.06.2020

Colinesteraza - 10519 [5320 - 12920], **Creatinina** - 0.77 [0.7 - 1.2], **Glicemie** - 80 [70 - 105

], **GOT** - 13 [0 - 45], **GPT** - 24 [0 - 45], **HDL-Colesterol** - 33 [35 - 65], **Hemoleucograma**

completa - Leucocite 8.15 [3.7 - 9.5], - Hematii 5.01 [4.32 - 5.66], - Hemoglobina 15.1 [

13.3 - 17.6], - Hematocrit 42.7 [39.0 - 51.0], - VEM 85.2 [82.0 - 98.0], - HEM 30.1 [25.0 -

33.0], - CHEM 35.4 [31.6 - 35.8], - Trombocite 169 [150 - 450], - NEUT% 44.2 [40 - 70]

, - LYMPH% 41.1 [20 - 40], - MONO% 9.6 [3.0 - 10.0], - EO% 4.5 [0 - 5], - BASO% 0.6

[0 - 2], - NEUT# 3.60 [1.5 - 6.6], - LYMPH# 3.35 [1.1 - 3.5], - MONO# 0.78 [0.21 - 0.92

], - EO# 0.37 [0.00 - 0.67], - BASO# 0.05 [0 - 0.13], - RDW-CV 12.4 [9.9 - 15.5], -

PDW* 17.7 [10 - 16.5], - MPV 12.7 [6.5 - 14.0], **Proteina C reactiva** - 0.22 [0 - 1],

Trigliceride - 155 [0 - 150], **Uree** - 38 [0 - 50], **Covid-19 (SARS-CoV-2)** - Nedetectabil [Nedetectabil -]

27.05.2020

Covid-19 (SARS-CoV-2) - Detectabil [Nedetectabil -]

29.05.2020

Covid-19 (SARS-CoV-2) - Detectabil [Nedetectabil -], **Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgG** -

Incert (Index=0.908) [Index < 0.8 Nonreactiv >= 0.8 - < 1.2 Incert > =1.2 Reactiv -], **Anticorpi**

anti SARS-CoV-2 IgM - Reactiv (Index=1.314) [Index < 0.8 Nonreactiv >= 0.8 - < 1.2 Incert >

=1.2 Reactiv -]

31.05.2020

Covid-19 (SARS-CoV-2) - Detectabil [Nedetectabil -]

Examene paraclinice:

EKG

Rx

T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 18.05.2020RGR PULM D=7.3 Gym2Fara leziuni pleuro-pulmonare, sub rezerva voalarii laterorotoracice stangi prin suprapunere de parti moi. || T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 12.05.2020RGR PULM D=9.1 Gym2Fara leziuni active pleuro-pulmonare vizibile rgr.SCD drept liber.SCD stang nevizualizabil.

Altele**Tratament efectuat**

BIXTONIM XYLO 0.5MG/ML pic.naz. || CLEXANE 6000UI (60MG)/ 0,6ML * 10 SER. PRE. ||
HEPATHROMBIN 300UI/G 40G UNG || KALETRA 200mg/50mg*120cpr.filmate || L-ARGININA 1000MG ||
LIVERPLUS 35MG - SILIMARINA BIOEEL || Lopinavir/Ritonavir Mylan 200mg/50mg*120cpr.film.(Kaletra) ||
MUCOVIM 200mg*20cps || NITRAZEPAM 2,5 MG LPH X 30 CPR || PARACETAMOL 500MG - MAGISTRA ||
PLAQUENIL 200MG*60 compr.film. || SARGENOR 1G || SIOFOR 1000 MG *60 compr.film. || STOP TOXIN
forte*30CPS || STOPTOXIN FORTE 3BLS*10CPS || VITAMINA C 1000mg*30cpr BERES

Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului:**EPICRIZA**

Pacient in varsta de 55 de ani, cunoscut cu HTAE sub tratament, cu DZ tip II se interneaza cu suspiciune infectiei cu SARS CoV2.

Pacientul este asimptomatic.

Din ancheta epidemiologica retinem ca nu a fost vaccinat antigripal, nu prezinta istoric de calatorie internationala recenta, nu a vizitat piete sau targuri de animale vii cu 14 zile anterior debutului simptomelor, fiind contact cu caz confirmat COVID-19, sotia-Amariei Doinita (confirmata in 10.05.20) .

Obiectiv la internare: pacient constient, cooperant, afebril, cu stare generala buna; supraponderal; prezinta asimetrie faciala (afirmativ pareza nerv facial in APP); faringe congestionat; MV prezent bilateral, raluri sibilante la nivelul campului pulmonar stang, SpO2=94-95% aa; zgomote cardiace ritmice, , sincrone cu pulsul, TA=145/90mmHg, AV=71/min; abdomen liber, fara sensibilitate la palpare, ficat si splina nepalpabile, loje renale libere, Giordano negativ bilateral, OTS, ROT, fara semne de focar neurologic, fara semne de iritatie meningeana.

Biologic: fara sindrom inflamator, GPT usor crescut.

RT PCR-SARS-CoV-2, proba 1 (11.05): NEDETECTABIL

RT PCR-SARS-CoV-2, proba 2 (13.05): Detectabil

RT PCR-SARS-CoV-2, proba 3 (18.05): Detectabil. Anticorpi IgG si IgM anti SARS COV 2: non - reactivi.

RT PCR-SARS-CoV-2, proba 4 (21.05): Detectabil

RT PCR-SARS-CoV-2, proba 5 (25.05): Detectabil

RT PCR-SARS-CoV-2, proba 6 (28.05): Detectabil

RT PCR-SARS-CoV-2, proba 7 (30.05): Detectabil. Anticorpi IgM REACTIVI, IgG Incert.

RT PCR-SARS-CoV-2, proba 8 (01.06): Detectabil

RT PCR-SARS-CoV-2, proba 9 (04.06): Detectabil

RT PCR-SARS-CoV-2, proba 10 (08.06): Detectabil

RT PCR-SARS-CoV-2, proba 11 (10.06): Detectabil

RT PCR-SARS-CoV-2, proba 12 (12.06): Detectabil

RT PCR-SARS-CoV-2, proba 13 (15.06): Detectabil

RT PCR SARS-COV 2 proba 14 (17.06): Detectabil

RT PCR SARS-COV 2 proba 15 (18.06.2020): Detectabil

RT PCR SARS-COV 2 proba 16 (22.06.2020): Detectabil

RT PCR SARS-COV 2 proba 17 (24.06.2020): NEDETECTABIL

Radiografia pulmonara (12.05.2020): "Fara leziuni active pleuro-pulmonare."

Rdg. pulmonara de control (18.05.2020): "Fara leziuni pleuro-pulmonare, sub rezerva voalarii laterorotoracice stangi prin suprapunere de parti moi."

Pe parcursul internarii a urmat tratament antiviral cu Kaletra 2*400 mg/zi timp de 10 zile si anticoagulant cu Clexane 0.6 ml/zi pentru prevenirea trombembolismul venos cu evolutie favorabila.

Se externeaza cu stare generala buna, afebril, stabil hemodinamic si respirator.

Tratament recomandat

Regim hipolipidic, hiposodat.

Tratament cu:

SEVIKAR 40/5 mg 1-0-0 tb/zi cu monitorizarea TA

TERTENSIF 1.5 mg 1-0-0 tb/zi

ASPENTER 75 mg 0-1-0 tb/zi

Ce mde igienindividualtrebuie srespecte persoanele externate la domiciliu?

-Dacse foloseaceebaie, aceasta va fi dezinfectatdupfolosire, se va dezinfecta toaleta toate obiectele atinse (inclusiv clanDezinfectarea se va face cu solupe bazde clor (Domestos) sau alcool (min 70 %).

-Sse spele pe mcu apstimp de cel pu20 de secunde, ori de cori este necesar (duputilizarea toaletei, pregmesei, etc).

-Scuresdezinfecete zilnic toate suprafepe care le atinge frecvent (ex: mese, clan obiecte de mobilier, bateria/robinetele de la chiuvetalte obiecte care pot fi atinse de alte persoane).

-Sacopere gura nasul cu de unicfolosinsau cu o atunci cstr

sau tusau sstrstuplica cotului. Batista se aruncimediat la gunoi, sac de plastic, dupcare se spalpe mcu apstimp de 20 de secunde.

-Spoarte mascce se cu alte persoane.

Purtarea meste una dintre mde prevenire limitare pentru ranumitor boli respiratorii, inclusiv cea determinatde noul coronavirus. Cu toate acestea, doar utilizarea unei mnu este suficientpentru a asigura un nivel adecvat de protecar trebui adoptate alte mla fel de relevante. Folosirea mtrebuie combinatcu igiena adecvata mcu alte mde prevenire control a transmiterii noului coronavirus de la om la om.

! timpul utiliztrebuie sevitaatingerea m

! smasca folosind tehnica adecvat(nu atinge partea din faci din spate), acurmatde spIMEDIATa mcu aps

! snu reutilizamde unicfolosinMasca se schimba maxim 4 ore sau mai repede caz de umezire.

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

Indicatie pentru revenire la internare

X Nu, nu este necesara revenirea pentru internare

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat prescriptie medicală, caz în care se va înscrie seria si numarul acesteia
- ☐ Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu a fost necesar
- ☒ Nu s-a eliberat prescriptie medicala

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

CCMAM 4169964,CCMAM 4169966

- ☒ S-a eliberat concediu medical la externare, caz în care se va înscrie seria si numarul acestuia
- ☐ Nu s-a eliberat concediu medical la externare deoarece nu a fost necesar
- ☐ Nu s-a eliberat concediu medical la externare

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu
- ☒ Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu, deoarece nu a fost necesar

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu
- ☒ Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu deoarece nu a fost necesar

(cu viza Unitatii judetene de implementare a programului, pentru diabet)

Un exemplar se constituie scrisoare medicala si se inmaneaza in termen de 72 de ore medicului de familie.

*conform contractului cadru/2014 - model scrisoare medicala/Bilet de iesire - anexa 43

Unitate judeteana de diabet zaharat:	
Nr. inregistrare al asiguratului:	

Data 24.06.2020

Sef sectie:

Conf. Dr. RADULESCU AMANDA

Medic primar

Dr. AMANDA RADULESCU
medic primar boli infecțioase
și epidemiologie
cod 043773

Medic curant:

NEAGOS OTILIA ELENA

Medic rezident:

Dr. OTILIA NEAGOS
medic specialist medicina internă
competență ecografie generală
cod 154782

Calea de transmitere:

- prin asigurat
- prin posta

*) Scrisoarea medicala se intocmeste în doua exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externării, într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;