

BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA *)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca **AVRAM VASILE-DANIEL**, nascut la data de **30.05.1978**, CNP / cod unic de asigurare **1780530120655**, Adresa: **Jud.CLUJ Loc.Cluj Napoca Str.PADIN Nr.32 Ap.78** a fost internat in serviciul nostru in perioada: **20.04.2020 20:48 - 08.05.2020 15:20**, FO: **14063 F.O.** / nr. din Registrul de consultatii **BOLI INFECTIOASE I-ADULTI** si se externeaza: **VINDECAT**

Diagnostic:

INFECTIE COVID 19.
PNEUMONIE INTERSTITIALA BILATERALA.

Motivele prezentarii

Anamneza

- factori de risc

Examen clinic

- general

- local

Examine de laborator:

01.05.2020

Covid-19 (SARS-CoV-2) - Nedetectabil [Nedetectabil -], **Creatinina** - 0.86 [0.7 - 1.2], **Glicemie** - 89 [70 - 105], **GOT** - 23 [0 - 45], **GPT** - 23 [0 - 45], **Hemoleucograma completa** - Leucocite 7.0 [3.7 - 9.5], - Hematii 5.01 [4.32 - 5.66], - Hemoglobina 15.9 [13.3 - 17.6], - Hematocrit 45.3 [39.0 - 51.0], - VEM 90.4 [82.0 - 98.0], - HEM 31.8 [25.0 - 33.0], - CHEM 35.2 [31.6 - 35.8], - RDW-CV% 13.4 [9.9 - 15.5], - Trombocite 227 [150 - 450], - MPV 8.9 [6.5 - 14.0], - NEUT% 60.71 [40 - 70], - LYMPH% 24.29 [20 - 40], - MONO% 12.61 [3.0 - 10.0], - EO% 1.94 [0 - 5], - BASO% 0.45 [0 - 2], - NEUT# 4.234 [1.5 - 6.6], - LYMPH# 1.694 [1.1 - 3.5], - MONO# 0.880 [0.21 - 0.92], - EO# 0.135 [0.00 - 0.67], - BASO# 0.031 [0 - 0.13], **LDH** - 169 [0 - 250], **Proteina C reactiva** - 0.31 [0 - 1], **Uree** - 28.5 [0 - 50], **Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgG** - Reactiv (Index=1.985) [Index < 0.8 Nonreactiv >= 0.8 - < 1.2 Incert >= 1.2 Reactiv -], **Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgM** - Reactiv (Index=3.079) [Index < 0.8 Nonreactiv >= 0.8 - < 1.2 Incert >= 1.2 Reactiv -]

02.05.2020

Covid-19 (SARS-CoV-2) - Nedetectabil [Nedetectabil -]

20.04.2020

APTT - APTT (sec) 23.9 [22.1 - 28.1], - APTT (%) [-], **Creatinina** - 0.90 [0.7 - 1.2], **Fibrinogen** - 449 [180 - 400], **Glicemie** - 99 [70 - 105], **GOT** - 26 [0 - 45], **GPT** - 27 [0 - 45], **Hemoleucograma completa** - Leucocite 5.0 [3.7 - 9.5], - Hematii 4.81 [4.32 - 5.66], - Hemoglobina 15.4 [13.3 - 17.6], - Hematocrit 42.7 [39.0 - 51.0], - VEM 88.9 [82.0 - 98.0], - HEM 32.0 [25.0 - 33.0], - CHEM 36.0 [31.6 - 35.8], - RDW-CV% 13.0 [9.9 - 15.5], - Trombocite 193 [150 - 450], - MPV 8.6 [6.5 - 14.0], - NEUT% 59.38 [40 - 70], - LYMPH% 22.05 [20 - 40], - MONO% 14.81 [3.0 - 10.0], - EO% 3.08 [0 - 5], - BASO% 0.68 [0 - 2], - NEUT# 2.995 [1.5 - 6.6], - LYMPH# 1.112 [1.1 - 3.5], - MONO# 0.747 [0.21 - 0.92], - EO# 0.155 [0.00 - 0.67], - BASO# 0.034 [0 - 0.13], **LDH** - 190 [0 - 250], **Proteina C reactiva** - 0.68 [0 - 1], **Timp de protrombina** - PT (sec) (plasma) 12.4 [8.9 - 13.1]

], - PT (%) (plasma) 76.5 [70 - 130], - INR (plasma) 1.14 [0.8 - 1.2], **Uree** - 30 [0 - 50], **VSH** - 29 [1 - 15]

27.04.2020

APTT - APTT (sec) 24.2 [22.1 - 28.1], - APTT (%) [-], **Creatinina** - 1.06 [0.7 - 1.2], **Feritina** - 232.6 [23.9 - 336.2], **Fibrinogen** - 374 [180 - 400], **Glicemie** - 92 [70 - 105], **GOT** - 20 [0 - 45], **GPT** - 23 [0 - 45], **Hemoleucograma completa** - Leucocite 6.67 [3.7 - 9.5], - Hematii 4.96 [4.32 - 5.66], - Hemoglobina 15.7 [13.3 - 17.6], - Hematocrit 43.8 [39.0 - 51.0], - VEM 88.3 [82.0 - 98.0], - HEM 31.7 [25.0 - 33.0], - CHEM 35.8 [31.6 - 35.8], - Trombocite 249 [150 - 450], - NEUT% 58.9 [40 - 70], - LYMPH% 24.6 [20 - 40], - MONO% 13.2 [3.0 - 10.0], - EO% 3.0 [0 - 5], - BASO% 0.3 [0 - 2], - NEUT# 3.93 [1.5 - 6.6], - LYMPH# 1.64 [1.1 - 3.5], - MONO# 0.88 [0.21 - 0.92], - EO# 0.20 [0.00 - 0.67], - BASO# 0.02 [0 - 0.13], - RDW-CV 12.6 [9.9 - 15.5], - PDW* 11.2 [10 - 16.5], - MPV 10.1 [6.5 - 14.0], **K** - 4.8 [3.5 - 5.1], **LDH** - 172 [0 - 250], **Na** - 143 [136 - 146], **Proteina C reactiva** - 0.23 [0 - 1], **Timp de protrombina** - PT (sec) (plasma) 13.1 [8.9 - 13.1], - PT (%) (plasma) 68.2 [70 - 130], - INR (plasma) 1.20 [0.8 - 1.2], **Uree** - 31 [0 - 50], **VSH** - 20 [1 - 15], **D-Dimeri** - 0.19 [0 - 0.55]

Examen paraclinice:

EKG

ECO

Rx

T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 21.04.2020RGR PULM APDD D=9.9 Gym2Accentuarea desenului interstitial infrahilar bilateral.Fara focare de condensare constituite.SCD libere.Cord cu dimensiuni normale. || T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 29.04.2020RG PULM D= 7.8 Gym2Fara arii de condensare evidente rgr. Desen pulmonar accentuat perihilar drept. || T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 24.04.2020RG. PULM.APDD- D= 16.9 GymFara arii de condensare evidente rgr. Desen pulmonar accentuat perihilar drept.

Altele

Tratament efectuat

KALETRA 200mg/50mg*120cpr.filmate || KALETRA 80MG/ML+20MG/ML SOL ORALA*60ML || Lopinavir/Ritonavir Mylan 200mg/50mg*120cpr.film.(Kaletra) || PARACETAMOL 500MG - MAGISTRA || PLAQUENIL 200MG*60 compr.film. || VITAMINA C 1000mg*30cpr BERES

Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului:

EPICRIZA

Pacient in varsta de 41 de ani, cunoscut in antecedente cu sarcoidoza (din 2007), pentru care a urmat tratament cu Prednison timp de 1 an, fara tratament actual, se interneaza in serviciul nostru cu infectie SARS COV-2 confirmata in data de 19.04.2020.

Boala actuala a debutat in urma 3 zile prin odinofagie.

Din ancheta epidemiologica retinem faptul ca sotia sa, asistenta la Clinica de Neurologice Cluj, este confirmata cu SARS COV-2 si internata in serviciul nostru, din data de 14.04.2020. Fiul sau este deasemenea internat in serviciul nostru, diagnosticat in data de 19.04.2020.

Examenul obiectiv la internare a relevat stare generala usor influentata, afebrilitate, tegumente si mucoase normal colorate, tesut celular subcutanat in exces reprezentat global, G=110 kg, sistem ganglionar superficial nepalpabil, tegumente si mucoase normal colorate, ascultatoric murmur vezicular fiziologic, fara raluri supraadaugate, FR=15/min, SaO2=98%, zgomote cardiace ritmice, bine batute, fara sufluri supraadaugate, SaO2=98%, AV=112 bpm, TA=135/90 mmHg, abdomen marit de volum pe seama tesutului adipos, mobil cu miscarile respiratorii, fara sensibilitate la palpare, hepatomegalie 3cm sub rebord, consistenta de organ, margine inferioara rotunjita, splina nepalpabila, fara semne de iritatie meningeana sau de focar neurologic.

Examinarile paraclinice efectuate initial in serviciul nostru au relevat monocitoza discreta, valori usor crescute ale VSH-ului (20 mm/h).

Examinarile paraclinice de control au relevat monocitoza, valori crescute ale VSH-ului (29 mm/h) si fibrinogenului (449 mg/dl).

TESTUL 1 RT-PCR SARS-COV2: DETECTABIL (19.04.2020)

TESTUL 2 RT-PCR SARS-COV2: NEDETECTABIL(02.05.20)

TESTUL 3 RT-PCR SARS-COV2: NEDETECTABIL (03.05.20)

Radiografie pulmonara efectuata initial a relevat accentuarea desenului interstitial infrahilar bilateral, fara focare de condensare constituite.

Radiografiile pulmonare de control au relevat desen pulmonar accentuat perihilar drept (interpretat in contextul sarcoidizei).

Pe parcursul internarii a urmat tratament conform protocolului cu Kaletra (2x200 mg/zi, per os, timp de 10 zile), Plaquenil 200 mg (2x2cpr/prima zi, apoi 2x1 cpr/zi, per os) si Vitamina C (2x1 g/zi, per os), sub care evolutia a fost favorabila.

Se externeaza vindecat virusologic, stabil hemodinamic si respirator.

Tratament recomandat

Izolare la domiciliu 14 zile (pana in 17.05)

Recomandla externare pentru prevenirea transmiterii infeccomunitate

Dupexternarea din spital este recomandatcontinuarea izolla domiciliu, timp de 14 zile, cu respectarea stricta urmindica

1. Izolasingur(camerbine aeriside preferat cu baie proprie pe care snu o folosicomun cu restul familiei. Daceste posibil, izolalocuinseparatde restul familiei.
2. Evitacomplet contactul cu ceilalmembri ai familiei, cu alte persoane sau cu animale de companie. cazul care contactul nu poate fi sub nicio formevitat complet, purtamascatunci csuntepreajma altor persoane (de exemplu, aceeaacameraceeamaetc.). Dacnu puteputa mascvor purta mascpersoanele care intrcamera dumneavoastrMasca de protectrebuie sacopere complet nasul gura persoanei care o poartAtenPurtarea mnu recomandarea de a evita contactul cu alte persoane.
3. Nu mergela serviciu/sau spa publice.
4. Nu folositransportul comun, taxi, uber sau alte mijloace de transport care spresupunun potencontact cu alte persoane.
5. Monitorizastarea de scontactatelefonice medicul cazul care este necesar.
6. Nu pdomiciliul pentru niciun motiv, afarde motive medicale. cazul care avenevoie de medicalurgentsunala 112 si mencsunteaauto-izolare 14 zile dupce afost externat din spital dupCOVID-19, apoi mncare este urgenmedicalastfel sse poatlua mnecesare, condide siguran
7. Dacavenevoie de medicale care nu sunt urgente, de exemplu pentru o boalcronicstabilualegprin telefon cu medicul dumneavoastrmenfaptul csunteauto-izolare 14 zile dupce afost externat din spital dupCOVID-19.
8. Dacstrsau tuacoperigura nasul cu un de unicfolosinpe care avegrijsaruncaimediat code gunoi prevcu sac de gunoi de unicfolosincu capac, apoi igienizam
9. Nu atingenicu mneigienizate dupce v-aatins fasau astr
10. Sppe mctu apsminimum 20 de secunde, frecvent, neapduporice contact cu ochii, nasul sau gura, dupstrtuse, sau suflarea nasului, precum duputilizarea toaletei, de pregsau servirea mesei.
11. Folosiprosoape de hde preferat, pentru a vmfa
12. Apa stimp de minimum 20 de secunde reprezintvarianta preferatde igienizare a mcazul care aceastvariantnu este disponibilfolosisoluantiseptice pentru mpe bazde alcool cu concentrade minim 60%.
13. Dezinfectafrecvent, cel puo datpe zi, cu solupe bazde alcool sau clor, suprafecu care intracontact, special: mese, noptiere, blat de bucclanobiecte sanitare, telefon, tablettastatursau alte suprafeUtilizadoludezinfectante conform instrucproduc
14. Aeriside mai multe ori pe zi care desactivit
15. Servimasa separat de restul familiei, camera dumneavoastrapoi spvesela taccu detergent apdin abundensau folosind temperaturi la made spvase, daceste posibil.
16. Nu belichide din aceeaesticlcu alte persoane, nu mdin aceeaafarfurie nu folosiaceleatac
17. Nu folosiprosop sau ade pat comun cu restul familiei. Acestea, precum hainele dumneavoastrvor

fi spuscate separat de ale celorlalmembri ai familiei, la temperaturile cele mai permise conform
instrucde pe etichet
18. Puteobdetalii despre COVID-19 dacsunala 0800.800.358, care este un numde informare, nu este
un numde urgen

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

Indicatie pentru revenire la internare

X Nu, nu este necesara revenirea pentru internare

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat prescriptie medicală, caz în care se va înscrie seria si numarul acesteia
- ☐ Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu a fost necesar
- ☒ Nu s-a eliberat prescriptie medicala

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat concediu medical la externare, caz în care se va înscrie seria si numarul acestuia
- ☐ Nu s-a eliberat concediu medical la externare deoarece nu a fost necesar
- ☒ Nu s-a eliberat concediu medical la externare

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu
- ☒ Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu, deoarece nu a fost necesar

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu
- ☒ Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu deoarece nu a fost necesar

(cu viza Unitatii judetene de implementare a programului, pentru diabet)


Unitate judeteana de diabet zaharat:	
Nr. inregistrare al asiguratului:	

Data 08.05.2020

Sef sectie:

Conf.Dr. LUPSE MIHAELA
MEDIC PRIMAR

Dr. MIHAELA LUPSE
medic primar boli infectioase
competenta scolarizata
cod 521011



Medic curant:

Dr. ITU MURESAN CORINA

Medic primar

Dr. CORINA ITU-MURESAN
medic primar
boli infectioase
173663

Medic rezident:

Calea de transmitere:

- prin asigurat
- prin posta

*) Scrisoarea medicala se intocmeste în doua exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii, într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;

Un exemplar se constituie scrisoare medicala si se inmaneaza in termen de 72 de ore medicului de familie.

*conform contractului cadru/2014 - model scrisoare medicala/Bilet de iesire - anexa 43