

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca Str. Iuliu Moldovan Nr. 23, 400348 Tel: +40-264-594655/565758; 593105. Fax: +40-264-593105; E-mail: infectioaseci@vahoo.com, wab:

E-mail: infectioasecj@yahoo.com web: www.infectioasecluj.ro



## BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA \*)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca **CADIS LAURA**, nascut la data de **19.12.1977**, CNP / cod unic de asigurare **2771219293119**, Adresa: **Jud.CLUJ Loc.Cluj Napoca Str.TRAIAN MOSOIU Nr.33 Ap.4** a fost internat in serviciul nostru in perioada: **18.06.2020 17:16 - 28.06.2020 13:30**, FO: **16259** F.O. / nr. din Registrul de consultatii **BOLI INFECTIOASE II-ADULTI** si se externeaza: **AMELIORAT** 

Diagn	ostice:
Diazn	osuce.

COVID-19 FORMA USOARA FIBROM UTERIN

Anami	
factor	de risc
Exame	n clinic ral
- local	
Exame	ne de laborator:
	18.06.2020
	<b>APTT</b> - APTT (sec) 22.3 [ 22.1 - 28.1 ] , - APTT (%) [ - ], <b>Creatinina</b> - 0.70 [ 0.5 - 0.9 ],
	<b>D-Dimeri</b> - 0.31 [ 0 - 0.55 ], <b>Feritina</b> - 73.9 [ 11.0 - 306.8 ], <b>Fibrinogen</b> - 290 [ 180 - 400 ],
	Glicemie - 112 [ 70 - 105 ], GOT - 16 [ 0 - 35 ], GPT - 8 [ 0 - 35 ], Hemoleucograma
	<b>completa</b> - Leucocite 4.86 [ 3.9 - 11.1 ] , - Hematii 4.19 [ 3.88 - 4.99 ] , - Hemoglobina 13.3 [
	11.5 - 15.4], - Hematocrit 39.1 [ 36.0 - 48.0], - VEM 93.3 [ 81.0 - 99.0], - HEM 31.7 [ 25.0 -
	33.0], - CHEM 34.0 [ 31.6 - 35.8], - Trombocite 189 [ 150 - 450], - NEUT% 64.1 [ 40 - 70 ]
	, - LYMPH% 27.0 [ 20 - 40 ] , - MONO% 6.8 [ 3.0 - 10.0 ] , - EO% 1.9 [ 0 - 5 ] , - BASO% 0.2
	[0-2], - NEUT# 3.12 [1.8 - 7.4], - LYMPH# 1.31 [1.1 - 3.5], - MONO# 0.33 [0.21 - 0.92
	], - EO# 0.09 [ 0.00 - 0.67 ], - BASO# 0.01 [ 0 - 0.13 ], - RDW-CV 11.6 [ 9.9 - 15.5 ], -
	PDW* 9.7 [ 10 - 16.5 ] , - MPV 9.5 [ 6.5 - 14.0 ], <b>Interleukina 6</b> - 2.46 [ 0 - 6.4 ], <b>LDH</b> - 132 [
	0 - 250 ], <b>Proteina C reactiva</b> - 0.03 [ 0 - 1 ], <b>Timp de protrombina</b> - PT (sec) (plasma) 10.5 [
	9.4 - 13.6], - PT (%) (plasma) 121.9 [ 70 - 130], - INR (plasma) 0.90 [ 0.8 - 1.2], <b>Uree</b> - 20 [
	0 - 50], <b>VSH</b> - 7[1 - 20]
	23.06.2020
	Covid-19 (SARS-CoV-2) - Detectabil [ Nedetectabil - ], Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgG -
	Nonreactiv (Index=0.574) [ Index < 0.8 Nonreactiv>= 0.8 - < 1.2 Incert > =1.2 Reactiv - ],
	Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgM - Nonreactiv (Index=0.776) [ Index < 0.8 Nonreactiv>= 0.8 - < 1.2 Incert > =1.2 Reactiv - ]
	25.06.2020
	Covid-19 (SARS-CoV-2) - Detectabil [ Nedetectabil - ], Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgG -
	Nonreactiv (Index= $0.622$ ) [ Index $< 0.8$ Nonreactiv>= $0.8 - < 1.2$ Incert > $= 1.2$ Reactiv - ],
	<b>Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgM</b> - Incert (Index=1.004) [ Index < 0.8 Nonreactiv>= 0.8 - < 1.2 Incert > =1.2 Reactiv - ]

ECO	
Rx	
	T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 19.06.2020RG. PULMD= 2.5Gym2Cord, aorta radiologic normale. Fara
	leziuni focale sau infiltrative pulmonar bilateral. SCD libere,    T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat:
	22.06.2020RG. PULM D=2.3 Gym2Cord, aorta radiologic in limite normale.Fara leziuni focale sau infiltrative
	pulmonar bilateral.SCD libere
Altele	
<b>Frata</b>	ment efectuat

ACETILCISTEINA 200MG LAROPHARM || CLEXANE 6000UI (60MG)/ 0,6ML \* 10 SER. PRE. || CODEINA FOSFAT 15MG - LABORMED || PARACETAMOL 500MG - MAGISTRA || PLAQUENIL 200MG\*60 compr.film. || VITAMINA C 1000mg\*30cpr BERES

Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului: EPICRIZA

Pacienta in varsta de 42 ani, fumatoare, cunoscuta cu fibrom uterin in tratament cu Mirena (de 5 ani), cu amenoree secundara, se interneaza pentru anosmie si mialgii, simptomatologie debutata brusc, cu 2 zile anterior internarii. Avand in vedere contextul epidemiologic (focar Covid-19 la Institutul inimii, unde lucreaza ca medic), se efectueaza testare PCR SARS-COV2, care este pozitiv in data de 18.06.2020 (Imogen), motiv pentru care se interneaza in clinica noastra pentru investigatii suplimentare si tratament de specialitate.

Mentionam ca pacienta a avut contact cu caz confirmat Covid-19 in urma cu 10 zile, cand a fost echipata cu halat de protectie, manusi si masca chirurgicala. Din martie urmeaza terapie profilactica cu Plaquenil (doza de incarcare, ulterior 2 tablete la 10 zile), intrerupta in aprilie; ia 2 tablete anterior internarii cu o saptamana. Locuieste cu sotul (testat in 18.06 si in 19.06, ambele teste fiind negative) si copilul (netestat).

Obiectiv cu stare generala buna, constienta, cooperanta, orientata temporo-spatial, fara semne de iritatie meningeana sau de focar neurologic, stabila hemodinamic si respirator, murmur vezicular prezent bilateral, fara raluri supraadaugate, SatO2=98% in aa, zgomote cardiace ritmice, fara sufluri patologice, TA=130/90 mmHg, AV=105/min, abdomen fara sensibilitate la palpare, tranzit intestinal normal, mictiuni fiziologice.

Biologic in limite normale.

Radiografia pulmonara este fara modificari patologice. In ziua urmatoare internarii prezinta tuse seaca, moderata.

Pe parcursul internarii pacienta a fost izolata, a urmat tratament cu Plaquenil 200 mg 2-0-2 tb in prima zi, ulterior 1-0-1 tb/zi, timp de 7 zile, anticoagulant cu Clexane 0,4 ml/zi timp de 7 zile, vitamina C, simptomatic.

Sub tratament, evolutia clinica a fost favorabila, cu remiterea simptomatologiei.

RT-PCR SARS-CoV-2 in data de 24.06.2020 DETECTABIL

IgM SARS-CoV-2: nonreactiv IgG SARS-CoV-2: nonreactiv

RT-PCR SARS-CoV-2 in data de 26.06.2020 DETECTABIL

IgM SARS-CoV-2: incert
IgG SARS-CoV-2: nonreactiv

Se externeaza ameliorata, cu indicatiile:

## Tratament recomandat

Conform Ordinului 1.137 din 23 iunie 2020 se indica izolare la domicliu pe o perioada de 4 zile de la externare. In aceasta perioada nu se va parasi domiciliul declarat si transmis catre ISU.

Dupa ce ajungeti acasa se recomanda efectuarea dusului, hainele cu care ati plecat acasa se vor pune intr-un sac impermeabil (fara a fi scuturate). Hainele (inclusiv hainele care pe care le-ati folosit in spital) se vor pastra in sac intr-un loc separat (preferabil pe balcon) timp de 5 zile, ulterior vor fi spalate la masina de spalat haine (la cea mai mare temperatura permisa de producator) cu dezinfectant pentru haine si calcate ulterior. Se vor folosi manusi pentru manipularea hainelor, care ulterior vor fi aruncate si va veti spala pe mcu apa si sapun. Telefonul, ceasul si alte obiecte electronice se vor dezinfecta cu servetele impregnate cu alcool.

Masuri de igiena individuala de respectat la domiciliu:

Sa se evite contactul apropiat cu celelalte persoane din locuinta si, daca este posibil, sa se izoleze camera separata, cu baie separata.

Daca se foloseste aceeasi baie, aceasta va fi dezinfectata dupa folosire, se va dezinfecta toaleta si toate obiectele atinse (inclusiv clante, intrerupatoare). Dezinfectarea se va face cu solutii pe baza de clor (ex. Domestos) sau alcool (min 70 %).

Sa nu primeascvizitatori in perioada de autoizolare la domiciliu.

Sa se spele pe maini cu apa si sapun, timp de cel putin 20 de secunde, ori de cate ori este necesar

(dupa utilizarea toaletei, inaintea pregatirii mesei, etc).

Sa curate si sa dezinfecteze zilnic toate suprafetele pe care le atinge frecvent (ex: mese, clante, obiecte de mobilier, bateria/robinetele de la chiuveta, alte obiecte care pot fi atinse si de alte persoane).

Sa isi acopere gura si nasul cu servetel de unica folosinta sau cu o tesatura atunci cand stranuta sau tuseste, sau sa stranute si sa tuseasca in plica cotului. Batista se arunca imediat la gunoi, in sac de plastic, dupa care se spala pe maini cu apa si sapun timp de 20 de secunde.

Sa pastreze distanta de minim 1,5 m atunci cand se intalneste cu alte persoane.

Sa poarte masca cand se intalneste cu alte persoane. Masca trebuie sa acopere nasul si gura.

Purtarea mastii este una dintre masurile de prevenire si limitare pentru raspandirea anumitor boli respiratorii, inclusiv cea determinata de noul coronavirus. Cu toate acestea, doar utilizarea unei masti nu este suficienta pentru a asigura un nivel adecvat de protectie si ar trebui adoptate si alte masuri la fel de relevante. Folosirea mastii trebuie combinata cu igiena adecvata a mainilor si cu alte masuri de prevenire si control a transmiterii noului coronavirus de la om la om.

- -in timpul utiliztrebuie sa evitati atingerea mastii;
- -sa indepartati masca folosind tehnica adecvata (nu atingeti partea din fata, ci indepartati snururile din spate), actiune urmata de spalarea IMEDIATA a mainilor cu apa si sapun;
- -sa nu reutilizati mastile de unica folosinta. Masca se schimba la maxim 4 ore sau mai repede caz de umezire.

S-a eliberat concediu medical pe perioada 18.06.2020-05.07.2020

## Monitorizarea dupa externare:

Monitorizarea starii de sanatate a pacientului pe perioada izolarii la domicliu se face de catre medicul de familie zilnic, prin sistemul de telemedicina. Pacientii care nu sunt inscrisi pe lista unui medic de familie vor fi monitorizati zilnic de catre DSP judeteana. In cazul aparitiei unor probleme de sanatate se va lua legatura telefonica cu medicul de familie sau se va suna la 112.

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

,		
Indicatie pentru revenire la internare		
X Nu, nu este necesara revenirea pentru internare		
Se completeazã obligatoriu una din cele douã informati		
- S-a eliberat prescriptie medicală, caz în care se v		
- Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu	a fost necesar	
- X Nu s-a eliberat prescriptie medicala		
Se completează obligatoriu una din cele două informati		
- S-a eliberat concediu medical la externare, caz în	n care se va înscrie seria si numarul acestuia	
- Nu s-a eliberat concediu medical la externare de	oarece nu a fost necesar	
- X Nu s-a eliberat concediu medical la externare		
Se completează obligatoriu una din cele două informati		
- S-a eliberat recomandare pentru ingrijiri medica		
- Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri med deoarece nu a fost necesar	licale la domiciliu/paliative la domiciliu,	
Se completează obligatoriu una din cele două informati	i:	
- S-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu		
- X Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispo	zitive medicale in ambulatoriu deoarece	
nu a fost necesar		
viza Unitatii judetene de implementare a programului, p	pentru diabet)	
Unitate judeteana de diabet zaharat:		
Nr inregistrare al acignratului:		

-----

Data 28.06.2020

Sef sectie:

Sef Lucrari Dr. MUNTEAN MONICA

**Medic curant:** 

Dr. IONESCU OVIDIU

**Medic rezident:** 

Medic primar

Dr. MONICA MUNTEAN medic primar boli injectioase cod 828242

Calea de transmitere:

- prin asigurat

- prin posta .....

-----

\*) Scrisoarea medicala se intocmeste în doua exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii , într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;