

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca Str. Iuliu Moldovan Nr. 23, 400348 Tel: +40-264-594655/565758; 593105. Fax: +40-264-593105;

E-mail: infectioasecj@yahoo.com web: www.infectioasecluj.ro



# BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA \*)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca VULTURAR ANDREI-STEFAN, nascut la data de 11.04.2013, CNP/ cod unic de asigurare 5130411125829, Adresa: Jud.CLUJ Loc.Cluj Napoca Str.IUGOSLAVIEI Nr.73 a fost internat in serviciul nostru in perioada: 11.08.2020 01:21 - 14.08.2020 14:00, FO: 19329 F.O. / nr. din Registrul de consultatii BOLI INFECTIOASE VI-COPII si se externeaza: AMELIORAT

## Diagnostice:

COVID-19 FORMA ASIMPTOMATICA

Motivele prezentarii				
Anamneza				
- factori de risc				
Examen clinic - general				
- local				
Examene de laborator: 11.08.2020				
APTT - APTT (sec) 22.7 [ 22.1 - 28.1 ] , - APTT (%) [ - ], Creatinina - 0.47 [ 0.4 - 0.6 ],				
<b>D-Dimeri</b> - 0.19 [ 0 - 0.55 ], <b>Feritina</b> - 14.2 [ 9.0 - 306.8 ], <b>Fibrinogen</b> - 155 [ 180 - 400 ],				
Glicemie - 93 [ 60 - 100 ], GOT - 24 [ 0 - 45 ], GPT - 14 [ 0 - 45 ], Hemoleucograma				
<b>completa</b> - Leucocite 5.5 [ 4.0 - 10.0 ] , - Hematii 5.04 [ 3.9 - 5.7 ] , - Hemoglobina 13.4 [ 11.3 -				
15.3], - Hematocrit 38.8 [ 33.0 - 45.0 ], - VEM 77.0 [ 72.0 - 99.6 ], - HEM 26.6 [ 24.0 - 34.0 ]				
, - CHEM 34.6 [ 31.0 - 35.0 ] , - RDW-CV% 12.5 [ 9.9 - 15.5 ] , - Trombocite 232 [ 150 - 450 ]				
, - MPV 8.2 [ 6.5 - 14.0 ] , - NEUT% 43.21 [ 37 - 65 ] , - LYMPH% 48.18 [ 27 - 50 ] , -				
MONO% 7.07 [ 3.0 - 10.0 ] , - EO% 1.00 [ 0 - 5 ] , - BASO% 0.54 [ 0 - 2 ] , - NEUT# 2.385 [				
1.5 - 6], - LYMPH# 2.660 [ 1.5 - 4.0 ], - MONO# 0.390 [ 0.15 - 1.3 ], - EO# 0.055 [ 0.00 -				
0.67], - BASO# 0.030 [ 0 - 0.13 ], <b>K</b> - 4.5 [ 3.5 - 5.1 ], <b>LDH</b> - 210 [ 120 - 300 ], <b>Na</b> - 140 [ 136				
- 146 ], <b>Proteina C reactiva</b> - 0.02 [ 0 - 1 ], <b>Timp de protrombina</b> - PT (sec) (plasma) 11.5 [				
9.4 - 13.6], - PT (%) (plasma) 99.2 [ 70 - 130 ], - INR (plasma) 1.00 [ 0.8 - 1.2 ], <b>Trigliceride</b>				
- 85 [ 0 - 150 ], <b>Uree</b> - 37.1 [ 0 - 50 ], <b>VSH</b> - 2 [ 1 - 15 ], <b>Covid-19 (SARS-CoV-2)</b> - Detectabil				
[ Nedetectabil - ]				
13.08.2020				
<b>APTT</b> - APTT (sec) 23.7 [ 22.1 - 28.1 ] , - APTT (%) [ - ], <b>Creatinina</b> - 0.50 [ 0.4 - 0.6 ],				
<b>D-Dimeri</b> - 0.19 [ 0 - 0.55 ], <b>Feritina</b> - 18.4 [ 9.0 - 306.8 ], <b>Fibrinogen</b> - 188 [ 180 - 400 ],				
Glicemie - 89 [ 60 - 100 ], GOT - 20 [ 0 - 45 ], GPT - 13 [ 0 - 45 ], Hemoleucograma				
<b>completa</b> - Leucocite 5.7 [ 4.0 - 10.0 ] , - Hematii 5.08 [ 3.9 - 5.7 ] , - Hemoglobina 13.6 [ 11.3 -				
15.3], - Hematocrit 39.1 [ 33.0 - 45.0], - VEM 76.9 [ 72.0 - 99.6], - HEM 26.9 [ 24.0 - 34.0]				
, - CHEM 34.9 [ 31.0 - 35.0 ] , - RDW-CV% 12.7 [ 9.9 - 15.5 ] , - Trombocite 219 [ 150 - 450 ]				
, - MPV 8.6 [ 6.5 - 14.0 ] , - NEUT% 29.46 [ 37 - 65 ] , - LYMPH% 58.86 [ 27 - 50 ] , -				
MONO% 9.01 [ 3.0 - 10.0 ] , - EO% 2.19 [ 0 - 5 ] , - BASO% 0.48 [ 0 - 2 ] , - NEUT# 1.670 [				
1.5 - 6], - LYMPH# 3.337 [ 1.5 - 4.0], - MONO# 0.511 [ 0.15 - 1.3], - EO# 0.124 [ 0.00 -				
0.67], - BASO# 0.027 [ 0 - 0.13], <b>K</b> - 4.7 [ 3.5 - 5.1], <b>LDH</b> - 193 [ 120 - 300], <b>Na</b> - 145 [ 136				

- 146 ], **Proteina C reactiva** - 0.01 [ 0 - 1 ], **Timp de protrombina** - PT (sec) (plasma) 10.5 [

 $9.4 - 13.6 \ ] \ , - PT \ (\%) \ (plasma) \ 121.9 \ [ \ 70 - 130 \ ] \ , - INR \ (plasma) \ 0.90 \ [ \ 0.8 - 1.2 \ ],$   $\textbf{Trigliceride} \ - 61 \ [ \ 0 \ - 150 \ ], \ \textbf{Uree} \ - 29 \ [ \ 0 \ - 50 \ ], \ \textbf{VSH} \ - 2 \ [ \ 1 \ - 15 \ ], \ \textbf{Anticorpi anti}$   $\textbf{SARS-CoV-2 IgG} \ - \ \text{Reactiv} \ (Index=1.657) \ [ \ Index \ < 0.8 \ Nonreactiv>= 0.8 \ - < 1.2 \ Incert>=1.2$   $\textbf{Reactiv} \ - \ ], \ \textbf{Anticorpi anti} \ \textbf{SARS-CoV-2 IgM} \ - \ Nonreactiv \ (Index=0.300) \ [ \ Index \ < 0.8 \ Nonreactiv>= 0.8 \ - < 1.2 \ Incert>=1.2 \ Reactiv \ - \ ]$ 

Exan	nene paraclinice:
EKG	
ECO	
Rx	
	T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 11.08.2020RGR.PULM.D=1.3 Gym2Fara leziuni pleuro-pulmonare evidente rgr.
Altel	<u> </u>
Trata	ment efectuat
	nformatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului:
	ICRIZA

Pacient in varsta de 7 ani, fara boli asociate, vaccinat la zi, se interneaza in clinica noastra insotit de tata in data de 11.08.2020, fara acuze.

Din ancheta epidemiologica retinem faptul ca pacientul a avut contact direct cu mama si tatal acestuia care sunt confirmati cu infectie SARS COV-2.

Obiectiv la internare: stare generala buna, constient, cooperant, afebril, apetent, T- 1,40 m, G-28 kg, congestie faringiana discreta, tesut conjunctiv-adipos bine reprezentat, torace normal conformat, MV prezent bilateral, fara raluri supraadaugate, Sa O2- 99% aa, zgomote cardiace ritmice, bine batute, fara sufluri supraadaugate auscultatoric, AV-69 b/min, abdomen mobil cu respiratia, liber, nedureros la palparea superficiala si profunda, tranzit intestinal prezent, diureza prezenta, fara semne de iritatie meningeana sau de focar neurologic.

Biologic la internare: fara modificari patologice. Anticorpii anti SARS COV-2 IgM negativi si IgG pozitivi.

Examen virusologic: rt-PCR SARS COV-2 (05.08.2020): DETECTABIL (proba 1) (cod caz: CJ 34668/2020)

rt-PCR SARS COV-2 (12.08.2020): DETECTABIL (proba 2) (cod caz: CJ

Radiologic la momentul internarii nu se observa modificari patologice.

S-a interpretat cazul cu diagnosticele sus mentionate si nu s-a administrat tratament medicamentos.

Se externeaza ameliorat, afebril, apetent, echilibrat hemodinamic si respirator, cu recomandari.

### Tratament recomandat

34668/2020).

Recomandari la externare pentru pacientul cu infectie SARS-CoV2

Conform Ordinului 1321/22.07.2020 se indica izolare la domicliu/locatia declarata pe o perioada de 4 zile de la externare (pana la implinirea a 14 zile de la momentul internarii). In aceasta perioada nu se va parasi domiciliul/locatia declarata.

Acestia pot desfasura activitatile curente si profesionale cu pastrarea distantarii si purtarea mastii acasa si la locul de munca pentru inca 10 zile, dupa incheierea perioadei de izolare.

Dupa ce ajungeti acasa se recomanda efectuarea dusului, hainele cu care ati plecat acasa se vor pune intr-un sac impermeabil (fara a fi scuturate). Hainele (inclusiv hainele care pe care le-ati folosit in spital) se vor pastra in sac intr-un loc separat (preferabil pe balcon) timp de 5 zile, ulterior vor fi

spalate la masina de spalat haine (la cea mai mare temperatura permisa de producator) cu dezinfectant pentru haine si calcate ulterior. Se vor folosi manusi pentru manipularea hainelor, care ulterior vor fi aruncate si va veti spala pe mcu apa si sapun. Telefonul, ceasul si alte obiecte electronice se vor dezinfecta cu servetele impregnate cu alcool.

Masuri de igiena individuala de respectat la domiciliu:

Sa se evite contactul apropiat cu celelalte persoane din locuinta si, daca este posibil, sa se izoleze camera separata, cu baie separata.

Daca se foloseste aceeasi baie, aceasta va fi dezinfectata dupa folosire, se va dezinfecta toaleta si toate obiectele atinse (inclusiv clante, intrerupatoare). Dezinfectarea se va face cu solutii pe baza de clor (ex. Domestos) sau alcool (min 70 %).

Sa nu primeascvizitatori in perioada de izolare la domiciliu/locatia declarata.

Sa se spele pe maini cu apa si sapun, timp de cel putin 20 de secunde, ori de cate ori este necesar (dupa utilizarea toaletei, inaintea pregatirii mesei, etc).

Sa curate si sa dezinfecteze zilnic toate suprafetele pe care le atinge frecvent (ex: mese, clante, obiecte de mobilier, bateria/robinetele de la chiuveta, alte obiecte care pot fi atinse si de alte persoane).

Sa isi acopere gura si nasul cu servetel de unica folosinta sau cu o tesatura atunci cand stranuta sau tuseste, sau sa stranute si sa tuseasca in plica cotului. Batista se arunca imediat la gunoi, in sac de plastic, dupa care se spala pe maini cu apa si sapun timp de 20 de secunde.

Sa pastreze distanta de minim 1,5 m atunci cand se intalneste cu alte persoane.

Sa poarte masca cand se intalneste cu alte persoane. Masca trebuie sa acopere nasul si gura.

Purtarea mastii este una dintre masurile de prevenire si limitare pentru raspandirea anumitor boli respiratorii, inclusiv cea determinata de noul coronavirus. Cu toate acestea, doar utilizarea unei masti nu este suficienta pentru a asigura un nivel adecvat de protectie si ar trebui adoptate si alte masuri la fel de relevante. Folosirea mastii trebuie combinata cu igiena adecvata a mainilor si cu alte masuri de prevenire si control a transmiterii noului coronavirus de la om la om.

- -in timpul utiliztrebuie sa evitati atingerea mastii;
- -sa indepartati masca folosind tehnica adecvata (nu atingeti partea din fata, ci indepartati snururile din spate), actiune urmata de spalarea IMEDIATA a mainilor cu apa si sapun;
- -sa nu reutilizati mastile de unica folosinta. Masca se schimba la maxim 4 ore sau mai repede caz de umezire.

#### Monitorizarea dupa externare:

Monitorizarea starii de sanatate a pacientului pe perioada izolarii la domicliu se face de catre medicul de familie zilnic, prin sistemul de telemedicina. Pacientii care nu sunt inscrisi pe lista unui medic de familie vor fi monitorizati zilnic de catre DSP judeteana. In cazul aparitiei unor probleme de sanatate se va lua legatura telefonica cu medicul de familie sau se va suna la 112.

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

### Indicatie pentru revenire la internare

X	Nu, nu este necesara revenirea pentru internare		

Se completeazã obligatoriu una din cele douã informatii:

- US-a eliberat prescriptie medicală, caz în care se va înscrie seria si numarul acesteia
- Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu a fost necesar
- X Nu s-a eliberat prescriptie medicala

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- S-a eliberat concediu medical la externare, caz în care se va înscrie seria si numarul acestuia
- Nu s-a eliberat concediu medical la externare deoarece nu a fost necesar
- X Nu s-a eliberat concediu medical la externare

Se completeazã obligatoriu una din cele douã informatii:

- S-a eliberat recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu				
- X Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu,				
deoarece nu a fost necesar				
Se completeazã obligatoriu una din cele douã informatii	:			
- S-a eliberat prescriptie medicalã pentru dispozitiv	ve medicale in ambulatoriu			
- X Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispoz	zitive medicale in ambulatoriu de	oarece		
nu a fost necesar				
u viza Unitatii judetene de implementare a programului, pe	entru diabet)			
Unitate judeteana de diabet zaharat:				
Nr. inregistrare al asiguratului:				
Data 14.08.2020				
Sef sectie:	Medic curant:	<b>Medic rezident:</b>		
Dr. SABOU MIHAELA	SZILAGYI TIMEA			
Medic primar				
Dr. MIHAELA SABOU	Dr. SZILAGYI-TIMEA			
holi injections	medie pecialist Boli Infectionse			
Alish	Cod Palesi			
Calea de transmitere:	,			
- prin asigurat				
- prin posta				

\*) Scrisoarea medicala se intocmeste în doua exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii , într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;