ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL ROSA PERRONE SCAVONE

Arthur Brandão Stocco

Camilly Fernanda Marques de Morais

Juliana Sanfins Santana e Silva

Luis Octávio Azevedo da Silva

MEU MIAU: SISTEMA DE BIOSSEGURANÇA PARA SANITÁRIOS FELINOS

ITATIBA

2025

1. RESUMO

2. INTRODUÇÃO

O termo “biossegurança”, é empregado para identificar certas ações que tem como objetivo a prevenção, contenção, diminuição ou eliminação de riscos referentes a atividades que acabam prejudicando a saúde humana (DA SILVA ALVES, 2015). A biossegurança é quebrada quando não seguimos as normas e práticas de segurança, algo que muitas vezes sucede nosso cotidiano e acabamos não percebendo. Tal ação impacta profundamente a vida de quem não a segue, podendo ocasionar contaminação, disseminação de doenças e riscos à saúde pública (GOMES, 2022).

O modo como cuidamos dos excrementos dos felinos pode ser um grande impasse em relação á biossegurança, pois é possível que nele contenham agentes contaminantes, como a toxoplasmose, na qual possui os gatos como hospedeiros definitivos. Para adquirir o protozoário dessa doença, o felídeo entra em contato com o micro-organismo (pela ingestão de carne crua/mal cozida ou qualquer outro meio de contato com algo já contaminado pelo Toxoplasma Gondii) que se encaminha para seu intestino, atravessando a parede intestinal, se multiplica e leva-o para forma de taquizoíto (fase do ciclo de vida em que o parasita prolifera rapidamente dentro das células do hospedeiro), após isso, as células formam os oocistos que são excretados junto com as fezes e podem infectar terceiros em um período de 1 a 5 dias (ABREU, 2023).

Dessa forma, existe o risco de outros animais entrarem em contato ou ingerirem esses dejetos, aumentando as chances de transmissão de doenças e contaminação entre eles. Segundo dados sobre a transmissão no Brasil e considerando os estados com maior índice de casos, no Mato Grosso, cerca de 57,1%, no Maranhão 50,7% e no Rio Grande do Sul 37,9% de casos de Toxoplasmose em gatos foram confirmados nos últimos 20 anos (PORTILHO, 2019).

Também é de grande perigo o contato de forma incorreta e sem a devida higiene do dono do felino para com suas fezes, levando em conta que essa doença afeta cerca de 64,9 % a 91,6 % da população brasileira (CONITEC, 2019), sendo principalmente gestantes, onde dados afirmam que 60 a 75% das mulheres em idade fértil estão infectadas pela toxoplasmose e a doença pode ser responsável por provocar abortamento, retardo do crescimento intrauterino, morte fetal, prematuridade e a síndrome da toxoplasmose congênita (WALCHER, 2017).

3. JUSTIFICATIVA

A convivência entre seres humanos e animais domésticos tem se tornado cada vez mais comum, especialmente com os felinos. Nesse contexto, a presença de caixas de areia tradicionais em ambientes domésticos pode representar riscos

à saúde animal e humana quando não há higienização adequada (ABREU, 2023). Além disso, o acesso livre às caixas de areia pode provocar estresse nos felinos, pois eles possuem um forte instinto territorial. Quando outros animais invadem esse espaço, há grande potencial do gato se sentir ameaçado, o que pode desencadear alterações comportamentais associadas à chamada "Síndrome de Pandora" (MÜLLER, 2023). Dessa maneira, torna-se importante desenvolver soluções que promovam maior controle, higiene e principalmente a manutenção da biossegurança durante o manejo e a limpeza das caixas de areia, contribuindo para o bem-estar e a saúde das populações naturais de felinos em espaços urbanos e de seus proprietários.

1.1 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABREU, Sabrina; SANCHES, Paulo Afonso Geraldo. PAPEL REAL DOS FELINOS NA TRANSMISSÃO DO TOXOPLASMA GONDII E SUA IMPORTANCIA NO QUE DIZ RESPEITO A SAÚDE PÚBLICA. Disponível em: https://www4.fag.edu.br/anais-2023/Anais-2023-100.pdf Acesso em: 12 mar. 2026.

Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC). **Ampliação do uso do teste do pezinho para detecção da toxoplasmose congênita**: relatório para consulta pública nº 84/2019. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2019. Disponível em: https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/consultas/relatorios/2019/relatorio_procedimentotoxoplasmose_cp_84_2019.pdf. Acesso em: 13 mar. 2026.

DA SILVA ALVES, Leandro; DA SILVA PACHECO, Jonas. Biosegurança: fator determinante nas unidades de atendimento à saúde. **Revista Fluminense de Extensão Universitária**, v. 5, n. 1, p. 33-40, 2015. Disponível em: https://editora.univassouras.edu.br/index.php/RFEU/article/view/564 Acesso em: 12 mar. 2026.

GOMES, Andréia Patrícia et al. Biosecurity and infectious diseases: contemporary challenges Biossegurança e doenças infecciosas: desafios contemporâneos. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 5, n. 2, p. 6364-6391, 2022. Acesso em: 12 mar. 2026.

MÜLLER, Rodrigo Alfredo Martins et al. SÍNDROME DE PANDORA EM FELINOS: REVISÃO DE LITERATURA. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 9, n. 8, p. 2410-2425, 2023. Disponível em: https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/11059 Acesso em: 12 mar. 2026.

PORTILHO, Maciria Bezerra Freire; DE CARVALHO, Aluísio Vasconcelos. A toxoplasmose em felinos: parasitologia, imunologia e diagnóstico animal. **Agrariae Liber**, v. 1, n. 1, p. 1-11, 2019. Disponível em: https://www.sapientiae.com.br/index.php/agrariaeliber/article/view/CBPC2674-6476.2019.001.0001/7 Acesso em: 13 mar. 2026.

WALCHER, Débora Liliane; COMPARSI, Bruna; PEDROSO, Débora. Toxoplasmose gestacional: uma revisão. **Braz J Clinical Analyses [Internet]**, v. 49, n. 4, p. 323-7, 2017. Disponível em: https://docs.bvsalud.org/biblioref/2019/08/1007913/rbac-vol-49-4-2017-ref-273.pdf Acesso em: 12 mar. 2026.