

Ficha técnica

Variable estadística X:	Lenguaje de programación favorito (FIPS)
Población:	Estudiantes de 2do año de Ingeniería de Sistemas
Muestra:	22 estudiantes de EMAT, grupo B
Unidad de observación:	Un estudiante individual
Fuente:	Recolección de datos mediante formulario de Google Forms
Tipo de dato estadístico:	Cualitativo nominal

Tabla de distribución de frecuencias

Cuadro 1: Lenguajes de programación favoritos de los estudiantes de EMAT B (FIPS)

Lenguaje (x_i)	Frecuencia absoluta (f_i)	Frecuencia relativa (h_i)	Porcentaje (%)
Java	14	0.6364	63.64 %
Python	1	0.0455	4.55 %
JavaScript	1	0.0455	4.55 %
C++	5	0.2273	22.73 %
Otro	1	0.0455	4.55 %
Total	22	1.0000	100 %

Nota: al ser una variable cualitativa nominal, no corresponde calcular frecuencias acumuladas, ya que las categorías no tienen un orden intrínseco.

Representación gráfica




Figura 1: Distribución de lenguajes de programación favoritos — diagrama de barras




Figura 2: Distribución de lenguajes de programación favoritos — diagrama circular

Ficha técnica

Variable estadística X:	Cantidad de horas programando (horas enteras)
Población:	Estudiantes de 2do año de Ingeniería de Sistemas
Muestra:	22 estudiantes de EMAT, grupo B
Unidad de observación:	Un estudiante individual
Fuente:	Recolección de datos mediante formulario de Google Forms
Tipo de dato estadístico:	Cuantitativo discreto

Tabla de distribución de frecuencias

Cuadro 2: Cantidad de horas programando de los estudiantes de EMAT B(horas enteras)

x_i	f_i	F_i	h_i	H_i	$h_i \%$
2	4	4	0.1818	0.1818	18.18 %
5	4	8	0.1818	0.3636	18.18 %
10	4	12	0.1818	0.5455	18.18 %
15	3	15	0.1364	0.6818	13.64 %
22	3	18	0.1364	0.8182	13.64 %
28	1	19	0.0455	0.8636	4.55 %
30	1	20	0.0455	0.9091	4.55 %
40+	2	22	0.0909	1.0000	9.09 %
Total	22		1.0000		100 %

Notación utilizada:

x_i Valor de la variable (horas programando)

f_i Frecuencia absoluta

F_i Frecuencia absoluta acumulada

h_i Frecuencia relativa

H_i Frecuencia relativa acumulada

$h_i \%$ Porcentaje

Representación gráfica




Figura 3: Distribución de horas programando — gráfico de barras




Figura 4: Distribución de horas programando — histograma

Medidas de tendencia central

1. Promedio (Media Aritmética)

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^k x_i \cdot f_i}{n}$$

Notación:

- x_i : valor de la variable
- f_i : frecuencia absoluta de x_i
- n : tamaño de la muestra

Desarrollo:

$$\bar{x} = \frac{(2)(4) + (5)(4) + (10)(4) + (15)(3) + (22)(3) + (28)(1) + (30)(1) + (40)(2)}{22} = \frac{317}{22} \approx 14.41$$

Interpretación: Los estudiantes de EMAT B dedican en promedio 14 horas programando a la semana.

2. Promedio Ponderado

$$\bar{x}_p = \frac{\sum_{i=1}^k w_i \cdot x_i}{\sum_{i=1}^k w_i}$$

Notación:

- x_i : valor de la variable
- w_i : peso asociado a x_i (en este caso, la frecuencia f_i)

Desarrollo:

Tomando las frecuencias f_i como los pesos w_i de cada valor:

$$\bar{x}_p = \frac{(4)(2) + (4)(5) + (4)(10) + (3)(15) + (3)(22) + (1)(28) + (1)(30) + (2)(40)}{4 + 4 + 4 + 3 + 3 + 1 + 1 + 2} = \frac{317}{22} \approx 14.41$$

Interpretación: Considerando el peso de cada frecuencia, los estudiantes de EMAT B dedican en promedio 14 horas programando a la semana.

3. Mediana (Md)

$$\text{Posición} = \frac{n}{2}$$

Notación:

- n : tamaño de la muestra (total de elementos)

Desarrollo:

- Posición = $\frac{22}{2} = 11$
- Como n es par, se promedian los valores en las posiciones 11 y 12.
- Buscando en F_i : ambas posiciones caen dentro de $F_i = 12$ (correspondiente a $x_i = 10$).

$$Md = \frac{10 + 10}{2} = 10$$

Interpretación: El 50 % de los estudiantes de EMAT B dedica a lo mucho 10 horas programando a la semana, mientras que el otro 50

4. Moda (Mo)

$$Mo = x_i \text{ tal que } f_i \text{ es máxima}$$

Notación:

- x_i : valor de la variable
- f_i : frecuencia absoluta de x_i

Desarrollo:

La frecuencia máxima es $f_i = 4$, alcanzada por tres valores: $x_i = 2$, $x_i = 5$ y $x_i = 10$.

$$Mo = \{2, 5, 10\} \quad (\text{distribución trimodal})$$

Interpretación: Los valores de horas que más se repiten entre los estudiantes de EMAT B son 2, 5 y 10 horas programando a la semana.

5. Cuartiles

$$Q_j = L_i + a \cdot \frac{\left(\frac{j \cdot m}{4}\right) - F_{i-1}}{f_i}$$

Notación:

- L_i : valor x_i de la fila donde se ubica la posición (al ser datos no agrupados, $L_i = x_i$)
- a : amplitud de clase; para datos no agrupados $a = 0$
- m : tamaño de la muestra ($m = 22$)
- j : número del cuartil a calcular ($j = 1, 2, 3$)
- F_{i-1} : frecuencia acumulada de la fila anterior
- f_i : frecuencia absoluta de la fila donde se ubica la posición

Desarrollo:

- $Q_1: \frac{(1)(22)}{4} = 5.5 \Rightarrow$ cae en $F_i = 8$ ($x_i = 5$)

$$Q_1 = 5 + 0 \cdot \frac{5.5 - 4}{4} = 5$$

- $Q_2: \frac{(2)(22)}{4} = 11 \Rightarrow$ cae en $F_i = 12$ ($x_i = 10$)

$$Q_2 = 10 + 0 \cdot \frac{11 - 8}{4} = 10$$

- $Q_3: \frac{(3)(22)}{4} = 16.5 \Rightarrow$ cae en $F_i = 18$ ($x_i = 22$)

$$Q_3 = 22 + 0 \cdot \frac{16.5 - 15}{3} = 22$$

Interpretación: Por ejemplo para Q_1 , el 25 % de los estudiantes de EMAT B dedica a lo mucho 5 horas programando a la semana, mientras que el otro 75 % dedica 5 horas o más.

6. Deciles

$$D_j = L_i + a \cdot \frac{\left(\frac{j \cdot m}{10}\right) - F_{i-1}}{f_i}$$

Notación:

- L_i : valor x_i de la fila donde se ubica la posición ($L_i = x_i$ por ser datos no agrupados)
- a : amplitud de clase; $a = 0$
- m : tamaño de la muestra ($m = 22$)
- j : número del decil a calcular ($j = 1, 2, \dots, 9$)
- F_{i-1} : frecuencia acumulada de la fila anterior
- f_i : frecuencia absoluta de la fila donde se ubica la posición

Desarrollo:

- $D_1: 2.2 \Rightarrow F_i = 4 (x_i = 2) \Rightarrow D_1 = 2 + 0 \cdot \frac{2.2-0}{4} = 2$
- $D_2: 4.4 \Rightarrow F_i = 8 (x_i = 5) \Rightarrow D_2 = 5 + 0 \cdot \frac{4.4-4}{4} = 5$
- $D_3: 6.6 \Rightarrow F_i = 8 (x_i = 5) \Rightarrow D_3 = 5 + 0 \cdot \frac{6.6-4}{4} = 5$
- $D_4: 8.8 \Rightarrow F_i = 12 (x_i = 10) \Rightarrow D_4 = 10 + 0 \cdot \frac{8.8-8}{4} = 10$
- $D_5: 11 \Rightarrow F_i = 12 (x_i = 10) \Rightarrow D_5 = 10 + 0 \cdot \frac{11-8}{4} = 10$
- $D_6: 13.2 \Rightarrow F_i = 15 (x_i = 15) \Rightarrow D_6 = 15 + 0 \cdot \frac{13.2-12}{3} = 15$
- $D_7: 15.4 \Rightarrow F_i = 18 (x_i = 22) \Rightarrow D_7 = 22 + 0 \cdot \frac{15.4-15}{3} = 22$
- $D_8: 17.6 \Rightarrow F_i = 18 (x_i = 22) \Rightarrow D_8 = 22 + 0 \cdot \frac{17.6-15}{3} = 22$
- $D_9: 19.8 \Rightarrow F_i = 20 (x_i = 30) \Rightarrow D_9 = 30 + 0 \cdot \frac{19.8-19}{1} = 30$

Interpretación: Para D_1 , el 10 % de los estudiantes de EMAT B dedica a lo mucho 2 horas programando a la semana.

7. Percentiles

$$P_j = L_i + a \cdot \frac{\left(\frac{j \cdot m}{100}\right) - F_{i-1}}{f_i}$$

Notación:

- L_i : valor x_i de la fila donde se ubica la posición ($L_i = x_i$ por ser datos no agrupados)
- a : amplitud de clase; $a = 0$
- m : tamaño de la muestra ($m = 22$)
- j : número del percentil a calcular ($j = 1, 2, \dots, 99$)
- F_{i-1} : frecuencia acumulada de la fila anterior
- f_i : frecuencia absoluta de la fila donde se ubica la posición

Desarrollo:

Se muestran los percentiles más usados como ejemplo:

- P_{10} : $2.2 \Rightarrow F_i = 4$ ($x_i = 2$) $\Rightarrow P_{10} = 2 + 0 \cdot \frac{2.2-0}{4} = 2$
- P_{25} : $5.5 \Rightarrow F_i = 8$ ($x_i = 5$) $\Rightarrow P_{25} = 5 + 0 \cdot \frac{5.5-4}{4} = 5$ ($= Q_1$)
- P_{50} : $11 \Rightarrow F_i = 12$ ($x_i = 10$) $\Rightarrow P_{50} = 10 + 0 \cdot \frac{11-8}{4} = 10$ ($= Md = Q_2$)
- P_{75} : $16.5 \Rightarrow F_i = 18$ ($x_i = 22$) $\Rightarrow P_{75} = 22 + 0 \cdot \frac{16.5-15}{3} = 22$ ($= Q_3$)
- P_{90} : $19.8 \Rightarrow F_i = 20$ ($x_i = 30$) $\Rightarrow P_{90} = 30 + 0 \cdot \frac{19.8-19}{1} = 30$

Interpretación: Para P_{10} , el 10 % de los estudiantes de EMAT B dedica a lo mucho 2 horas programando a la semana.