

Nous

Camilo Tayac

2026-06-08

Tabla de contenidos

Nous	3
Introducción	4
Resumen	5
I Conjuntos	6
1 Proposición y su negación	7
II Química	9
2 Cinética química	10
III Apéndices	12
References	13

Nous

Bienvenido a **Nous**, un cuaderno de apuntes sobre lógica, conjuntos, química y otros temas que voy estudiando. Cada nota nace en Obsidian y se publica como libro con Quarto.

Este libro crece conmigo — los temas se agregan a medida que los estudio.

Introducción

Cómo leer este libro

Los capítulos están organizados por materia. Cada uno puede leerse de forma independiente. Al final hay referencias bibliográficas.

Convenciones

- ## divide secciones dentro de un mismo tema
- @exm- son ejemplos
- @tbl- son tablas
- @eq- son ecuaciones

Resumen

(por definir — se actualizará cuando haya más contenido)

Conjuntos

1 Proposición y su negación

7

1 Proposición y su negación

1.1. Definición de proposición

La unión de dos o más palabras nos permite crear una oración o enunciado, como se muestra en el Ejemplo 1.1.

Ejemplo 1.1. *El sol es una estrella.*

Un enunciado es una **proposición** cuando tiene sentido asignarle un valor de verdad (verdadero o falso), aunque no sepamos cuál es (Muñoz 2001). Usando la lógica, podemos determinar si un enunciado es V o F.

1.2. Enunciados que no son proposiciones

Hay enunciados que no son proposiciones, como se ve en el Ejemplo 1.2, en el cual no podemos determinar si el enunciado es V o F, dado que se trata de una expresión de saludo.

Ejemplo 1.2. *Hola, ¿cómo estás?*

Otro caso son los enunciados con variables sin valor asignado. En el Ejemplo 1.3, no tiene sentido preguntar si es verdadero o falso porque x no representa nada concreto.

Ejemplo 1.3. x es blanco

1.3. Negación de una proposición

La proposición del Ejemplo 1.1 puede etiquetarse con una letra; en esta ocasión será la letra P . La proposición P puede tener su negación, como se observa en el Ejemplo 1.4. La negación se representa con el signo $\neg$; por tanto, la negación de P queda como $\neg P$. $\neg P$ se lee como “no P ” o “la negación de P ” (Muñoz 2001).

Ejemplo 1.4. *El sol no es una estrella.*

1.4. Tabla de verdad

Las proposiciones P y $\neg P$ pueden valorarse como V o F. Si P es V, entonces $\neg P$ es F; y si P es F, entonces $\neg P$ es V. Esto se puede representar con una **tabla de verdad** (Muñoz 2001), como se observa en la Tabla 1.1.

Tabla 1.1: Tabla de verdad para las proposiciones P y $\neg P$

P	$\neg P$
V	F
F	V

Química

2 Cinética química

10

2 Cinética química

2.1. Introducción a la cinética química

Cuando hablamos de una reacción química es cuando los reactivos se convierten en productos. En esta ocasión solo nos enfocamos en el inicio y el final. Entre el inicio y el final hay etapas que determinan cómo ha cambiado el reactivo al producto, cómo cambia un enlace, cómo se transfiere un átomo, etc. Todo este proceso sucede en un tiempo determinado, y al medir cómo cambia la concentración con el tiempo puedo determinar la velocidad de reacción. La velocidad de reacción es la velocidad con la cual ocurre una reacción química, pasa de reactivo a producto y la rama de la química que estudia esto es la cinética química ([Brown et al. 2014](#)).

2.2. Teoría de colisiones

Para que ocurra una reacción química debe ocurrir colisiones o choques entre los reactivos para que haya una transferencia de átomos o una reorganización de enlaces formando el producto. Esto solo ocurre si el choque o colisión se da en la posición correcta y si tiene la suficiente energía ([Brown et al. 2014](#)).

2.3. Efecto del estado físico

Hay varios factores que afectan la colisión entre partículas. El primero es el estado físico de los reactivos. Al estar los reactivos en una mezcla homogénea, la cantidad de colisiones es mayor y más rápida, permitiendo que los reactivos generen esa reorganización de átomos o enlaces. Pero si estamos en una mezcla heterogénea, como sólido y líquido, esto reduce los choques y la velocidad se reduce, lo que disminuye la cantidad de producto que se genera en el tiempo. Un ejemplo cotidiano que ayuda a comprender esto es el tipo de presentación de un medicamento: un medicamento sólido se va a demorar más en hacer efecto que el medicamento en presentación en polvo, dado que el sólido tiene menor área superficial comparado con el polvo ([Brown et al. 2014](#)).

Una analogía para entender esto: imagina 10 mineros que van a picar una piedra gigante. Se van a demorar más porque tienen que ir picando de afuera hacia dentro y, al ser una sola piedra, el área que pueden picar es menor. Ahora, ¿qué pasa si esa misma piedra está partida en 10 piedras más pequeñas?

Los mineros van a poder escoger cada uno una piedra, y se va a picar más rápido porque cada minero va a tener más área que picar en comparación con la piedra grande.

2.4. Efecto de la concentración

El segundo factor que afecta la colisión es la concentración de los reactivos. A mayor concentración en un espacio determinado, aumentan las probabilidades de colisión, y si hay más colisiones o choques, hay mayor velocidad de reacción ([Brown et al. 2014](#)).

Imaginemos un espacio con dos partículas. Con el tiempo, estas partículas se moverán, pero como tienen tanto espacio, su probabilidad de que choquen es baja. Ahora imaginemos un espacio con un millón de partículas. Con el tiempo se moverán, pero como hay una gran cantidad de partículas, ellas van a chocar muy fácilmente con otra partícula, y ese choque aumenta la probabilidad de que se forme el producto, aumentando la velocidad de reacción.

2.5. Efecto de la temperatura

El tercer factor es la temperatura. La temperatura se relaciona con la energía cinética y la energía cinética se relaciona con el movimiento de las partículas. Si hay mayor movimiento de las partículas mayor va a ser la probabilidad de que choquen, y además estas colisiones tendrán mayor energía, lo que permite superar la barrera de energía necesaria para que la reacción ocurra. A temperatura baja el movimiento es menor, por ende los choques son menores y con menos energía. Si la temperatura es alta el movimiento de las partículas es mayor, por ende hay más choques y con mayor energía. Por lo tanto, la temperatura afecta la velocidad de reacción al modificar tanto la frecuencia como la energía de los choques entre partículas ([Brown et al. 2014](#)).

2.6. Efecto de los catalizadores

El cuarto factor es la utilización de catalizador. Un catalizador es un compuesto que permite acelerar una reacción química afectando los tipos de colisiones y modificando los mecanismos de reacción, sin participar en la reacción química ([Brown et al. 2014](#)).

Apéndice

References

13

References

- Brown, Theodore L. et al. (2014). *Química, la ciencia central*. 12.^a ed. México: Pearson Educación. ISBN: 978-607-32-2237-2.
- Muñoz, Juan Manuel (2001). *Introducción a la teoría de conjuntos*. Recuperado de <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/79986>.