

César Antônio de Magalhães

Curso de integrais duplas e triplas

Brasil

2016

César Antônio de Magalhães

Curso de integrais duplas e triplas

Exercícios de integrais duplas e triplas em
conformidade com as normas ABNT.

Universidade Norte do Paraná – Unopar

Brasil

2016

Lista de ilustrações

Figura 1 – Integrais duplas - Aula 1 - Exercício I e II	15
Figura 2 – Integrais duplas - Aula 2 - Exercício I	16
Figura 3 – Integrais duplas - Aula 2 - Exercício II	17
Figura 4 – Integrais duplas - Aula 2 - Exercício III	17
Figura 5 – Integrais duplas - Aula 2 - Exercício IV	18
Figura 6 – Integrais duplas - Aula 2 - Exercício V	19
Figura 7 – Integrais duplas - Aula 3 - Exercício I	19
Figura 8 – Integrais duplas - Aula 3 - Exercício II	20
Figura 9 – Integrais duplas - Aula 4 - Exercício II	21
Figura 10 – Integrais duplas - Aula 4 - Exercício III	21
Figura 11 – Integrais duplas - Aula 5 - Exercício I	23
Figura 12 – Integrais duplas - Aula 5 - Exercício II	23
Figura 13 – Integrais duplas - Aula 8 - Exercício I	25
Figura 14 – Integrais duplas - Aula 9 - Exercício I	27
Figura 15 – Integrais duplas - Aula 10 - Exercício I	27
Figura 16 – Coordenadas polares - Aula 01 - Exercício I	28
Figura 17 – Coordenadas polares - Aula 01 - Exercício II	30
Figura 18 – Coordenadas polares - Aula 02 - Exercício I	31
Figura 19 – Coordenadas polares - Aula 02 - Exercício II	31
Figura 20 – Coordenadas polares - Aula 03 - Exercício I	32
Figura 21 – Integrais triplas - Aula 03 - Exercício I	37
Figura 22 – Integrais triplas - Aula 04 - Exercício I	39
Figura 23 – Integrais triplas - Aula 04 - Exercício II	40
Figura 24 – Integrais triplas - Aula 04 - Exercício III	41
Figura 25 – Coordenadas esféricas - Aula 02 - Exercício I	42
Figura 26 – Coordenadas esféricas - Aula 06 - Exercício I	45
Figura 27 – Coordenadas cartesianas e polares	55
Figura 28 – Coordenadas esféricas	56
Figura 29 – Determinação do seno, cosseno e tangente	57
Figura 30 – Círculo trigonométrico	57

Lista de tabelas

Tabela 1 – Derivadas simples	51
Tabela 2 – Derivadas trigonométricas	51
Tabela 3 – Integrais simples	53
Tabela 4 – Integrais trigonométricas	54
Tabela 5 – Transformação de coordenadas cartesianas em polares	55
Tabela 6 – Coordenadas polares a partir das suas correspondentes cartesianas	55
Tabela 7 – Transformação de coordenadas cartesianas em esféricas	56
Tabela 8 – Coordenadas esféricas a partir das suas correspondentes cartesianas	56
Tabela 9 – Identidades trigonométricas	58
Tabela 10 – Relação entre trigonométricas e inversas	58
Tabela 11 – Substituição trigonométrica	58
Tabela 12 – Ângulos notáveis	59

Lista de abreviaturas e siglas

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
v	Volume
a	Área
R	Região
P	Ponto
r	Raio
co	Cateto oposto
ca	Cateto adjacente
h	Hipotenusa
sen	Seno
cos	Cosseno
tg	Tangente
sec	Secante
cossec	Cossecante
cotg	Cotangente
arcsen	Arco seno
arccos	Arco cosseno
arctg	Arco tangente
arcsec	Arco secante
arccossec	Arco cossecante
arccotg	Arco cotangente
log	Logaritmo
ln	Logaritmo natural
e	Número de Euler
lim	Limite

Lista de símbolos

\int	Integral
\iint	Integral dupla
\iiint	Integral tripla
π	Letra grega minúscula pi
α	Ângulo alfa
θ	Ângulo theta
\in	Pertence

Sumário

	Introdução	13
1	INTEGRAIS DUPLAS	15
	<i>Cálculo de integrais duplas.</i>	
1.1	Invertendo os limites de integração - Aula 1	15
1.2	Determinação da região de integração - Aula 2	16
1.3	Cálculo de volume - Aula 3	19
1.4	Invertendo a ordem de integração - Aula 4	20
1.5	Cálculo de integrais duplas ou iteradas	22
1.5.1	Aula 5	22
1.5.2	Aula 6	23
1.5.3	Aula 7	25
1.6	Cálculo de área - Aula 8	25
1.7	Cálculo de volume	26
1.7.1	Aula 9	26
1.7.2	Aula 10	27
1.8	Coordenadas polares	28
1.8.1	Aula 1	28
1.8.2	Aula 2	30
1.8.3	Aula 3	32
2	INTEGRAIS TRIPLAS	33
	<i>Cálculo de integrais triplas.</i>	
2.1	Introdução - Aula 1	33
2.2	Cálculo de integrais triplas - Aula 2	34
2.3	Cálculo do volume de um sólido - Aula 3	36
2.4	Esboço de um sólido - Aula 4	38
2.5	Coordenadas esféricas	41
2.5.1	Aula 1	41
2.5.2	Aula 2	42
2.5.3	Aula 3	42
2.5.4	Aula 4	43
2.5.5	Aula 5	44
2.5.6	Aula 6	45

REFERÊNCIAS	47
-----------------------	----

ANEXOS 49

	ANEXO A – DERIVADAS	51
A.1	Derivadas simples	51
A.2	Derivadas trigonométricas	51
	ANEXO B – INTEGRAIS	53
B.1	Integrais simples	53
B.2	Integrais trigonométricas	54
B.3	Relação entre coordenadas cartesianas e polares	55
B.4	Relação entre coordenadas cartesianas e esféricas	56
	ANEXO C – FUNÇÕES TRIGONOMÉTRICAS	57
C.1	Determinação do seno, cosseno e tangente	57
C.2	Círculo trigonométrico	57
C.3	Identidades trigonométricas	58
C.4	Relação entre trigonométricas e inversas	58
C.5	Substituição trigonométrica	58
C.6	Ângulos notáveis	59

Introdução

Esse documento contém exercícios retirados do Youtube através do canal OMate-matico.com, acesse-o em <https://www.youtube.com/c/omatematicogrings>.

Uma lista de exercícios prontos sobre *derivadas duplas e triplas* é apresentado em [Grings \(2016\)](#).


1 Integrais duplas

Cálculo de integrais duplas.

1.1 Invertendo os limites de integração - Aula 1

1. Exercício

Figura 1 – Integrais duplas - Aula 1 - Exercício I e II



$$f(x) = x^2; g(x) = x^3$$

$$x = 0 \Rightarrow f(0) = g(0) \Rightarrow 0^2 = 0^3$$

$$x = 1 \Rightarrow f(1) = g(1) \Rightarrow 1^2 = 1^3$$

$$\begin{aligned} a &= \int_0^1 dx \int_{g(x)}^{f(x)} dy = \int_0^1 dx \int_{x^3}^{x^2} dy = \int_0^1 dx [y]_{x^3}^{x^2} = \int_0^1 dx [x^2 - x^3] = \\ &= \int_0^1 x^2 dx - \int_0^1 x^3 dx = \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \right]_0^1 = \left[\frac{4x^3 - 3x^2}{12} \right]_0^1 = \frac{1}{12} [4x^3 - 3x^2]_0^1 = \\ &= \frac{1}{12} [x^2(4x - 3)]_0^1 = \frac{1}{12} [1^2(4 \cdot 1 - 3) - 0^2(4 \cdot 0 - 3)] = \frac{1}{12} = 0,08\bar{3} \end{aligned}$$

2. Exercício

$$f(x) = x^2 \Rightarrow f(y) = \sqrt{y}; g(x) = x^3 \Rightarrow g(y) = \sqrt[3]{y}$$

$$y = 0 \Rightarrow f(0) = g(0) \Rightarrow \sqrt{0} = \sqrt[3]{0}$$

$$y = 1 \Rightarrow f(1) = g(1) \Rightarrow \sqrt{1} = \sqrt[3]{1}$$


$$\begin{aligned}
a &= \int_0^1 dy \int_{f(y)}^{g(y)} dx = \int_0^1 dy \int_{\sqrt{y}}^{\sqrt[3]{y}} dx = \int_0^1 dy [x]_{\sqrt{y}}^{\sqrt[3]{y}} = \int_0^1 dy [\sqrt[3]{y} - \sqrt{y}] = \\
&\int_0^1 \sqrt[3]{y} dy - \int_0^1 \sqrt{y} dy = \int_0^1 y^{\frac{1}{3}} dy - \int_0^1 y^{\frac{1}{2}} dy = \left[\frac{y^{\frac{4}{3}}}{\left(\frac{4}{3}\right)} - \frac{y^{\frac{3}{2}}}{\left(\frac{3}{2}\right)} \right]_0^1 = \\
&\left[\frac{3\sqrt[3]{y^4}}{4} - \frac{2\sqrt{y^3}}{3} \right]_0^1 = \left[\frac{9\sqrt[3]{y^4} - 8\sqrt{y^3}}{12} \right]_0^1 = \frac{1}{12} [9\sqrt[3]{y^4} - 8\sqrt{y^3}]_0^1 = \\
&\frac{1}{12} [(9\sqrt[3]{1^4} - 8\sqrt{1^3}) - (9\sqrt[3]{0^4} - 8\sqrt{0^3})] = \frac{1}{12}(9 - 8) = \frac{1}{12} = 0,08\bar{3}
\end{aligned}$$

1.2 Determinação da região de integração - Aula 2

1. Exercício

$$R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 6\}$$

Figura 2 – Integrais duplas - Aula 2 - Exercício I




$$\begin{aligned}
a &= \int_0^2 dx \int_0^6 dy = \int_0^2 dx [y]_0^6 = \int_0^2 dx [6 - 0] = 6 \int_0^2 dx = 6[x]_0^2 = \\
&6[2 - 0] = 6 \cdot 2 = 12
\end{aligned}$$

2. Exercício

$$R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq 2x\}$$

$$\begin{aligned}
a &= \int_0^1 dx \int_x^{2x} dy = \int_0^1 dx [y]_x^{2x} = \int_0^1 dx [2x - x] = 2 \int_0^1 x dx - \int_0^1 x dx = \\
&\left[2 \frac{x^2}{2} - \frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \left[\frac{2x^2 - x^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{2} [x^2]_0^1 = \frac{1}{2} [1^2 - 0^2] = \frac{1}{2} = 0,5
\end{aligned}$$

Figura 3 – Integrais duplas - Aula 2 - Exercício II




3. Exercício

$$R = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq y \leq 1, 0 \leq x \leq \sqrt{1-y^2} \right\}$$

$$y = 0, y = 1$$

$$x = 0, x = \sqrt{1-y^2} \Rightarrow x^2 = 1-y^2 \Rightarrow x^2 - 1 = -y^2 \Rightarrow y^2 = -x^2 + 1 \Rightarrow y = \sqrt{1-x^2}$$

Figura 4 – Integrais duplas - Aula 2 - Exercício III



$$\begin{aligned} a &= \int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{1-y^2}} dx = \int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{1-y^2}} dx = \int_0^1 dy [x]_0^{\sqrt{1-y^2}} = \int_0^1 dy [\sqrt{1-y^2} - 0] = \\ &= \int_0^1 \sqrt{1-y^2} dy = \int_0^1 \sqrt{1-\sin^2(t)} \cos(t) dt = \int_0^1 \sqrt{\cos^2(t)} \cos(t) dt = \\ &= \int_0^1 \cos(t) \cos(t) dt = \int_0^1 \cos^2(t) dt = \int_0^1 \frac{1+\cos(2t)}{2} dt = \frac{1}{2} \int_0^1 [1+\cos(2t)] dt = \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 dt + \frac{1}{2} \int_0^1 \cos(2t) dt = \frac{1}{2} \int_0^1 dt + \frac{1}{2} \int_0^1 \cos(u) \frac{du}{2} = \frac{1}{2} \int_0^1 dt + \frac{1}{4} \int_0^1 \cos(u) du = \\ &= \left[\frac{1}{2}t + \frac{1}{4} \sin(u) \right]_0^1 = \left[\frac{t}{2} + \frac{\sin(2t)}{4} \right]_0^1 = \left[\frac{t}{2} + \frac{2 \sin(t) \cos(t)}{4} \right]_0^1 = \left[\frac{t + \sin(t) \cos(t)}{2} \right]_0^1 = \\ &= \frac{1}{2} \left[\arcsen(y) + y\sqrt{1-y^2} \right]_0^1 = \frac{1}{2} \left[(\arcsen(1) + 1 \cdot \sqrt{1-1^2}) - (\arcsen(0) + 0 \cdot \sqrt{1-0^2}) \right] = \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{\pi}{2} - 0 \right] = \frac{\pi}{4} = 0,785 \end{aligned}$$

$$y = \text{sen}(t) \Rightarrow dy = \cos(t)dt$$

$$u = 2t \Rightarrow \frac{du}{2} = dt$$

$$\text{sen}(t) = \frac{co}{h} = \frac{y}{1} = y$$

$$h^2 = co^2 + ca^2 \Rightarrow 1 = y^2 + ca^2 \Rightarrow ca = \sqrt{1 - y^2}$$

$$\cos(t) = \frac{ca}{h} = \frac{\sqrt{1 - y^2}}{1} = \sqrt{1 - y^2}$$


$$y = \text{sen}(t) \Rightarrow t = \arcsen(y)$$

4. Exercício

$$y = x^2 + 1, y = -x^2 - 1; x = 1, x = -1$$

$$R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid -1 \leq x \leq 1, -x^2 - 1 \leq y \leq x^2 + 1\}$$

Figura 5 – Integrais duplas - Aula 2 - Exercício IV




$$\begin{aligned} a &= \int_{-1}^1 dx \int_{f(x)}^{g(x)} dy = \int_{-1}^1 dx \int_{-x^2-1}^{x^2+1} dy = \int_{-1}^1 dx [y]_{-x^2-1}^{x^2+1} = \\ &= \int_{-1}^1 dx [x^2 + 1 - (-x^2 - 1)] = \int_{-1}^1 dx [x^2 + 1 + x^2 + 1] = \\ &= \int_{-1}^1 dx [2x^2 + 2] = 2 \int_{-1}^1 x^2 dx + 2 \int_{-1}^1 dx = \left[\frac{2x^3}{3} + 2x \right]_{-1}^1 = \left[2 \left(\frac{x^3 + 3x}{3} \right) \right]_{-1}^1 = \\ &= \frac{2}{3} [x(x^2 + 3)]_{-1}^1 = \frac{2}{3} [1 \cdot (1^2 + 3) - (-1) \cdot ((-1)^2 + 3)] = \frac{2}{3} (4 + 4) = \frac{2}{3} 8 = \frac{16}{3} = 5, \bar{3} \end{aligned}$$

5. Exercício

$$R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq y \leq 2, -y \leq x \leq y\}$$

Figura 6 – Integrais duplas - Aula 2 - Exercício V




$$\begin{aligned}
 a &= \int_0^2 dy \int_{f(y)}^{g(y)} dx = \int_0^2 dy \int_{-y}^y dx = \int_0^2 dy [x]_{-y}^y = \int_0^2 dy [y - (-y)] = \int_0^2 dy [2y] = \\
 &2 \int_0^2 y dy = \left[\frac{2y^2}{2} \right]_0^2 = 2^2 - 0^2 = 4
 \end{aligned}$$

1.3 Cálculo de volume - Aula 3

1. Exercício

Figura 7 – Integrais duplas - Aula 3 - Exercício I



$$z = 4; dz = dxdy$$


$$\begin{aligned}
 v &= \int_0^3 \int_0^2 z dz = \int_0^3 \int_0^2 4 dy dx = 4 \int_0^3 dx \int_0^2 dy = 4 \int_0^3 dx [y]_0^2 = 4 \int_0^3 dx [2 - 0] = \\
 &8 \int_0^3 dx = 8[x]_0^3 = 8[3 - 0] = 8 \cdot 3 = 24
 \end{aligned}$$

2. Exercício

$$R = [0, 3] \times [0, 4]$$

$$\iint_R (8 - 2y) da$$

Figura 8 – Integrais duplas - Aula 3 - Exercício II



$$z = 8 - 2y; da = dz = dx dy$$

$$\begin{aligned} v &= \int_0^3 \int_0^4 z dz = \int_0^3 \int_0^4 (8 - 2y) dx dy = \int_0^3 dx \int_0^4 (8 - 2y) dy = \\ &= \int_0^3 dx \left(8 \int_0^4 dy - 2 \int_0^4 y dy \right) = \int_0^3 dx 2 \left(4 \int_0^4 dy - \int_0^4 y dy \right) = \\ &= 2 \int_0^3 dx \left[4y - \frac{y^2}{2} \right]_0^4 = 2 \int_0^3 dx \left[\frac{8y - y^2}{2} \right]_0^4 = 2 \int_0^3 dx \frac{1}{2} [y(8 - y)]_0^4 = \\ &= \int_0^3 dx [4(8 - 4) - 0(8 - 0)] = 16 \int_0^3 dx = 16[x]_0^3 = 16[3 - 0] = 48 \end{aligned}$$

1.4 Invertendo a ordem de integração - Aula 4

1. Exercício


$$z = f(x, y) = y e^x; dz = dx dy$$

$$\begin{aligned} v &= \int_2^4 \int_1^9 z dz = \int_2^4 \int_1^9 y e^x dy dx = \int_2^4 e^x dx \int_1^9 y dy = \int_2^4 e^x dx \left[\frac{y^2}{2} \right]_1^9 = \\ &= \int_2^4 e^x dx \frac{1}{2} [y^2]_1^9 = \frac{1}{2} \int_2^4 e^x dx [9^2 - 1^2] = 40 \int_2^4 e^x dx = 40 [e^x]_2^4 = 40 [e^4 - e^2] = \\ &= 40e^2 (e^2 - 1) \end{aligned}$$

2. Exercício

$$z = f(x, y) = x^2 y^3; dz = dx dy$$

Figura 9 – Integrais duplas - Aula 4 - Exercício II



$$\begin{aligned}
 v &= \int_0^1 \int_2^4 z \, dz = \int_0^1 \int_2^4 x^2 y^3 \, dx dy = \int_0^1 x^2 \, dx \int_2^4 y^3 \, dy = \int_0^1 x^2 \, dx \left[\frac{y^4}{4} \right]_2^4 = \\
 &= \frac{1}{4} \int_0^1 x^2 \, dx [y^4]_2^4 = \frac{1}{4} \int_0^1 x^2 \, dx [4^4 - 2^4] = \frac{1}{4} \int_0^1 x^2 \, dx [2^8 - 2^4] = \\
 &= \frac{1}{4} \int_0^1 x^2 \, dx [2^4 (2^4 - 1)] = \frac{1}{4} \int_0^1 x^2 \, dx [16 \cdot 15] = 60 \int_0^1 x^2 \, dx = 60 \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 = 20 [x^3]_0^1 = \\
 &= 20 [1^3 - 0^3] = 20 \cdot 1 = 20
 \end{aligned}$$


3. Exercício

$$\iint_R (x + 2y) \, da$$

R = Região limitada pela parábola $y = x^2 + 1$ e as retas $x = -1$ e $x = 2$.

$$z = f(x, y) = x + 2y; \, da = dz = dx dy$$

Figura 10 – Integrais duplas - Aula 4 - Exercício III



$$\begin{aligned}
v &= \int_{-1}^2 \int_0^{x^2+1} z \, dz = \int_{-1}^2 \int_0^{x^2+1} (x+2y) \, dx \, dy = \\
&= \int_{-1}^2 dx \int_0^{x^2+1} (x+2y) \, dy = \int_{-1}^2 dx \left(x \int_0^{x^2+1} dy + 2 \int_0^{x^2+1} y \, dy \right) = \\
&= \int_{-1}^2 dx \left[xy + 2 \frac{y^2}{2} \right]_0^{x^2+1} = \int_{-1}^2 dx [y(x+y)]_0^{x^2+1} = \\
&= \int_{-1}^2 dx [(x^2+1)[x+(x^2+1)] - 0(x+0)] = \int_{-1}^2 dx [(x^2+1)(x^2+x+1)] = \\
&= \int_{-1}^2 dx (x^4 + x^3 + 2x^2 + x + 1) = \\
&= \int_{-1}^2 x^4 \, dx + \int_{-1}^2 x^3 \, dx + 2 \int_{-1}^2 x^2 \, dx + \int_{-1}^2 x \, dx + \int_{-1}^2 dx = \\
&= \left[\frac{x^5}{5} + \frac{x^4}{4} + 2 \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + x \right]_{-1}^2 = \left[\frac{12x^5 + 15x^4 + 40x^3 + 30x^2 + 60x}{60} \right]_{-1}^2 = \\
&= \frac{1}{60} [x(12x^4 + 15x^3 + 40x^2 + 30x + 60)]_{-1}^2 = \\
&= \frac{1}{60} [2(12 \cdot 2^4 + 15 \cdot 2^3 + 40 \cdot 2^2 + 30 \cdot 2 + 60) \\
&\quad - (-1)(12(-1)^4 + 15(-1)^3 + 40(-1)^2 + 30(-1) + 60)] = \\
&= \frac{1}{60} [2(192 + 120 + 160 + 60 + 60) + (12 - 15 + 40 - 30 + 60)] = \frac{1}{60} (1184 + 67) = \\
&= \frac{1251}{60} = \frac{417}{20} = 20,85
\end{aligned}$$

1.5 Cálculo de integrais duplas ou iteradas

1.5.1 Aula 5


1. Exercício

$$\begin{aligned}
f(x, y) &= x^3; \quad 0 \leq x \leq 2; \quad x^2 \leq y \leq 4 \\
\iint_R f(x, y) \, dy \, dx
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
v &= \int_0^2 \int_{x^2}^4 x^3 \, dx \, dy = \int_0^2 x^3 \, dx \int_{x^2}^4 dy = \int_0^2 x^3 \, dx [y]_{x^2}^4 = \int_0^2 x^3 \, dx [4 - x^2] = \\
&= 4 \int_0^2 x^3 \, dx - \int_0^2 x^5 \, dx = \left[4 \frac{x^4}{4} - \frac{x^6}{6} \right]_0^2 = \left[\frac{6x^4 - x^6}{6} \right]_0^2 = \frac{1}{6} [x^4(6 - x^2)]_0^2 = \\
&= \frac{1}{6} [2^4(6 - 2^2) - 0^4(6 - 0^2)] = \frac{1}{6} (16 \cdot 2) = \frac{32}{6} = \frac{16}{3} = 5,2
\end{aligned}$$

2. Exercício


Figura 11 – Integrais duplas - Aula 5 - Exercício I



$$f(x, y) = x^2 y; \quad 1 \leq x \leq 3; \quad x \leq y \leq 2x + 1$$

$$\iint_R f(x, y) dy dx$$

Figura 12 – Integrais duplas - Aula 5 - Exercício II



$$\begin{aligned} v &= \int_1^3 \int_x^{2x+1} x^2 y dx dy = \int_1^3 x^2 dx \int_x^{2x+1} y dy = \int_1^3 x^2 dx \left[\frac{y^2}{2} \right]_x^{2x+1} = \\ &= \int_1^3 x^2 dx \frac{1}{2} [(2x+1)^2 - (x)^2] = \frac{1}{2} \int_1^3 x^2 dx (3x^2 + 4x + 1) = \\ &= \frac{3}{2} \int_1^3 x^4 dx + 2 \int_1^3 x^3 dx + \frac{1}{2} \int_1^3 x^2 dx = \left[\frac{3}{2} \frac{x^5}{5} + 2 \frac{x^4}{4} + \frac{1}{2} \frac{x^3}{3} \right]_1^3 = \left[\frac{3x^5}{10} + \frac{x^4}{2} + \frac{x^3}{6} \right]_1^3 = \\ &= \left[\frac{18x^5 + 30x^4 + 10x^3}{60} \right]_1^3 = \left[\frac{2x^3 (9x^2 + 15x + 5)}{60} \right]_1^3 = \\ &= \frac{1}{30} [x^3 (9x^2 + 15x + 5)]_1^3 = \frac{1}{30} [3^3 (9 \cdot 3^2 + 15 \cdot 3 + 5) - 1^3 (9 \cdot 1^2 + 15 \cdot 1 + 5)] = \\ &= \frac{1}{30} [27(81 + 45 + 5) - (9 + 15 + 5)] = \frac{1}{30} [27 \cdot 131 - 29] = \frac{3508}{30} = 116,9\bar{3} \end{aligned}$$

1.5.2 Aula 6

1. Exercício

$$f(x, y) = 1; 0 \leq x \leq 1; 1 \leq y \leq e^x$$

$$\iint_R f(x, y) dy dx$$

$$\begin{aligned} v &= \int_0^1 \int_1^{e^x} dy dx = \int_0^1 dx [y]_1^{e^x} = \int_0^1 dx (e^x - 1) = [e^x - x]_0^1 = \\ &= e^1 - 1 - (e^0 - 0) = e - 1 - 1 = e - 2 \end{aligned}$$

2. Exercício

$$f(x, y) = x; 0 \leq x \leq 1; 1 \leq y \leq e^{x^2}$$

$$\iint_R f(x, y) dy dx$$

$$\begin{aligned} v &= \int_0^1 \int_1^{e^{x^2}} x dx dy = \int_0^1 x dx \int_1^{e^{x^2}} dy = \int_0^1 x dx [y]_1^{e^{x^2}} = \int_0^1 x dx (e^{x^2} - 1) = \\ &= \int_0^1 x e^{x^2} dx - \int_0^1 x dx = \int_0^1 e^u \frac{du}{2} - \int_0^1 x dx = \frac{1}{2} \int_0^1 e^u du - \int_0^1 x dx = \\ &= \left[\frac{1}{2} e^u - \frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \left[\frac{e^{x^2} - x^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{2} [e^{x^2} - x^2]_0^1 = \frac{1}{2} [e^{1^2} - 1^2 - (e^{0^2} - 0^2)] = \\ &= \frac{1}{2} (e - 1 - 1) = \frac{e - 2}{2} \end{aligned}$$

$$u = x^2; \frac{du}{2} = x dx$$

3. Exercício

$$f(x, y) = 2xy; 0 \leq y \leq 1; y^2 \leq x \leq y$$

$$\iint_R f(x, y) dx dy$$

$$\begin{aligned} v &= \int_0^1 \int_{y^2}^y 2xy dx dy = 2 \int_0^1 y dy \int_{y^2}^y x dx = 2 \int_0^1 y dy \left[\frac{x^2}{2} \right]_{y^2}^y = 2 \int_0^1 y dy \frac{1}{2} [x^2]_{y^2}^y = \\ &= \int_0^1 y dy (y^2 - y^4) = \int_0^1 (y^3 - y^5) dy = \left[\frac{y^4}{4} - \frac{y^6}{6} \right]_0^1 = \\ &= \left[\frac{6y^4 - 4y^6}{24} \right]_0^1 = \left[\frac{2y^4 (3 - 2y^2)}{24} \right]_0^1 = \frac{1}{12} [1^4 (3 - 2 \cdot 1^2) - 0^4 (3 - 2 \cdot 0^2)] = \frac{1}{12} = 0,08\bar{3} \end{aligned}$$

1.5.3 Aula 7

1. Exercício

$$f(x, y) = \frac{1}{x+y}; \quad 1 \leq y \leq e; \quad 0 \leq x \leq y$$

$$\iint_R f(x, y) dx dy$$


$$\begin{aligned} v &= \int_1^e \int_0^y \frac{1}{x+y} dx dy = \int_1^e dy \int_0^y (x+y)^{-1} dx = \int_1^e dy \int_0^y u^{-1} du = \\ &= \int_1^e dy \int_0^y [\ln |u|]_0^y = \int_1^e dy \int_0^y [\ln |x+y|]_0^y = \int_1^e dy \int_0^y (\ln |y+y| - \ln |0+y|) = \\ &= \int_1^e dy \int_0^y (\ln |2y| - \ln |y|) = \int_1^e dy \int_0^y (\ln |2| + \ln |y| - \ln |y|) = \ln |2| \int_1^e dy = \\ &= \ln |2| [y]_1^e = \ln |2|(e-1) \end{aligned}$$

$$u = x + y; \quad du = (1 + 0)dx = dx$$

1.6 Cálculo de área - Aula 8

1. Exercício

Figura 13 – Integrais duplas - Aula 8 - Exercício I



$$\begin{aligned}
a &= \int_{-1}^0 dx \int_0^{x^2+1} dy + \int_{-1}^0 dx \int_{-1}^0 dy + \int_0^{y^2} dx \int_{-1}^0 dy + \int_0^1 dx \int_{\sqrt{x}}^{x^2+1} dy = \\
&= \int_{-1}^0 dx \left(\int_0^{x^2+1} dy + \int_{-1}^0 dy \right) + \int_0^{y^2} dx \int_{-1}^0 dy + \int_0^1 dx \int_{\sqrt{x}}^{x^2+1} dy = \\
&= \int_{-1}^0 dx ([y]_0^{x^2+1} + [y]_{-1}^0) + \int_{-1}^0 dy [x]_0^{y^2} + \int_0^1 dx [y]_{\sqrt{x}}^{x^2+1} = \\
&= \int_{-1}^0 dx (x^2 + 1 + 1) + \int_{-1}^0 dy y^2 + \int_0^1 dx (x^2 + 1 - \sqrt{x}) = \\
&= \int_{-1}^0 (x^2 + 2) dx + \int_{-1}^0 y^2 dy + \int_0^1 (x^2 - x^{\frac{1}{2}} + 1) dx = \\
&= \left[\frac{x^3}{3} + 2x \right]_{-1}^0 + \left[\frac{y^3}{3} \right]_{-1}^0 + \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^{\frac{3}{2}}}{\left(\frac{3}{2}\right)} + x \right]_0^1 = \\
&= \left[\frac{x^3 + 6x}{3} \right]_{-1}^0 + \frac{1}{3} [y^3]_{-1}^0 + \left[\frac{x^3}{3} - \frac{2\sqrt{x^3}}{3} + x \right]_0^1 = \\
&= \frac{1}{3} [x(x^2 + 6)]_{-1}^0 + \frac{1}{3} [\theta^3 - (-1)^3] + \left[\frac{x^3 - 2\sqrt{x^3} + 3x}{3} \right]_0^1 = \\
&= \frac{1}{3} [0(0^2 + 6) - (-1)((-1)^2 + 6)] + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} [x^3 - 2\sqrt{x^3} + 3x]_0^1 = \\
&= \frac{7}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} [1^3 - 2\sqrt{1^3} + 3 \cdot 1 - (0^3 - 2\sqrt{0^3} + 3 \cdot 0)] = \frac{7}{3} + \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = \\
&= \frac{7 + 1 + 2}{3} = \frac{10}{3} = 3, \bar{3}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
a &= \int_{-1}^1 dx \int_1^{x^2+1} dy + \int_{-1}^{y^2} dx \int_{-1}^1 dy = \int_{-1}^1 dx [y]_1^{x^2+1} + \int_{-1}^1 dy [x]_{-1}^{y^2} = \\
&= \int_{-1}^1 dx (x^2 + 1 - 1) + \int_{-1}^1 dy (y^2 + 1) = \left[\frac{x^3}{3} \right]_{-1}^1 + \left[\frac{y^3}{3} + y \right]_{-1}^1 = \\
&= \frac{1}{3} [x^3]_{-1}^1 + \frac{1}{3} [y(y^2 + 3)]_{-1}^1 = \\
&= \frac{1}{3} ([1^3 - (-1)^3] + [1(1^2 + 3) - (-1)((-1)^2 + 3)]) = \frac{1}{3}(2 + 4 + 4) = \frac{10}{3} = 3, \bar{3}
\end{aligned}$$

1.7 Cálculo de volume


1.7.1 Aula 9

1. Exercício

Esboce a região de integração e o sólido cujo volume é dado pela integral abaixo:

$$\int_0^1 \int_0^1 (4 - x - 2y) \, dx \, dy$$

Figura 14 – Integrais duplas - Aula 9 - Exercício I



$$\begin{aligned} v &= \int_0^1 \int_0^1 (4 - x - 2y) \, dx dy = \int_0^1 dx \left(4 \int_0^1 dy - x \int_0^1 dy - 2 \int_0^1 y \, dy \right) = \\ &= 4 \int_0^1 dx \int_0^1 dy - \int_0^1 x \, dx \int_0^1 dy - 2 \int_0^1 dx \int_0^1 y \, dy = \\ &= 4[x]_0^1[y]_0^1 - \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1 [y]_0^1 - 2[x]_0^1 \left[\frac{y^2}{2} \right]_0^1 = 4 - \frac{1}{2} - 2 \frac{1}{2} = \frac{8 - 1 - 2}{2} = \frac{5}{2} = 2,5 \end{aligned}$$


1.7.2 Aula 10

1. Exercício

Calcule o volume do sólido limitado pelos planos:

$$x = 0, y = 0, z = 0 \text{ e } 6x + 2y + 3z = 6$$

Figura 15 – Integrais duplas - Aula 10 - Exercício I



$$P_1 = (0, 0, 0)$$

$$6x = -2y - 3z + 6 \Rightarrow x = \frac{-2y - 3z + 6}{6} = \frac{-2 \cdot 0 - 3 \cdot 0 + 6}{6} = \frac{6}{6} = 1 \Rightarrow P_2 = (1, 0, 0)$$

$$2y = -6x - 3z + 6 \Rightarrow y = \frac{-6x - 3z + 6}{2} = \frac{-6 \cdot 0 - 3 \cdot 0 + 6}{2} = \frac{6}{2} = 3 \Rightarrow P_3 = (0, 3, 0)$$

$$3z = -6x - 2y + 6 \Rightarrow z = \frac{-6x - 2y + 6}{3} = \frac{-6 \cdot 0 - 2 \cdot 0 + 6}{3} = \frac{6}{3} = 2 \Rightarrow P_4 = (0, 0, 2)$$

$$x = 0, x = 1$$

$$y = 0, y = \frac{-6x - 3z + 6}{2} = \frac{-6x - 3 \cdot 0 + 6}{2} = -3x + 3$$

$$z = \frac{-6x - 2y + 6}{3} = -2x - \frac{2y}{3} + 2$$

$$\begin{aligned} v &= \int_0^1 \int_0^{-3x+3} \left(-2x - \frac{2y}{3} + 2 \right) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^{-3x+3} \left(-2x - \frac{2y}{3} + 2 \right) dy = \\ &= \int_0^1 dx \left[-2xy - \frac{2}{3} \frac{y^2}{2} + 2y \right]_0^{-3x+3} = \int_0^1 dx \frac{1}{3} [-6xy - y^2 + 6y]_0^{-3x+3} = \\ &= \frac{1}{3} \int_0^1 dx [-y(6x + y - 6)]_0^{-3x+3} = \\ &= \frac{1}{3} \int_0^1 dx [-(-3x + 3)(6x + (-3x + 3) - 6) + 0(6x + 0 - 6)] = \\ &= \frac{1}{3} \int_0^1 dx [(3x - 3)(3x - 3)] = \frac{1}{3} \int_0^1 (9x^2 - 18x + 9) dx = \frac{1}{3} \left[9 \frac{x^3}{3} - 18 \frac{x^2}{2} + 9x \right]_0^1 = \\ &= \frac{1}{3} [3x^3 - 9x^2 + 9x]_0^1 = \frac{1}{3} [3x(x^2 - 3x + 3)]_0^1 = \\ &= \frac{1}{3} [1(1^2 - 3 \cdot 1 + 3) - 0(0^2 - 3 \cdot 0 + 3)] = 1 \end{aligned}$$


1.8 Coordenadas polares

1.8.1 Aula 1

1. Exercício

Calcule a área do círculo de raio igual a dois

Figura 16 – Coordenadas polares - Aula 01 - Exercício I



$$r = 2 \Rightarrow a = \pi r^2 = 2^2 \pi = 4\pi$$

$$x^2 + y^2 = r^2 \Rightarrow x^2 + y^2 = 2^2 \Rightarrow x^2 + y^2 = 4 \Rightarrow y = \pm \sqrt{4 - x^2}$$

$$R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid -2 \leq x \leq 2, -\sqrt{4 - x^2} \leq y \leq \sqrt{4 - x^2}\}$$

$$\begin{aligned}
a &= \int_{-2}^2 dx \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} dy = \int_{-2}^2 dx (\sqrt{4-x^2} + \sqrt{4-x^2}) = 2 \int_{-2}^2 \sqrt{4-x^2} dx = \\
&= 2 \int_{-2}^2 \sqrt{4 - (2 \operatorname{sen}(\alpha))^2} 2 \cos(\alpha) d\alpha = 4 \int_{-2}^2 \sqrt{4 - 4 \operatorname{sen}^2(\alpha)} \cos(\alpha) d\alpha = \\
&= 4 \int_{-2}^2 \sqrt{4 - 4(1 - \cos^2(\alpha))} \cos(\alpha) d\alpha = 4 \int_{-2}^2 \sqrt{4 - (4 - 4 \cos^2(\alpha))} \cos(\alpha) d\alpha = \\
&= 4 \int_{-2}^2 \sqrt{4 - 4 + 4 \cos^2(\alpha)} \cos(\alpha) d\alpha = 4 \int_{-2}^2 2 \cos(\alpha) \cos(\alpha) d\alpha = \\
&= 8 \int_{-2}^2 \cos^2(\alpha) d\alpha = 8 \int_{-2}^2 \left(\frac{1 + \cos(2\alpha)}{2} \right) d\alpha = 8 \int_{-2}^2 \left(\frac{1}{2} + \frac{\cos(2\alpha)}{2} \right) d\alpha = \\
&= 4 \int_{-2}^2 d\alpha + 4 \int_{-2}^2 \cos(2\alpha) d\alpha = 4 \int_{-2}^2 d\alpha + 4 \int_{-2}^2 \cos(u) \frac{du}{2} = \\
&= 4 \int_{-2}^2 d\alpha + 2 \int_{-2}^2 \cos(u) du = [4\alpha + 2 \operatorname{sen}(u)]_{-2}^2 = [4\alpha + 2 \operatorname{sen}(2\alpha)]_{-2}^2 = \\
&= [4\alpha + 4 \operatorname{sen}(\alpha) \cos(\alpha)]_{-2}^2 = [4(\alpha + \operatorname{sen}(\alpha) \cos(\alpha))]_{-2}^2 = \\
&= \left[4 \left(\operatorname{arcsen} \left(\frac{x}{2} \right) + \frac{x \sqrt{4-x^2}}{2} \right) \right]_{-2}^2 = \left[4 \left(\operatorname{arcsen} \left(\frac{x}{2} \right) + \frac{x \sqrt{4-x^2}}{4} \right) \right]_{-2}^2 = \\
&= 4 \left(\operatorname{arcsen} \left(\frac{2}{2} \right) + \frac{2\sqrt{4-2^2}}{4} \right) - 4 \left(\operatorname{arcsen} \left(\frac{(-2)}{2} \right) + \frac{(-2)\sqrt{4-(-2)^2}}{4} \right) = \\
&= 4 \operatorname{arcsen}(1) - 4 \operatorname{arcsen}(-1) = 4(\operatorname{arcsen}(1) - \operatorname{arcsen}(-1)) = 4 \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} \right) = 4 \left(\frac{2\pi}{2} \right) = 4\pi
\end{aligned}$$

$$x = 2 \operatorname{sen}(\alpha); \quad dx = 2 \cos(\alpha) d\alpha$$

$$u = 2\alpha; \quad \frac{du}{2} = d\alpha$$

$$\operatorname{sen}(\alpha) = \frac{co}{h} = \frac{x}{2} \Rightarrow \alpha = \operatorname{arcsen} \left(\frac{x}{2} \right)$$

$$h^2 = co^2 + ca^2 \Rightarrow 2^2 = x^2 + ca^2 \Rightarrow ca = \sqrt{4-x^2}$$

$$\cos(\alpha) = \frac{ca}{h} = \frac{\sqrt{4-x^2}}{2}$$

$$R = \{(r, \theta) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq r \leq 2, 0 \leq \theta \leq 2\pi\}$$

$$\begin{aligned}
a &= \int_{-2}^2 dx \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} dy = \int_0^2 \int_0^{2\pi} r dr d\theta = \int_0^2 r dr \int_0^{2\pi} d\theta = \left[\frac{r^2}{2} \right]_0^2 [\theta]_0^{2\pi} = \\
&= \frac{1}{2} [2^2 - 0^2] [2\pi - 0] = \frac{4}{2} 2\pi = 4\pi
\end{aligned}$$


2. Exercício

$$\iint_R \frac{da}{1+x^2+y^2}$$

$$R = \left\{ (r, \theta) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq r \leq 2, \frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{2} \right\}$$

Figura 17 – Coordenadas polares - Aula 01 - Exercício II

$$volume = \int_0^2 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{2}} \frac{r \, dr d\theta}{1+r^2}$$



$$\begin{aligned} v &= \iint_R \frac{da}{1+x^2+y^2} = \int_0^2 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{2}} \frac{r \, dr d\theta}{1+r^2} = \int_0^2 \frac{r \, dr}{1+r^2} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{2}} d\theta = \\ &= \int_0^2 (1+r^2)^{-1} r \, dr \left[\theta \right]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{2}} = \int_0^2 (1+r^2)^{-1} r \, dr \left(\frac{3\pi}{2} - \frac{\pi}{4} \right) = \\ &= \int_0^2 (1+r^2)^{-1} r \, dr \left(\frac{6\pi - \pi}{4} \right) = \frac{5\pi}{4} \int_0^2 (1+r^2)^{-1} r \, dr = \frac{5\pi}{4} \int_0^2 u^{-1} \frac{du}{2} = \\ &= \frac{5\pi}{8} \int_0^2 u^{-1} du = \frac{5\pi}{8} [ln|u|]_0^2 = \frac{5\pi}{8} [ln|1+r^2|]_0^2 = \frac{5\pi}{8} [ln|1+2^2| - ln|1+0^2|] = \\ &= \frac{5\pi}{8} [ln|5| - ln|1|] = \frac{5\pi ln|5|}{8} \end{aligned}$$

$$u = 1 + r^2 \Rightarrow \frac{du}{2} = r \, dr$$

$$e^x = 1 = e^0 \Rightarrow x = 0$$

1.8.2 Aula 2

1. Exercício

$$\iint_R e^{x^2+y^2} \, dx dy$$

R , região entre as curvas abaixo:

$$x^2 + y^2 = 4$$


$$x^2 + y^2 = 9$$

$$x^2 + y^2 = r^2 \Rightarrow e^{x^2+y^2} = e^{r^2}$$

$$da = dx dy = r \, dr d\theta$$

$$R = \{(r, \theta) \in \mathbb{R}^2 \mid 2 \leq r \leq 3, 0 \leq \theta \leq 2\pi\}$$

Figura 18 – Coordenadas polares - Aula 02 - Exercício I



$$\begin{aligned}
 v &= \iint_R e^{x^2+y^2} dx dy = \int_2^3 \int_0^{2\pi} e^{r^2} r dr d\theta = \int_2^3 e^{r^2} r dr \int_0^{2\pi} d\theta = \int_2^3 e^u \frac{du}{2} \int_0^{2\pi} d\theta = \\
 &= \frac{1}{2} \int_2^3 e^u du \int_0^{2\pi} d\theta = \frac{1}{2} [e^u]_2^3 [\theta]_0^{2\pi} = \frac{1}{2} [e^{r^2}]_2^3 2\pi = (e^9 - e^4) \pi = \pi (e^9 - e^4)
 \end{aligned}$$

$$u = r^2 \Rightarrow \frac{du}{2} = r dr$$


2. Exercício

$$\iint_R \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$$

R , região cujo o contorno é:

$$x^2 + y^2 = 4$$

Figura 19 – Coordenadas polares - Aula 02 - Exercício II



$$x^2 + y^2 = r^2 \Rightarrow \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{r^2} = r$$

$$da = dx dy = r dr d\theta$$

$$R = \{(r, \theta) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq r \leq 2, 0 \leq \theta \leq 2\pi\}$$

$$\begin{aligned}
 v &= \iint_R \sqrt{x^2 + y^2} dx dy = \int_0^2 \int_0^{2\pi} r^2 dr d\theta = \int_0^2 r^2 dr \int_0^{2\pi} d\theta = \\
 &= \left[\frac{r^3}{3} \right]_0^2 [\theta]_0^{2\pi} = \frac{2^3}{3} 2\pi = \frac{16\pi}{3}
 \end{aligned}$$

1.8.3 Aula 3


1. Exercício

Calcular o volume do sólido acima do plano xoy delimitado pela função abaixo.

xoy

$$z = 4 - 2x^2 - 2y^2$$

Figura 20 – Coordenadas polares - Aula 03 - Exercício I



$$4 - 2x^2 - 2y^2 = 0 \Rightarrow -2x^2 - 2y^2 = -4 \Rightarrow -2(x^2 + y^2) = -4 \Rightarrow$$

$$x^2 + y^2 = \frac{-4}{-2} = 2 \Rightarrow r = \sqrt{2}$$

$$R = \{(r, \theta) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq r \leq \sqrt{2}, 0 \leq \theta \leq 2\pi\}$$

$$z = 4 - 2x^2 - 2y^2 = 4 - 2(x^2 + y^2) = 4 - 2r^2$$

$$da = dxdy = r drd\theta$$

$$\begin{aligned} \iint_R z da &= \iint_R (4 - 2x^2 - 2y^2) dxdy = \int_0^{\sqrt{2}} \int_0^{2\pi} (4 - 2r^2) r dr d\theta = \\ &= \int_0^{\sqrt{2}} (4r - 2r^3) dr \int_0^{2\pi} d\theta = \int_0^{\sqrt{2}} (4r - 2r^3) dr [\theta]_0^{2\pi} = 2\pi \int_0^{\sqrt{2}} (4r - 2r^3) dr = \\ &= 8\pi \int_0^{\sqrt{2}} r dr - 4\pi \int_0^{\sqrt{2}} r^3 dr = \left[\frac{8\pi r^2}{2} - \frac{4\pi r^4}{4} \right]_0^{\sqrt{2}} = [4\pi r^2 - \pi r^4]_0^{\sqrt{2}} = [\pi r^2 (4 - r^2)]_0^{\sqrt{2}} = \\ &= \pi (\sqrt{2})^2 (4 - (\sqrt{2})^2) = 2\pi(4 - 2) = 4\pi \end{aligned}$$

2 Integrais triplas

Cálculo de integrais triplas.

2.1 Introdução - Aula 1

1. Exercício

Calcule a integral tripla abaixo.

$$\iiint_R 12xy^2z^3 dv$$

$$R = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid -1 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 3, 0 \leq z \leq 2\}$$

$$dv = dxdydz$$

$$\begin{aligned} \iiint_R 12xy^2z^3 dv &= \int_{-1}^2 \int_0^3 \int_0^2 12xy^2z^3 dxdydz = 12 \int_{-1}^2 x dx \int_0^3 y^2 dy \int_0^2 z^3 dz = \\ 12 \left[\frac{x^2}{2} \right]_{-1}^2 \left[\frac{y^3}{3} \right]_0^3 \left[\frac{z^4}{4} \right]_0^2 &= \frac{1}{2} [x^2]_{-1}^2 [y^3]_0^3 [z^4]_0^2 = \frac{1}{2} (2^2 - (-1)^2) 3^3 2^4 = \frac{1}{2} 3 \cdot 27 \cdot 16 = 648 \end{aligned}$$

2. Exercício

Observe a integral e preencha os retângulos abaixo.

$$\int_1^5 \int_2^4 \int_3^6 f(x, y, z) dxdzdy$$

$$[3] \leq x \leq [6]$$

$$[1] \leq y \leq [5]$$

$$[2] \leq z \leq [4]$$

3. Exercício

$$\begin{aligned}
\int_{-1}^1 \int_0^2 \int_0^1 (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz &= \int_{-1}^1 dz \int_0^2 dy \int_0^1 (x^2 + y^2 + z^2) dx = \\
&= \int_{-1}^1 dz \int_0^2 dy \left(\int_0^1 x^2 dx + y^2 \int_0^1 dx + z^2 \int_0^1 dx \right) = \\
&= \int_{-1}^1 dz \int_0^2 dy \int_0^1 x^2 dx + \int_{-1}^1 dz \int_0^2 y^2 dy \int_0^1 dx + \int_{-1}^1 z^2 dz \int_0^2 dy \int_0^1 dx = \\
&= [z]_{-1}^1 [y]_0^2 \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 + [z]_{-1}^1 \left[\frac{y^3}{3} \right]_0^2 [x]_0^1 + \left[\frac{z^3}{3} \right]_{-1}^1 [y]_0^2 [x]_0^1 = \\
&= [z]_{-1}^1 [y]_0^2 \frac{1}{3} [x^3]_0^1 + [z]_{-1}^1 \frac{1}{3} [y^3]_0^2 [x]_0^1 + \frac{1}{3} [z^3]_{-1}^1 [y]_0^2 [x]_0^1 = \\
&= \frac{1}{3} ([1+1]2 \cdot 1^3 + [1+1]2^3 \cdot 1 + [1^3 - (-1)^3] 2 \cdot 1) = \frac{1}{3} (4 + 16 + 4) = \frac{24}{3} = 8
\end{aligned}$$

4. Exercício

$$\begin{aligned}
\int_0^2 \int_{-1}^{y^2} \int_{-1}^z yz dx dz dy &= \int_0^2 \int_{-1}^{y^2} \left(yz \int_{-1}^z dx \right) dz dy = \int_0^2 \int_{-1}^{y^2} [yzx]_{-1}^z dz dy = \\
\int_0^2 \int_{-1}^{y^2} [yz^2 + yz] dz dy &= \int_0^2 \left(y \int_{-1}^{y^2} z^2 dz + y \int_{-1}^{y^2} z dz \right) dy = \int_0^2 \left[y \frac{z^3}{3} + y \frac{z^2}{2} \right]_{-1}^{y^2} dy = \\
&= \int_0^2 \left[\frac{2yz^3 + 3yz^2}{6} \right]_{-1}^{y^2} dy = \frac{1}{6} \int_0^2 [yz^2(2z+3)]_{-1}^{y^2} dy = \\
\frac{1}{6} \int_0^2 \left[y(y^2)^2(2y^2+3) - y(-1)^2(2(-1)+3) \right] dy &= \frac{1}{6} \int_0^2 [y^5(2y^2+3) - y] dy = \\
\frac{1}{6} \int_0^2 (2y^7 + 3y^5 - y) dy &= \frac{1}{6} \left[\frac{2y^8}{8} + \frac{3y^6}{6} - \frac{y^2}{2} \right]_0^2 = \frac{1}{6} \left[\frac{y^8}{4} + \frac{y^6}{2} - \frac{y^2}{2} \right]_0^2 = \\
\frac{1}{6} \left[\frac{y^8 + 2y^6 - 2y^2}{4} \right]_0^2 &= \frac{1}{24} [y^2(y^6 + 2y^4 - 2)]_0^2 = \frac{1}{24} [2^2(2^6 + 2 \cdot 2^4 - 2)] = \\
&= \frac{1}{24} [4(64 + 32 - 2)] = \frac{94}{6} = \frac{47}{3}
\end{aligned}$$

2.2 Cálculo de integrais triplas - Aula 2

1. Exercício

$$\iiint_R xy \operatorname{sen}(yz) dv$$

$$R = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq \frac{\pi}{6} \right\}$$

$$\begin{aligned}
\iiint_R xy \operatorname{sen}(yz) \, dv &= \int_0^\pi \int_0^1 \int_0^{\frac{\pi}{6}} xy \operatorname{sen}(yz) \, dz dy dx = \\
&= \int_0^\pi \int_0^1 \left(x \int_0^{\frac{\pi}{6}} \operatorname{sen}(yz) y \, dz \right) dy dx = \int_0^\pi \int_0^1 \left(x \int_0^{\frac{\pi}{6}} \operatorname{sen}(u) \, du \right) dy dx = \\
&= \int_0^\pi \int_0^1 [-x \cos(u)]_0^{\frac{\pi}{6}} dy dx = \int_0^\pi \int_0^1 [-x \cos(yz)]_0^{\frac{\pi}{6}} dy dx = \\
&= \int_0^\pi \int_0^1 \left(-x \cos\left(\frac{y\pi}{6}\right) + x \cos(0) \right) dy dx = \int_0^\pi \int_0^1 \left(-x \cos\left(\frac{y\pi}{6}\right) + x \right) dy dx = \\
&= \int_0^\pi \left(-x \int_0^1 \cos\left(\frac{y\pi}{6}\right) dy + x \int_0^1 dy \right) dx = \int_0^\pi \left(-x \int_0^1 \cos(v) \frac{6 \, dv}{\pi} + x \int_0^1 dy \right) dx = \\
&= \int_0^\pi \left(\frac{-6x}{\pi} \int_0^1 \cos(v) \, dv + x \int_0^1 dy \right) dx = \int_0^\pi \left[\frac{-6x \operatorname{sen}(v)}{\pi} + xy \right]_0^1 dx = \\
&= \int_0^\pi \left[\frac{-6x \operatorname{sen}\left(\frac{y\pi}{6}\right) + xy\pi}{\pi} \right]_0^1 dx = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \left[-x \left(6 \operatorname{sen}\left(\frac{y\pi}{6}\right) - y\pi \right) \right]_0^1 dx = \\
&= \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \left[-x \left(6 \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{6}\right) - \pi \right) + x(6 \operatorname{sen}(0) - 0) \right] dx = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \left(-6x \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{6}\right) + x\pi \right) dx = \\
&= \frac{-6 \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{6}\right)}{\pi} \int_0^\pi x \, dx + \pi \int_0^\pi x \, dx = \left[\frac{-6 \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{6}\right)}{\pi} \frac{x^2}{2} + \frac{\pi x^2}{2} \right]_0^\pi = \\
&= \left[\frac{-3x^2 \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{6}\right)}{\pi} + \frac{\pi x^2}{2} \right]_0^\pi = \left[\frac{-6x^2 \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{6}\right) + \pi^2 x^2}{2\pi} \right]_0^\pi = \frac{1}{2\pi} \left[-x^2 \left(6 \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{6}\right) - \pi^2 \right) \right]_0^\pi = \\
&= \frac{1}{2\pi} \left[-\pi^2 \left(6 \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{6}\right) - \pi^2 \right) \right] = \frac{-\pi \left(6 \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{6}\right) - \pi^2 \right)}{2} = \frac{-\pi \left(6 \frac{1}{2} - \pi^2 \right)}{2} = \\
&= \frac{-\pi (3 - \pi^2)}{2} = \frac{\pi^3 - 3\pi}{2}
\end{aligned}$$

$$u = yz \Rightarrow du = y \, dz$$

$$v = \frac{y\pi}{6} \Rightarrow \frac{6 \, dv}{\pi} = dy$$

$$\begin{aligned}
\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-y^2}} \int_0^y z \, dx \, dz \, dy &= \int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-y^2}} \left(z \int_0^y dx \right) dz \, dy = \int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-y^2}} [zx]_0^y dz \, dy = \\
&= \int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-y^2}} (zy) \, dz \, dy = \int_0^1 \left(y \int_0^{\sqrt{1-y^2}} z \, dz \right) dy = \int_0^1 \left[\frac{yz^2}{2} \right]_0^{\sqrt{1-y^2}} dy = \\
&= \int_0^1 \left(\frac{y(\sqrt{1-y^2})^2}{2} \right) dy = \int_0^1 \frac{y-y^3}{2} dy = \frac{1}{2} \int_0^1 (y-y^3) dy = \frac{1}{2} \left[\frac{y^2}{2} - \frac{y^4}{4} \right]_0^1 = \\
&= \frac{1}{2} \left[\frac{2y^2 - y^4}{4} \right]_0^1 = \frac{1}{8} [y^2(2-y^2)]_0^1 = \frac{1}{8} [1^2(2-1^2)] = \frac{1}{8}
\end{aligned}$$

3. Exercício

$$\begin{aligned}
\int_0^3 \int_0^{\sqrt{9-z^2}} \int_0^x xy \, dy \, dx \, dz &= \int_0^3 \int_0^{\sqrt{9-z^2}} \left(x \int_0^x y \, dy \right) dx \, dz = \\
&= \int_0^3 \int_0^{\sqrt{9-z^2}} \left[\frac{xy^2}{2} \right]_0^x dx \, dz = \frac{1}{2} \int_0^3 \int_0^{\sqrt{9-z^2}} x^3 \, dx \, dz = \\
&= \frac{1}{2} \int_0^3 \left[\frac{x^4}{4} \right]_0^{\sqrt{9-z^2}} dz = \frac{1}{2} \int_0^3 \left[\frac{(\sqrt{9-z^2})^4}{4} \right] dz = \frac{1}{8} \int_0^3 [(9-z^2)^2] dz = \\
&= \frac{1}{8} \int_0^3 (81 - 18z^2 + z^4) dz = \frac{1}{8} \left[81z - \frac{18z^3}{3} + \frac{z^5}{5} \right]_0^3 = \frac{1}{8} \left[\frac{1215z - 90z^3 + 3z^5}{15} \right]_0^3 = \\
&= \frac{1}{120} [3z(405 - 30z^2 + z^4)]_0^3 = \frac{1}{40} [z(405 - 30z^2 + z^4)]_0^3 = \frac{1}{40} [3(405 - 30 \cdot 3^2 + 3^4)] = \\
&= \frac{1}{40} [3(405 - 270 + 81)] = \frac{648}{40} = \frac{81}{5}
\end{aligned}$$

2.3 Cálculo do volume de um sólido - Aula 3

1. Exercício

Use integral tripla para encontrar o volume do sólido no primeiro octante limitado pelos planos coordenados e pelo plano dado pela equação abaixo.


$$3x + 6y + 4z = 12$$

$$P_0(0, 0, 0)$$

$$x = 0, y = 0; 4z = 12 \Rightarrow z = \frac{12}{4} = 3; P_1(0, 0, 3)$$

$$x = 0, z = 0; 6y = 12 \Rightarrow y = \frac{12}{6} = 2; P_2(0, 2, 0)$$

Figura 21 – Integrais triplas - Aula 03 - Exercício I



$$y = 0, z = 0; 3x = 12 \Rightarrow x = \frac{12}{3} = 4; P_3(4, 0, 0)$$

$$0 \leq x \leq 4$$

$$3x + 6y = 12 \Rightarrow x + 2y = 4 \Rightarrow y = \frac{4-x}{2} = 2 - \frac{x}{2}; 0 \leq y \leq \left(2 - \frac{x}{2}\right)$$

$$3x + 6y + 4z = 12 \Rightarrow z = \frac{12 - 3x - 6y}{4} = 3 - \frac{3x}{4} - \frac{3y}{2}; 0 \leq z \leq \left(3 - \frac{3x}{4} - \frac{3y}{2}\right)$$

$$\begin{aligned}
& \int_0^4 dx \int_0^{2-\frac{x}{2}} dy \int_0^{3-\frac{3x}{4}-\frac{3y}{2}} dz = \int_0^4 dx \int_0^{2-\frac{x}{2}} dy [z]_0^{3-\frac{3x}{4}-\frac{3y}{2}} = \\
& \int_0^4 dx \int_0^{2-\frac{x}{2}} \left(3 - \frac{3x}{4} - \frac{3y}{2}\right) dy = \int_0^4 dx \left[3y - \frac{3xy}{4} - \frac{3y^2}{4}\right]_0^{2-\frac{x}{2}} = \\
& \int_0^4 \left(3\left(2 - \frac{x}{2}\right) - \frac{3x\left(2 - \frac{x}{2}\right)}{4} - \frac{3\left(2 - \frac{x}{2}\right)^2}{4}\right) dx = \\
& \int_0^4 \left(6 - \frac{3x}{2} - \frac{\left(6x - \frac{3x^2}{2}\right)}{4} - \frac{3\left(4 - 2x + \frac{x^2}{4}\right)}{4}\right) dx = \\
& \int_0^4 \left(6 - \frac{3x}{2} - \frac{\left(\frac{12x - 3x^2}{2}\right)}{4} - \frac{\left(12 - 6x + \frac{3x^2}{4}\right)}{4}\right) dx = \\
& \int_0^4 \left(6 - \frac{3x}{2} - \left(\frac{12x - 3x^2}{8}\right) - \frac{\left(\frac{48 - 24x + 3x^2}{4}\right)}{4}\right) dx = \\
& \int_0^4 \left(6 - \frac{3x}{2} - \left(\frac{3x}{2} - \frac{3x^2}{8}\right) - \left(\frac{48 - 24x + 3x^2}{16}\right)\right) dx = \\
& \int_0^4 \left(6 - \frac{3x}{2} - \frac{3x}{2} + \frac{3x^2}{8} - 3 + \frac{3x}{2} - \frac{3x^2}{16}\right) dx = \int_0^4 \left(3 - \frac{3x}{2} + \frac{3x^2}{16}\right) dx = \\
& \left[3x - \frac{3x^2}{4} + \frac{3x^3}{48}\right]_0^4 = 3 \cdot 4 - \frac{3 \cdot 4^2}{4} + \frac{3 \cdot 4^3}{48} = 12 - 12 + 4 = 4
\end{aligned}$$


2.4 Esboço de um sólido - Aula 4

1. Exercício

Faça o esboço do sólido cujo volume é dado pela integral abaixo.

$$v = \int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \int_0^{y+1} dz dy dx = \int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_0^{y+1} dz$$

Figura 22 – Integrais triplas - Aula 04 - Exercício I



$$\begin{aligned}
 v &= \int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_0^{y+1} dz = \int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} dy [z]_0^{y+1} = \int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} (y+1) dy = \\
 &= \int_{-1}^1 dx \left[\frac{y^2}{2} + y \right]_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} = \\
 &= \int_{-1}^1 \left[\frac{(\sqrt{1-x^2})^2}{2} + \sqrt{1-x^2} - \left(\frac{(-\sqrt{1-x^2})^2}{2} - \sqrt{1-x^2} \right) \right] dx = \\
 &= \int_{-1}^1 \left(\frac{1-x^2}{2} + \sqrt{1-x^2} - \frac{1-x^2}{2} + \sqrt{1-x^2} \right) dx = \\
 &= \int_{-1}^1 \left(\frac{1}{2} - \frac{x^2}{2} + \sqrt{1-x^2} - \frac{1}{2} + \frac{x^2}{2} + \sqrt{1-x^2} \right) dx = \int_{-1}^1 (2\sqrt{1-x^2}) dx = \\
 &= 2 \int_{-1}^1 \sqrt{1-\sin^2(\theta)} \cos(\theta) d\theta = 2 \int_{-1}^1 \sqrt{1-(1-\cos^2(\theta))} \cos(\theta) d\theta = \\
 &= 2 \int_{-1}^1 \sqrt{\cos^2(\theta)} \cos(\theta) d\theta = 2 \int_{-1}^1 \cos^2(\theta) d\theta = 2 \int_{-1}^1 \left(\frac{1+\cos(2\theta)}{2} \right) d\theta = \\
 &= 2 \int_{-1}^1 \left(\frac{1}{2} + \frac{\cos(2\theta)}{2} \right) d\theta = \int_{-1}^1 d\theta + \int_{-1}^1 \cos(2\theta) d\theta = \int_{-1}^1 d\theta + \int_{-1}^1 \cos(u) \frac{du}{2} = \\
 &= \int_{-1}^1 d\theta + \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \cos(u) du = \left[\theta + \frac{\sin(u)}{2} \right]_{-1}^1 = \left[\theta + \frac{\sin(2\theta)}{2} \right]_{-1}^1 = \\
 &= \left[\theta + \frac{2\sin(\theta)\cos(\theta)}{2} \right]_{-1}^1 = [\theta + \sin(\theta)\cos(\theta)]_{-1}^1 = [\arcsen(x) + x\sqrt{1-x^2}]_{-1}^1 = \\
 &= [\arcsen(1) + 1\sqrt{1-1^2} - (\arcsen(-1) + (-1)\sqrt{1-(-1)^2})] = [\arcsen(1) - \arcsen(-1)] = \\
 &= \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi + \pi}{2} = \frac{2\pi}{2} = \pi
 \end{aligned}$$

$$x = \sin(\theta) \Rightarrow dx = \cos(\theta) d\theta$$

$$u = 2\theta \Rightarrow \frac{du}{2} = d\theta$$

$$\sin(\theta) = \frac{co}{h} = \frac{x}{1} = x; \theta = \arcsen(x)$$

$$1 = x^2 + ca \Rightarrow ca = \sqrt{1-x^2}$$


$$\cos(\theta) = \frac{ca}{h} = \frac{\sqrt{1-x^2}}{1} = \sqrt{1-x^2}$$

2. Exercício

Faça o esboço do sólido cujo volume é dado pela integral abaixo.

$$v = \int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} \int_0^2 dy dz dx = \int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dz \int_0^2 dy$$

Figura 23 – Integrais triplas - Aula 04 - Exercício II



$$\begin{aligned} v &= \int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dz [y]_0^2 = 2 \int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dz = 2 \int_0^1 dx [z]_0^{\sqrt{1-x^2}} = 2 \int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx = \\ &= 2 \int_0^1 \sqrt{1-\sin^2(\theta)} \cos(\theta) d\theta = 2 \int_0^1 \sqrt{1-(1-\cos^2(\theta))} \cos(\theta) d\theta = \\ &= 2 \int_0^1 \sqrt{\cos^2(\theta)} \cos(\theta) d\theta = 2 \int_0^1 \cos^2(\theta) d\theta = 2 \int_0^1 \left(\frac{1+\cos(2\theta)}{2} \right) d\theta = \\ &= 2 \int_0^1 \left(\frac{1}{2} + \frac{\cos(2\theta)}{2} \right) d\theta = \int_0^1 d\theta + \int_0^1 \cos(2\theta) d\theta = \int_0^1 d\theta + \int_0^1 \cos(u) \frac{du}{2} = \\ &= \int_0^1 d\theta + \frac{1}{2} \int_0^1 \cos(u) du = \left[\theta + \frac{\sin(u)}{2} \right]_0^1 = \left[\theta + \frac{\sin(2\theta)}{2} \right]_0^1 = \left[\theta + \frac{2\sin(\theta)\cos(\theta)}{2} \right]_0^1 = \\ &= [\theta + \sin(\theta)\cos(\theta)]_0^1 = [\arcsen(x) + x\sqrt{1-x^2}]_0^1 = \\ &= \arcsen(1) + 1\sqrt{1-1^2} - (\arcsen(0) + 0\sqrt{1-0^2}) = \arcsen(1) - \arcsen(0) = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

$$x = \sin(\theta) \Rightarrow dx = \cos(\theta) d\theta$$

$$u = 2\theta \Rightarrow \frac{du}{2} = d\theta$$

$$\sin(\theta) = \frac{co}{h} = \frac{x}{1} = x; \theta = \arcsen(x)$$

$$1 = x^2 + ca \Rightarrow ca = \sqrt{1-x^2}$$


$$\cos(\theta) = \frac{ca}{h} = \frac{\sqrt{1-x^2}}{1} = \sqrt{1-x^2}$$

3. Exercício

Faça o esboço do sólido cujo volume é dado pela integral abaixo.

$$v = \int_{-1}^0 \int_0^1 \int_0^{y^2} dz dx dy = \int_{-1}^0 dy \int_0^1 dx \int_0^{y^2} dz$$

Figura 24 – Integrais triplas - Aula 04 - Exercício III



$$v = \int_{-1}^0 dy \int_0^1 dx \int_0^{y^2} dz = \int_{-1}^0 dy \int_0^1 dx [z]_0^{y^2} = \int_{-1}^0 y^2 dy \int_0^1 dx = \int_{-1}^0 y^2 dy [x]_0^1 = \int_{-1}^0 y^2 dy = \left[\frac{y^3}{3} \right]_{-1}^0 = \frac{0^3}{3} - \frac{(-1)^3}{3} = \frac{1}{3}$$

2.5 Coordenadas esféricas

2.5.1 Aula 1

1. Exercício

Use coordenadas esféricas para calcular

$$\iiint_R (x^2 + y^2 + z^2) dv$$

, onde R é a bola unitária $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$.

$$x^2 + y^2 + z^2 = r^2$$

$$dv = dx dy dz = r^2 \sin(\varphi) dr d\varphi d\theta$$

$$0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \varphi \leq \pi$$

$$\begin{aligned} \iiint_R (x^2 + y^2 + z^2) dv &= \int_0^1 \int_0^{2\pi} \int_0^\pi r^4 \sin(\varphi) d\varphi d\theta dr = \\ &= \int_0^1 \int_0^{2\pi} \left(r^4 \int_0^\pi \sin(\varphi) d\varphi \right) d\theta dr = \int_0^1 \int_0^{2\pi} \left(r^4 [-\cos(\varphi)]_0^\pi \right) d\theta dr = \\ &= \int_0^1 \int_0^{2\pi} \left(r^4 [-\cos(\pi) + \cos(0)] \right) d\theta dr = \int_0^1 \int_0^{2\pi} 2r^4 d\theta dr = \int_0^1 \left(2r^4 \int_0^{2\pi} d\theta \right) dr = \\ &= \int_0^1 \left(2r^4 [\theta]_0^{2\pi} \right) dr = \int_0^1 4\pi r^4 dr = 4\pi \int_0^1 r^4 dr = 4\pi \left[\frac{r^5}{5} \right]_0^1 = \frac{4\pi}{5} \end{aligned}$$


2.5.2 Aula 2

1. Exercício

$$x^2 + y^2 + z^2 = 16$$

$$z = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Figura 25 – Coordenadas esféricas - Aula 02 - Exercício I



$$\begin{aligned} z = \sqrt{x^2 + y^2} &\Rightarrow r \cos(\varphi) = \sqrt{(r \sin(\varphi) \cos(\theta))^2 + (r \sin(\varphi) \sin(\theta))^2} = \\ &= \sqrt{r^2 \sin^2(\varphi) \cos^2(\theta) + r^2 \sin^2(\varphi) \sin^2(\theta)} = \sqrt{r^2 \sin^2(\varphi) (\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta))} = \\ &= r \sin(\varphi) \Rightarrow \frac{r \cos(\varphi)}{r \sin(\varphi)} = \frac{r \sin(\varphi)}{r \cos(\varphi)} \Rightarrow 1 = \operatorname{tg}(\varphi) \Rightarrow \varphi = \operatorname{arctg}(1) = \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

$$0 \leq r \leq 4, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}$$

$$\begin{aligned} v &= \int_0^4 \int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{4}} r^2 \sin(\varphi) d\varphi d\theta dr = \int_0^4 \int_0^{2\pi} \left(r^2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin(\varphi) d\varphi \right) d\theta dr = \\ &= \int_0^4 \int_0^{2\pi} \left(r^2 [-\cos(\varphi)]_0^{\frac{\pi}{4}} \right) d\theta dr = \int_0^4 \int_0^{2\pi} \left(r^2 \left[-\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + \cos(0) \right] \right) d\theta dr = \\ &= \int_0^4 \int_0^{2\pi} \left(r^2 \left[-\frac{\sqrt{2}}{2} + 1 \right] \right) d\theta dr = \int_0^4 \int_0^{2\pi} \frac{r^2 (2 - \sqrt{2})}{2} d\theta dr = \\ &= \int_0^4 \left(\frac{r^2 (2 - \sqrt{2})}{2} [\theta]_0^{2\pi} \right) dr = \int_0^4 \frac{r^2 (2 - \sqrt{2})}{2} 2\pi dr = \int_0^4 \pi (2 - \sqrt{2}) r^2 dr = \\ &= \pi (2 - \sqrt{2}) \left[\frac{r^3}{3} \right]_0^4 = \frac{64\pi (2 - \sqrt{2})}{3} \end{aligned}$$

2.5.3 Aula 3

1. Exercício

$$x^2 + y^2 + z^2 = r^2 = 4^2 = 16$$

$$0 \leq r \leq 4, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \varphi \leq \pi$$

$$\begin{aligned} v &= \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \int_0^4 r^2 \operatorname{sen}(\varphi) dr d\theta d\varphi = \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \left(\operatorname{sen}(\varphi) \left[\frac{r^3}{3} \right]_0^4 \right) d\theta d\varphi = \\ &= \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \left(\operatorname{sen}(\varphi) \frac{64}{3} \right) d\theta d\varphi = \frac{64}{3} \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \operatorname{sen}(\varphi) d\theta d\varphi = \frac{64}{3} \int_0^\pi \left(\operatorname{sen}(\varphi) [\theta]_0^{2\pi} \right) d\varphi = \\ &= \frac{64}{3} \int_0^\pi \operatorname{sen}(\varphi) 2\pi d\varphi = \frac{128\pi}{3} \int_0^\pi \operatorname{sen}(\varphi) d\varphi = \frac{128\pi}{3} [-\cos(\varphi)]_0^\pi = \\ &= \frac{128\pi}{3} (-\cos(\pi) + \cos(0)) = \frac{128\pi}{3} (1 + 1) = \frac{256\pi}{3} \end{aligned}$$

2.5.4 Aula 4

1. Exercício

$$\iiint_R e^{\sqrt{(x^2+y^2+z^2)^3}} dv$$

$$R = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = r^2 \Rightarrow e^{\sqrt{(x^2+y^2+z^2)^3}} = e^{\sqrt{(r^2)^3}} = e^{r^3}$$

$$dv = dx dy dz = r^2 \operatorname{sen}(\varphi) dr d\theta d\varphi$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = r^2 = 1^2 = 1$$

$$0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \varphi \leq \pi$$

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_0^{2\pi} \int_0^\pi e^{r^3} r^2 \operatorname{sen}(\varphi) d\varphi d\theta dr &= \int_0^1 e^{r^3} r^2 dr \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi \operatorname{sen}(\varphi) d\varphi = \\ \int_0^1 e^u \frac{du}{3} [\theta]_0^{2\pi} [-\cos(\varphi)]_0^\pi &= \frac{1}{3} [e^{r^3}]_0^1 2\pi (-\cos(\pi) + \cos(0)) = \frac{2\pi}{3} (e^{1^3} - e^{0^3}) (1 + 1) = \\ &= \frac{4\pi}{3} (e - 1) \end{aligned}$$

$$u = r^3 \Rightarrow \frac{du}{3} = r^2 dr$$

2.5.5 Cálculo de massa com coordenadas esféricas - Aula 5

1. Exercício retirado da página 899 de (ROGAWSKI, 2009)

Encontre a massa de uma esfera S de raio 4 centrada na origem com densidade de massa dado abaixo.

$$\mu = f(x, y, z) = x^2 + y^2$$

$$\begin{aligned}\mu &= \frac{m}{v} \Rightarrow m = \mu v \Rightarrow \int dm = \int \mu dv \Rightarrow \\ m &= \int \mu dv = \iiint_R \mu dv = \iiint_S (x^2 + y^2) dv\end{aligned}$$

$$S = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 16\}$$

$$\begin{aligned}x^2 + y^2 &= (r \operatorname{sen}(\varphi) \cos(\theta))^2 + (r \operatorname{sen}(\varphi) \operatorname{sen}(\theta))^2 = \\ r^2 \operatorname{sen}^2(\varphi) \cos^2(\theta) + r^2 \operatorname{sen}^2(\varphi) \operatorname{sen}^2(\theta) &= r^2 \operatorname{sen}^2(\varphi) (\cos^2(\theta) + \operatorname{sen}^2(\theta)) = \\ &= r^2 \operatorname{sen}^2(\varphi)\end{aligned}$$

$$dv = dx dy dz = r^2 \operatorname{sen}(\varphi) dr d\theta d\varphi$$

$$0 \leq r \leq 4, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \varphi \leq \pi$$

$$\begin{aligned}m &= \iiint_S (x^2 + y^2) dv = \int_0^4 \int_0^{2\pi} \int_0^\pi (r^2 \operatorname{sen}^2(\varphi)) r^2 \operatorname{sen}(\varphi) d\varphi d\theta dr = \\ &= \int_0^4 \int_0^{2\pi} \int_0^\pi r^4 \operatorname{sen}^3(\varphi) d\varphi d\theta dr = \int_0^4 r^4 dr \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi \operatorname{sen}^2 \operatorname{sen}(\varphi) d\varphi = \\ &= \left[\frac{r^5}{5} \right]_0^4 [\theta]_0^{2\pi} \int_0^\pi (1 - \cos^2(\varphi)) \operatorname{sen}(\varphi) d\varphi = \\ &= \frac{1024}{5} 2\pi \left(\int_0^\pi \operatorname{sen}(\varphi) d\varphi - \int_0^\pi \cos^2(\varphi) \operatorname{sen}(\varphi) d\varphi \right) = \\ &= \frac{2048\pi}{5} \left(\int_0^\pi \operatorname{sen}(\varphi) d\varphi + \int_0^\pi u^2 du \right) = \frac{2048\pi}{5} \left[-\cos(\varphi) + \frac{u^3}{3} \right]_0^\pi = \\ &= \frac{2048\pi}{5} \left[\frac{-3\cos(\varphi) + \cos^3(\varphi)}{3} \right]_0^\pi = \frac{2048\pi}{15} \left[-\cos(\varphi) (3 - \cos^2(\varphi)) \right]_0^\pi = \\ &= \frac{2048\pi}{15} \left[-\cos(\pi) (3 - \cos^2(\pi)) + \cos(0) (3 - \cos^2(0)) \right] = \frac{2048\pi}{15} [(3 - 1) + (3 - 1)] = \\ &= \frac{2048\pi}{15} (2 + 2) = \frac{8192\pi}{15}\end{aligned}$$

$$u = \cos(\varphi) \Rightarrow -du = \operatorname{sen}(\varphi) d\varphi$$

2.5.6 Aula 6


1. Exercício retirado da página 1023 de (STEWART, 2002)

Calcule a integral abaixo, onde E está contido entre as esferas dadas abaixo no 1º octante.

$$\iiint_E z \, dv$$

$$E = \{(x, y, z) \mid 1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4\}$$

Figura 26 – Coordenadas esféricas - Aula 06 - Exercício I



$$z = r \cos(\varphi)$$

$$dv = dx dy dz = r^2 \sin(\varphi) dr d\theta d\varphi$$

$$1 \leq r \leq 2, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$$

$$\begin{aligned} \iiint_E z \, dv &= \int_1^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (r \cos(\varphi)) r^2 \sin(\varphi) d\varphi d\theta dr = \\ &= \int_1^2 r^3 dr \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(\varphi) \cos(\varphi) d\varphi = \left[\frac{r^4}{4} \right]_1^2 [\theta]_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} u du = \left(\frac{16}{4} - \frac{1}{4} \right) \frac{\pi}{2} \left[\frac{u^2}{2} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \\ &= \frac{16 - 1}{4} \frac{\pi}{2} \left[\frac{\sin^2(\varphi)}{2} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{15\pi}{16} \left[\sin^2\left(\frac{\pi}{2}\right) - \sin^2(0) \right] = \frac{15\pi}{16} \\ u &= \sin(\varphi) \Rightarrow du = \cos(\varphi) d\varphi \end{aligned}$$

Referências

GRINGS, F. *Curso de Integrais Duplas e Triplas*. [S.l.], 2016. Disponível em: <https://www.youtube.com/playlist?list=PL82B9E5FF3F2B3BD3>. Citado na página 13.

ROGAWSKI, J. *Cálculo Vol.II*. [S.l.]: Bookman, 2009. Acesso em: 02 sep 2016. Citado na página 44.

STEWART, J. *Cálculo Vol.II*. 4. ed. [S.l.]: Pioneira Thomson Learning Ltda, 2002. Acesso em: 02 sep 2016. Citado na página 45.

Anexos

ANEXO A – Derivadas

A.1 Derivadas simples

Tabela 1 – Derivadas simples

$y = c$	$\Rightarrow y' = 0$
$y = x$	$\Rightarrow y' = 1$
$y = x^c$	$\Rightarrow y' = cx^{c-1}$
$y = e^x$	$\Rightarrow y' = e^x$
$y = \ln x $	$\Rightarrow y' = \frac{1}{x}$
$y = uv$	$\Rightarrow y' = u'v + uv'$
$y = \frac{u}{v}$	$\Rightarrow y' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$
$y = u^c$	$\Rightarrow y' = cu^{c-1}u'$
$y = e^u$	$\Rightarrow y' = e^u u'$
$y = c^u$	$\Rightarrow y' = c^u u' \ln c $
$y = \ln u $	$\Rightarrow y' = \frac{u'}{u}$
$y = \log_c u $	$\Rightarrow y' = \frac{u'}{u} \log_c e $

A.2 Derivadas trigonométricas

Tabela 2 – Derivadas trigonométricas

$y = \text{sen}(x)$	$\Rightarrow y' = \cos(x)$
$y = \cos(x)$	$\Rightarrow y' = -\text{sen}(x)$
$y = \text{tg}(x)$	$\Rightarrow y' = \sec^2(x)$
$y = \text{cotg}(x)$	$\Rightarrow y' = -\text{cossec}^2(x)$
$y = \sec(x)$	$\Rightarrow y' = \sec(x) \text{tg}(x)$
$y = \text{cossec}(x)$	$\Rightarrow y' = -\text{cossec}(x) \text{cotg}(x)$
$y = \arcsen(x)$	$\Rightarrow y' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$y = \arccos(x)$	$\Rightarrow y' = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$
$y = \arctg(x)$	$\Rightarrow y' = \frac{1}{1+x^2}$
$y = \text{arccotg}(x)$	$\Rightarrow y' = \frac{-1}{1+x^2}$
$y = \text{arcsec}(x)$	$\Rightarrow y' = \frac{1}{ x \sqrt{x^2-1}}$
$y = \text{arccossec}(x)$	$\Rightarrow y' = \frac{-1}{ x \sqrt{x^2-1}}$

ANEXO B – Integrais

B.1 Integrais simples

Tabela 3 – Integrais simples

$\int dx$	$=$	$x + c$
$\int x^p dx$	$=$	$\frac{x^{p+1}}{p+1} + c \rightarrow p \neq -1$
$\int e^x dx$	$=$	$e^x + c$
$\int \frac{dx}{x}$	$=$	$\ln x + c$
$\int u^p du$	$=$	$\frac{u^{p+1}}{p+1} + c \rightarrow p \neq -1$
$\int e^u du$	$=$	$e^u + c$
$\int \frac{du}{u}$	$=$	$\ln u + c$
$\int p^u du$	$=$	$\frac{p^u}{\ln p } + c$


B.2 Integrais trigonométricas

Tabela 4 – Integrais trigonométricas

$\int \operatorname{sen}(u) du$	$= -\cos(u) + c$
$\int \cos(u) du$	$= \operatorname{sen}(u) + c$
$\int \operatorname{tg}(u) du$	$= \ln \sec(u) + c$
$\int \operatorname{cotg}(u) du$	$= \ln \operatorname{sen}(u) + c$
$\int \sec(u) du$	$= \ln \sec(u) + \operatorname{tg}(u) + c$
$\int \operatorname{cossec}(u) du$	$= \ln \operatorname{cossec}(u) - \operatorname{cotg}(u) + c$
$\int \sec^2(u) du$	$= \operatorname{tg}(u) + c$
$\int \operatorname{cossec}^2(u) du$	$= -\operatorname{cotg}(u) + c$
$\int \sec(u) \operatorname{tg}(u) du$	$= \sec(u) + c$
$\int \operatorname{cossec}(u) \operatorname{cotg}(u) du$	$= -\operatorname{cossec}(u) + c$
$\int \frac{du}{\sqrt{1-x^2}}$	$= \operatorname{arcsen}(x) + c$
$-\int \frac{du}{\sqrt{1-x^2}}$	$= \operatorname{arccos}(x) + c$
$\int \frac{du}{1+x^2}$	$= \operatorname{arctg}(x) + c$
$-\int \frac{du}{1+x^2}$	$= \operatorname{arccotg}(x) + c$
$\int \frac{du}{ x \sqrt{x^2-1}}$	$= \operatorname{arcsec}(x) + c$
$-\int \frac{du}{ x \sqrt{x^2-1}}$	$= \operatorname{arccossec}(x) + c$

B.3 Relação entre coordenadas cartesianas e polares

Figura 27 – Coordenadas cartesianas e polares



$$r \in [0, \infty), \theta \in [0, 2\pi]$$

Tabela 5 – Transformação de coordenadas cartesianas em polares

$$\left| \begin{array}{lll} \theta & = & \arctg\left(\frac{y}{x}\right) \Rightarrow \frac{y}{x} = \operatorname{tg}(\theta) \\ \operatorname{sen}(\theta) & = & \frac{y}{r} \Rightarrow y = r \operatorname{sen}(\theta) \\ \operatorname{cos}(\theta) & = & \frac{x}{r} \Rightarrow x = r \operatorname{cos}(\theta) \end{array} \right|$$


Tabela 6 – Coordenadas polares a partir das suas correspondentes cartesianas

$$\left| \begin{array}{lll} x^2 + y^2 & = & r^2 \Rightarrow r = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \operatorname{sen}(\theta) & = & \frac{y}{r} \Rightarrow \theta = \arcsen\left(\frac{y}{r}\right) \\ \operatorname{cos}(\theta) & = & \frac{x}{r} \Rightarrow \theta = \arccos\left(\frac{x}{r}\right) \end{array} \right|$$

$$v = \iint_{R(x,y)} f(x, y) \, dx dy = \iint_{R(r,\theta)} f(r \operatorname{cos}(\theta), r \operatorname{sen}(\theta)) r \, dr d\theta$$

B.4 Relação entre coordenadas cartesianas e esféricas

Figura 28 – Coordenadas esféricas



$$r \in [0, \infty), \varphi \in [0, \pi], \theta \in [0, 2\pi]$$

Tabela 7 – Transformação de coordenadas cartesianas em esféricas

$$\left| \begin{array}{lll} \frac{x}{r} & = & \frac{x}{r} \Rightarrow x = r \operatorname{sen}(\varphi) \cos(\theta) \\ \frac{y}{r} & = & \frac{y}{r} \Rightarrow y = r \operatorname{sen}(\varphi) \operatorname{sen}(\theta) \\ \frac{z}{r} & = & \frac{z}{r} \Rightarrow z = r \cos(\varphi) \end{array} \right|$$

Tabela 8 – Coordenadas esféricas a partir das suas correspondentes cartesianas

$$\left| \begin{array}{lll} x^2 + y^2 + z^2 & = & r^2 \Rightarrow r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \\ \operatorname{tg}(\theta) & = & \frac{y}{x} \Rightarrow \theta = \operatorname{arctg}\left(\frac{y}{x}\right) \\ \operatorname{tg}(\varphi) & = & \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{z} \Rightarrow \varphi = \operatorname{arctg}\left(\frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{z}\right) \end{array} \right|$$

$$v = \iiint_{R(x,y,z)} f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz = \iiint_{R(r,\theta,\varphi)} f(r \operatorname{sen}(\varphi) \cos(\theta), r \operatorname{sen}(\varphi) \operatorname{sen}(\theta), r \cos(\varphi)) \, r^2 \operatorname{sen}(\varphi) \, dr \, d\varphi \, d\theta$$

ANEXO C – Funções trigonométricas

C.1 Determinação do seno, cosseno e tangente

Figura 29 – Determinação do seno, cosseno e tangente


θ = ângulo
 h = hipotenusa
 co = cateto oposto
 ca = cateto adjacente

$$h^2 = co^2 + ca^2$$

$$\text{sen } \theta = \frac{co}{h}$$

$$\text{cos } \theta = \frac{ca}{h}$$

$$\text{tg } \theta = \frac{co}{ca}$$




C.2 Círculo trigonométrico

Figura 30 – Círculo trigonométrico

$$\text{tg } \theta = \frac{\text{sen } \theta}{\text{cos } \theta} \quad \text{cotg } \theta = \frac{\text{cos } \theta}{\text{sen } \theta}$$

$$\text{sec } \theta = \frac{1}{\text{cos } \theta} \quad \text{cosec } \theta = \frac{1}{\text{sen } \theta}$$

$$\text{sen}^2 \theta + \text{cos}^2 \theta = 1 \quad \text{sec}^2 \theta - \text{tg}^2 \theta = 1 \quad \text{cosec}^2 \theta - \text{cotg}^2 \theta = 1$$



C.3 Identidades trigonométricas

Tabela 9 – Identidades trigonométricas

$\operatorname{tg}(x)$	$=$	$\frac{\operatorname{sen}(x)}{\cos(x)}$
$\operatorname{cotg}(x)$	$=$	$\frac{\cos(x)}{\operatorname{sen}(x)}$
$\sec(x)$	$=$	$\frac{1}{\cos(x)}$
$\operatorname{cosec}(x)$	$=$	$\frac{1}{\operatorname{sen}(x)}$
$\operatorname{sen}^2(x) + \cos^2(x)$	$=$	1
$\sec^2(x) - \operatorname{tg}^2(x)$	$=$	1
$\operatorname{cosec}^2(x) - \operatorname{cotg}^2(x)$	$=$	1
$\operatorname{sen}^2(x)$	$=$	$\frac{1 - \cos(2x)}{2}$
$\cos^2(x)$	$=$	$\frac{1 + \cos(2x)}{2}$
$\operatorname{sen}(2x)$	$=$	$2 \operatorname{sen}(x) \cos(x)$
$\cos(2x)$	$=$	$\cos^2(x) - \operatorname{sen}^2(x)$

C.4 Relação entre trigonométricas e inversas

Tabela 10 – Relação entre trigonométricas e inversas

$\operatorname{sen}(\theta)$	$=$	x	\Rightarrow	θ	$=$	$\operatorname{arcsen}(x)$
$\cos(\theta)$	$=$	x	\Rightarrow	θ	$=$	$\operatorname{arccos}(x)$
$\operatorname{tg}(\theta)$	$=$	x	\Rightarrow	θ	$=$	$\operatorname{arctg}(x)$
$\operatorname{cosec}(\theta)$	$=$	x	\Rightarrow	θ	$=$	$\operatorname{arccosec}(x)$
$\sec(\theta)$	$=$	x	\Rightarrow	θ	$=$	$\operatorname{arcsec}(x)$
$\operatorname{cotg}(\theta)$	$=$	x	\Rightarrow	θ	$=$	$\operatorname{arccotg}(x)$

C.5 Substituição trigonométrica

Tabela 11 – Substituição trigonométrica

$\sqrt{a^2 - x^2}$	\Rightarrow	x	$=$	$a \operatorname{sen}(\theta)$
$\sqrt{a^2 + x^2}$	\Rightarrow	x	$=$	$a \operatorname{tg}(\theta)$
$\sqrt{x^2 - a^2}$	\Rightarrow	x	$=$	$a \sec(\theta)$

C.6 Ângulos notáveis

Tabela 12 – Ângulos notáveis

ângulo	$0^\circ (0)$	$30^\circ \left(\frac{\pi}{6}\right)$	$45^\circ \left(\frac{\pi}{4}\right)$	$60^\circ \left(\frac{\pi}{3}\right)$	$90^\circ \left(\frac{\pi}{2}\right)$
sen	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
cos	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
tg	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	\nexists