

César Antônio de Magalhães

## **Curso de integrais duplas e triplas**

Brasil

2016



César Antônio de Magalhães

## **Curso de integrais duplas e triplas**

Exercícios de integrais duplas e triplas em  
conformidade com as normas ABNT.

Universidade Norte do Paraná – Unopar

Brasil

2016



# **Lista de ilustrações**

Figura 1 – Integrais duplas - Aula 1 - Exercício I e II . . . . .	15
Figura 2 – Integrais duplas - Aula 2 - Exercício I . . . . .	16
Figura 3 – Integrais duplas - Aula 2 - Exercício II . . . . .	17
Figura 4 – Integrais duplas - Aula 2 - Exercício III . . . . .	17
Figura 5 – Integrais duplas - Aula 2 - Exercício IV . . . . .	18
Figura 6 – Integrais duplas - Aula 2 - Exercício V . . . . .	19
Figura 7 – Integrais duplas - Aula 3 - Exercício I . . . . .	19
Figura 8 – Integrais duplas - Aula 3 - Exercício II . . . . .	20
Figura 9 – Integrais duplas - Aula 4 - Exercício II . . . . .	21
Figura 10 – Integrais duplas - Aula 4 - Exercício III . . . . .	21
Figura 11 – Integrais duplas - Aula 5 - Exercício I . . . . .	23
Figura 12 – Integrais duplas - Aula 5 - Exercício II . . . . .	23
Figura 13 – Integrais duplas - Aula 8 - Exercício I . . . . .	25
Figura 14 – Integrais duplas - Aula 9 - Exercício I . . . . .	27
Figura 15 – Integrais duplas - Aula 10 - Exercício I . . . . .	27
Figura 16 – Coordenadas polares - Aula 01 - Exercício I . . . . .	28
Figura 17 – Coordenadas polares - Aula 01 - Exercício II . . . . .	30
Figura 18 – Coordenadas polares - Aula 02 - Exercício I . . . . .	31
Figura 19 – Coordenadas polares - Aula 02 - Exercício II . . . . .	31
Figura 20 – Coordenadas polares - Aula 03 - Exercício I . . . . .	32
Figura 21 – Integrais triplas - Aula 03 - Exercício I . . . . .	37
Figura 22 – Integrais triplas - Aula 04 - Exercício I . . . . .	39
Figura 23 – Integrais triplas - Aula 04 - Exercício II . . . . .	40
Figura 24 – Integrais triplas - Aula 04 - Exercício III . . . . .	41
Figura 25 – Coordenadas esféricas - Aula 02 - Exercício I . . . . .	42
Figura 26 – Coordenadas esféricas - Aula 06 - Exercício I . . . . .	45
Figura 27 – Coordenadas esféricas - Aula 07 - Exercício I . . . . .	46
Figura 28 – Coordenadas cilíndricas - Aula 01 - Exercício I . . . . .	46
Figura 29 – Coordenadas cilíndricas - Aula 02 - Exercício I . . . . .	47
Figura 30 – Coordenadas cilíndricas - Aula 03 - Exercício I . . . . .	48
Figura 31 – Coordenadas cilíndricas - Aula 04 - Exercício I . . . . .	48
Figura 32 – Coordenadas cilíndricas - Aula 07 - Exercício I . . . . .	50
Figura 33 – Coordenadas cilíndricas - Aula 08 - Exercício I . . . . .	51
Figura 34 – Coordenadas polares . . . . .	61
Figura 35 – Coordenadas cilíndricas . . . . .	62
Figura 36 – Coordenadas esféricas . . . . .	63

Figura 37 – Determinação do seno, cosseno e tangente . . . . .	65
Figura 38 – Círculo trigonométrico . . . . .	65

# **Lista de tabelas**

Tabela 1 – Derivadas simples . . . . .	57
Tabela 2 – Derivadas trigonométricas . . . . .	57
Tabela 3 – Integrais simples . . . . .	59
Tabela 4 – Integrais trigonométricas . . . . .	60
Tabela 5 – Transformação de coordenadas cartesianas em polares . . . . .	61
Tabela 6 – Coordenadas polares a partir das suas correspondentes cartesianas . . .	61
Tabela 7 – Transformação de coordenadas cartesianas em cilíndricas . . . . .	62
Tabela 8 – Coordenadas cilíndricas a partir das suas correspondentes cartesianas .	62
Tabela 9 – Transformação de coordenadas cartesianas em esféricas . . . . .	63
Tabela 10 – Coordenadas esféricas a partir das suas correspondentes cartesianas .	63
Tabela 11 – Identidades trigonométricas . . . . .	66
Tabela 12 – Relação entre trigonométricas e inversas . . . . .	66
Tabela 13 – Substituição trigonométrica . . . . .	66
Tabela 14 – Ângulos notáveis . . . . .	67



# Lista de abreviaturas e siglas

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
$v$	Volume
$a$	Área
$R$	Região
$P$	Ponto
$r$	Raio
$co$	Cateto oposto
$ca$	Cateto adjacente
$h$	Hipotenusa
sen	Seno
cos	Cosseno
tg	Tangente
sec	Secante
cossec	Cossecante
cotg	Cotangente
arcsen	Arco seno
arccos	Arco cosseno
arctg	Arco tangente
arcsec	Arco secante
arccossec	Arco cossecante
arccotg	Arco cotangente
log	Logaritmo
ln	Logaritmo natural
e	Número de Euler
lim	Limite



# Listas de símbolos

$\int$	Integral
$\iint$	Integral dupla
$\iiint$	Integral tripla
$\pi$	Letra grega minúscula pi
$\alpha$	Ângulo alfa
$\theta$	Ângulo theta
$\in$	Pertence



# Sumário

<b>Introdução</b> . . . . .	<b>13</b>	
<b>1</b>	<b>INTEGRAIS DUPLAS</b> . . . . .	<b>15</b>
<i>Cálculo de integrais duplas.</i>		
1.1	<b>Invertendo os limites de integração - Aula 1</b> . . . . .	15
1.2	<b>Determinação da região de integração - Aula 2</b> . . . . .	16
1.3	<b>Cálculo de volume - Aula 3</b> . . . . .	19
1.4	<b>Invertendo a ordem de integração - Aula 4</b> . . . . .	20
1.5	<b>Cálculo de integrais duplas ou iteradas</b> . . . . .	22
1.5.1	Aula 5 . . . . .	22
1.5.2	Aula 6 . . . . .	23
1.5.3	Aula 7 . . . . .	24
1.6	<b>Cálculo de área - Aula 8</b> . . . . .	25
1.7	<b>Cálculo de volume</b> . . . . .	26
1.7.1	Aula 9 . . . . .	26
1.7.2	Aula 10 . . . . .	27
1.8	<b>Coordenadas polares</b> . . . . .	28
1.8.1	Aula 1 . . . . .	28
1.8.2	Aula 2 . . . . .	30
1.8.3	Aula 3 . . . . .	32
<b>2</b>	<b>INTEGRAIS TRIPLAS</b> . . . . .	<b>33</b>
<i>Cálculo de integrais triplas.</i>		
2.1	<b>Introdução - Aula 1</b> . . . . .	33
2.2	<b>Cálculo de integrais triplas - Aula 2</b> . . . . .	34
2.3	<b>Cálculo do volume de um sólido - Aula 3</b> . . . . .	36
2.4	<b>Esboço de um sólido - Aula 4</b> . . . . .	38
2.5	<b>Coordenadas esféricas</b> . . . . .	41
2.5.1	Aula 1 . . . . .	41
2.5.2	Aula 2 . . . . .	42
2.5.3	Aula 3 . . . . .	42
2.5.4	Aula 4 . . . . .	43
2.5.5	Aula 5 . . . . .	43
2.5.6	Aula 6 . . . . .	44
2.5.7	Aula 7 . . . . .	45
2.6	<b>Coordenadas cilíndricas</b> . . . . .	46

2.6.1	Aula 1 . . . . .	46
2.6.2	Aula 2 . . . . .	47
2.6.3	Aula 3 . . . . .	47
2.6.4	Aula 4 . . . . .	48
2.6.5	Aula 5 . . . . .	49
2.6.6	Aula 6 . . . . .	49
2.6.7	Aula 7 . . . . .	50
2.6.8	Aula 8 . . . . .	50
	<b>REFERÊNCIAS . . . . .</b>	<b>53</b>
	<b>ANEXOS</b>	<b>55</b>
	<b>ANEXO A – DERIVADAS . . . . .</b>	<b>57</b>
<b>A.1</b>	<b>Derivadas simples . . . . .</b>	<b>57</b>
<b>A.2</b>	<b>Derivadas trigonométricas . . . . .</b>	<b>57</b>
	<b>ANEXO B – INTEGRAIS . . . . .</b>	<b>59</b>
<b>B.1</b>	<b>Integrais simples . . . . .</b>	<b>59</b>
<b>B.2</b>	<b>Integrais trigonométricas . . . . .</b>	<b>60</b>
<b>B.3</b>	<b>Coordenadas polares . . . . .</b>	<b>61</b>
<b>B.4</b>	<b>Coordenadas cilíndricas . . . . .</b>	<b>62</b>
<b>B.5</b>	<b>Coordenadas esféricas . . . . .</b>	<b>63</b>
	<b>ANEXO C – FUNÇÕES TRIGONOMÉTRICAS . . . . .</b>	<b>65</b>
<b>C.1</b>	<b>Determinação do seno, cosseno e tangente . . . . .</b>	<b>65</b>
<b>C.2</b>	<b>Círculo trigonométrico . . . . .</b>	<b>65</b>
<b>C.3</b>	<b>Identidades trigonométricas . . . . .</b>	<b>66</b>
<b>C.4</b>	<b>Relação entre trigonométricas e inversas . . . . .</b>	<b>66</b>
<b>C.5</b>	<b>Substituição trigonométrica . . . . .</b>	<b>66</b>
<b>C.6</b>	<b>Ângulos notáveis . . . . .</b>	<b>67</b>

# Introdução

Esse documento contém exercícios retirados do Youtube através do canal OMAtematico.com, acesse-o em <<https://www.youtube.com/c/omatematicogrings>>.

Uma lista de exercícios prontos sobre *derivadas duplas e triplas* é apresentado em Grings (2016).




# 1 Integrais duplas

*Cálculo de integrais duplas.*

## 1.1 Invertendo os limites de integração - Aula 1

### 1. Exercício

Figura 1 – Integrais duplas - Aula 1 - Exercício I e II



$$f(x) = x^2; \quad g(x) = x^3$$

$$x = 0 \Rightarrow f(0) = g(0) \Rightarrow 0^2 = 0^3$$

$$x = 1 \Rightarrow f(1) = g(1) \Rightarrow 1^2 = 1^3$$

$$\begin{aligned} a &= \int_0^1 dx \int_{g(x)}^{f(x)} dy = \int_0^1 dx \int_{x^3}^{x^2} dy = \int_0^1 dx [y]_{x^3}^{x^2} = \int_0^1 dx [x^2 - x^3] = \\ &\int_0^1 x^2 dx - \int_0^1 x^3 dx = \left[ \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \right]_0^1 = \left[ \frac{4x^3 - 3x^2}{12} \right]_0^1 = \frac{1}{12} [4x^3 - 3x^2]_0^1 = \\ &\frac{1}{12} [x^2 (4x - 3)]_0^1 = \frac{1}{12} [1^2 (4 \cdot 1 - 3) - 0^2 (4 \cdot 0 - 3)] = \frac{1}{12} = 0,08\bar{3} \end{aligned}$$

### 2. Exercício

$$f(x) = x^2 \Rightarrow f(y) = \sqrt{y}; \quad g(x) = x^3 \Rightarrow g(y) = \sqrt[3]{y}$$

$$y = 0 \Rightarrow f(0) = g(0) \Rightarrow \sqrt{0} = \sqrt[3]{0}$$

$$y = 1 \Rightarrow f(1) = g(1) \Rightarrow \sqrt{1} = \sqrt[3]{1}$$


$$\begin{aligned}
a &= \int_0^1 dy \int_{f(y)}^{g(y)} dx = \int_0^1 dy \int_{\sqrt[3]{y}}^{\sqrt[3]{y}} dx = \int_0^1 dy [x]_{\sqrt[3]{y}}^{\sqrt[3]{y}} = \int_0^1 dy [\sqrt[3]{y} - \sqrt{y}] = \\
&\int_0^1 \sqrt[3]{y} dy - \int_0^1 \sqrt{y} dy = \int_0^1 y^{\frac{1}{3}} dy - \int_0^1 y^{\frac{1}{2}} dy = \left[ \frac{y^{\frac{4}{3}}}{\left(\frac{4}{3}\right)} - \frac{y^{\frac{3}{2}}}{\left(\frac{3}{2}\right)} \right]_0^1 = \\
&\left[ \frac{3\sqrt[3]{y^4}}{4} - \frac{2\sqrt{y^3}}{3} \right]_0^1 = \left[ \frac{9\sqrt[3]{y^4} - 8\sqrt{y^3}}{12} \right]_0^1 = \frac{1}{12} \left[ 9\sqrt[3]{y^4} - 8\sqrt{y^3} \right]_0^1 = \\
&\frac{1}{12} [(9\sqrt[3]{1^4} - 8\sqrt{1^3}) - (9\sqrt[3]{0^4} - 8\sqrt{0^3})] = \frac{1}{12}(9 - 8) = \frac{1}{12} = 0,08\bar{3}
\end{aligned}$$

## 1.2 Determinação da região de integração - Aula 2

### 1. Exercício

$$R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 6\}$$

Figura 2 – Integrais duplas - Aula 2 - Exercício I




$$\begin{aligned}
a &= \int_0^2 dx \int_0^6 dy = \int_0^2 dx [y]_0^6 = \int_0^2 dx [6 - 0] = 6 \int_0^2 dx = 6[x]_0^2 = \\
&6[2 - 0] = 6 \cdot 2 = 12
\end{aligned}$$

### 2. Exercício

$$R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq 2x\}$$

$$\begin{aligned}
a &= \int_0^1 dx \int_x^{2x} dy = \int_0^1 dx [y]_x^{2x} = \int_0^1 dx [2x - x] = 2 \int_0^1 x dx - \int_0^1 x dx = \\
&\left[ 2\frac{x^2}{2} - \frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \left[ \frac{2x^2 - x^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{2} [x^2]_0^1 = \frac{1}{2} [1^2 - 0^2] = \frac{1}{2} = 0,5
\end{aligned}$$

Figura 3 – Integrais duplas - Aula 2 - Exercício II




## 3. Exercício

$$R = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq y \leq 1, 0 \leq x \leq \sqrt{1 - y^2} \right\}$$

$$y = 0, y = 1$$

$$x = 0, x = \sqrt{1 - y^2} \Rightarrow x^2 = 1 - y^2 \Rightarrow x^2 - 1 = -y^2 \Rightarrow y^2 = -x^2 + 1 \Rightarrow y = \sqrt{1 - x^2}$$

Figura 4 – Integrais duplas - Aula 2 - Exercício III



$$a = \int_0^1 dy \int_0^{f(y)} dx = \int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{1-y^2}} dx = \int_0^1 dy [x]_0^{\sqrt{1-y^2}} = \int_0^1 dy [\sqrt{1-y^2} - 0] =$$

$$\int_0^1 \sqrt{1-y^2} dy = \int_0^1 \sqrt{1-\sin^2(t)} \cos(t) dt = \int_0^1 \sqrt{\cos^2(t)} \cos(t) dt =$$

$$\int_0^1 \cos(t) \cos(t) dt = \int_0^1 \cos^2(t) dt = \int_0^1 \frac{1+\cos(2t)}{2} dt = \frac{1}{2} \int_0^1 [1+\cos(2t)] dt =$$

$$\frac{1}{2} \int_0^1 dt + \frac{1}{2} \int_0^1 \cos(2t) dt = \frac{1}{2} \int_0^1 dt + \frac{1}{2} \int_0^1 \cos(u) \frac{du}{2} = \frac{1}{2} \int_0^1 dt + \frac{1}{4} \int_0^1 \cos(u) du =$$

$$\left[ \frac{1}{2}t + \frac{1}{4} \sin(u) \right]_0^1 = \left[ \frac{t}{2} + \frac{\sin(2t)}{4} \right]_0^1 = \left[ \frac{t}{2} + \frac{2\sin(t)\cos(t)}{4} \right]_0^1 = \left[ \frac{t + \sin(t)\cos(t)}{2} \right]_0^1 =$$

$$\frac{1}{2} \left[ \arcsen(y) + y\sqrt{1-y^2} \right]_0^1 = \frac{1}{2} \left[ (\arcsen(1) + 1 \cdot \sqrt{1-1^2}) - (\arcsen(0) + 0 \cdot \sqrt{1-0^2}) \right] =$$

$$\frac{1}{2} \left[ \frac{\pi}{2} - 0 \right] = \frac{\pi}{4} = 0,785$$

$$y = \sin(t) \Rightarrow dy = \cos(t) dt$$


$$\begin{aligned}
u &= 2t \Rightarrow \frac{du}{2} = dt \\
\sin(t) &= \frac{co}{h} = \frac{y}{1} = y \\
h^2 &= co^2 + ca^2 \Rightarrow 1 = y^2 + ca^2 \Rightarrow ca = \sqrt{1 - y^2} \\
\cos(t) &= \frac{ca}{h} = \frac{\sqrt{1 - y^2}}{1} = \sqrt{1 - y^2} \\
y &= \sin(t) \Rightarrow t = \arcsen(y)
\end{aligned}$$

## 4. Exercício

$$y = x^2 + 1, y = -x^2 - 1; x = 1, x = -1$$

$$R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid -1 \leq x \leq 1, -x^2 - 1 \leq y \leq x^2 + 1\}$$

Figura 5 – Integrais duplas - Aula 2 - Exercício IV




$$\begin{aligned}
a &= \int_{-1}^1 dx \int_{f(x)}^{g(x)} dy = \int_{-1}^1 dx \int_{-x^2 - 1}^{x^2 + 1} dy = \int_{-1}^1 dx [y]_{-x^2 - 1}^{x^2 + 1} = \\
&= \int_{-1}^1 dx [x^2 + 1 - (-x^2 - 1)] = \int_{-1}^1 dx [x^2 + 1 + x^2 + 1] = \\
&= \int_{-1}^1 dx [2x^2 + 2] = 2 \int_{-1}^1 x^2 dx + 2 \int_{-1}^1 dx = \left[ 2 \frac{x^3}{3} + 2x \right]_{-1}^1 = \left[ 2 \left( \frac{x^3 + 3x}{3} \right) \right]_{-1}^1 = \\
&= \frac{2}{3} [x(x^2 + 3)]_{-1}^1 = \frac{2}{3} [1 \cdot (1^2 + 3) - (-1)((-1)^2 + 3)] = \frac{2}{3}(4 + 4) = \frac{2}{3}8 = \frac{16}{3} = 5,\overline{3}
\end{aligned}$$

## 5. Exercício

$$R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq y \leq 2, -y \leq x \leq y\}$$

$$\begin{aligned}
a &= \int_0^2 dy \int_{f(y)}^{g(y)} dx = \int_0^2 dy \int_{-y}^y dx = \int_0^2 dy [x]_{-y}^y = \int_0^2 dy [y - (-y)] = \int_0^2 dy [2y] = \\
&= 2 \int_0^2 y dy = \left[ 2 \frac{y^2}{2} \right]_0^2 = 2^2 - 0^2 = 4
\end{aligned}$$


Figura 6 – Integrais duplas - Aula 2 - Exercício V



### 1.3 Cálculo de volume - Aula 3

#### 1. Exercício

Figura 7 – Integrais duplas - Aula 3 - Exercício I



$$z = 4; \ dz = dxdy$$

$$\begin{aligned} v &= \int_0^3 \int_0^2 z \, dz = \int_0^3 \int_0^2 4 \, dy \, dx = 4 \int_0^3 dx \int_0^2 dy = 4 \int_0^3 dx [y]_0^2 = 4 \int_0^3 dx [2 - 0] = \\ &8 \int_0^3 dx = 8[x]_0^3 = 8[3 - 0] = 8 \cdot 3 = 24 \end{aligned}$$


#### 2. Exercício

$$R = [0, 3] \times [0, 4]$$

$$\iint_R (8 - 2y) \, da$$

$$z = 8 - 2y; \ da = dz = dxdy$$

Figura 8 – Integrais duplas - Aula 3 - Exercício II



$$\begin{aligned}
 v &= \int_0^3 \int_0^4 z \, dz = \int_0^3 \int_0^4 (8 - 2y) \, dy \, dx = \int_0^3 dx \int_0^4 (8 - 2y) \, dy = \\
 &= \int_0^3 dx \left( 8 \int_0^4 dy - 2 \int_0^4 y \, dy \right) = \int_0^3 dx 2 \left( 4 \int_0^4 dy - \int_0^4 y \, dy \right) = \\
 &= 2 \int_0^3 dx \left[ 4y - \frac{y^2}{2} \right]_0^4 = 2 \int_0^3 dx \left[ \frac{8y - y^2}{2} \right]_0^4 = 2 \int_0^3 dx \frac{1}{2} [y(8 - y)]_0^4 = \\
 &= \int_0^3 dx [4(8 - 4) - 0(8 - 0)] = 16 \int_0^3 dx = 16[x]_0^3 = 16[3 - 0] = 48
 \end{aligned}$$

## 1.4 Invertendo a ordem de integração - Aula 4

### 1. Exercício

$$z = f(x, y) = y e^x; \, dz = dx dy$$


$$\begin{aligned}
 v &= \int_2^4 \int_1^9 z \, dz = \int_2^4 \int_1^9 y e^x \, dy \, dx = \int_2^4 e^x \, dx \int_1^9 y \, dy = \int_2^4 e^x \, dx \left[ \frac{y^2}{2} \right]_1^9 = \\
 &= \int_2^4 e^x \, dx \frac{1}{2} [y^2]_1^9 = \frac{1}{2} \int_2^4 e^x \, dx [9^2 - 1^2] = 40 \int_2^4 e^x \, dx = 40 [e^x]_2^4 = 40 [e^4 - e^2] = \\
 &\quad 40e^2 (e^2 - 1)
 \end{aligned}$$

### 2. Exercício

$$z = f(x, y) = x^2 y^3; \, dz = dx dy$$

$$\begin{aligned}
 v &= \int_0^1 \int_2^4 z \, dz = \int_0^1 \int_2^4 x^2 y^3 \, dy \, dx = \int_0^1 x^2 \, dx \int_2^4 y^3 \, dy = \int_0^1 x^2 \, dx \left[ \frac{y^4}{4} \right]_2^4 = \\
 &= \frac{1}{4} \int_0^1 x^2 \, dx [y^4]_2^4 = \frac{1}{4} \int_0^1 x^2 \, dx [4^4 - 2^4] = \frac{1}{4} \int_0^1 x^2 \, dx [2^8 - 2^4] = \\
 &= \frac{1}{4} \int_0^1 x^2 \, dx [2^4 (2^4 - 1)] = \frac{1}{4} \int_0^1 x^2 \, dx [16 \cdot 15] = 60 \int_0^1 x^2 \, dx = 60 \left[ \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = 20 [x^3]_0^1 = \\
 &\quad 20 [1^3 - 0^3] = 20 \cdot 1 = 20
 \end{aligned}$$

Figura 9 – Integrais duplas - Aula 4 - Exercício II




## 3. Exercício

$$\iint_R (x + 2y) \, da$$

$R$  = Região limitada pela parábola  $y = x^2 + 1$  e as retas  $x = -1$  e  $x = 2$ .

$$z = f(x, y) = x + 2y; \, da = dz = dxdy$$

Figura 10 – Integrais duplas - Aula 4 - Exercício III



$$\begin{aligned}
v &= \int_{-1}^2 \int_0^{x^2+1} z \, dz = \int_{-1}^2 \int_0^{x^2+1} (x + 2y) \, dy \, dx = \\
\int_{-1}^2 dx \int_0^{x^2+1} (x + 2y) \, dy &= \int_{-1}^2 dx \left( x \int_0^{x^2+1} dy + 2 \int_0^{x^2+1} y \, dy \right) = \\
\int_{-1}^2 dx \left[ xy + 2 \frac{y^2}{2} \right]_0^{x^2+1} &= \int_{-1}^2 dx [y(x + y)]_0^{x^2+1} = \\
\int_{-1}^2 dx \left[ (x^2 + 1) \left[ x + (x^2 + 1) \right] - 0(x + 0) \right] &= \int_{-1}^2 dx \left[ (x^2 + 1) (x^2 + x + 1) \right] = \\
\int_{-1}^2 dx (x^4 + x^3 + 2x^2 + x + 1) &= \\
\int_{-1}^2 x^4 \, dx + \int_{-1}^2 x^3 \, dx + 2 \int_{-1}^2 x^2 \, dx + \int_{-1}^2 x \, dx + \int_{-1}^2 dx &= \\
\left[ \frac{x^5}{5} + \frac{x^4}{4} + 2 \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + x \right]_{-1}^2 &= \left[ \frac{12x^5 + 15x^4 + 40x^3 + 30x^2 + 60x}{60} \right]_{-1}^2 = \\
\frac{1}{60} \left[ x (12x^4 + 15x^3 + 40x^2 + 30x + 60) \right]_{-1}^2 &= \\
\frac{1}{60} \left[ 2 (12 \cdot 2^4 + 15 \cdot 2^3 + 40 \cdot 2^2 + 30 \cdot 2 + 60) \right. & \\
\left. - (-1) (12(-1)^4 + 15(-1)^3 + 40(-1)^2 + 30(-1) + 60) \right] = & \\
\frac{1}{60} [2(192 + 120 + 160 + 60 + 60) + (12 - 15 + 40 - 30 + 60)] &= \frac{1}{60}(1184 + 67) = \\
\frac{1251}{60} &= \frac{417}{20} = 20,85
\end{aligned}$$

## 1.5 Cálculo de integrais duplas ou iteradas

### 1.5.1 Aula 5

#### 1. Exercício


$$f(x, y) = x^3; \quad 0 \leq x \leq 2; \quad x^2 \leq y \leq 4$$

$$\iint_R f(x, y) \, dy \, dx$$

$$\begin{aligned}
v &= \int_0^2 \int_{x^2}^4 x^3 \, dy \, dx = \int_0^2 x^3 \, dx \int_{x^2}^4 dy = \int_0^2 x^3 \, dx [y]_{x^2}^4 = \int_0^2 x^3 \, dx [4 - x^2] = \\
4 \int_0^2 x^3 \, dx - \int_0^2 x^5 \, dx &= \left[ 4 \frac{x^4}{4} - \frac{x^6}{6} \right]_0^2 = \left[ \frac{6x^4 - x^6}{6} \right]_0^2 = \frac{1}{6} [x^4 (6 - x^2)]_0^2 = \\
\frac{1}{6} [2^4 (6 - 2^2) - 0^4 (6 - 0^2)] &= \frac{1}{6} (16 \cdot 2) = \frac{32}{6} = \frac{16}{3} = 5,2
\end{aligned}$$

#### 2. Exercício


Figura 11 – Integrais duplas - Aula 5 - Exercício I



$$f(x, y) = x^2y; \quad 1 \leq x \leq 3; \quad x \leq y \leq 2x + 1$$

$$\iint_R f(x, y) dy dx$$

Figura 12 – Integrais duplas - Aula 5 - Exercício II



$$\begin{aligned}
 v &= \int_1^3 \int_x^{2x+1} x^2 y \, dy \, dx = \int_1^3 x^2 \, dx \int_x^{2x+1} y \, dy = \int_1^3 x^2 \, dx \left[ \frac{y^2}{2} \right]_x^{2x+1} = \\
 &= \int_1^3 x^2 \, dx \frac{1}{2} [(2x+1)^2 - (x)^2] = \frac{1}{2} \int_1^3 x^2 \, dx (3x^2 + 4x + 1) = \\
 &= \frac{3}{2} \int_1^3 x^4 \, dx + 2 \int_1^3 x^3 \, dx + \frac{1}{2} \int_1^3 x^2 \, dx = \left[ \frac{3}{2} \frac{x^5}{5} + 2 \frac{x^4}{4} + \frac{1}{2} \frac{x^3}{3} \right]_1^3 = \left[ \frac{3x^5}{10} + \frac{x^4}{2} + \frac{x^3}{6} \right]_1^3 = \\
 &= \left[ \frac{18x^5 + 30x^4 + 10x^3}{60} \right]_1^3 = \left[ \frac{2x^3(9x^2 + 15x + 5)}{60} \right]_1^3 = \\
 &= \frac{1}{30} [x^3 (9x^2 + 15x + 5)]_1^3 = \frac{1}{30} [3^3 (9 \cdot 3^2 + 15 \cdot 3 + 5) - 1^3 (9 \cdot 1^2 + 15 \cdot 1 + 5)] = \\
 &= \frac{1}{30} [27(81 + 45 + 5) - (9 + 15 + 5)] = \frac{1}{30} [27 \cdot 131 - 29] = \frac{3508}{30} = 116,9\overline{3}
 \end{aligned}$$

### 1.5.2 Aula 6

#### 1. Exercício

$$f(x, y) = 1; \quad 0 \leq x \leq 1; \quad 1 \leq y \leq e^x$$

$$\iint_R f(x, y) dy dx$$

$$v = \int_0^1 \int_1^{e^x} dy dx = \int_0^1 dx [y]_1^{e^x} = \int_0^1 dx (e^x - 1) = [e^x - x]_0^1 = e^1 - 1 - (e^0 - 0) = e - 1 - 1 = e - 2$$

2. Exercício

$$f(x, y) = x; \quad 0 \leq x \leq 1; \quad 1 \leq y \leq e^{x^2}$$

$$\iint_R f(x, y) dy dx$$

$$\begin{aligned} v &= \int_0^1 \int_1^{e^{x^2}} x dy dx = \int_0^1 x dx \int_1^{e^{x^2}} dy = \int_0^1 x dx [y]_1^{e^{x^2}} = \int_0^1 x dx (e^{x^2} - 1) = \\ &\int_0^1 x e^{x^2} dx - \int_0^1 x dx = \int_0^1 e^u \frac{du}{2} - \int_0^1 x dx = \frac{1}{2} \int_0^1 e^u du - \int_0^1 x dx = \\ &\left[ \frac{1}{2} e^u - \frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \left[ \frac{e^{x^2} - x^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{2} [e^{x^2} - x^2]_0^1 = \frac{1}{2} [e^{1^2} - 1^2 - (e^{0^2} - 0^2)] = \\ &\frac{1}{2}(e - 1 - 1) = \frac{e - 2}{2} \end{aligned}$$

$$u = x^2; \quad \frac{du}{2} = x dx$$

3. Exercício

$$f(x, y) = 2xy; \quad 0 \leq y \leq 1; \quad y^2 \leq x \leq y$$

$$\iint_R f(x, y) dx dy$$

$$\begin{aligned} v &= \int_0^1 \int_{y^2}^y 2xy dx dy = 2 \int_0^1 y dy \int_{y^2}^y x dx = 2 \int_0^1 y dy \left[ \frac{x^2}{2} \right]_{y^2}^y = 2 \int_0^1 y dy \frac{1}{2} [x^2]_{y^2}^y = \\ &\int_0^1 y dy (y^2 - y^4) = \int_0^1 (y^3 - y^5) dy = \left[ \frac{y^4}{4} - \frac{y^6}{6} \right]_0^1 = \\ &\left[ \frac{6y^4 - 4y^6}{24} \right]_0^1 = \left[ \frac{2y^4(3 - 2y^2)}{24} \right]_0^1 = \frac{1}{12} [1^4 (3 - 2 \cdot 1^2) - 0^4 (3 - 2 \cdot 0^2)] = \frac{1}{12} = 0,08\bar{3} \end{aligned}$$

### 1.5.3 Aula 7

1. Exercício

$$f(x, y) = \frac{1}{x+y}; \quad 1 \leq y \leq e; \quad 0 \leq x \leq y$$

$$\iint_R f(x, y) dx dy$$


$$\begin{aligned}
 v &= \int_1^e \int_0^y \frac{1}{x+y} dx dy = \int_1^e dy \int_0^y (x+y)^{-1} dx = \int_1^e dy \int_0^y u^{-1} du = \\
 &\int_1^e dy \int_0^y [\ln|u|]_0^y = \int_1^e dy \int_0^y [\ln|x+y|]_0^y = \int_1^e dy \int_0^y (\ln|y+y| - \ln|0+y|) = \\
 &\int_1^e dy \int_0^y (\ln|2y| - \ln|y|) = \int_1^e dy \int_0^y (\ln|2| + \ln|y| - \ln|y|) = \ln|2| \int_1^e dy = \\
 &\ln|2|[y]_1^e = \ln|2|(e-1)
 \end{aligned}$$

$$u = x + y; \quad du = (1 + 0)dx = dx$$

## 1.6 Cálculo de área - Aula 8

### 1. Exercício

Figura 13 – Integrais duplas - Aula 8 - Exercício I



$$\begin{aligned}
a &= \int_{-1}^0 dx \int_0^{x^2+1} dy + \int_{-1}^0 dx \int_{-1}^0 dy + \int_0^{y^2} dx \int_{-1}^0 dy + \int_0^1 dx \int_{\sqrt{x}}^{x^2+1} dy = \\
&= \int_{-1}^0 dx \left( \int_0^{x^2+1} dy + \int_{-1}^0 dy \right) + \int_0^{y^2} dx \int_{-1}^0 dy + \int_0^1 dx \int_{\sqrt{x}}^{x^2+1} dy = \\
&\quad \int_{-1}^0 dx \left( [y]_0^{x^2+1} + [y]_{-1}^0 \right) + \int_{-1}^0 dy [x]_0^{y^2} + \int_0^1 dx [y]_{\sqrt{x}}^{x^2+1} = \\
&\quad \int_{-1}^0 dx (x^2 + 1 + 1) + \int_{-1}^0 dy y^2 + \int_0^1 dx (x^2 + 1 - \sqrt{x}) = \\
&\quad \int_{-1}^0 (x^2 + 2) dx + \int_{-1}^0 y^2 dy + \int_0^1 (x^2 - x^{\frac{1}{2}} + 1) dx = \\
&\quad \left[ \frac{x^3}{3} + 2x \right]_{-1}^0 + \left[ \frac{y^3}{3} \right]_{-1}^0 + \left[ \frac{x^3}{3} - \frac{x^{\frac{3}{2}}}{\left(\frac{3}{2}\right)} + x \right]_0^1 = \\
&\quad \left[ \frac{x^3 + 6x}{3} \right]_{-1}^0 + \frac{1}{3} \left[ y^3 \right]_{-1}^0 + \left[ \frac{x^3}{3} - \frac{2\sqrt{x^3}}{3} + x \right]_0^1 = \\
&\quad \frac{1}{3} \left[ x(x^2 + 6) \right]_{-1}^0 + \frac{1}{3} \left[ 0^3 - (-1)^3 \right] + \left[ \frac{x^3 - 2\sqrt{x^3} + 3x}{3} \right]_0^1 = \\
&\quad \frac{1}{3} [0(0^2 + 6) - (-1)((-1)^2 + 6)] + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} [x^3 - 2\sqrt{x^3} + 3x]_0^1 = \\
&\quad \frac{7}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} [1^3 - 2\sqrt{1^3} + 3 \cdot 1 - (0^3 - 2\sqrt{0^3} + 3 \cdot 0)] = \frac{7}{3} + \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = \\
&\quad \frac{7 + 1 + 2}{3} = \frac{10}{3} = 3, \bar{3}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
a &= \int_{-1}^1 dx \int_1^{x^2+1} dy + \int_{-1}^{y^2} dx \int_{-1}^1 dy = \int_{-1}^1 dx [y]_1^{x^2+1} + \int_{-1}^1 dy [x]_{-1}^{y^2} = \\
&= \int_{-1}^1 dx (x^2 + 1 - 1) + \int_{-1}^1 dy (y^2 + 1) = \left[ \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^1 + \left[ \frac{y^3}{3} + y \right]_{-1}^1 = \\
&\quad \frac{1}{3} [x^3]_{-1}^1 + \frac{1}{3} [y(y^2 + 3)]_{-1}^1 = \\
&\quad \frac{1}{3} ([1^3 - (-1)^3] + [1(1^2 + 3) - (-1)((-1)^2 + 3)]) \frac{1}{3} (2 + 4 + 4) = \frac{10}{3} = 3, \bar{3}
\end{aligned}$$

## 1.7 Cálculo de volume


### 1.7.1 Aula 9

#### 1. Exercício

Esboce a região de integração e o sólido cujo volume é dado pela integral abaixo:

$$\int_0^1 \int_0^1 (4 - x - 2y) dx dy$$

Figura 14 – Integrais duplas - Aula 9 - Exercício I



$$\begin{aligned}
 v &= \int_0^1 \int_0^1 (4-x-2y) dy dx = \int_0^1 dx \left( 4 \int_0^1 dy - x \int_0^1 dy - 2 \int_0^1 y dy \right) = \\
 &\quad 4 \int_0^1 dx \int_0^1 dy - \int_0^1 x dx \int_0^1 dy - 2 \int_0^1 dx \int_0^1 y dy = \\
 &\quad 4[x]_0^1[y]_0^1 - \left[ \frac{x^2}{2} \right]_0^1 [y]_0^1 - 2[x]_0^1 \left[ \frac{y^2}{2} \right]_0^1 = 4 - \frac{1}{2} - 2 \frac{1}{2} = \frac{8-1-2}{2} = \frac{5}{2} = 2,5
 \end{aligned}$$


### 1.7.2 Aula 10

#### 1. Exercício

Calcule o volume do sólido limitado pelos planos:

$$x = 0, y = 0, z = 0 \text{ e } 6x + 2y + 3z = 6$$

Figura 15 – Integrais duplas - Aula 10 - Exercício I



$$P_1 = (0, 0, 0)$$

$$6x = -2y - 3z + 6 \Rightarrow x = \frac{-2y - 3z + 6}{6} = \frac{-2 \cdot 0 - 3 \cdot 0 + 6}{6} = \frac{6}{6} = 1 \Rightarrow P_2 = (1, 0, 0)$$

$$2y = -6x - 3z + 6 \Rightarrow y = \frac{-6x - 3z + 6}{2} = \frac{-6 \cdot 0 - 3 \cdot 0 + 6}{2} = \frac{6}{2} = 3 \Rightarrow P_3 = (0, 3, 0)$$

$$3z = -6x - 2y + 6 \Rightarrow z = \frac{-6x - 2y + 6}{3} = \frac{-6 \cdot 0 - 2 \cdot 0 + 6}{3} = \frac{6}{3} = 2 \Rightarrow P_4 = (0, 0, 2)$$

$$x = 0, x = 1$$

$$y = 0, y = \frac{-6x - 3z + 6}{2} = \frac{-6x - 3 \cdot 0 + 6}{2} = -3x + 3$$

$$z = \frac{-6x - 2y + 6}{3} = -2x - \frac{2y}{3} + 2$$

$$\begin{aligned} v &= \int_0^1 \int_0^{-3x+3} \left( -2x - \frac{2y}{3} + 2 \right) dy dx = \int_0^1 dx \int_0^{-3x+3} \left( -2x - \frac{2y}{3} + 2 \right) dy = \\ &\int_0^1 dx \left[ -2xy - \frac{2y^2}{3} + 2y \right]_0^{-3x+3} = \int_0^1 dx \frac{1}{3} \left[ -6xy - y^2 + 6y \right]_0^{-3x+3} = \\ &\frac{1}{3} \int_0^1 dx [-y(6x + y - 6)]_0^{-3x+3} = \\ &\frac{1}{3} \int_0^1 dx [ -(-3x + 3)(6x + (-3x + 3) - 6) + 0(6x + 0 - 6) ] = \\ &\frac{1}{3} \int_0^1 dx [(3x - 3)(3x - 3)] = \frac{1}{3} \int_0^1 (9x^2 - 18x + 9) dx = \frac{1}{3} \left[ 9 \frac{x^3}{3} - 18 \frac{x^2}{2} + 9x \right]_0^1 = \\ &\frac{1}{3} \left[ 3x^3 - 9x^2 + 9x \right]_0^1 = \frac{1}{3} \left[ 3x(x^2 - 3x + 3) \right]_0^1 = \\ &\left[ 1(1^2 - 3 \cdot 1 + 3) - 0(0^2 - 3 \cdot 0 + 3) \right] = 1 \end{aligned}$$


## 1.8 Coordenadas polares

### 1.8.1 Aula 1

#### 1. Exercício

Calcule a área do círculo de raio igual a dois

Figura 16 – Coordenadas polares - Aula 01 - Exercício I



$$r = 2 \Rightarrow a = \pi r^2 = 2^2 \pi = 4\pi$$

$$x^2 + y^2 = r^2 \Rightarrow x^2 + y^2 = 2^2 \Rightarrow x^2 + y^2 = 4 \Rightarrow y = \pm \sqrt{4 - x^2}$$

$$R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid -2 \leq x \leq 2, -\sqrt{4 - x^2} \leq y \leq \sqrt{4 - x^2}\}$$

$$\begin{aligned}
a &= \int_{-2}^2 dx \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} dy = \int_{-2}^2 dx (\sqrt{4-x^2} + \sqrt{4-x^2}) = 2 \int_{-2}^2 \sqrt{4-x^2} dx = \\
&\quad 2 \int_{-2}^2 \sqrt{4 - (2 \sin(\alpha))^2} 2 \cos(\alpha) d\alpha = 4 \int_{-2}^2 \sqrt{4 - 4 \sin^2(\alpha)} \cos(\alpha) d\alpha = \\
&\quad 4 \int_{-2}^2 \sqrt{4 - 4(1 - \cos^2(\alpha))} \cos(\alpha) d\alpha = 4 \int_{-2}^2 \sqrt{4 - (4 - 4 \cos^2(\alpha))} \cos(\alpha) d\alpha = \\
&\quad 4 \int_{-2}^2 \sqrt{4 - 4 + 4 \cos^2(\alpha)} \cos(\alpha) d\alpha = 4 \int_{-2}^2 2 \cos(\alpha) \cos(\alpha) d\alpha = \\
&\quad 8 \int_{-2}^2 \cos^2(\alpha) d\alpha = 8 \int_{-2}^2 \left( \frac{1 + \cos(2\alpha)}{2} \right) d\alpha = 8 \int_{-2}^2 \left( \frac{1}{2} + \frac{\cos(2\alpha)}{2} \right) d\alpha = \\
&\quad 4 \int_{-2}^2 d\alpha + 4 \int_{-2}^2 \cos(2\alpha) d\alpha = 4 \int_{-2}^2 d\alpha + 4 \int_{-2}^2 \cos(u) \frac{du}{2} = \\
&\quad 4 \int_{-2}^2 d\alpha + 2 \int_{-2}^2 \cos(u) du = [4\alpha + 2 \sin(u)]_{-2}^2 = [4\alpha + 2 \sin(2\alpha)]_{-2}^2 = \\
&\quad [4\alpha + 4 \sin(\alpha) \cos(\alpha)]_{-2}^2 = [4(\alpha + \sin(\alpha) \cos(\alpha))]_{-2}^2 = \\
&\quad \left[ 4 \left( \arcsen \left( \frac{x}{2} \right) + \frac{x \sqrt{4-x^2}}{2} \right) \right]_{-2}^2 = \left[ 4 \left( \arcsen \left( \frac{x}{2} \right) + \frac{x \sqrt{4-x^2}}{4} \right) \right]_{-2}^2 = \\
&\quad 4 \left( \arcsen \left( \frac{2}{2} \right) + \frac{2 \sqrt{4-2^2}}{4} \right) - 4 \left( \arcsen \left( \frac{(-2)}{2} \right) + \frac{(-2) \sqrt{4-(-2)^2}}{4} \right) = \\
&\quad 4 \arcsen(1) - 4 \arcsen(-1) = 4(\arcsen(1) - \arcsen(-1)) = 4 \left( \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} \right) = 4 \left( \frac{2\pi}{2} \right) = 4\pi
\end{aligned}$$

$$x = 2 \sin(\alpha); \quad dx = 2 \cos(\alpha) d\alpha$$

$$u = 2\alpha; \quad \frac{du}{2} = d\alpha$$

$$\sin(\alpha) = \frac{co}{h} = \frac{x}{2} \Rightarrow \alpha = \arcsen \left( \frac{x}{2} \right)$$

$$h^2 = co^2 + ca^2 \Rightarrow 2^2 = x^2 + ca^2 \Rightarrow ca = \sqrt{4 - x^2}$$

$$\cos(\alpha) = \frac{ca}{h} = \frac{\sqrt{4 - x^2}}{2}$$

$$R = \{(r, \theta) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq r \leq 2, 0 \leq \theta \leq 2\pi\}$$


$$\begin{aligned}
a &= \int_{-2}^2 dx \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} dy = \int_0^2 \int_0^{2\pi} r dr d\theta = \int_0^2 r dr \int_0^{2\pi} d\theta = \left[ \frac{r^2}{2} \right]_0^2 [\theta]_0^{2\pi} = \\
&\quad \frac{1}{2} [2^2 - 0^2] [2\pi - 0] = \frac{4}{2} 2\pi = 4\pi
\end{aligned}$$

## 2. Exercício

$$\iint_R \frac{da}{1+x^2+y^2}$$

$$R = \{(r, \theta) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq r \leq 2, \frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{2}\}$$

Figura 17 – Coordenadas polares - Aula 01 - Exercício II



$$\begin{aligned}
 v &= \iint_R \frac{da}{1+x^2+y^2} = \int_0^2 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{2}} \frac{r d\theta dr}{1+r^2} = \int_0^2 \frac{r dr}{1+r^2} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{2}} d\theta = \\
 &= \int_0^2 (1+r^2)^{-1} r dr [\theta]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{2}} = \int_0^2 (1+r^2)^{-1} r dr \left( \frac{3\pi}{2} - \frac{\pi}{4} \right) = \\
 &= \int_0^2 (1+r^2)^{-1} r dr \left( \frac{6\pi - \pi}{4} \right) = \frac{5\pi}{4} \int_0^2 (1+r^2)^{-1} r dr = \frac{5\pi}{4} \int_0^2 u^{-1} \frac{du}{2} = \\
 &= \frac{5\pi}{8} \int_0^2 u^{-1} du = \frac{5\pi}{8} [\ln|u|]_0^2 = \frac{5\pi}{8} [\ln|1+r^2|]_0^2 = \frac{5\pi}{8} [\ln|1+2^2| - \ln|1+0^2|] = \\
 &= \frac{5\pi}{8} [\ln|5| - \ln|1|] = \frac{5\pi \ln|5|}{8}
 \end{aligned}$$

$$u = 1 + r^2 \Rightarrow \frac{du}{2} = r dr$$

$$e^x = 1 = e^0 \Rightarrow x = 0$$

### 1.8.2 Aula 2

#### 1. Exercício

$$\iint_R e^{x^2+y^2} dx dy$$

$R$ , região entre as curvas abaixo:

$$x^2 + y^2 = 4$$


$$x^2 + y^2 = 9$$

$$x^2 + y^2 = r^2 \Rightarrow e^{x^2+y^2} = e^{r^2}$$

$$da = dx dy = r dr d\theta$$

$$R = \{(r, \theta) \in \mathbb{R}^2 \mid 2 \leq r \leq 3, 0 \leq \theta \leq 2\pi\}$$

Figura 18 – Coordenadas polares - Aula 02 - Exercício I



$$v = \iint_R e^{x^2+y^2} dx dy = \int_2^3 \int_0^{2\pi} e^{r^2} r d\theta dr = \int_2^3 e^{r^2} r dr \int_0^{2\pi} d\theta = \int_2^3 e^u \frac{du}{2} \int_0^{2\pi} d\theta =$$

$$\frac{1}{2} \int_2^3 e^u du \int_0^{2\pi} d\theta = \frac{1}{2} [e^u]_2^{3} [\theta]_0^{2\pi} = \frac{1}{2} [e^{r^2}]_2^3 2\pi = (e^{3^2} - e^{2^2}) \pi = \pi (e^9 - e^4)$$

$$u = r^2 \Rightarrow \frac{du}{2} = r dr$$


2. Exercício

$$\iint_R \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$$

$R$ , região cujo o contorno é:

$$x^2 + y^2 = 4$$

Figura 19 – Coordenadas polares - Aula 02 - Exercício II



$$x^2 + y^2 = r^2 \Rightarrow \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{r^2} = r$$

$$da = dx dy = r dr d\theta$$

$$R = \{(r, \theta) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq r \leq 2, 0 \leq \theta \leq 2\pi\}$$

$$v = \iint_R \sqrt{x^2 + y^2} dx dy = \int_0^2 \int_0^{2\pi} r^2 d\theta dr = \int_0^2 r^2 dr \int_0^{2\pi} d\theta =$$

$$\left[ \frac{r^3}{3} \right]_0^2 [\theta]_0^{2\pi} = \frac{2^3}{3} 2\pi = \frac{16\pi}{3}$$

### 1.8.3 Aula 3


#### 1. Exercício

Calcular o volume do sólido acima do plano  $xoy$  delimitado pela função abaixo.

$xoy$

$$z = 4 - 2x^2 - 2y^2$$

Figura 20 – Coordenadas polares - Aula 03 - Exercício I



$$4 - 2x^2 - 2y^2 = 0 \Rightarrow -2x^2 - 2y^2 = -4 \Rightarrow -2(x^2 + y^2) = -4 \Rightarrow$$

$$x^2 + y^2 = \frac{-4}{-2} = 2 \Rightarrow r = \sqrt{2}$$

$$R = \{(r, \theta) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq r \leq \sqrt{2}, 0 \leq \theta \leq 2\pi\}$$

$$z = 4 - 2x^2 - 2y^2 = 4 - 2(x^2 + y^2) = 4 - 2r^2$$

$$da = dx dy = r dr d\theta$$

$$\begin{aligned} \iint_R z da &= \iint_R (4 - 2x^2 - 2y^2) dx dy = \int_0^{\sqrt{2}} \int_0^{2\pi} (4 - 2r^2) r d\theta dr = \\ &\int_0^{\sqrt{2}} (4r - 2r^3) dr \int_0^{2\pi} d\theta = \int_0^{\sqrt{2}} (4r - 2r^3) dr [\theta]_0^{2\pi} = 2\pi \int_0^{\sqrt{2}} (4r - 2r^3) dr = \\ &8\pi \int_0^{\sqrt{2}} r dr - 4\pi \int_0^{\sqrt{2}} r^3 dr = \left[ \frac{8\pi r^2}{2} - \frac{4\pi r^4}{4} \right]_0^{\sqrt{2}} = \left[ 4\pi r^2 - \pi r^4 \right]_0^{\sqrt{2}} = \left[ \pi r^2 (4 - r^2) \right]_0^{\sqrt{2}} = \\ &\pi (\sqrt{2})^2 \left( 4 - (\sqrt{2})^2 \right) = 2\pi(4 - 2) = 4\pi \end{aligned}$$

## 2 Integrais triplas

*Cálculo de integrais triplas.*

### 2.1 Introdução - Aula 1

#### 1. Exercício

Calcule a integral tripla abaixo.

$$\iiint_R 12xy^2z^3 \, dv$$

$$R = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid -1 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 3, 0 \leq z \leq 2\}$$

$$dv = dx dy dz$$

$$\begin{aligned} \iiint_R 12xy^2z^3 \, dv &= \int_{-1}^2 \int_0^3 \int_0^2 12xy^2z^3 \, dz dy dx = 12 \int_{-1}^2 x \, dx \int_0^3 y^2 \, dy \int_0^2 z^3 \, dz = \\ &= 12 \left[ \frac{x^2}{2} \right]_{-1}^2 \left[ \frac{y^3}{3} \right]_0^3 \left[ \frac{z^4}{4} \right]_0^2 = \frac{1}{2} \left[ x^2 \right]_{-1}^2 \left[ y^3 \right]_0^3 \left[ z^4 \right]_0^2 = \frac{1}{2} (2^2 - (-1)^2) 3^3 2^4 = \frac{1}{2} 3 \cdot 27 \cdot 16 = 648 \end{aligned}$$

#### 2. Exercício

Observe a integral e preencha os retângulos abaixo.

$$\int_1^5 \int_2^4 \int_3^6 f(x, y, z) \, dx \, dz \, dy$$

$$[3] \leq x \leq [6]$$

$$[1] \leq y \leq [5]$$

$$[2] \leq z \leq [4]$$

#### 3. Exercício

$$\begin{aligned}
\int_{-1}^1 \int_0^2 \int_0^1 (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz &= \int_{-1}^1 dz \int_0^2 dy \int_0^1 (x^2 + y^2 + z^2) dx = \\
&\int_{-1}^1 dz \int_0^2 dy \left( \int_0^1 x^2 dx + y^2 \int_0^1 dx + z^2 \int_0^1 dx \right) = \\
&\int_{-1}^1 dz \int_0^2 dy \int_0^1 x^2 dx + \int_{-1}^1 dz \int_0^2 y^2 dy \int_0^1 dx + \int_{-1}^1 z^2 dz \int_0^2 dy \int_0^1 dx = \\
&[z]_{-1}^1 [y]_0^2 \left[ \frac{x^3}{3} \right]_0^1 + [z]_{-1}^1 \left[ \frac{y^3}{3} \right]_0^2 [x]_0^1 + \left[ \frac{z^3}{3} \right]_{-1}^1 [y]_0^2 [x]_0^1 = \\
&[z]_{-1}^1 [y]_0^2 \frac{1}{3} \left[ x^3 \right]_0^1 + [z]_{-1}^1 \frac{1}{3} \left[ y^3 \right]_0^2 [x]_0^1 + \frac{1}{3} \left[ z^3 \right]_{-1}^1 [y]_0^2 [x]_0^1 = \\
&\frac{1}{3} ([1+1]2 \cdot 1^3 + [1+1]2^3 \cdot 1 + [1^3 - (-1)^3] 2 \cdot 1) = \frac{1}{3} (4 + 16 + 4) = \frac{24}{3} = 8
\end{aligned}$$

#### 4. Exercício

$$\begin{aligned}
\int_0^2 \int_{-1}^{y^2} \int_{-1}^z yz dx dz dy &= \int_0^2 \int_{-1}^{y^2} \left( yz \int_{-1}^z dx \right) dz dy = \int_0^2 \int_{-1}^{y^2} [yzx]_{-1}^z dz dy = \\
&\int_0^2 \int_{-1}^{y^2} [yz^2 + yz] dz dy = \int_0^2 \left( y \int_{-1}^{y^2} z^2 dz + y \int_{-1}^{y^2} z dz \right) dy = \int_0^2 \left[ y \frac{z^3}{3} + y \frac{z^2}{2} \right]_{-1}^{y^2} dy = \\
&\int_0^2 \left[ \frac{2yz^3 + 3yz^2}{6} \right]_{-1}^{y^2} dy = \frac{1}{6} \int_0^2 [yz^2 (2z + 3)]_{-1}^{y^2} dy = \\
&\frac{1}{6} \int_0^2 \left[ y (y^2)^2 (2y^2 + 3) - y(-1)^2 (2(-1) + 3) \right] dy = \frac{1}{6} \int_0^2 [y^5 (2y^2 + 3) - y] dy = \\
&\frac{1}{6} \int_0^2 (2y^7 + 3y^5 - y) dy = \frac{1}{6} \left[ \frac{2y^8}{8} + \frac{3y^6}{6} - \frac{y^2}{2} \right]_0^2 = \frac{1}{6} \left[ \frac{y^8}{4} + \frac{y^6}{2} - \frac{y^2}{2} \right]_0^2 = \\
&\frac{1}{6} \left[ \frac{y^8 + 2y^6 - 2y^2}{4} \right]_0^2 = \frac{1}{24} [y^2 (y^6 + 2y^4 - 2)]_0^2 = \frac{1}{24} [2^2 (2^6 + 2 \cdot 2^4 - 2)] = \\
&\frac{1}{24} [4(64 + 32 - 2)] = \frac{94}{6} = \frac{47}{3}
\end{aligned}$$

## 2.2 Cálculo de integrais triplas - Aula 2

#### 1. Exercício

$$\iiint_R xy \operatorname{sen}(yz) dv$$

$$R = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq \frac{\pi}{6} \right\}$$

$$\begin{aligned}
\iiint_R xy \sin(yz) dv &= \int_0^\pi \int_0^1 \int_0^{\frac{\pi}{6}} xy \sin(yz) dz dy dx = \\
\int_0^\pi \int_0^1 \left( x \int_0^{\frac{\pi}{6}} \sin(yz) y dz \right) dy dx &= \int_0^\pi \int_0^1 \left( x \int_0^{\frac{\pi}{6}} \sin(u) du \right) dy dx = \\
\int_0^\pi \int_0^1 [-x \cos(u)]_0^{\frac{\pi}{6}} dy dx &= \int_0^\pi \int_0^1 [-x \cos(yz)]_0^{\frac{\pi}{6}} dy dx = \\
\int_0^\pi \int_0^1 \left( -x \cos\left(\frac{y\pi}{6}\right) + x \cos(0) \right) dy dx &= \int_0^\pi \int_0^1 \left( -x \cos\left(\frac{y\pi}{6}\right) + x \right) dy dx = \\
\int_0^\pi \left( -x \int_0^1 \cos\left(\frac{y\pi}{6}\right) dy + x \int_0^1 dy \right) dx &= \int_0^\pi \left( -x \int_0^1 \cos(v) \frac{6dv}{\pi} + x \int_0^1 dy \right) dx = \\
\int_0^\pi \left( \frac{-6x}{\pi} \int_0^1 \cos(v) dv + x \int_0^1 dy \right) dx &= \int_0^\pi \left[ \frac{-6x \sin(v)}{\pi} + xy \right]_0^1 dx = \\
\int_0^\pi \left[ \frac{-6x \sin\left(\frac{y\pi}{6}\right) + xy\pi}{\pi} \right]_0^1 dx &= \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \left[ -x \left( 6 \sin\left(\frac{y\pi}{6}\right) - y\pi \right) \right]_0^1 dx = \\
\frac{1}{\pi} \int_0^\pi \left[ -x \left( 6 \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) - \pi \right) + x(6 \sin(0) - 0) \right] dx &= \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \left( -6x \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) + x\pi \right) dx = \\
\frac{-6 \sin\left(\frac{\pi}{6}\right)}{\pi} \int_0^\pi x dx + \pi \int_0^\pi x dx &= \left[ \frac{-6 \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) x^2}{\pi} \frac{2}{2} + \frac{\pi x^2}{2} \right]_0^\pi = \\
\left[ \frac{-3x^2 \sin\left(\frac{\pi}{6}\right)}{\pi} + \frac{\pi x^2}{2} \right]_0^\pi &= \left[ \frac{-6x^2 \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) + \pi^2 x^2}{2\pi} \right]_0^\pi = \frac{1}{2\pi} \left[ -x^2 \left( 6 \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) - \pi^2 \right) \right]_0^\pi = \\
\frac{1}{2\pi} \left[ -\pi^2 \left( 6 \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) - \pi^2 \right) \right] &= \frac{-\pi \left( 6 \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) - \pi^2 \right)}{2} = \frac{-\pi \left( 6 \frac{1}{2} - \pi^2 \right)}{2} = \\
&\frac{-\pi (3 - \pi^2)}{2} = \frac{\pi^3 - 3\pi}{2}
\end{aligned}$$

$$u = yz \Rightarrow du = y dz$$

$$v = \frac{y\pi}{6} \Rightarrow \frac{6dv}{\pi} = dy$$

$$\begin{aligned}
\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-y^2}} \int_0^y z \, dx \, dz \, dy &= \int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-y^2}} \left( z \int_0^y dx \right) dz \, dy = \int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-y^2}} [zx]_0^y dz \, dy = \\
\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-y^2}} (zy) dz \, dy &= \int_0^1 \left( y \int_0^{\sqrt{1-y^2}} z \, dz \right) dy = \int_0^1 \left[ \frac{yz^2}{2} \right]_0^{\sqrt{1-y^2}} dy = \\
\int_0^1 \left( \frac{y(\sqrt{1-y^2})^2}{2} \right) dy &= \int_0^1 \frac{y-y^3}{2} dy = \frac{1}{2} \int_0^1 (y-y^3) dy = \frac{1}{2} \left[ \frac{y^2}{2} - \frac{y^4}{4} \right]_0^1 = \\
\frac{1}{2} \left[ \frac{2y^2 - y^4}{4} \right]_0^1 &= \frac{1}{8} [y^2 (2-y^2)]_0^1 = \frac{1}{8} [1^2 (2-1^2)] = \frac{1}{8}
\end{aligned}$$

### 3. Exercício

$$\begin{aligned}
\int_0^3 \int_0^{\sqrt{9-z^2}} \int_0^x xy \, dy \, dx \, dz &= \int_0^3 \int_0^{\sqrt{9-z^2}} \left( x \int_0^x y \, dy \right) dx \, dz = \\
\int_0^3 \int_0^{\sqrt{9-z^2}} \left[ \frac{xy^2}{2} \right]_0^x &= \frac{1}{2} \int_0^3 \int_0^{\sqrt{9-z^2}} x^3 dx \, dz = \\
\frac{1}{2} \int_0^3 \left[ \frac{x^4}{4} \right]_0^{\sqrt{9-z^2}} dz &= \frac{1}{2} \int_0^3 \left[ \frac{(\sqrt{9-z^2})^4}{4} \right] dz = \frac{1}{8} \int_0^3 [(9-z^2)^2] dz = \\
\frac{1}{8} \int_0^3 (81 - 18z^2 + z^4) dz &= \frac{1}{8} \left[ 81z - \frac{18z^3}{3} + \frac{z^5}{5} \right]_0^3 = \frac{1}{8} \left[ \frac{1215z - 90z^3 + 3z^5}{15} \right]_0^3 = \\
\frac{1}{120} \left[ 3z (405 - 30z^2 + z^4) \right]_0^3 &= \frac{1}{40} [z (405 - 30z^2 + z^4)]_0^3 = \frac{1}{40} [3 (405 - 30 \cdot 3^2 + 3^4)] = \\
\frac{1}{40} [3 (405 - 270 + 81)] &= \frac{648}{40} = \frac{81}{5}
\end{aligned}$$

## 2.3 Cálculo do volume de um sólido - Aula 3

### 1. Exercício

Use integral tripla para encontrar o volume do sólido no primeiro octante limitado pelos planos coordenados e pelo plano dado pela equação abaixo.


$$3x + 6y + 4z = 12$$

$$P_0(0, 0, 0)$$

$$x = 0, y = 0; 4z = 12 \Rightarrow z = \frac{12}{4} = 3; P_1(0, 0, 3)$$

$$x = 0, z = 0; 6y = 12 \Rightarrow y = \frac{12}{6} = 2; P_2(0, 2, 0)$$

Figura 21 – Integrais triplas - Aula 03 - Exercício I



$$y = 0, z = 0; 3x = 12 \Rightarrow x = \frac{12}{3} = 4; P_3(4, 0, 0)$$

$$0 \leq x \leq 4$$

$$3x + 6y = 12 \Rightarrow x + 2y = 4 \Rightarrow y = \frac{4-x}{2} = 2 - \frac{x}{2}; 0 \leq y \leq \left(2 - \frac{x}{2}\right)$$

$$3x + 6y + 4z = 12 \Rightarrow z = \frac{12 - 3x - 6y}{4} = 3 - \frac{3x}{4} - \frac{3y}{2}; 0 \leq z \leq \left(3 - \frac{3x}{4} - \frac{3y}{2}\right)$$

$$\begin{aligned}
& \int_0^4 dx \int_0^{2-\frac{x}{2}} dy \int_0^{3-\frac{3x}{4}-\frac{3y}{2}} dz = \int_0^4 dx \int_0^{2-\frac{x}{2}} dy [z]_0^{3-\frac{3x}{4}-\frac{3y}{2}} = \\
& \int_0^4 dx \int_0^{2-\frac{x}{2}} \left( 3 - \frac{3x}{4} - \frac{3y}{2} \right) dy = \int_0^4 dx \left[ 3y - \frac{3xy}{4} - \frac{3y^2}{4} \right]_0^{2-\frac{x}{2}} = \\
& \int_0^4 \left( 3 \left( 2 - \frac{x}{2} \right) - \frac{3x \left( 2 - \frac{x}{2} \right)}{4} - \frac{3 \left( 2 - \frac{x}{2} \right)^2}{4} \right) dx = \\
& \int_0^4 \left( 6 - \frac{3x}{2} - \frac{\left( 6x - \frac{3x^2}{2} \right)}{4} - \frac{3 \left( 4 - 2x + \frac{x^2}{4} \right)}{4} \right) dx = \\
& \int_0^4 \left( 6 - \frac{3x}{2} - \frac{\left( \frac{12x - 3x^2}{2} \right)}{4} - \frac{\left( 12 - 6x + \frac{3x^2}{4} \right)}{4} \right) dx = \\
& \int_0^4 \left( 6 - \frac{3x}{2} - \left( \frac{12x - 3x^2}{8} \right) - \frac{\left( \frac{48 - 24x + 3x^2}{4} \right)}{4} \right) dx = \\
& \int_0^4 \left( 6 - \frac{3x}{2} - \left( \frac{3x}{2} - \frac{3x^2}{8} \right) - \left( \frac{48 - 24x + 3x^2}{16} \right) \right) dx = \\
& \int_0^4 \left( 6 - \frac{3x}{2} - \frac{3x}{2} + \frac{3x^2}{8} - \left( 3 - \frac{3x}{2} + \frac{3x^2}{16} \right) \right) dx = \\
& \int_0^4 \left( 6 - \frac{3x}{2} - \frac{3x}{2} + \frac{3x^2}{8} - 3 + \frac{3x}{2} - \frac{3x^2}{16} \right) dx = \int_0^4 \left( 3 - \frac{3x}{2} + \frac{3x^2}{16} \right) dx = \\
& \left[ 3x - \frac{3x^2}{4} + \frac{3x^3}{48} \right]_0^4 = 3 \cdot 4 - \frac{3 \cdot 4^2}{4} + \frac{3 \cdot 4^3}{48} = 12 - 12 + 4 = 4
\end{aligned}$$


## 2.4 Esboço de um sólido - Aula 4

### 1. Exercício

Faça o esboço do sólido cujo volume é dado pela integral abaixo.

$$v = \int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \int_0^{y+1} dz dy dx = \int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_0^{y+1} dz$$

Figura 22 – Integrais triplas - Aula 04 - Exercício I



$$\begin{aligned}
 v &= \int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_0^{y+1} dz = \int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} dy [z]_0^{y+1} = \int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} (y+1) dy = \\
 &\quad \int_{-1}^1 dx \left[ \frac{y^2}{2} + y \right]_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} = \\
 &\quad \int_{-1}^1 \left[ \frac{(\sqrt{1-x^2})^2}{2} + \sqrt{1-x^2} - \left( \frac{(-\sqrt{1-x^2})^2}{2} - \sqrt{1-x^2} \right) \right] dx = \\
 &\quad \int_{-1}^1 \left( \frac{1-x^2}{2} + \sqrt{1-x^2} - \frac{(1-x^2)}{2} + \sqrt{1-x^2} \right) dx = \\
 &\quad \int_{-1}^1 \left( \frac{1}{2} - \frac{x^2}{2} + \sqrt{1-x^2} - \frac{1}{2} + \frac{x^2}{2} + \sqrt{1-x^2} \right) dx = \int_{-1}^1 (2\sqrt{1-x^2}) dx = \\
 &\quad 2 \int_{-1}^1 \sqrt{1-\sin^2(\theta)} \cos(\theta) d\theta = 2 \int_{-1}^1 \sqrt{1-(1-\cos^2(\theta))} \cos(\theta) d\theta = \\
 &\quad 2 \int_{-1}^1 \sqrt{\cos^2(\theta)} \cos(\theta) d\theta = 2 \int_{-1}^1 \cos^2(\theta) d\theta = 2 \int_{-1}^1 \left( \frac{1+\cos(2\theta)}{2} \right) d\theta = \\
 &\quad 2 \int_{-1}^1 \left( \frac{1}{2} + \frac{\cos(2\theta)}{2} \right) d\theta = \int_{-1}^1 d\theta + \int_{-1}^1 \cos(2\theta) d\theta = \int_{-1}^1 d\theta + \int_{-1}^1 \cos(u) \frac{du}{2} = \\
 &\quad \int_{-1}^1 d\theta + \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \cos(u) du = \left[ \theta + \frac{\sin(u)}{2} \right]_{-1}^1 = \left[ \theta + \frac{\sin(2\theta)}{2} \right]_{-1}^1 = \\
 &\quad \left[ \theta + \frac{2\sin(\theta)\cos(\theta)}{2} \right]_{-1}^1 = [\theta + \sin(\theta)\cos(\theta)]_{-1}^1 = [\arcsen(x) + x\sqrt{1-x^2}]_{-1}^1 = \\
 &\quad [\arcsen(1) + 1\sqrt{1-1^2} - (\arcsen(-1) + (-1)\sqrt{1-(-1)^2})] = [\arcsen(1) - \arcsen(-1)] = \\
 &\quad \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi + \pi}{2} = \frac{2\pi}{2} = \pi
 \end{aligned}$$

$$x = \sin(\theta) \Rightarrow dx = \cos(\theta) d\theta$$

$$u = 2\theta \Rightarrow \frac{du}{2} = d\theta$$

$$\sin(\theta) = \frac{co}{h} = \frac{x}{1} = x; \quad \theta = \arcsen(x)$$

$$1 = x^2 + ca \Rightarrow ca = \sqrt{1-x^2}$$


$$\cos(\theta) = \frac{ca}{h} = \frac{\sqrt{1-x^2}}{1} = \sqrt{1-x^2}$$

## 2. Exercício

Faça o esboço do sólido cujo volume é dado pela integral abaixo.

$$v = \int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} \int_0^2 dy dz dx = \int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dz \int_0^2 dy$$

Figura 23 – Integrais triplas - Aula 04 - Exercício II



$$\begin{aligned}
v &= \int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dz [y]_0^2 = 2 \int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dz = 2 \int_0^1 dx [z]_0^{\sqrt{1-x^2}} = 2 \int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx = \\
&= 2 \int_0^1 \sqrt{1-\sin^2(\theta)} \cos(\theta) d\theta = 2 \int_0^1 \sqrt{1-(1-\cos^2(\theta))} \cos(\theta) d\theta = \\
&= 2 \int_0^1 \sqrt{\cos^2(\theta)} \cos(\theta) d\theta = 2 \int_0^1 \cos^2(\theta) d\theta = 2 \int_0^1 \left( \frac{1+\cos(2\theta)}{2} \right) d\theta = \\
&= 2 \int_0^1 \left( \frac{1}{2} + \frac{\cos(2\theta)}{2} \right) d\theta = \int_0^1 d\theta + \int_0^1 \cos(2\theta) d\theta = \int_0^1 d\theta + \int_0^1 \cos(u) \frac{du}{2} = \\
&= \int_0^1 d\theta + \frac{1}{2} \int_0^1 \cos(u) du = \left[ \theta + \frac{\sin(u)}{2} \right]_0^1 = \left[ \theta + \frac{\sin(2\theta)}{2} \right]_0^1 = \left[ \theta + \frac{2\sin(\theta)\cos(\theta)}{2} \right]_0^1 = \\
&= [\theta + \sin(\theta)\cos(\theta)]_0^1 = [\arcsen(x) + x\sqrt{1-x^2}]_0^1 = \\
&= \arcsen(1) + 1\sqrt{1-1^2} - (\arcsen(0) + 0\sqrt{1-0^2}) = \arcsen(1) - \arcsen(0) = \frac{\pi}{2}
\end{aligned}$$

$$x = \sin(\theta) \Rightarrow dx = \cos(\theta) d\theta$$

$$u = 2\theta \Rightarrow \frac{du}{2} = d\theta$$

$$\sin(\theta) = \frac{co}{h} = \frac{x}{1} = x; \quad \theta = \arcsen(x)$$

$$1 = x^2 + ca \Rightarrow ca = \sqrt{1-x^2}$$


$$\cos(\theta) = \frac{ca}{h} = \frac{\sqrt{1-x^2}}{1} = \sqrt{1-x^2}$$

### 3. Exercício

Faça o esboço do sólido cujo volume é dado pela integral abaixo.

$$v = \int_{-1}^0 \int_0^1 \int_0^{y^2} dz dx dy = \int_{-1}^0 dy \int_0^1 dx \int_0^{y^2} dz$$

Figura 24 – Integrais triplas - Aula 04 - Exercício III



$$\begin{aligned} v &= \int_{-1}^0 dy \int_0^1 dx \int_0^{y^2} dz = \int_{-1}^0 dy \int_0^1 dx [z]_0^{y^2} = \int_{-1}^0 y^2 dy \int_0^1 dx = \int_{-1}^0 y^2 dy [x]_0^1 = \\ &\quad \int_{-1}^0 y^2 dy = \left[ \frac{y^3}{3} \right]_{-1}^0 = \frac{0^3}{3} - \frac{(-1)^3}{3} = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

## 2.5 Coordenadas esféricas

### 2.5.1 Aula 1

#### 1. Exercício

Use coordenadas esféricas para calcular

$$\iiint_R (x^2 + y^2 + z^2) dv$$

, onde R é a bola unitária  $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ .

$$x^2 + y^2 + z^2 = r^2$$

$$dv = dx dy dz = r^2 \sin(\varphi) dr d\theta d\varphi$$

$$0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \varphi \leq \pi$$


$$\begin{aligned} \iiint_R (x^2 + y^2 + z^2) dv &= \int_0^1 \int_0^{2\pi} \int_0^\pi r^4 \sin(\varphi) d\varphi d\theta dr = \\ \int_0^1 \int_0^{2\pi} \left( r^4 \int_0^\pi \sin(\varphi) d\varphi \right) d\theta dr &= \int_0^1 \int_0^{2\pi} \left( r^4 [-\cos(\varphi)]_0^\pi \right) d\theta dr = \\ \int_0^1 \int_0^{2\pi} \left( r^4 [-\cos(\pi) + \cos(0)] \right) d\theta dr &= \int_0^1 \int_0^{2\pi} 2r^4 d\theta dr = \int_0^1 \left( 2r^4 \int_0^{2\pi} d\theta \right) dr = \\ \int_0^1 \left( 2r^4 [\theta]_0^{2\pi} \right) dr &= \int_0^1 4\pi r^4 dr = 4\pi \int_0^1 r^4 dr = 4\pi \left[ \frac{r^5}{5} \right]_0^1 = \frac{4\pi}{5} \end{aligned}$$

### 2.5.2 Aula 2

#### 1. Exercício

$$\begin{aligned}x^2 + y^2 + z^2 &= 16 \\z &= \sqrt{x^2 + y^2}\end{aligned}$$

Figura 25 – Coordenadas esféricas - Aula 02 - Exercício I



$$\begin{aligned}z &= \sqrt{x^2 + y^2} \Rightarrow r \cos(\varphi) = \sqrt{(r \sin(\varphi) \cos(\theta))^2 + (r \sin(\varphi) \sin(\theta))^2} = \\&\sqrt{r^2 \sin^2(\varphi) \cos^2(\theta) + r^2 \sin^2(\varphi) \sin^2(\theta)} = \sqrt{r^2 \sin^2(\varphi) (\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta))} = \\r \sin(\varphi) &\Rightarrow \frac{r \cos(\varphi)}{r \sin(\varphi)} = \frac{r \sin(\varphi)}{r \cos(\varphi)} \Rightarrow 1 = \operatorname{tg}(\varphi) \Rightarrow \varphi = \operatorname{arctg}(1) = \frac{\pi}{4}\end{aligned}$$

$$0 \leq r \leq 4, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}$$

$$\begin{aligned}v &= \int_0^4 \int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{4}} r^2 \sin(\varphi) d\varphi d\theta dr = \int_0^4 \int_0^{2\pi} \left( r^2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin(\varphi) d\varphi \right) d\theta dr = \\&\int_0^4 \int_0^{2\pi} \left( r^2 [-\cos(\varphi)]_0^{\frac{\pi}{4}} \right) d\theta dr = \int_0^4 \int_0^{2\pi} \left( r^2 \left[ -\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + \cos(0) \right] \right) d\theta dr = \\&\int_0^4 \int_0^{2\pi} \left( r^2 \left[ -\frac{\sqrt{2}}{2} + 1 \right] \right) d\theta dr = \int_0^4 \int_0^{2\pi} \frac{r^2 (2 - \sqrt{2})}{2} d\theta dr = \\&\int_0^4 \left( \frac{r^2 (2 - \sqrt{2})}{2} [\theta]_0^{2\pi} \right) dr = \int_0^4 \frac{r^2 (2 - \sqrt{2})}{2} 2\pi dr = \int_0^4 \pi (2 - \sqrt{2}) r^2 dr = \\&\pi (2 - \sqrt{2}) \left[ \frac{r^3}{3} \right]_0^4 = \frac{64\pi (2 - \sqrt{2})}{3}\end{aligned}$$

### 2.5.3 Aula 3

#### 1. Exercício

$$x^2 + y^2 + z^2 = r^2 = 4^2 = 16$$

$$0 \leq r \leq 4, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \varphi \leq \pi$$

$$\begin{aligned} v &= \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \int_0^4 r^2 \sin(\varphi) dr d\theta d\varphi = \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \left( \sin(\varphi) \left[ \frac{r^3}{3} \right]_0^4 \right) d\theta d\varphi = \\ &\int_0^\pi \int_0^{2\pi} \left( \sin(\varphi) \frac{64}{3} \right) d\theta d\varphi = \frac{64}{3} \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \sin(\varphi) d\theta d\varphi = \frac{64}{3} \int_0^\pi \left( \sin(\varphi) [\theta]_0^{2\pi} \right) d\varphi = \\ &\frac{64}{3} \int_0^\pi \sin(\varphi) 2\pi d\varphi = \frac{128\pi}{3} \int_0^\pi \sin(\varphi) d\varphi = \frac{128\pi}{3} [-\cos(\varphi)]_0^\pi = \\ &\frac{128\pi}{3} (-\cos(\pi) + \cos(0)) = \frac{128\pi}{3} (1 + 1) = \frac{256\pi}{3} \end{aligned}$$

#### 2.5.4 Aula 4

##### 1. Exercício

$$\iiint_R e^{\sqrt{(x^2+y^2+z^2)^3}} dv$$

$$R = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = r^2 \Rightarrow e^{\sqrt{(x^2+y^2+z^2)^3}} = e^{\sqrt{(r^2)^3}} = e^{r^3}$$

$$dv = dx dy dz = r^2 \sin(\varphi) dr d\theta d\varphi$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = r^2 = 1^2 = 1$$

$$0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \varphi \leq \pi$$

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_0^{2\pi} \int_0^\pi e^{r^3} r^2 \sin(\varphi) d\varphi d\theta dr &= \int_0^1 e^{r^3} r^2 dr \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi \sin(\varphi) d\varphi = \\ \int_0^1 e^u \frac{du}{3} [\theta]_0^{2\pi} [-\cos(\varphi)]_0^\pi &= \frac{1}{3} [e^{r^3}]_0^1 2\pi (-\cos(\pi) + \cos(0)) = \frac{2\pi}{3} (e^{1^3} - e^{0^3}) (1 + 1) = \\ &\frac{4\pi}{3} (e - 1) \end{aligned}$$

$$u = r^3 \Rightarrow \frac{du}{3} = r^2 dr$$

#### 2.5.5 Cálculo de massa com coordenadas esféricas - Aula 5

##### 1. Exercício retirado da página 899 de ([ROGAWSKI, 2009](#))

Encontre a massa de uma esfera S de raio 4 centrada na origem com densidade de massa dado abaixo.

$$\mu = f(x, y, z) = x^2 + y^2$$

$$\begin{aligned}\mu &= \frac{m}{v} \Rightarrow m = \mu v \Rightarrow \int dm = \int \mu dv \Rightarrow \\ m &= \int \mu dv = \iiint_R \mu \, dv = \iiint_S (x^2 + y^2) \, dv \\ S &= \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 16\}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x^2 + y^2 &= (r \sin(\varphi) \cos(\theta))^2 + (r \sin(\varphi) \sin(\theta))^2 = \\ r^2 \sin^2(\varphi) \cos^2(\theta) + r^2 \sin^2(\varphi) \sin^2(\theta) &= r^2 \sin^2(\varphi) (\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta)) = \\ r^2 \sin^2(\varphi)\end{aligned}$$

$$dv = dx dy dz = r^2 \sin(\varphi) dr d\theta d\varphi$$

$$0 \leq r \leq 4, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \varphi \leq \pi$$

$$\begin{aligned}m &= \iiint_S (x^2 + y^2) \, dv = \int_0^4 \int_0^{2\pi} \int_0^\pi (r^2 \sin^2(\varphi)) r^2 \sin(\varphi) \, d\varphi d\theta dr = \\ \int_0^4 \int_0^{2\pi} \int_0^\pi r^4 \sin^3(\varphi) \, d\varphi d\theta dr &= \int_0^4 r^4 dr \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi \sin^2 \sin(\varphi) \, d\varphi = \\ \left[ \frac{r^5}{5} \right]_0^{2\pi} [\theta]_0^{2\pi} \int_0^\pi (1 - \cos^2(\varphi)) \sin(\varphi) \, d\varphi &= \\ \frac{1024}{5} 2\pi \left( \int_0^\pi \sin(\varphi) \, d\varphi - \int_0^\pi \cos^2(\varphi) \sin(\varphi) \, d\varphi \right) &= \\ \frac{2048\pi}{5} \left( \int_0^\pi \sin(\varphi) \, d\varphi + \int_0^\pi u^2 \, du \right) &= \frac{2048\pi}{5} \left[ -\cos(\varphi) + \frac{u^3}{3} \right]_0^\pi = \\ \frac{2048\pi}{5} \left[ \frac{-3\cos(\varphi) + \cos^3(\varphi)}{3} \right]_0^\pi &= \frac{2048\pi}{15} \left[ -\cos(\varphi) (3 - \cos^2(\varphi)) \right]_0^\pi = \\ \frac{2048\pi}{15} \left[ -\cos(\pi) (3 - \cos^2(\pi)) + \cos(0) (3 - \cos^2(0)) \right] &= \frac{2048\pi}{15} [(3 - 1) + (3 - 1)] = \\ \frac{2048\pi}{15} (2 + 2) &= \frac{8192\pi}{15} \\ u = \cos(\varphi) \Rightarrow -du &= \sin(\varphi) \, d\varphi\end{aligned}$$


### 2.5.6 Aula 6

- Exercício retirado da página 1023 de ([STEWART, 2002](#))

Calcule a integral abaixo, onde E está contido entre as esferas dadas abaixo no 1º octante.

$$\iiint_E z \, dv$$

Figura 26 – Coordenadas esféricas - Aula 06 - Exercício I



$$E = \{(x, y, z) \mid 1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4\}$$

$$z = r \cos(\varphi)$$

$$dv = dx dy dz = r^2 \sin(\varphi) dr d\theta d\varphi$$

$$1 \leq r \leq 2, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$$

$$\begin{aligned} \iiint_E z \, dv &= \int_1^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (r \cos(\varphi)) r^2 \sin(\varphi) \, d\varphi d\theta dr = \\ \int_1^2 r^3 dr \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(\varphi) \cos(\varphi) \, d\varphi &= \left[ \frac{r^4}{4} \right]_1^2 \left[ \theta \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} u \, du = \left( \frac{16}{4} - \frac{1}{4} \right) \frac{\pi}{2} \left[ \frac{u^2}{2} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \\ \frac{16 - 1}{4} \frac{\pi}{2} \left[ \frac{\sin^2(\varphi)}{2} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} &= \frac{15\pi}{16} \left[ \sin^2\left(\frac{\pi}{2}\right) - \sin(0) \right] = \frac{15\pi}{16} \end{aligned}$$

$$u = \sin(\varphi) \Rightarrow du = \cos(\varphi) \, d\varphi$$

### 2.5.7 Aula 7

- Exercício retirado da página 1023 de ([STEWART, 2002](#))

Calcule

$$\iiint_E \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \, dv$$


, onde  $E$  é limitado abaixo pelo cone  $\phi = \frac{\pi}{6}$  e acima pela esfera  $\rho = 2$ .

$$0 \leq \rho \leq 2, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \phi \leq \frac{\pi}{6}$$

$$\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{\rho^2} = \rho$$

$$dv = \rho^2 \sin(\phi) \, d\rho d\theta d\phi$$

Figura 27 – Coordenadas esféricas - Aula 07 - Exercício I



$$\begin{aligned}
 \iiint_E \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dv &= \int_0^2 \int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{6}} (\rho) \rho^2 \sin(\phi) d\phi d\theta d\rho = \\
 \int_0^2 \rho^3 d\rho \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{6}} \sin(\phi) d\phi &= \left[ \frac{\rho^4}{4} \right]_0^2 [\theta]_0^{2\pi} [-\cos(\phi)]_0^{\frac{\pi}{6}} = \\
 \frac{16}{4} 2\pi \left( -\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) + \cos(0) \right) &= 8\pi \left( \frac{-\sqrt{3}}{2} + 1 \right) = 8\pi \frac{-\sqrt{3} + 2}{2} = 4\pi (2 - \sqrt{3})
 \end{aligned}$$

## 2.6 Coordenadas cilíndricas

### 2.6.1 Aula 1


#### 1. Exercício

Encontre o volume do sólido limitado pelas funções abaixo.

$$z = x^2 + y^2$$

$$z = 9$$

Figura 28 – Coordenadas cilíndricas - Aula 01 - Exercício I



$$z = x^2 + y^2 = r^2$$

$$x^2 + y^2 = r^2 = 3^2 = 9$$

$$0 \leq r \leq 3, 0 \leq \theta \leq 2\pi, r^2 \leq z \leq 9$$

$$\begin{aligned} \int_0^3 \int_0^{2\pi} \int_{r^2}^9 r dz d\theta dr &= \int_0^3 r dr \int_0^{2\pi} d\theta \int_{r^2}^9 dz = \int_0^3 r dr \int_0^{2\pi} d\theta [z]_{r^2}^9 = \\ \int_0^3 r (9 - r^2) dr \int_0^{2\pi} d\theta &= \int_0^3 (9r - r^3) dr \int_0^{2\pi} d\theta = \left[ \frac{9r^2}{2} - \frac{r^4}{4} \right]_0^{2\pi} = \\ \left[ \frac{18r^2 - r^4}{4} \right]_0^{2\pi} 2\pi &= \frac{\pi}{2} [r^2 (18 - r^2)]_0^{2\pi} = \frac{\pi}{2} 9 (18 - 9) = \frac{81\pi}{2} \end{aligned}$$


### 2.6.2 Aula 2

#### 1. Exercício

$$x^2 + y^2 = r^2 = 2^2 = 4$$

$$0 \leq r \leq 2, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq z \leq 5$$

Figura 29 – Coordenadas cilíndricas - Aula 02 - Exercício I



$$\int_0^2 r dr \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^5 dz = \left[ \frac{r^2}{2} \right]_0^{2\pi} [\theta]_0^{2\pi} [z]_0^5 = \frac{4}{2} 2\pi 5 = 20\pi$$


### 2.6.3 Aula 3

#### 1. Exercício

$$0 \leq r \leq 3, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq z \leq 2$$

$$\int_0^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^2 r dz d\theta dr = \int_0^3 r dr \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^2 dz = \left[ \frac{r^2}{2} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} [\theta]_0^{\frac{\pi}{2}} [z]_0^2 = \frac{9}{2} \frac{\pi}{2} 2 = \frac{9\pi}{2}$$

Figura 30 – Coordenadas cilíndricas - Aula 03 - Exercício I




### 2.6.4 Aula 4

#### 1. Exercício

$$x^2 + y^2 + z^2 = r^2 = 16$$

Figura 31 – Coordenadas cilíndricas - Aula 04 - Exercício I



$$x^2 + y^2 + z^2 = 16 \Rightarrow z^2 = 16 - x^2 - y^2 \Rightarrow z = \pm\sqrt{16 - x^2 - y^2} = \pm\sqrt{16 - (x^2 + y^2)} = \pm\sqrt{16 - r^2}$$

$$0 \leq r \leq 4, 0 \leq \theta \leq 2\pi, -\sqrt{16 - r^2} \leq z \leq \sqrt{16 - r^2}$$

$$\begin{aligned} \int_0^4 \int_0^{2\pi} \int_{-\sqrt{16-r^2}}^{\sqrt{16-r^2}} r dz d\theta dr &= \int_0^4 r dr \int_0^{2\pi} d\theta \int_{-\sqrt{16-r^2}}^{\sqrt{16-r^2}} dz = \\ \int_0^4 r dr \int_0^{2\pi} d\theta [z]_{-\sqrt{16-r^2}}^{\sqrt{16-r^2}} &= \int_0^4 r dr \int_0^{2\pi} d\theta [\sqrt{16-r^2} + \sqrt{16-r^2}] = \\ \int_0^4 r dr \int_0^{2\pi} d\theta [2\sqrt{16-r^2}] &= 2 \int_0^4 \sqrt{16-r^2} r dr \int_0^{2\pi} d\theta = \end{aligned}$$

$$2 \int_0^4 \sqrt{u} \left( \frac{-du}{2} \right) [\theta]_0^{2\pi} = -2\pi \int_0^4 u^{\frac{1}{2}} du = -2\pi \left[ \frac{u^{\frac{3}{2}}}{\left(\frac{3}{2}\right)} \right]_0^4 = -2\pi \left[ \frac{2\sqrt{u^3}}{3} \right]_0^4 =$$

$$\begin{aligned} \frac{-4\pi}{3} \left[ \sqrt{(16-r^2)^3} \right]_0^4 &= \frac{-4\pi}{3} \left[ \sqrt{(16-4^2)^3} - \sqrt{(16-0^2)^3} \right] = \frac{-4\pi}{3} (-\sqrt{(4^2)^3}) = \\ \frac{-4\pi}{3} (-4^3) &= \frac{256\pi}{3} \end{aligned}$$

$$u = 16 - r^2 \Rightarrow \frac{-du}{2} = r dr$$

### 2.6.5 Aula 5

1. Exercício

$$\iiint_R z \sqrt{x^2 + y^2} dv$$

$$x^2 + y^2 \leq 4, 1 \leq z \leq 5$$

$$x^2 + y^2 = r^2 = 2^2 = 4$$

$$0 \leq r \leq 2, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 1 \leq z \leq 5$$

$$\sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{r^2} = r$$

$$\begin{aligned} \int_0^2 \int_0^{2\pi} \int_1^5 zr^2 dz d\theta dr &= \int_0^2 r^2 dr \int_0^{2\pi} d\theta \int_1^5 z dz = \left[ \frac{r^3}{3} \right]_0^2 [\theta]_0^{2\pi} \left[ \frac{z^2}{2} \right]_1^5 = \\ &\frac{8}{3} 2\pi \frac{1}{2} (5^2 - 1^2) = \frac{8\pi}{3} 24 = 64\pi \end{aligned}$$

### 2.6.6 Aula 6

1. Exercício retirado da página 1023 de ([STEWART, 2002](#))

Calcule a integral abaixo onde  $E$  é a região dada abaixo.

$$\iiint_E \sqrt{x^2 + y^2} dv$$

$$x^2 + y^2 \leq 16, -5 \leq z \leq 4$$

$$x^2 + y^2 = r^2 = 4^2 = 16$$

$$0 \leq r \leq 4, 0 \leq \theta \leq 2\pi, -5 \leq z \leq 4$$

$$\sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{r^2} = r$$


$$\begin{aligned} \int_0^4 \int_0^{2\pi} \int_{-5}^4 r^2 dz d\theta dr &= \int_0^4 r^2 dr \int_0^{2\pi} d\theta \int_{-5}^4 dz = \left[ \frac{r^3}{3} \right]_0^4 [\theta]_0^{2\pi} [z]_{-5}^4 = \frac{64}{3} 2\pi (4 + 5) = \\ &\frac{64}{3} 9 \cdot 2\pi = 384\pi \end{aligned}$$

### 2.6.7 Aula 7

- Exercício retirado da página 1023 de (STEWART, 2002)

Determine o volume da região  $E$  limitada pelos paraboloides  $z = x^2 + y^2$  e  $z = 36 - 3x^2 - 3y^2$ .

Figura 32 – Coordenadas cilíndricas - Aula 07 - Exercício I



$$z = x^2 + y^2 = r^2$$

$$z = 36 - 3x^2 - 3y^2 = 36 - 3(x^2 + y^2) = 36 - 3r^2$$

$$r^2 = 36 - 3r^2 \Rightarrow r^2 + 3r^2 = 36 \Rightarrow 4r^2 = 36 \Rightarrow r^2 = \frac{36}{4} = 9 \Rightarrow r = \sqrt{9} = 3$$

$$0 \leq r \leq 3, 0 \leq \theta \leq 2\pi, r^2 \leq z \leq 36 - 3r^2$$

$$\begin{aligned} \int_0^3 \int_0^{2\pi} \int_{r^2}^{36-3r^2} r \, dz \, d\theta \, dr &= \int_0^3 r \, dr \int_0^{2\pi} d\theta \int_{r^2}^{36-3r^2} dz = \int_0^3 r \, dr \int_0^{2\pi} d\theta [z]_{r^2}^{36-3r^2} = \\ \int_0^3 r \, dr \int_0^{2\pi} d\theta [36 - 3r^2 - r^2] &= \int_0^3 r \, dr = \int_0^3 r (36 - 4r^2) \, dr \int_0^{2\pi} d\theta = \int_0^3 r \, dr = \\ \int_0^3 (36r - 4r^3) \, dr \int_0^{2\pi} d\theta &= \left[ \frac{36r^2}{2} - \frac{4r^4}{4} \right]_0^{2\pi} = 2\pi [18r^2 - r^4]_0^3 = \\ 2\pi (18 \cdot 3^2 - 3^4) &= 2\pi (162 - 81) = 162\pi \end{aligned}$$

### 2.6.8 Aula 8

- Exercício retirado da página 1023 de (STEWART, 2002)


Calcule

$$\iiint_E x^2 \, dv$$

, onde  $E$  é o sólido que está dentro do cilindro  $x^2 + y^2 = 1$ , acima do plano  $z = 0$  e abaixo do cone  $z^2 = 4x^2 + 4y^2$ .

$$x^2 + y^2 = 1 \Rightarrow r^2 = 1 \Rightarrow r = 1$$

Figura 33 – Coordenadas cilíndricas - Aula 08 - Exercício I



$$z^2 = 4x^2 + 4y^2 = 4(x^2 + y^2) = 4r^2 \Rightarrow z = \pm\sqrt{4r^2} = \pm 2r$$

$$0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq z \leq 2r$$

$$x^2 = (r \cos(\theta))^2 = r^2 \cos^2(\theta)$$

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_0^{2\pi} \int_0^{2r} (r^2 \cos^2(\theta)) r \, dz d\theta dr &= \int_0^1 r^3 dr \int_0^{2\pi} \cos^2(\theta) d\theta \int_0^{2r} dz = \\ \int_0^1 r^3 dr \int_0^{2\pi} \cos^2(\theta) d\theta [z]_0^{2r} &= 2 \int_0^1 r^4 dr \int_0^{2\pi} \cos^2(\theta) d\theta = \\ 2 \int_0^1 r^4 dr \int_0^{2\pi} \frac{1 + \cos(2\theta)}{2} d\theta &= \left[ \frac{r^5}{5} \right]_0^{2\pi} (1 + \cos(2\theta)) d\theta = \\ \frac{1}{5} \left( \int_0^{2\pi} d\theta + \int_0^{2\pi} \cos(u) \frac{du}{2} \right) &= \frac{1}{5} \left( \int_0^{2\pi} d\theta + \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \cos(u) du \right) = \\ \frac{1}{5} \left[ \theta + \frac{\sin(u)}{2} \right]_0^{2\pi} &= \frac{1}{5} \left[ \theta + \frac{\sin(2\theta)}{2} \right]_0^{2\pi} = \frac{1}{5} \left[ \theta + \frac{2 \sin(\theta) \cos(\theta)}{2} \right]_0^{2\pi} = \\ \frac{1}{5} [2\pi + \sin(2\pi) \cos(2\pi) - (0 + \sin(0) \cos(0))] &= \frac{2\pi}{5} \end{aligned}$$

$$u = 2\theta \Rightarrow \frac{du}{2} = d\theta$$



## Referências

GRINGS, F. *Curso de Integrais Duplas e Triplos*. [S.l.], 2016. Disponível em: <<https://www.youtube.com/playlist?list=PL82B9E5FF3F2B3BD3>>. Citado na página 13.

ROGAWSKI, J. *Cálculo Vol.II*. [S.l.]: Bookman, 2009. Acesso em: 02 sep 2016. Citado na página 43.

STEWART, J. *Cálculo Vol.II*. 4. ed. [S.l.]: Pioneira Thomson Learning Ltda, 2002. Acesso em: 02 sep 2016. Citado 4 vezes nas páginas 44, 45, 49 e 50.



## Anexos



# ANEXO A – Derivadas

## A.1 Derivadas simples

Tabela 1 – Derivadas simples

$y = c$	$\Rightarrow y' = 0$
$y = x$	$\Rightarrow y' = 1$
$y = x^c$	$\Rightarrow y' = cx^{c-1}$
$y = e^x$	$\Rightarrow y' = e^x$
$y = \ln x $	$\Rightarrow y' = \frac{1}{x}$
$y = uv$	$\Rightarrow y' = u'v + uv'$
$y = \frac{u}{v}$	$\Rightarrow y' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$
$y = u^c$	$\Rightarrow y' = cu^{c-1}u'$
$y = e^u$	$\Rightarrow y' = e^u u'$
$y = c^u$	$\Rightarrow y' = c^u u' \ln c $
$y = \ln u $	$\Rightarrow y' = \frac{u'}{u}$
$y = \log_c u $	$\Rightarrow y' = \frac{1}{u} \log_c e $

## A.2 Derivadas trigonométricas

Tabela 2 – Derivadas trigonométricas

$y = \sin(x)$	$\Rightarrow y' = \cos(x)$
$y = \cos(x)$	$\Rightarrow y' = -\sin(x)$
$y = \tg(x)$	$\Rightarrow y' = \sec^2(x)$
$y = \cotg(x)$	$\Rightarrow y' = -\operatorname{cossec}^2(x)$
$y = \sec(x)$	$\Rightarrow y' = \sec(x) \tg(x)$
$y = \operatorname{cossec}(x)$	$\Rightarrow y' = -\operatorname{cossec}(x) \cotg(x)$
$y = \arcsen(x)$	$\Rightarrow y' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$y = \arccos(x)$	$\Rightarrow y' = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$
$y = \arctg(x)$	$\Rightarrow y' = \frac{1}{1+x^2}$
$y = \operatorname{arccotg}(x)$	$\Rightarrow y' = \frac{-1}{1+x^2}$
$y = \operatorname{arcsec}(x)$	$\Rightarrow y' = \frac{1}{ x \sqrt{x^2-1}}$
$y = \operatorname{arccossec}(x)$	$\Rightarrow y' = \frac{-1}{ x \sqrt{x^2-1}}$



# ANEXO B – Integrais

## B.1 Integrais simples

Tabela 3 – Integrais simples

$\int dx$	$=$	$x + c$
$\int x^p dx$	$=$	$\frac{x^{p+1}}{p+1} + c \rightarrow p \neq -1$
$\int e^x dx$	$=$	$e^x + c$
$\int \frac{dx}{x}$	$=$	$\ln x  + c$
$\int u^p du$	$=$	$\frac{u^{p+1}}{p+1} + c \rightarrow p \neq -1$
$\int e^u du$	$=$	$e^u + c$
$\int \frac{du}{u}$	$=$	$\ln u  + c$
$\int p^u du$	$=$	$\frac{p^u}{\ln p } + c$


## B.2 Integrais trigonométricas

Tabela 4 – Integrais trigonométricas

$\int \sin(u)du$	$= -\cos(u) + c$
$\int \cos(u)du$	$= \sin(u) + c$
$\int \operatorname{tg}(u)du$	$= \ln  \sec(u)  + c$
$\int \operatorname{cotg}(u)du$	$= \ln  \sin(u)  + c$
$\int \sec(u)du$	$= \ln  \sec(u) + \operatorname{tg}(u)  + c$
$\int \operatorname{cossec}(u)du$	$= \ln  \operatorname{cossec}(u) - \operatorname{cotg}(u)  + c$
$\int \sec^2(u)du$	$= \operatorname{tg}(u) + c$
$\int \operatorname{cossec}^2(u)du$	$= -\operatorname{cotg}(u) + c$
$\int \sec(u) \operatorname{tg}(u)du$	$= \sec(u) + c$
$\int \operatorname{cossec}(u) \operatorname{cotg}(u)du$	$= -\operatorname{cossec}(u) + c$
$\int \frac{du}{\sqrt{1-x^2}}$	$= \operatorname{arcsen}(x) + c$
$-\int \frac{du}{\sqrt{1-x^2}}$	$= \arccos(x) + c$
$\int \frac{du}{1+x^2}$	$= \operatorname{arctg}(x) + c$
$-\int \frac{du}{1+x^2}$	$= \operatorname{arccotg}(x) + c$
$\int \frac{du}{ x \sqrt{x^2-1}}$	$= \operatorname{arcsec}(x) + c$
$-\int \frac{du}{ x \sqrt{x^2-1}}$	$= \operatorname{arccossec}(x) + c$

## B.3 Coordenadas polares

Figura 34 – Coordenadas polares



$$r \in [0, \infty), \theta \in [0, 2\pi]$$

Tabela 5 – Transformação de coordenadas cartesianas em polares

$$\begin{array}{lcl} y & = & r \sin(\theta) \\ x & = & r \cos(\theta) \end{array}$$


Tabela 6 – Coordenadas polares a partir das suas correspondentes cartesianas

$$\begin{array}{lcl} r^2 & = & x^2 + y^2 \\ \theta & = & \arcsen\left(\frac{y}{r}\right) \\ \theta & = & \arccos\left(\frac{x}{r}\right) \\ \theta & = & \arctg\left(\frac{y}{x}\right) \end{array}$$

$$\iint_R z \, da = \iint_R f(x, y) \, dx \, dy = \iint_R f(r \cos(\theta), r \sin(\theta)) r \, dr \, d\theta$$

## B.4 Coordenadas cilíndricas

Figura 35 – Coordenadas cilíndricas



$$r \in [0, \infty), \theta \in [0, 2\pi]$$

Tabela 7 – Transformação de coordenadas cartesianas em cilíndricas

$$\left| \begin{array}{lcl} x & = & r \cos(\theta) \\ y & = & r \sin(\theta) \\ z & = & z \end{array} \right|$$


Tabela 8 – Coordenadas cilíndricas a partir das suas correspondentes cartesianas

$$\left| \begin{array}{lcl} r^2 & = & x^2 + y^2 \\ \theta & = & \arctg\left(\frac{y}{x}\right) \end{array} \right|$$

$$\iiint_R f(x, y, z) dv = \iiint_R f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_R f(r \cos(\theta), r \sin(\theta), z) r dr d\theta dz$$

## B.5 Coordenadas esféricas

Figura 36 – Coordenadas esféricas



$$r \in [0, \infty), \theta \in [0, 2\pi], \varphi \in [0, \pi]$$

Tabela 9 – Transformação de coordenadas cartesianas em esféricas

$$\left| \begin{array}{lcl} x & = & r \sin(\varphi) \cos(\theta) \\ y & = & r \sin(\varphi) \sin(\theta) \\ z & = & r \cos(\varphi) \end{array} \right|$$

Tabela 10 – Coordenadas esféricas a partir das suas correspondentes cartesianas

$$\left| \begin{array}{lcl} r^2 & = & x^2 + y^2 + z^2 \\ \theta & = & \arctg \left( \frac{y}{x} \right) \\ \varphi & = & \arctg \left( \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{z} \right) \end{array} \right|$$


$$\begin{aligned} \iiint_R f(x, y, z) dv &= \iiint_R f(x, y, z) dx dy dz = \\ \iiint_R f(r \sin(\varphi) \cos(\theta), r \sin(\varphi) \sin(\theta), r \cos(\varphi)) r^2 \sin(\varphi) dr d\varphi d\theta \end{aligned}$$



# ANEXO C – Funções trigonométricas


## C.1 Determinação do seno, cosseno e tangente

Figura 37 – Determinação do seno, cosseno e tangente



## C.2 Círculo trigonométrico

Figura 38 – Círculo trigonométrico



### C.3 Identidades trigonométricas

Tabela 11 – Identidades trigonométricas

$\operatorname{tg}(x)$	$=$	$\frac{\operatorname{sen}(x)}{\cos(x)}$
$\operatorname{cotg}(x)$	$=$	$\frac{\cos(x)}{\operatorname{sen}(x)}$
$\sec(x)$	$=$	$\frac{1}{\cos(x)}$
$\operatorname{cossec}(x)$	$=$	$\frac{1}{\operatorname{sen}(x)}$
$\operatorname{sen}^2(x) + \cos^2(x)$	$=$	1
$\sec^2(x) - \operatorname{tg}^2(x)$	$=$	1
$\operatorname{cossec}^2(x) - \operatorname{cotg}^2(x)$	$=$	1
$\operatorname{sen}^2(x)$	$=$	$\frac{1 - \cos(2x)}{2}$
$\cos^2(x)$	$=$	$\frac{1 + \cos(2x)}{2}$
$\operatorname{sen}(2x)$	$=$	$2 \operatorname{sen}(x) \cos(x)$
$\cos(2x)$	$=$	$\cos^2(x) - \operatorname{sen}^2(x)$

### C.4 Relação entre trigonométricas e inversas

Tabela 12 – Relação entre trigonométricas e inversas

$\operatorname{sen}(\theta)$	$=$	$x$	$\Rightarrow$	$\theta$	$=$	$\operatorname{arcsen}(x)$
$\cos(\theta)$	$=$	$x$	$\Rightarrow$	$\theta$	$=$	$\operatorname{arccos}(x)$
$\operatorname{tg}(\theta)$	$=$	$x$	$\Rightarrow$	$\theta$	$=$	$\operatorname{arctg}(x)$
$\operatorname{cossec}(\theta)$	$=$	$x$	$\Rightarrow$	$\theta$	$=$	$\operatorname{arccossec}(x)$
$\sec(\theta)$	$=$	$x$	$\Rightarrow$	$\theta$	$=$	$\operatorname{arcsec}(x)$
$\operatorname{cotg}(\theta)$	$=$	$x$	$\Rightarrow$	$\theta$	$=$	$\operatorname{arccotg}(x)$

### C.5 Substituição trigonométrica

Tabela 13 – Substituição trigonométrica

$\sqrt{a^2 - x^2}$	$\Rightarrow$	$x = a \operatorname{sen}(\theta)$
$\sqrt{a^2 + x^2}$	$\Rightarrow$	$x = a \operatorname{tg}(\theta)$
$\sqrt{x^2 - a^2}$	$\Rightarrow$	$x = a \sec(\theta)$

## C.6 Ângulos notáveis

Tabela 14 – Ângulos notáveis

ângulo	$0^\circ (0)$	$30^\circ \left(\frac{\pi}{6}\right)$	$45^\circ \left(\frac{\pi}{4}\right)$	$60^\circ \left(\frac{\pi}{3}\right)$	$90^\circ \left(\frac{\pi}{2}\right)$
sen	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
cos	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
tg	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	$\nexists$