## Álgebra y Geometría Analítica

- 1. Hallar las ecuaciones de la recta en su forma simétrica, paramétrica vectorial y paramétrica escalar para los siguientes elementos geométricos dados:
  - a) Los puntos  $P_1 = (-1, 3)$  y S = (2, 5)
  - b) El punto  $P_2 = (-1, 4)$  y su dirección paralela al vector  $\vec{d} = (4, -1)$
- 2. Hallar las ecuaciones de la recta en su forma simétrica, paramétrica vectorial y paramétrica escalar para los siguientes elementos geométricos dados:
  - a) Los puntos  $P_1 = (-3, 2, 1)$  y  $P_2 = (1, 5, 4)$
  - b) Los puntos  $Q_1 = (1, 1, 0)$  y  $Q_2 = (1, -3, 2)$
  - c) El punto  $P_2 = (1,4,2)$  y su dirección paralela al vector  $\vec{d} = (-2,2,3)$
  - d) El punto  $A_1 = (3, -2, 1)$  y el vector director  $\vec{s} = (5, 0, 2)$
  - e) El punto  $B_1=(3,2,4)$  y con dirección perpendicular al vector  $\vec{d}=\check{i}+2\check{j}+\check{k}$
- 3. Haciendo uso de GeoGebra resuelva los puntos 1) y 2) anteriores.
- 4. Encontrar puntos que pertenezcan a las siguientes rectas:

a) 
$$(x, y, z) = (1, -3, 2) + k(1, 1, 4)$$

b) 
$$\begin{cases} x = 1 + 2k \\ y = -2 + 3k \\ z = 4 + 2k \end{cases}$$

c) 
$$\frac{x+1}{3} = y + 1 = z$$

d) 
$$\frac{x+2}{4} = y - 2 = z + 3$$

5. Dados los siguientes puntos P = (1, -1, 2) y Q = (0, 2, 3). ¿A cuál o cuáles de las siguientes rectas pertenecen?

a) 
$$(x, y, z) = (2, 3, 4) + k(1, -4, 2)$$

b) 
$$\begin{cases} x = 1 + k \\ y = 4 - 2k \\ z = 3 + k \end{cases}$$

c) 
$$\frac{x+1}{2} = \frac{y+3}{4} = \frac{z-1}{2}$$

- 6. Haciendo uso de GeoGebra resuelva el punto 5).
- 7. Hallar la ecuación normal y general del plano dados los siguientes elementos:
  - a) El punto  $P_1 = (1, 1, 3)$  y el vector normal  $\vec{n} = (-1, 4, 3)$

- b) El punto  $P_2 = (-1, 4, 5)$  y el vector normal  $\vec{n} = 2\dot{i} + \dot{j}$
- 8. Encontrar la ecuación paramétrica vectorial y escalar del plano que pasa por tres puntos:
  - a)  $P_1 = (1, 1, 2), P_2 = (5, 4, 3) \text{ y } P_3 = (4, 2, 1)$
- 9. Encontrar la ecuación normal del plano a partir de los puntos  $P_1 = (1, 1, 2), P_2 = (-1, 0, 5)$  $P_3 = (2, 6, -1)$
- 10. Dados los siguientes puntos P = (1, -1, 2) y Q = (3, 2, 5). ¿A cuál o cuáles de los siguientes planos pertenecen?
  - a) (x-2, y+3, z-1) \* (1, 4, 2) = 0
  - b) 2x 3y + 5z = 2
  - c) x + 3y = 0
- 11. Dados los siguientes planos encontrar puntos que pertenezcan a ellos:
  - a) 2x + y 5z = 4
  - b) -y + z = 2
  - c) x + 3z = 0
  - d) (x-1, y+3, z-2) \* (-1, 0, 5) = 0
- 12. Dado el plano -x + y = 0 y la recta (x, y, z) = (1, -1, 0) + k(2, 1, 3) indicar si son:
  - a) Paralelos
  - b) Perpendiculares
  - c) Ni paralelos ni perpendiculares
- 13. Dados los siguientes planos 2x + 3y z = 1 y 4z = -1, indicar si son:
  - a) Paralelos
  - b) Perpendiculares
  - c) Ni paralelos ni perpendiculares
- 14. Dados los siguientes planos encontrar el ángulo entre ellos:

a) 
$$\begin{cases} \pi \colon x - y + 2z = 2\\ \alpha \colon -x - 2y + 3z = 1 \end{cases}$$
b) 
$$\begin{cases} \pi \colon x + 2y = 0\\ \alpha \colon -3y + 4z = 0 \end{cases}$$

b) 
$$\begin{cases} \pi \colon x + 2y = 0 \\ \alpha \colon -3y + 4z = 0 \end{cases}$$

c) 
$$\begin{cases} \pi \colon x = 0 \\ \alpha \colon y - 2z = 1 \end{cases}$$

15. Dadas las siguientes rectas encontrar el ángulo entre ellas:

a) 
$$\begin{cases} (x, y, z) = (1, -1, 3) + k(2, 0, -1) \\ \frac{x+3}{2} = y = \frac{z-1}{5} \end{cases}$$

b) 
$$\begin{cases} \begin{cases} x = 1 + 3k \\ y = k \\ z = 2 + 2k \end{cases} \\ \frac{x-1}{2} = 2y = z + 1 \end{cases}$$

16. Dados los siguientes planos y rectas encontrar el ángulo entre ellos:

a) 
$$\begin{cases} -2x + y - z = 2\\ (x, y, z) = (1, 1, 5) + k(1, 3, 1) \end{cases}$$
b) 
$$\begin{cases} x - 2y + 3z = 0\\ x + 1 = \frac{y - 3}{8} = z \end{cases}$$

- 17. Encontrar la distancia del punto P=(2,5,3) al plano -2x+y+3z=0
- 18. Encontrar la distancia entre la recta (x, y, z) = (1, 1, 5) + k(-2, 1, 3) y el punto P = (4, 3, 2)
- 19. Encontrar las distancias entre los siguientes entes geométricos:
  - a) El plano -3x + 2y + z = 1 y la recta (x, y, z) = (1, -5, 1) + k(2, 2, 2)
  - b) El plano -x + 2y z = 4 y el plano -2x + 4y 2z = 0
  - c) La recta (x, y, z) = (3, -2, 1) + k(2, 1, 3) y la recta  $\frac{x-2}{4} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{6}$
  - d) El plano -2x + y = 0 y el plano -4x + 3y = 1
- 20. Debate con tus compañeros sobre la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones. Para que tu respuesta sea válida debes justificarla adecuadamente, por lo cual puedes emplear definiciones, ejemplos, gráficos, cálculos, etc.
  - a) El vector director de una recta (de  $\mathbb{R}^2$  o  $\mathbb{R}^3$ ) que pasa por dos puntos conocidos A y B, puede hallarse como A-B.
  - b) Si (x, y, z) = (1, x + 2, -y) entonces x = 1, y = 3 y z = -3
  - c) El punto P = (5, 3, 1) no pertenece a la recta (x, y, z) = (3, 1, -2) + k(2, 1, 3)
  - d) Las rectas y = 3x 2 y (x, y) = (1, 2) + k(-1, 3) son paralelas.
  - e) Las rectas  $\frac{(x-1)}{3} = \frac{(y-1)}{2} = \frac{(z-1)}{1}$  y (x, y, z) = (1, 1, 1) + k(-1, 0, 3) son perpendiculares.
  - f) Siempre puede escribirse la ecuación simétrica de la recta (en  $\mathbb{R}^2$  o  $\mathbb{R}^3$  ).
  - g) La recta  $\frac{(x+3)}{3} = \frac{(y-2)}{2} = \frac{(z-1)}{1}$  corta al plano yz en el punto (0,2,4), al plano xz en (-6,0,0) y al plano xy en (0,0,1).
  - h) Un plano queda completamente determinado por dos de sus puntos y un vector paralelo a él.
  - i) Un plano queda completamente determinado por tres cualesquiera de sus puntos.
  - j) Un plano queda completamente determinado por uno de sus puntos y un vector perpendicular a él.
  - k) Si nos dan las ecuaciones de dos rectas que se cortan, podemos hallar sin inconvenientes la ecuación del plano que determinan.
  - 1) Si nos dan las ecuaciones de dos rectas paralelas, tenemos elementos suficientes como para hallar las ecuaciones del plano que determinan.

- m) Si nos dan las ecuaciones de dos rectas cualesquiera en el espacio, podemos hallar sin inconvenientes la ecuación del plano que determinan.
- n) Un plano es paralelo a una recta cuando cualquier vector normal al plano es paralelo al vector director de la recta.
- o) Dos planos paralelos tienen vectores normales que son uno múltiplo escalar del otro.
- p) Dos planos perpendiculares tienen vectores normales paralelos.
- q) Una recta es perpendicular a un plano cuando su vector director es paralelo al plano.
- r) Si una recta es perpendicular a un plano, entonces cualquier vector paralelo a la recta es perpendicular a cualquier vector paralelo al plano.
- s) Dos vectores no colineales determinan una familia de planos.
- t) Dos vectores cualesquiera determinan una familia de planos.
- u) El ángulo entre dos rectas puede calcularse mediante el ángulo entre los vectores directores de las rectas.