

OPERAÇÕES BINÁRIAS E APLICAÇÕES

um resumo

Guilherme Philippi

15 de fevereiro de 2021

Apresenta-se nesse texto um compilado de definições e resultados envolvendo os conceitos de operações binárias e algumas de suas aplica. Tudo que aqui se apresenta fora extraído de [1, 2, 3], principalmente de [1].

1 Operações binárias

Definição 1.1 (Operação binária). Uma *operação binária* sobre um conjunto S é uma função $\ast : S \times S \longrightarrow S$.

Exemplo 1.1 (Produto sobre \mathbb{R}). Seja a função $\cdot : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ tal que $\cdot(x, y) = x \cdot y$, isto é, associa-se a cada par (x, y) de números reais o respectivo produto $x \cdot y$. A função \cdot é a operação binária conhecida como *produto sobre \mathbb{R}* .

Exemplo 1.2 (Composição de funções). O mapa $\circ : \mathcal{F}_{\mathbb{R}} \times \mathcal{F}_{\mathbb{R}} \longrightarrow \mathcal{F}_{\mathbb{R}}$, em que $\mathcal{F}_{\mathbb{R}}$ representa o *conjunto das funções de \mathbb{R} em \mathbb{R}* , é a operação definida pela *composição de funções* $\circ(f, g) = f \circ g$ sobre $\mathcal{F}_{\mathbb{R}}$.

Observação 1.1 (Notação de operação). Usaremos a notação $\ast(a, b) = a \ast b$, para simplificar a escrita de propriedades. Também, quando não houver ambiguidade, suprimiremos o símbolo da operação, fazendo $a \ast b = ab$.

Exemplo 1.3 (Adição sobre \mathbb{R}). A função $+: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ definida pela soma $x + y$ é a operação de *adição sobre \mathbb{R}* .

Definição 1.2. Para $a, b, c \in S$, uma operação binária \ast é dita

- *Associativa*, se $(a \ast b) \ast c = a \ast (b \ast c)$;
- *Comutativa*, se $a \ast b = b \ast a$.

Exemplo 1.4 (Multiplicação matricial). Seja $\mathbb{R}^{n \times n}$ o *conjunto das matrizes reais quadradas de ordem n* . A operação $\times : \mathbb{R}^{n \times n} \times \mathbb{R}^{n \times n} \longrightarrow \mathbb{R}^{n \times n}$ é o *produto matricial* $\times(M, N) = M \times N$ sobre $\mathbb{R}^{n \times n}$. Sabe-se que essa operação é associativa, visto que $(XY)Z = X(YZ)$, $\forall X, Y, Z \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Porém, como

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 23 & 34 \\ 31 & 46 \end{pmatrix},$$

segue que \times não pode ser comutativa.

Exemplo 1.5 (Potência em \mathbb{N}). Seja $f(x, y) = x^y$ a operação de *potenciação* sobre \mathbb{N} . f não é nem associativa,

$$\text{pois } 2^{(3^4)} = 2^{81} \neq (2^3)^4 = 2^{12},$$

nem comutativa,

$$\text{pois } 2^3 = 8 \neq 3^2 = 9.$$

Exemplo 1.6 (Adição). As adições sobre $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ ou \mathbb{C} são operações tanto associativas quanto comutativas. Deixa-se ao leitor mostrar que isso é verdade.

Proposição 1.1. *Seja uma operação associativa dada sobre o conjunto S . Há uma única forma de definir, para todo inteiro n , um produto de n elementos $a_1, \dots, a_n \in S$ (diremos $[a_1 \cdots a_n]$) com as seguintes propriedades:*

1. o produto $[a_1]$ de um elemento é o próprio elemento;
2. o produto $[a_1 a_2]$ de dois elementos é dado pela operação binária;
3. para todo inteiro $1 \leq i \leq n$, $[a_1 \cdots a_n] = [a_1 \cdots a_i][a_{i+1} \cdots a_n]$.

Demonstração. A demonstração dessa proposição é feita por indução em n . □

Definição 1.3 (Elemento neutro à esquerda e à direita). Dizemos que $e \in S$ é um *elemento neutro à direita* para uma operação binária $*$ se $e * a = a$ para todo $a \in S$. Caso $a * e = a$ para todo $a \in S$, diremos que e é um *elemento neutro à esquerda* para a operação binária $*$.

Exemplo 1.7. 0 é o elemento neutro à direita e à esquerda da adição nos naturais, visto que para todo $a \in \mathbb{N}$ $a + 0 = a$ e $0 + a = a$.

Definição 1.4 (Elemento neutro). Dizemos que $e \in S$ é um *elemento neutro* para uma operação binária (ou, também, uma *identidade*) se $ea = ae = a$ para todo $a \in S$.

Proposição 1.2. *O elemento identidade é único.*

Demonstração. Se e, e' são identidades, já que e é identidade, então $ee' = e'$ e, como e' é uma identidade, $ee' = e$. Logo $e = e'$, isto é, a identidade é única. □

Exemplo 1.8. Seja a matriz

$$I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Esta matriz é o elemento neutro da operação de multiplicação matricial sobre $\mathbb{R}^{2 \times 2}$.

Observação 1.2. Usaremos $\vec{1}$ para representar a identidade multiplicativa e $\vec{0}$ para denotar a aditiva.

Definição 1.5 (Elemento oposto). Seja uma operação binária que possua uma identidade. Um elemento $a \in S$ é chamado *invertível* se há um outro elemento $b \in S$ tal que $ab = ba = 1$. Desde que b exista, ela é única e a denotaremos por a^{-1} e a chamaremos *inversa de a* (ou *elemento oposto de a*).

Exemplo 1.9. Em \mathbb{R} , 3 é um elemento invertível para a multiplicação, pois

$$\frac{1}{3} \cdot 3 = \vec{1} = 3 \cdot \frac{1}{3}.$$

Porém, 0 não é invertível para essa operação, visto que não existe $n \in \mathbb{R}$ tal que $0 \cdot n = \vec{1} = 1$.

Proposição 1.3. Se $a, b \in S$ possuem inversa, então a inversa da composição $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$.

Exemplo 1.10. Sejam as funções $f, g \in \mathcal{F}_{\mathbb{R}}$ tal que $f(x) = 3x - 1$ e $g(x) = \frac{x}{3} + 2$. Como ambas as funções são bijetoras, segue que possuem inversas para a composição de funções dadas por $f^{-1}(x) = \frac{x+1}{3}$ e $g^{-1}(x) = 3x - 6$. Da proposição 1.3,

$$(f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1} = g^{-1}(f^{-1}(x)) = g^{-1}\left(\frac{x+1}{3}\right) = 3\frac{x+1}{3} - 6 = x - 5.$$

Observação 1.3 (Notação de potências). Usaremos as seguintes notações:

- $a^n = a^{n-1}a$ é a operação de $a \cdots a$ n vezes;
- a^{-n} é a inversa de a^n ;
- $a^0 = \vec{1}$.

Com isso, tem-se que $a^{r+s} = a^r a^s$ e $(a^r)^s = a^{rs}$. (Isso não induz uma notação de fração $\frac{b}{a}$ a menos que seja uma operação comutativa, visto que ba^{-1} pode ser diferente de $a^{-1}b$). Para falar de uma operação aditiva, usaremos $-a$ no lugar de a^{-1} e na no lugar de a^n .

Definição 1.6 (Elemento regular à direita e à esquerda). Dizemos que $e \in S$ é um *elemento regular à direita para uma operação binária $*$* se, para todo $x, y \in S$, $e * x = e * y \implies x = y$. Caso $x * e = y * e \implies x = y$ para todo $x, y \in S$, diremos que e é um *elemento regular à esquerda para a operação binária $*$* .

Exemplo 1.11. 3 é regular à direita e à esquerda da adição nos naturais, visto que para todo $x, y \in \mathbb{N}$, $3 + x = 3 + y \implies x = y$ e $x + 3 = y + 3 \implies x = y$.

Definição 1.7 (Elemento regular). Dizemos que $e \in S$ é um *elemento regular para uma operação binária* se for regular tanto à esquerda quanto à direita.

Exemplo 1.12. A matriz $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ é

Referências

- [1] John B Fraleigh. *A First Course in Abstract Algebra*. Pearson, 2014.
- [2] Michael Artin. *Algebra*. A Simon and Schuster Company, 1991.
- [3] Rudolf R. Maier. *Algebra I (texto de aula)*. UFSC, 2005.