TRUNG TÂM TIÊM CHỦNG
TÂM TRÍ
Tận tâm đồng hành cùng bạn

TRUNG TÂM TIÊM CHỦNG TÂM TRÍ
TAM TRI VACCINATION CENTER

SỔ TIÊM CHỦNG



Website: tamtrihealthcare.vn

TRUNG TÂM TIÊM CHỦNG
TÂM TRÍ
Tận tâm đồng hành cùng bạn

TRUNG TÂM TIÊM CHỦNG TÂM TRÍ

TAM TRI VACCINATION CENTER

Tiêm vắc xin đã khẳng định vai trò không thể thay thế trong công tác phòng bệnh trên toàn thế giới. Vắc xin là chế phẩm sinh học, vì thế bên cạnh tác dụng chính, nó cũng có những tác dụng không mong muốn khác. Việc tìm hiểu kiến thức liên quan đến vắc xin và tiêm chủng là hết sức cần thiết, người cần tiêm chủng hoặc cha mẹ của trẻ cần được tiêm chủng nên dành thời gian để đọc, hiểu các thông tin cần thiết này nhằm hiểu được giá trị to lớn của vắc xin và tiêm chủng cũng như biết cách xử trí kịp thời những phản ứng do tiêm vắc xin có thể xảy ra.

SỔ TIÊM CHỦNG

THÔNG TIN CHUNG:

1. Họ tên bé (viết in hoa):----------
2. Giới tính: Nam ☐ Nữ ☐ Ngày sinh:------/------/------
3. Họ tên bố/mẹ:----------
4. Số điện thoại liên hệ:----------

THÔNG TIN Y TẾ:

1. Nơi sinh:----------
2. Tuổi khai sinh:----------
3. Đẻ thường ☐ Hình thức khác ☐
4. Cân nặng:----------kg Chiều cao:----------cm
5. Các bất thường khác (nếu có):----------

VÌ SAO NÊN LỰA CHỌN TRUNG TÂM TIÊM CHỦNG TÂM TRÍ?

Làm mẹ là một hành trình bắt đầu từ rất sớm, từ những ngày chuẩn bị mang thai, suốt 9 tháng thai kỳ, đến khoảnh khắc con chào đời và từng bước lớn khôn.
Trên hành trình ấy, tiêm chủng là một phần quan trọng của chăm sóc sức khỏe chủ động, giúp mẹ và bé có thêm sự bảo vệ trước nhiều bệnh truyền nhiễm có thể phòng ngừa bằng vắc xin. Thấu hiểu điều đó, Trung tâm Tiêm chủng Tâm Trí được xây dựng với định hướng trở thành nơi đồng hành cùng mẹ, bé và cả gia đình trong hành trình chủ động phòng bệnh.

VÌ CHÚNG TỐI QUAN TÂM TỚI MẸ TRƯỚC VÀ TRONG THAI KỲ

Tiêm chủng không chỉ dành cho trẻ nhỏ.
Phụ nữ chuẩn bị mang thai và phụ nữ mang thai có những nhu cầu tiêm chủng riêng theo từng giai đoạn. Tại Tâm Trí, khách hàng được tư vấn để chủ động chuẩn bị kiến thức và kế hoạch tiêm chủng phù hợp, góp phần bảo vệ sức khỏe của mẹ và thai nhi.

BÉ TRONG NHỮNG NĂM THÁNG ĐẦU ĐỜI

Những năm tháng đầu đời là giai đoạn trẻ cần được chăm sóc và bảo vệ đặc biệt.
Tâm Trí đồng hành cùng ba mẹ trong việc theo dõi lịch tiêm, tư vấn phác đồ và thực hiện tiêm chủng cho trẻ theo từng độ tuổi, để hành trình lớn khôn của con được chăm sóc một cách chủ động và khoa học.

VÌ SAO NÊN LỰA CHỌN TRUNG TÂM TIÊM CHỦNG TÂM TRÍ?

CẢ GIA ĐÌNH

Không chỉ mẹ và bé, người thân trong gia đình cũng cần được chủ động bảo vệ sức khỏe.
Tâm Trí cung cấp dịch vụ tiêm chủng cho trẻ em và người lớn, trong đó chú trọng các nhóm có nhu cầu tiêm chủng đặc biệt như phụ nữ chuẩn bị mang thai, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh mạn tính và những người có nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm.

VÌ TÂM TRÍ HIỂU RẰNG

Đằng sau một mũi tiêm của em bé là sự lo lắng của ba mẹ.
Đằng sau một mũi tiêm của mẹ bầu là mong muốn bảo vệ cả mẹ và con.
Và đằng sau mỗi quyết định tiêm chủng của gia đình là mong muốn được chủ động phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe tốt hơn mỗi ngày.
Vì vậy, Tâm Trí chú trọng từng trải nghiệm của khách hàng:

- Vắc xin đa dạng cho trẻ em, phụ nữ và người lớn, phù hợp từng độ tuổi và nhu cầu tiêm chủng.
- 100% khách hàng được bác sĩ khám sàng lọc trước tiêm, tư vấn phù hợp với tình trạng sức khỏe.
- Đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế chuyên môn, tận tâm, đồng hành cùng mẹ và bé trong từng mũi tiêm.
- Không gian hiện đại, sạch sẽ, thoáng mát, thân thiện và thuận tiện cho trẻ nhỏ, mẹ bầu và gia đình.
- Hệ thống bảo quản vắc xin đạt yêu cầu, được kiểm soát chặt chẽ trong quá trình lưu trữ.
- Tư vấn lịch tiêm và phác đồ tiêm chủng, giúp ba mẹ chủ động theo dõi và chăm sóc sức khỏe cho con.
- Chủ động nguồn vắc xin, đáp ứng nhu cầu tiêm chủng theo phác đồ.

KHÁM SÀNG LỌC
trước tiêm chủng
NHỮNG THÔNG TIN CẦN BIẾT



1. TẠI SAO CẦN KHÁM SÀNG LỌC TRƯỚC KHI TIÊM CHỦNG?

+ Khám sàng lọc trước khi tiêm chủng vắc xin là việc rất cần thiết nhằm phát hiện những bất thường cần lưu ý để chỉ định tiêm, tạm hoãn hay không được tiêm một loại vắc xin nào đó đối với người được tiêm chủng
+ Vì vậy, người đi tiêm chủng và bác sĩ cần trao đổi thông tin đầy đủ để bảo đảm việc tiêm chủng là đúng thời điểm, hiệu quả và an toàn.
+ Kết quả khám sàng lọc trước tiêm chủng được căn cứ trên những thông tin mà người đi tiêm chủng cung cấp cho bác sĩ và những dấu hiệu bác sĩ phát hiện sau khi thăm khám.
+ Nếu người được tiêm là trẻ em thì cần được cung cấp thông tin từ cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.

2. NHỮNG THÔNG TIN CẦN THÔNG BÁO CHO BÁC SĨ LÀ GÌ?

Với trẻ em, bố mẹ hoặc người giám sát trẻ cần thông báo cho bác sĩ các vấn đề về sức khỏe và lịch sử tiêm chủng như:

Trẻ đã đủ cân nặng 2 kg chưa? (đối với trẻ sơ sinh)

Trẻ có bú (ăn), uống, ngủ, chơi bình thường trong những ngày gần đây hay không?

Trẻ có đang sốt hay mắc bệnh gì không?

Trẻ có bệnh lý bẩm sinh hoặc mắc phải bệnh nào khiến trẻ phải nhập viện điều trị từ khi sinh đến nay không?

Trẻ có đang dùng thuốc hoặc sử dụng phương pháp điều trị nào trong 3 tháng qua không?

Trẻ có tiêm chủng vắc xin nào trong vòng 4 tuần gần đây không?

Trẻ có tiền sử dị ứng với thuốc hay thức ăn nào không?

+ Trẻ có tiền sử dị ứng với vắc xin hoặc có phản ứng nặng ở các lần tiêm trước hay không?

+ **Với người lớn** cũng cần thông báo cho bác sĩ các vấn đề:
+ Tình trạng sức khỏe hiện tại, các bệnh đã và đang mắc
+ Những loại thuốc - liệu pháp điều trị đã và đang dùng trong vòng 03 tháng gần đây; các loại vắc xin đã tiêm trong vòng 04 tuần gần đây
+ Tiền sử dị ứng, phản ứng của cơ thể với các loại thức ăn, thuốc, vắc xin.

Với phụ nữ, ngoài các thông tin cơ bản như trên, cần thông báo cho bác sĩ biết mình đang có thai hoặc đang cho con bú hay không, hoặc thời gian dự định có thai.

BÁC SĨ SẼ KHÁM NHƯ THẾ NÀO?

Việc khám sàng lọc trước tiêm chủng được thực hiện theo đúng quy định nghiêm ngặt của Bộ Y Tế *(Quyết định số 2470/QĐ-BYT ban hành ngày 14/6/2019)*, tập trung vào việc đánh giá tình trạng sức khỏe chung của cơ thể bao gồm:

+ Đo thân nhiệt
+ Đánh giá tri giác
+ Quan sát nhịp thở, nghe phổi
+ Nghe tim
+ Phát hiện các bất thường khác

NHỮNG PHẢN ỨNG THƯỜNG GẶP KHI TIÊM VẮC XIN

Vắc xin là chế phẩm sinh học nên khi sử dụng (tiêm, uống) có thể xảy ra các phản ứng phụ với cơ thể. Phản ứng nhẹ hay nặng tùy thuộc vào nhiều yếu tố như: đáp ứng miễn dịch của cơ thể, thành tố của vắc xin, quy trình vận chuyển, nhiệt độ bảo quản, cách tiêm, chăm sóc sau tiêm (tại cơ sở y tế và tại nhà)... Thông thường hay gặp là các phản ứng nhẹ, không kéo dài và không cần điều trị đặc biệt. Các phản ứng nặng rất hiếm gặp nhưng có thể xảy ra như phản ứng phản vệ, nhiễm độc, co giật do sốt cao. Lúc này, bệnh nhân cần được xử trí tại chỗ đúng cách và đưa đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt.

STT	LOẠI BỆNH	TÊN VẮC XIN PHÒNG BỆNH	ĐỐI TƯỢNG LỊCH TIÊM LIỀU ĐƯỜNG DÙNG	CÁC PHẢN ỨNG SAU TIÊM CHỦNG THƯỜNG GẶP
1	LAO	BCG	**Cho trẻ sơ sinh** + Lịch tiêm 1 mũi duy nhất **Tiêm càng sớm càng tốt trong tháng đầu tiên sau sinh khi trẻ có cân nặng trên 2000 gram.** + Liều dùng: 0,1ml (tương đương 0,05 mg BCG) + Đường dùng: tiêm trong da, mặt ngoài phía trên cánh tay hoặc vai trái.	• Tại chỗ tiêm: đau, sưng, nóng Toàn thân: Trẻ sốt nhẹ, quấy khóc, bú kém, thường hết sau một vài ngày • Thông thường sau khi tiêm BCG, xuất hiện một nốt nhỏ tại chỗ tiêm và biến mất sau 30 phút. Khoảng 2 tuần xuất hiện một vết loét đỏ có kích thước nhỏ, sau 2 tuần vết loét tự lành và để lại sẹo khoảng 5mm • Nếu xuất hiện hạch cổ, hạch nách, hạch dưới xương đòn trái, nốt mủ quá to tại chỗ tiêm (đường kính trên 1cm) cần đến cơ sở y tế khám lại ngay.



“Mỗi cột mốc của mẹ và con đều đáng được chăm sóc bằng sự tận tâm và thấu hiểu.”

BSCKII. Đỗ Văn Tâm

Giám đốc Hệ thống Y tế Tâm Trí

2	Viêm gan B	Có thể là 1 trong 3 tên sau: Engerix B Euvax B Heberbi - Ovac HB	**Cho trẻ từ sơ sinh và người lớn** + Lịch tiêm thông thường 3 mũi - Mũi 1: lần tiêm đầu tiên - Mũi 2: 1 tháng sau mũi một - Mũi 3: 5 tháng sau mũi 2 + Lịch tiêm nhanh 4 mũi - Mũi 1: lần tiêm đầu tiên - Mũi 2: 1 tháng sau mũi một - Mũi 3: 1 tháng sau mũi 2 - Mũi 4: 10 tháng sau mũi 3 Lịch tiêm này dùng trong các vắc xin phối hợp có thành phần vắc xin viêm gan B, trẻ có mẹ nhiễm virus viêm gan B, người mới tiếp xúc với nguồn bệnh, người di trú hoặc không thể tuân thủ phác đồ thông thường. + Liều dùng: **Engerix B** - Trẻ em 0-19 tuổi: 10 mcg/0,5 ml - Người từ 20 tuổi: 20 mcg/1 ml **EuVax B** - Trẻ em 0-15 tuổi: 10 mcg/0,5 ml - Người từ 16 tuổi: 20 mcg/1 ml **Heberbiovac HB** - Trẻ em từ 0-10 tuổi: 10 mcg/0,5 ml - Người trên 10 tuổi: 20 mcg/1 ml	• Tại chỗ tiêm: đau, sưng nhẹ. • Toàn thân: sốt nhẹ, trẻ quấy khóc. • Các triệu chứng thường hết sau vài giờ đến 1 - 2 ngày.
3	Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Bại liệt, Hib, Viêm gan B	Có thể là 1 trong 2 tên sau: Infanrix Hexa Hexaxim (6 trong 1)	**Cho trẻ từ 2 tháng tuổi (có thể tiêm sớm lúc 6 tuần tuổi) đến 24 tháng tuổi** + Lịch tiêm 4 mũi - Mũi 1,2,3: khi trẻ 2,3,4 tháng tuổi hoặc 2,4,6 tháng tuổi. - Mũi 4: khi trẻ 16–18 tháng tuổi. + Liều dùng: 0,5 ml + Đường dùng: tiêm bắp	• Tại chỗ tiêm: sưng đỏ, đau từ 1-3 ngày. Có thể nổi cục cứng, sau khoảng 1-3 tuần sẽ tự khỏi. • Toàn thân: trẻ có thể sốt, quấy khóc, nôn, tiêu chảy, bú kém.
4	Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Bại liệt, Hib	Pentaxim (5 trong 1)	**Cho trẻ từ 2 tháng tuổi đến 24 tháng tuổi** + Lịch tiêm 4 mũi: - Mũi 1,2,3: khi trẻ 2,3,4 tháng tuổi hoặc 2,4,6 tháng tuổi. - Mũi 4: khi trẻ 16 – 18 tháng tuổi. + Liều dùng: 0,5 ml + Đường dùng: tiêm bắp	• Tại chỗ tiêm: nốt quầng đỏ, nốt cứng lớn hơn 2 cm. Các triệu chứng trên thường gặp trong 48 giờ sau khi tiêm và có thể kéo dài 48-72 giờ. • Toàn thân: trẻ có thể sốt, quấy

				• khóc, tiêu chảy, nôn, chán ăn, buồn ngủ, phát ban. • Các mũi tiêm sau: trẻ thường có phản ứng sau tiêm mạnh... • hơn so với những lần tiêm trước do đã có miễn dịch trước đó như sốt nhiều hơn, tại chỗ tiêm có thể đỏ, sưng nhiều hơn hoặc lan ra toàn bộ tay chân bên tiêm, thường tự khỏi trong vòng 3-5 ngày
5	**Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Bại liệt**	**Tetraxim (4 trong 1)**	**Cho trẻ từ 2 tháng đến dưới 7 tuổi:** + Lịch tiêm 5 mũi: - Mũi 1,2,3: khi trẻ 2,3,4 tháng tuổi hoặc 2,4,6 tháng tuổi. - Mũi 4: khi trẻ 16 - 18 tháng tuổi - Mũi 5: từ 4 - 6 tuổi **Nếu trẻ từ 7 tuổi đến 13 tuổi mà chưa tiêm đủ 4 liều cơ bản bạch hầu - ho gà - uốn ván (chọn vắc xin phù hợp với độ tuổi)** + Lịch tiêm 3 liều: - Mũi 1: lần đầu tiên - Mũi 2: một tháng sau mũi 1 - Mũi 3: sáu tháng sau mũi 2 + Liều dùng: 0,5 ml + Đường dùng: tiêm bắp	• Tại chỗ tiêm: đỏ, sưng (có thể hơn 5 cm) hoặc lan ra toàn bộ chi bên tiêm. Xảy ra trong vòng 24 - 72 giờ sau khi tiêm vắc xin và tự khỏi trong vòng 3 - 5 ngày. • Toàn thân: sốt, tiêu chảy, kém ăn, quấy khóc.
6	**Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván**	**Có thể là 1 trong 2 tên sau: Adacel, Boostrix**	**Cho trẻ từ 4 tuổi trở lên và người lớn đã tiêm lịch cơ bản bạch hầu - ho gà - uốn ván:** + Lịch tiêm 1 mũi - Tiêm nhắc 1 mũi mỗi 10 năm hoặc tiêm nhắc theo độ tuổi khuyến cáo **Cho trẻ từ 7 tuổi trở lên và người lớn chưa tiêm đủ lịch cơ bản bạch hầu - ho gà - uốn ván:** + Lịch tiêm 3 mũi: - Mũi 1: Lần tiêm đầu tiên - Mũi 2: Một tháng sau mũi 1 - Mũi 3: Sáu tháng sau mũi 2 - Tiêm nhắc một mũi mỗi 10 năm hoặc tiêm nhắc theo độ tuổi khuyến cáo + Liều dùng: 0,5 ml **Adacel: không tiêm cho người trên 64 tuổi**	• Tại chỗ tiêm: đau, sưng, đỏ. • Toàn thân: sốt, mệt mỏi, đau đầu, rối loạn tiêu hoá.

			Boostrix, Adacel: có thể tiêm cho phụ nữ đang mang thai vào 3 tháng giữa hoặc 3 tháng cuối thai kỳ	
7	**Bạch hầu, Uốn ván**	**TD**	**Cho trẻ từ 7 tuổi trở lên và người lớn đã tiêm lịch cơ bản bạch hầu - uốn ván:** + Lịch tiêm 1 mũi - Tiêm nhắc một mũi mỗi 10 năm hoặc tiêm nhắc theo độ tuổi khuyến cáo. **Cho trẻ từ 7 tuổi trở lên và người lớn chưa tiêm lịch cơ bản bạch hầu - uốn ván:** + Lịch tiêm 3 mũi: - Mũi 1: Lần tiêm đầu tiên - Mũi 2: Một tháng sau mũi 1 - Mũi 3: Sáu tháng sau mũi 2 Tiêm nhắc một mũi mỗi 10 năm hoặc tiêm nhắc theo độ tuổi khuyến cáo + Liều dùng: 0,5 ml + Đường dùng: Tiêm bắp sâu	• Tại chỗ tiêm: đau, quầng đỏ, sưng nhẹ. • Sốt nhẹ 38C - 39C, đau cơ cánh tay, đau đầu. Các triệu chứng nhẹ và thường tự khỏi sau vài ngày.
8	**Viêm màng não, viêm phổi và các bệnh khác do Haemophilus influenzae type b (Hib)**	**Quimi-Hib**	**Trẻ từ 2 tháng tuổi đến dưới 12 tháng tuổi** - Mũi 1: lúc 2 tháng tuổi - Mũi 2: 2 tháng sau mũi một - Mũi 3: 2 tháng sau mũi hai - Một mũi tiêm nhắc khi 15 - 18 tháng cách mũi ba tối thiểu 6 tháng Khi trẻ từ 12 tháng tuổi: tiêm 1 mũi duy nhất **Không tiêm vắc xin này khi trẻ trên 15 tuổi** Liều dùng: 0,5 ml Đường dùng: tiêm bắp	• Tại chỗ tiêm: sưng, đau, đỏ và có thể ngứa tại vị trí tiêm. • Toàn thân: sốt nhẹ, quấy khóc, biếng ăn, buồn nôn, nôn, tiêu chảy. Các triệu chứng thường nhẹ và tự khỏi trong 1 - 3 ngày.
9	**Bệnh tiêu chảy do Rota virus**	**Có thể là 1 trong 3 tên sau: Rotarix, Rotateq, Rotavin M1**	**Rotarix:** cho trẻ từ 6 tuần tuổi đến trước 24 tuần tuổi + Lịch uống 2 liều liên tiếp cách nhau tối thiểu 4 tuần + Liều dùng: 1,5 ml **Rotateq:** cho trẻ từ 7,5 tuần tuổi đến trước 32 tuần tuổi + Liều uống đầu tiên khi trẻ 7,5 - 12 tuần tuổi + Lịch uống 3 liều liên tiếp cách nhau tối thiểu 4 tuần + Liều dùng: 2 ml	• Toàn thân: rối loạn tiêu hóa và thường tự khỏi sau vài ngày. • Nếu đi ngoài phân nước nhiều lần, nôn nhiều, có dấu hiệu mất nước nên khám lại ngay tại cơ sở y tế.
10	**Bệnh do phế cầu (viêm màng**	**Có thể là 1 trong 2 tên sau: Synflorix,**	**Synflorix: Cho trẻ từ 2 tháng tuổi (có thể tiêm sớm lúc 6 tuần tuổi) đến 5 tuổi.** • Lịch tiêm 4 mũi cho trẻ từ 2 - 6 tháng tuổi: - 3 mũi tiêm cơ bản cách nhau tối thiểu 1 tháng - Mũi 4: 6 tháng sau mũi ba (nếu trên 1 tuổi, mũi 4 có thể cách mũi 3 là hai tháng).	• Synflorix: • Tại chỗ tiêm: sưng, đau, đỏ. • Toàn thân: trẻ có thể sốt trên 38OC, ăn uống

	nền/não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa)	Prevenar 13	• Lịch tiêm 3 mũi cho trẻ từ 7 - 11 tháng tuổi: - 2 mũi cơ bản cách nhau ít nhất 1 tháng - Mũi 3: 6 tháng sau mũi 2 (Nếu trên 1 tuổi, mũi 3 có thể cách mũi 2 là hai tháng) • Lịch tiêm 2 mũi cho trẻ từ 1 đến 5 tuổi: - Mũi 1: lần tiêm đầu tiên - Mũi 2: cách mũi 1 ít nhất hai tháng. + Liều dùng: 0,5 ml + Đường dùng: tiêm bắp **Không tiêm vắc xin này khi trẻ trên 5 tuổi** **Prevenar 13: Cho trẻ em từ 2 tháng tuổi (có thể tiêm sớm lúc 6 tuần tuổi) và người lớn** • Trẻ em từ 2 tháng tuổi đến 6 tháng tuổi: - 3 mũi tiêm cơ bản cách nhau tối thiểu 1 tháng	kém, bị kích thích, quấy khóc. Prevenar 13: • Tại chỗ tiêm: ban đỏ, chai cứng, sưng đau, tăng nhạy cảm tại chỗ tiêm. • Toàn thân: sốt, đau đầu, buồn ngủ, giảm cảm giác thèm ăn, nôn mửa, tiêu chảy.
11	Bệnh cúm	Có thể là 1 trong 4 tên sau: Vaxigrip Tetra, GCFLU Quadriva-lent Influvac Tetra IVACFLU-S	**Vaxigrip Tetra, GCFLU Quadrivalent, Influvac Tetra: cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên và người lớn** - Trẻ từ 6 tháng tuổi đến dưới 9 tuổi chưa từng tiêm ngừa cúm: 2 mũi cách nhau ít nhất 1 tháng và tiêm nhắc 01 mũi hàng năm - Trẻ từ 6 tháng tuổi đến dưới 9 tuổi đã được tiêm ngừa cúm, trẻ từ 9 tuổi và người lớn: tiêm 1 mũi và tiêm nhắc 01 mũi hàng năm + Liều dùng: 0,5 ml **Có thể tiêm vắc xin Vaxigrip Tetra / Influvac Tetra / GCFLU Quadrivalent cho phụ nữ có thai (tốt nhất là 3 tháng giữa và cuối của thai kỳ).** **IVACFLU-S: Cho người từ 18 đến 60 tuổi:** + Lịch tiêm: 01 mũi và tiêm nhắc 01 mũi hàng năm + Liều dùng: 0,5 ml + Đường dùng: tiêm bắp	• Tại chỗ tiêm: đau, đỏ, sưng. • Toàn thân: đau đầu, sốt, mệt mỏi.
12	Bệnh Sởi	Mvvac	**Trẻ từ 9 tháng tuổi trở lên:** + Lịch tiêm: 1 mũi. Nên tiêm nhắc vắc xin phối hợp có thành phần sởi. + Liều dùng: 0,5 ml + Đường dùng: tiêm dưới da.	• Tại chỗ tiêm: đau, sưng, đỏ. • Toàn thân: sốt, ban, ho, sổ mũi.
13	Bệnh Sởi Quai Bị Rubella	Có thể chọn 1 trong 3 Loại vắc xin sau:	**MMRII: Cho trẻ từ 12 tháng tuổi và người lớn (có thể tiêm cho trẻ từ 9 đến dưới 12 tháng tuổi)** Lịch tiêm cho trẻ từ 9 đến dưới 12 tháng tuổi: - Mũi 1: lần đầu tiên tiêm trong độ tuổi (từ lúc 9 tháng) - Mũi 2: 03 tháng sau mũi 1 - Khuyến cáo Mũi 3: 3 năm sau mũi 2 hoặc lúc	• Tại chỗ tiêm: đau tại nơi tiêm trong một thời gian ngắn. • Toàn thân: sốt, mề đay, phát ban nhẹ, buồn nôn, nôn, tiêu chảy.

		MMRII **Sởi Quai Bị Rubella (Ấn Độ)**	trẻ 4 - 6 tuổi + Lịch tiêm 2 mũi cho trẻ từ 12 tháng tuổi trở lên đến dưới 7 tuổi: Nếu trẻ đã được tiêm mũi sởi trước đó: - Mũi 1: lần tiêm đầu tiên và phải cách mũi sởi đơn trước đó ít nhất 1 tháng - Mũi 2: 3 năm sau mũi 1 hoặc lúc trẻ 4 - 6 tuổi Nếu trẻ chưa được tiêm mũi sởi trước đó: tiêm 2 mũi cách nhau 3 tháng + Lịch tiêm 2 mũi cho trẻ từ 7 tuổi và người lớn: - Mũi 1: lần tiêm đầu tiên - Mũi 2: cách mũi 1 ít nhất một tháng **Phụ nữ nên hoàn tất lịch tiêm trước khi có thai ít nhất 3 tháng** + Liều dùng: 0,5 ml + Đường dùng: tiêm dưới da, nên tiêm mặt ngoài phía trên cánh tay	
			VẮC XIN SỞI - QUAI BỊ - RUBELLA (ẤN ĐỘ) Chỉ định cho trẻ từ 12 tháng tuổi đến 10 tuổi.	
		PRIORIX	**PRIORIX: Trẻ từ tròn 9 tháng tuổi và người lớn** **Trẻ từ tròn 9 tháng tuổi đến<12 tháng tuổi:** + Chưa tiêm vắc xin có thành phần sởi: - Mũi 1: lần tiêm đầu tiên trong độ tuổi (từ lúc 9 tháng). - Mũi 2: 03 tháng sau mũi 1. Khuyến cáo Mũi 3: 3 năm sau mũi 2 hoặc lúc trẻ 4 - 6 tuổi. **Trẻ từ tròn 12 tháng tuổi đến < 7 tuổi:** Đã tiêm vắc xin có thành phần sởi: Mũi 1: cách ít nhất 1 tháng sau mũi vắc xin có thành phần sởi. - Mũi 2: cách 3 năm sau mũi 1 hoặc lúc trẻ 4 - 6 tuổi. + Chưa tiêm vắc xin có thành phần sởi: - Mũi 1: lần tiêm đầu tiên trong độ tuổi. - Mũi 2: 3 tháng sau mũi 1. + Trẻ từ tròn 7 tuổi và người lớn: - Mũi 1: lần tiêm đầu tiên trong độ tuổi. - Mũi 2: cách mũi 1 là 1 tháng. **Phụ nữ nên hoàn tất lịch tiêm trước khi có thai ít nhất 3 tháng.** + Liều dùng: 0,5 ml + Đường dùng: tiêm dưới da hoặc tiêm bắp	
14	**Thuỷ Đậu**	**Có thể là 1 trong 3 tên sau varivax**	**Đối với Varivax, Varicella: Cho trẻ từ 12 tháng tuổi và người lớn chưa từng mắc bệnh** + Lịch tiêm cho trẻ từ 12 tháng tuổi đến 12 tuổi: *- Mũi 1: lần tiêm đầu tiên* *- Khuyến cáo mũi 2: cách mũi 1 ít nhất 3 tháng*	• Tại chỗ tiêm: phát ban dạng thủy đậu, đau, đỏ, sưng. • Toàn thân: sốt.

		varicella varilrix	+ Lịch tiêm cho trẻ từ 13 tuổi và người lớn: *- Mũi 1: lần tiêm đầu tiên* *- Mũi 2: cách mũi 1 ít nhất 1 tháng* + Liều dùng: 0,5 ml + Đường dùng: tiêm dưới da, nên tiêm mặt ngoài phía trên cánh tay. **Đối với Varilrix: cho trẻ từ 9 tháng tuổi và người lớn chưa từng mắc bệnh** + Trẻ từ 9 tháng đến 12 tuổi: 2 mũi *- Mũi 1: lần tiêm đầu tiên trong độ tuổi* *- Mũi 2: cách mũi 1 ít nhất 3 tháng* + Trẻ từ 13 tuổi trở lên và người lớn: 2 mũi *- Tiêm 2 mũi cách nhau ít nhất 1 tháng (không tiêm trước 4 tuần).* + Liều dùng: 0,5 ml + Đường dùng: tiêm dưới da ở vùng cơ delta hoặc vùng mặt ngoài đùi. **Phụ nữ nên hoàn tất lịch tiêm vắc xin phòng bệnh thủy đậu trước khi có thai tốt nhất 3 tháng.**	• **Thận trọng:** Tránh dùng chế phẩm chứa salicylate (thuốc aspirin hoặc các chế phẩm bôi, dán giảm đau) trong ít nhất 6 tuần sau tiêm.
15	Viên não Nhật Bản	Có thể là 1 trong 3 tên sau: Jevax Imojev Jeev	**JEVAX: cho trẻ từ 12 tháng tuổi và người lớn** + Lịch tiêm 3 mũi *- Mũi 1: lần tiêm đầu tiên* *- Mũi 2: một đến hai tuần sau mũi 1* *- Mũi 3: một năm sau mũi 2* **Tiêm nhắc một mũi mỗi 3 năm** + Liều dùng: *- Trẻ từ 12 tháng tuổi đến 36 tháng tuổi: 0.5ml* *- Trẻ trên 36 tháng và người lớn: 1ml* + Đường dùng: tiêm dưới da, nên tiêm mặt ngoài phía trên cánh tay. **IMOJEV: cho trẻ từ 9 tháng tuổi và người lớn** + Lịch tiêm 2 mũi cho trẻ từ 9 tháng tuổi đến 18 tuổi: tiêm 2 mũi cách nhau ít nhất 1 năm + Lịch tiêm cho người trên 18 tuổi: tiêm một liều duy nhất + Liều dùng: 0.5ml + Đường dùng: tiêm dưới da **JEEV: cho trẻ từ 12 tháng tuổi và người lớn đến 49 tuổi** - Lịch tiêm cho trẻ từ 1 tuổi đến tròn 3 tuổi: *+ 2 mũi cơ bản:* *- Mũi 1: lần đầu đến tiêm* *- Mũi 2: cách ít nhất 1 tháng sau mũi 1* *+ 3 mũi nhắc:* *- Mũi 3: cách mũi 2 ít nhất 1 năm* *- Mũi 4: cách mũi 3 ít nhất 3 năm hoặc khi trẻ từ 5 - 6 tuổi (theo khuyến cáo của Đài Loan/Hàn Quốc)* *Mũi 5: cách mũi 4 ít nhất 6 năm (theo khuyến cáo của Hàn Quốc)*	**Jevax** • Tại chỗ tiêm: đau, sưng, đỏ. • Toàn thân: mệt mỏi, đau đầu, sốt. **Imojev** • Tại chỗ tiêm: đau, đỏ, sưng tại vị trí tiêm là triệu chứng thường gặp. • Toàn thân: sốt, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, cầu kính, mất cảm giác thèm ăn, nôn. **JEEV** Trẻ em: - Phản ứng tại chỗ: đau, nhạy cảm, đau, sưng, đỏ chỗ tiêm. - Phản ứng toàn thân: sốt, giảm sự thèm ăn, buồn ngủ, ban đỏ.Người lớn: - Phản ứng tại chỗ: đau tại chỗ tiêm, sưng, ngứa - Phản ứng toàn thân: sốt, nhức đầu.

			Mũi 5: cách mũi 4 ít nhất 6 năm (theo khuyến cáo của Hàn Quốc) - Lịch tiêm cho người trên 3 tuổi đến 49 tuổi: *+ 2 mũi cơ bản:* *- Mũi 2: cách ít nhất 1 tháng sau mũi 1* *+ 2 mũi nhắc:* *- Mũi 3: cách mũi 2 ít nhất 1 năm* *- Mũi 4: cách mũi 3 ít nhất 10 năm (theo khuyến cáo của châu Âu)* *Liều dùng:* *- Trẻ từ 12 tháng đến tròn 36 tháng tuổi: 3mcg/0.5 ml* *- Trẻ từ trên 36 tháng và người lớn đến 49 tuổi: 6mcg/0.5 ml* *Đường dùng: tiêm bắp*	
16	**Viên gan A**	**Có thể là 1 trong 2 tên sau: Avaxim Havax**	**Cho trẻ từ 12 tháng tuổi và người lớn:** + Lịch tiêm 2 mũi cách nhau ít nhất 6 – 12 tháng + Liều dùng: **Avaxin** *- Trẻ em từ 12 tháng tuổi – 15 tuổi: Avaxim 80U* 0.5ml **Havax** *- Trẻ em từ 24 tháng tuổi - dưới 18 tuổi: Havax 0,5ml* *- Người lớn từ 18 tuổi trở lên: Havax 1 ml* + Đường dùng: tiêm bắp *- Mũi 4: cách mũi 3 ít nhất 3 năm hoặc khi trẻ từ 5 - 6 tuổi (theo khuyến cáo của Đài Loan/Hàn Quốc)* *Mũi 5: cách mũi 4 ít nhất 6 năm (theo khuyến cáo của Hàn Quốc)*	**Jevax** • Tại chỗ tiêm: đau, sưng, đỏ. • Toàn thân: mệt mỏi, đau đầu, sốt. **Imojev** • Tại chỗ tiêm: đau, đỏ, sưng tại vị trí tiêm là triệu chứng thường gặp. • Toàn thân: sốt, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, cầu kính, mất cảm giác thèm ăn, nôn.

LỜI KHUYÊN CỦA CHUYÊN GIA Y TẾ:

Bạn cần lưu lại cơ sở tiêm chủng ít nhất 30 phút để theo dõi và được nhân viên y tế kiểm tra trước khi ra về. Đặc biệt với trẻ nhỏ, cần theo dõi tiếp trong 48 giờ sau tiêm.

MIỄN PHÍ **Khám** & tư vấn trước tiêm



Tổng đài tư vấn:

***3979 (nhánh 4)**

Website: tamtrihealthcare.vn

				JEEV Trẻ em: - Phản ứng tại chỗ: đau, nhạy cảm, đau, sưng, đỏ chỗ tiêm. - Phản ứng toàn thân: sốt, giảm sự thèm ăn, buồn ngủ, ban đỏ. - Người lớn: Phản ứng tại chỗ: đau tại chỗ tiêm, sưng, ngứa - Phản ứng toàn thân: sốt, nhức đầu.
17	Viên gan A + B	Twinrix	**Cho trẻ từ 12 tháng tuổi và người lớn:** + Lịch tiêm 2 mũi cho trẻ từ 12 tháng – 15 tuổi *- Mũi 1: lần tiêm đầu tiên* *- Mũi 2: sáu tháng sau mũi 1* + Lịch tiêm 3 mũi cho người từ 16 tuổi trở lên *- Mũi 1: lần tiêm đầu tiên* *- Mũi 2: một tháng sau mũi 1* *- Mũi 3: năm tháng sau mũi 2* + Liều dùng: 1 ml + Đường dùng: tiêm bắp	• Tại chỗ tiêm: đau, sưng, đỏ. • Toàn thân: đau đầu, khó chịu.đầu, khó chịu.
18	Viêm màng não do não mô cầu B+C	VA - Mengoc -BC	**Cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên và người lớn đến 45 tuổi** + Lịch tiêm: 2 mũi cách nhau ít nhất 45 ngày + Liều dùng: 0.5 ml + Đường dùng: tiêm bắp sâu	• Tại chỗ tiêm: sưng đau, có thể tạo cục cứng, sau khoảng 72 giờ sẽ tự khỏi. • Toàn thân: sốt nhẹ.
19	Viêm màng não do não mô cầu A,C,Y và W135	Menactra	**Cho trẻ từ 9 tháng tuổi trở lên và người lớn đến 55 tuổi** + Lịch tiêm: *- Trẻ từ 9 tháng đến dưới 24 tháng tuổi: tiêm 2 liều cách nhau ít nhất 3 tháng* *- Trẻ em từ 2 tuổi và người lớn đến 55 tuổi: tiêm một liều* *- Có thể tiêm một liều nhắc lại cho người từ 15 tuổi đến 55 tuổi nếu tiếp tục có nguy cơ mắc bệnh. Mũi tiêm nhắc cách mũi tiêm trước ít nhất 4 năm.* + Liều dùng: 0.5ml + Đường dùng: tiêm bắp	• Tại chỗ tiêm: đau – sưng - đỏ tại vị trí tiêm. • Toàn thân: ngủ gà, cáu kỉnh, nhức đầu, mệt mỏi, tiêu chảy, chán ăn. Các triệu chứng thường, nhẹ và thoáng qua.
20	Vắc xin ngừa các	Gardasil	**Cho nữ giới từ 9 – 26 tuổi** + Lịch tiêm 3 mũi: *- Mũi 1: lần tiêm đầu tiên*	• Tại chỗ tiêm: có thể ban đỏ, sưng, đau, ngứa

	bệnh do vi rút HPV	Gardasil 9	*- Mũi 2: 2 tháng sau mũi 1* *- Mũi 3: cách mũi 2 ít nhất 4 tháng* Khi cần điều chỉnh lịch tiêm thì mũi 2 phải cách mũi 1 ít nhất một tháng và mũi 3 phải cách mũi 2 ít nhất ba tháng. **Người (nam và nữ) từ 9 tuổi đến 14 tuổi tại thời điểm tiêm lần đầu tiên** ✦ Phác đồ 2 mũi: *- Mũi 1: lần đầu tiên trong độ tuổi* *- Mũi 2: cách mũi 1 từ 6 – 12 tháng* ✦ Phác đồ 3 mũi: *- Mũi 1: lần đầu tiên trong độ tuổi* *- Mũi 2: cách mũi 1 ít nhất 2 tháng* *- Mũi 3: cách mũi 2 ít nhất 4 tháng* **Người (nam và nữ) từ 15 tuổi đến 26 tuổi tại thời điểm tiêm lần đầu tiên** ✦ Phác đồ 3 mũi: *- Mũi 1: lần đầu tiên trong độ tuổi* *- Mũi 2: cách mũi 1 ít nhất 2 tháng* *- Mũi 3: cách mũi 2 ít nhất 4 tháng* Khi cần điều chỉnh lịch tiêm thì mũi 2 phải cách mũi 1 ít nhất 1 tháng và mũi 3 phải cách mũi 2 ít nhất 3 tháng. ✦ Liều dùng: 0.5ml ✦ Đường dùng: tiêm bắp	• Toàn thân: sốt, mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn.
21	Uốn ván	VAT	**Cho trẻ em và người lớn** ✦ Lịch tiêm cơ bản 3 mũi: *- Mũi 1: lần tiêm đầu tiên* *- Mũi 2: 1 tháng sau mũi một* *- Mũi 3: 6 tháng sau mũi hai* **Tiêm nhắc mỗi 5 – 10** **Lịch tiêm cho phụ nữ có thai (theo thông tư 38/2017/TT-BYT** 1. Đối với người chưa tiêm hoặc không rõ tiền sử hoặc chưa tiêm đủ 3 mũi vắc xin có chứa thành phần uốn ván liều cơ bản: *- Lần 1: tiêm sớm khi có thai lần đầu* *Lần 2: ít nhất 1 tháng sau lần 1* *Lần 3: ít nhất 6 tháng sau lần 2 hoặc kỳ có thai lần sau* *Lần 4: ít nhất 1 năm sau lần 3 hoặc kỳ có thai lần sau Lần 5: ít nhất 1 năm sau lần 4 hoặc kỳ có thai lần sau.* 2. Đối với người đã tiêm đủ 3 mũi vắc xin có chứa thành phần uốn ván liều cơ bản: *Lần 1: Tiêm sớm khi có thai lần đầu* *Lần 2: ít nhất 1 tháng sau lần 1* *Lần 3: ít nhất 1 năm sau lần 2* 3. Đối với người đã tiêm đủ 3 mũi vắc xin có chứa thành phần uốn ván liều cơ bản và 1 liều nhắc lại: *Lần 1: tiêm sớm khi có thai lần đầu* *Lần 2: ít nhất 1 năm sau lần 1* Mũi tiêm trong lúc mang thai cần phải hoàn thành trước ngày dự sinh ít nhất 1 tháng ✦ Liều dùng: 0.5 ml ✦ Đường dùng: tiêm bắp sâu **Lưu ý khi đã phơi nhiễm bệnh uốn ván: tiêm huyết thanh kháng uốn ván khi cần và tiếp tục tiêm chủng đủ phác đồ.**	• Tại chỗ tiêm: đau, quầng đỏ, nốt cứng hay sưng xuất hiện trong vòng 48 giờ sau khi tiêm và kéo dài trong 1-2 ngày. • Toàn thân: sốt, khó chịu thoáng qua. • Khi khách hàng bị vết thương hoặc có nguy cơ bị uốn ván, đến ngay cơ sở y tế để được tiêm vắc xin và globulin miễn dịch (nếu cần).

22	Thương hàn	Có thể là 1 trong 2 tên sau: Typhim VI, Typhoid VI	**Cho trẻ trên 2 tuổi và người lớn** + Lịch tiêm: 1 mũi + Liều dùng: 0.5ml + Đường dùng: tiêm bắp hoặc dưới da **Tiêm nhắc: mỗi 3 năm nếu có nguy cơ nhiễm bệnh**	• Tại chỗ tiêm: đau, sưng, quầng đỏ. • Toàn thân: sốt, đau đầu, đau khớp.
23	Tả	mORCVAX	**Cho trẻ trên 2 tuổi và người lớn** + Lịch cơ bản: 2 liều uống cách nhau 14 ngày + Lịch nhắc lại: trước mỗi mùa dịch tả, 2 liều uống cách nhau 14 ngày + Liều dùng: 1.5ml	• Thường gặp: Sau khi uống vắc xin, có cảm giác buồn nôn, nôn. • Hiếm gặp: đau đầu, đau bụng, tiêu chảy, sốt. • Các triệu chứng thường tự khỏi không cần điều trị.
24	Bệnh dại	Có thể là 1 trong 2	**Cho trẻ em và người lớn** + Lịch tiêm dự phòng: đường tiêm bắp (liều dùng 0.5 ml) hoặc đường tiêm trong da (liều dùng 0.1ml) *- Ba mũi cơ bản: tiêm vào các **ngày 0** – 7 – 21/28* + Lịch tiêm sau phơi nhiễm • Với người đã tiêm dự phòng: đường tiêm bắp (liều dùng 0.5 ml) hoặc đường tiêm trong da (liều dùng 0.1ml) *- Lịch tiêm 2 mũi vào các ngày 0 – 3* • Với người chưa tiêm dự phòng: đường tiêm bắp (liều dùng 0.5 ml) *- Lịch tiêm 5 mũi vào các ngày 0 - 3 - 7 - 14 - 28* • Với người chưa tiêm dự phòng: đường tiêm trong da (liều dùng: 2 mũi tiêm trong da, mỗi mũi 0.1 ml tại 2 vị trí khác nhau) *- Lịch tiêm 2 mũi/1 lần x 4 lần vào các ngày 0 - 3 - 7 - 28*	• Tại chỗ tiêm: đau, quầng đỏ, sưng, ngứa và nốt cứng. • Toàn thân: sốt, đau • Tại chỗ tiêm: sưng đau, có thể tạo cục cứng, sau khoảng 72 giờ sẽ tự khỏi. • Toàn thân: sốt nhẹ.
25	Vắc xin phòng bệnh Covid	COVID-19 vaccine AstraZeneca	**Cho người từ 18 tuổi trở lên** + Lịch tiêm: *- Mũi 1: lần tiêm đầu tiên* *- Mũi 2: cách mũi 1 từ 4 – 12 tuần* *- Mũi 3 bổ sung: cách mũi 2 ít nhất 4 tuần (ưu tiên người suy giảm miễn dịch...)* *- Mũi 1 nhắc lại: cách mũi cơ bản cuối cùng hoặc mũi bổ sung ít nhất 3 đến 6 tháng*	• Tại chỗ tiêm: đau, sưng và đỏ. • Toàn thân: đau đầu, buồn nôn, đau cơ, đau khớp, ngứa, mệt mỏi, bồn chồn, sốt, ớn lạnh.

Phòng bệnh	Tháng tuổi														
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	15	18	2	4
Lao	1	Nếu không tiêm được trong vòng 1 tháng đầu tiên													
Viêm gan B**	24h	2					3								
	24h	2	3								4				
Bạch hầu - Ho gà - Uốn ván			1	2	3								4		
					2*		3*								
Bại liệt			1	2	3								4		
					2*		3*								
Viêm họng, viêm phổi, viêm màng não do HiB			1	2	3							4			
					2*		3*								
Tiêu chảy do vi rút Rota (uống)			1	2	3*										
Viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu			1	2	3						4				
					2*		3*								
	(Nếu tiêm chủng muộn)							1	2		3				
											2 mũi (nếu chưa tiêm chủng)			1 hoặc chủng và	
Viêm màng não do não mô cầu BC							1		2						
Viêm màng não do não mô cầu A,C,Y và W135										2 mũi					
Cúm							1	2	Tiêm nhắc 01 mũi						
Viêm não Nhật Bản (vắc xin bất hoạt não chuột)											1+2			3	
Viêm não Nhật Bản (vắc xin bất hoạt tế bào Vero)											1+2				
Viêm não Nhật Bản (vắc xin sống)										1					
Sởi - Quai bị - Rubella										1					
Thuỷ đậu (trái rạ)										1	2				
Viêm gan A											1		2		
Viêm gan A+B											1		2		
Uốn ván															
Vắc xin ngừa các bệnh do vi rút HPV: Gardasil															
Vắc xin ngừa các bệnh do vi rút HPV: Gardasil 9															
Thương hàn															
Tả															
Dại	Tiêm dự phòng trước phơi nhiễm 3 mũi. Tiêm bắt buộc														

Lịch tiêm chuẩn | Lịch tiêm khuyến cáo | Không khuyến cáo tiêm

Năm tuổi												Nhóm tuổi theo năm			
4	5	6	7	8	9	10	12	14	15	16	18	19-26	27-45	46-64	≥65
3 - 4 mũi (nếu chưa tiêm chủng)															
	5		1 mũi (nhắc mỗi 10 năm) hoặc 3 mũi (nếu chưa từng tiêm trước đây)												
	5														
1 mũi (nếu chưa tiêm chủng)															
2 mũi (nếu chưa tiêm tuỳ loại vắc xin)	1 mũi (nếu chưa tiêm chủng)														
2 mũi (nếu chưa tiêm chủng)															
1 mũi															
mỗi năm	Tiêm 01 mũi mỗi năm														
Tiêm đủ 3 mũi (nếu chưa tiêm chủng). Tiêm nhắc mỗi 3 năm															
Tiêm nhắc 2-3 mũi tuỳ độ tuổi															
Tiêm nhắc 1 mũi cách mũi 1 tối thiểu 12 tháng												1 mũi (nếu chưa tiêm chủng)			
2	2 mũi cách nhau 1 tháng (nếu chưa tiêm chủng). Phụ nữ nên tiêm trước khi mang thai ít nhất 3 tháng														
2	2 mũi cách nhau 1 - 3 tháng tuỳ theo độ tuổi (nếu chưa tiêm chủng). Phụ nữ nên tiêm trước khi mang thai ít nhất 3 tháng														
2 mũi (nếu chưa tiêm chủng)															
2 mũi (nếu chưa tiêm chủng)															
												3 mũi (nếu chưa tiêm chủng)			
	3 mũi, tiêm nhắc mỗi 5 - 10 năm. Riêng phụ nữ mang thai nên tiêm ít nhất 2 mũi để ngừa uốn ván sơ sinh														
					3mũi										
					2-3mũi				3mũi						
1 mũi, tiêm nhắc mỗi 3 năm															
Uống 2 liều cách nhau 2 tuần															
khi bị phơi nhiễm (5 mũi nếu chưa từng tiêm dự phòng, 2 mũi nếu đã tiêm dự phòng)															

*Lịch tiêm có thể thay đổi tùy theo loại vắc xin, sự tuân thủ phác đồ tiêm chủng và cập nhật hướng dẫn của cơ quan y tế.
**Viêm gan B liều sơ sinh để phòng lây truyền bệnh từ mẹ sang con. Nếu tiêm vắc xin phối hợp có thành phần viêm gan B thì theo lịch tiêm của vắc xin phối hợp.

LỊCH SỬ TIÊM CHỦNG / VACCINATION RECORDS:

Phòng bệnh /Vaccination against	Mũi tiêm /Sequence	Ngày tiêm, uống /Date given	Tên vắc xin/ Vaccine Name	Liều lượng(ml) /Dosage	Bác sĩ chỉ định /Physician	Đường và vị trí tiêm/ Route & Site	Lô - hạn sử dụng /Lot-Exp	Nước sản xuất /Mfr	KTV tiêm /Vaccinator
1. LAO/ Tuberculosis	1								
Ghi chú									
2. VIÊM GAN B/ Hepatitis B	Mũi sơ sinh								
	Mũi 1								
	Mũi 2								
	Mũi 3								
	Mũi 4								
	Nhắc lại								
Ghi chú									
3. BẠCH HẦU, UỐN VÁN, HO GÀ, BẠI LIỆT/Diphtheria, Tetanus, Pertussis, Poliomyelitis	Mũi 1								
	Mũi 2								
	Mũi 3								
	Mũi 4								
	Tiêm nhắc								
Ghi chú									

Phòng bệnh /Vaccination against	Mũi tiêm /Sequence	Ngày tiêm, uống /Date given	Tên vắc xin/ Vaccine Name	Liều lượng(ml) /Dosage	Bác sĩ chỉ định /Physician	Đường và vị trí tiêm/ Route & Site	Lô - hạn sử dụng /Lot-Exp	Nước sản xuất /Mfr	KTV tiêm /Vaccinator
4. VIÊM PHỔI, VIÊM MÀNG NÃO DO HIB/ Haemophilus Influenzae type B (Hib)	Mũi 1								
	Mũi 2								
	Mũi 3								
	Nhắc lại								
Ghi chú									
5. VIÊM PHỔI, VIÊM MÀNG NÃO, NHIỄM KHUẨN HUYẾT DO PHẾ CẦU/ Pneumococcal Disease	Mũi 1								
	Mũi 2								
	Mũi 3								
	Mũi 4								
Ghi chú									
6. TIÊU CHẢY DO ROTA VIRUS/ Rota virus	Liều 1								
	Liều 2								
	Liều 3								
Ghi chú									

Phòng bệnh /Vaccination against	Mũi tiêm /Sequence	Ngày tiêm, uống /Date given	Tên vắc xin/ Vaccine Name	Liều lượng(ml) /Dosage	Bác sĩ chỉ định /Physician	Đường và vị trí tiêm/ Route & Site	Lô - hạn sử dụng /Lot-Exp	Nước sản xuất /Mfr	KTV tiêm /Vaccinator
7. CÚM/ Influenza	Mũi 1								
	Mũi 2								
	Nhắc lại								
	Nhắc lại								
	Nhắc lại								
	Nhắc lại								
	Nhắc lại								
	Nhắc lại								
	Nhắc lại								
Ghi chú									
8. VIÊM MÀNG NÃO MÔ CẦU NHÓM B VÀ C/ Meningococcal Disease type BC	Mũi 1								
	Mũi 2								
Ghi chú									

Phòng bệnh /Vaccination against	Mũi tiêm /Sequence	Ngày tiêm, uống /Date given	Tên vắc xin/ Vaccine Name	Liều lượng(ml) /Dosage	Bác sĩ chỉ định /Physician	Đường và vị trí tiêm/ Route & Site	Lô - hạn sử dụng /Lot-Exp	Nước sản xuất /Mfr	KTV tiêm /Vaccinator
VIÊM MÀNG NÃO MÔ CẦU NHÓM A, C, Y VÀ W-135/ Meningococcal Disease type A,C, Y and W-135	Mũi 1								
	Mũi 2								
	Nhắc lại								
Ghi chú									
10. SỞI/MEASLES	Mũi 1								
Ghi chú									
11. SỞI - QUAI BỊ-RUBELLA/ Measles, Mumps and Rubella	Mũi 1								
	Mũi 2								
	Mũi 3								
Ghi chú									
12. THỦY ĐẬU/ Varicella	Mũi 1								
	Mũi 2								
Ghi chú									

Phòng bệnh /Vaccination against	Mũi tiêm /Sequence	Ngày tiêm, uống /Date given	Tên vắc xin/ Vaccine Name	Liều lượng(ml) /Dosage	Bác sĩ chỉ định /Physician	Đường và vị trí tiêm/ Route & Site	Lô - hạn sử dụng /Lot-Exp	Nước sản xuất /Mfr	KTV tiêm /Vaccinator
13. VIÊM NÃO NHẬT BẢN/ Japanese Encephalitis									
Ghi chú									
14. VIÊM GAN A/ Hepatitis A	Mũi 1								
	Mũi 2								
Ghi chú									
15. THƯƠNG HÀN/ Typhoid	Mũi 1								
	Mũi 2								
	Mũi 3								
Ghi chú									
16. TẢ/Cholera	Mũi 1								
	Mũi 2								

Phòng bệnh /Vaccination against		Mũi tiêm /Sequence	Ngày tiêm, uống /Date given	Tên vắc xin/ Vaccine Name	Liều lượng(ml) /Dosage	Bác sĩ chỉ định /Physician	Đường và vị trí tiêm/ Route & Site	Lô - hạn sử dụng /Lot-Exp	Nước sản xuất /Mfr	KTV tiêm /Vaccinator
17. VẮC XIN PHÒNG CÁC BỆNH DO VIRUS HPV/ Human Papillomavirus (HPV)	GARDASIL (4 TYPE)	Mũi 1								
		Mũi 2								
		Mũi 3								
	GARDASIL 9	Mũi 1								
		Mũi 2								
		Mũi 3								
Ghi chú										
18. Uốn ván/Tetanus (TT/Tdap/Td)		Mũi 1								
		Mũi 2								
		Mũi 3								
		Mũi 4								
		Mũi 5								
19. HUYẾT THANH KHÁNG UỐN VÁN/ SAT		Mũi 1								
		Mũi 2								
Ghi chú										
20. VẮC XIN PHÒNG COVID 19		Mũi 1								
		Mũi 2								
21. CÁC BỆNH KHÁC/ Others										

TIÊM PHÒNG BỆNH DẠI

Tiêm ngừa sau khi bị động vật cắn, tiếp xúc

- Ngày bị động vật cắn, tiếp xúc:
- Loại động vật: Chó☐ Mèo☐ Khác☐
- Tình trạng động vật: Bình thường☐ Bệnh☐ Chạy rong☐ Lên cơn dại☐
- Vị trí vết thương: Đầu, mặt, cổ☐ Bộ phận sinh dục☐ Đầu chi☐ Tay☐ Chân☐ Khác:.....
- Đặc điểm vết thương: Độ I☐ Độ II☐ Độ III☐
- Ngày tiêm huyết thanh kháng Dại (nếu có):

Phòng bệnh /Vaccination against	Mũi tiêm /Sequence	Ngày tiêm, uống /Date given	Tên vắc xin/ Vaccine Name	Liều lượng(ml) /Dosage	Bác sĩ chỉ định /Physician	Đường và vị trí tiêm/ Route & Site	Lô - hạn sử dụng /Lot-Exp	Nước sản xuất /Mfr	KTV tiêm /Vaccinator
DẠI/Rabies	Mũi 1 NO								
	Mũi 2 N3								
	Mũi 3 N7								
	Mũi 4* N14								
	Mũi 5 N28								

(*) Nếu tiêm trong da: tiêm tại 2 vị trí khác nhau, liều 0.1 ml và không tiêm mũi N14

Dự phòng khi chưa bị động vật cắn, tiếp xúc

Phòng bệnh /Vaccination against	Mũi tiêm /Sequence	Ngày tiêm, uống /Date given	Tên vắc xin/ Vaccine Name	Liều lượng(ml) /Dosage	Bác sĩ chỉ định /Physician	Đường và vị trí tiêm/ Route & Site	Lô - hạn sử dụng /Lot-Exp	Nước sản xuất /Mfr	KTV tiêm /Vaccinator
DẠI/Rabies	Mũi 1 NO								
	Mũi 2 N7								
	Mũi 3 N21/28								

Lưu ý trong thời gian tiêm vắc xin:

- Nếu phải sử dụng Corticoid liều cao hoặc nội tiết tố ACTH, tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa.
- Không uống rượu bia
- Hạn chế làm việc nặng hay tập thể thao
- Sau khi bị động vật cắn, cào:

  • Vệ sinh vết thương ngay sau khi bị cắn bằng nước chảy dưới vòi và xà phòng, nước sát khuẩn.
  • Theo dõi con vật trong 10 ngày
  • Không đập chết, cho hay bán con vật
  • Không tiêm ngừa Dại cho con vật trong lúc theo dõi
  • Nếu con vật chết, chạy mất hay bị Dại, phải báo ngay cho cán bộ tiêm chủng để quyết định hướng xử trí tiếp theo.

BẢNG CHIỀU CAO - CÂN NẶNG CHUẨN

Nguồn theo tài liệu tổ chức y tế thế giới WHO



BÉ GÁI

THÁNG TUỔI	CÂN NẶNG (kg)			CHIỀU CAO (cm)		
	-2SD	TRUNG BÌNH	+2SD	-2SD	TRUNG BÌNH	+2SD
Sơ sinh	2.4	3.2	4.2	45.4	49.1	52.9
1 tháng	3.2	4.2	5.5	49.8	53.7	57.6
2 tháng	3.9	5.1	6.6	53.0	57.1	61.1
3 tháng	4.5	5.8	7.5	55.6	59.8	64.0
4 tháng	5.0	6.4	8.2	57.8	62.1	66.4
5 tháng	5.4	6.9	8.8	59.6	64.0	68.5
6 tháng	5.7	7.3	9.3	61.2	65.7	70.3
7 tháng	6.0	7.6	9.8	62.7	67.3	71.9
8 tháng	6.3	7.9	10.2	64.0	68.7	73.5
9 tháng	6.5	8.2	10.5	65.3	70.1	75.0
10 tháng	6.7	8.5	10.9	66.5	71.5	76.4
11 tháng	6.9	8.7	11.2	67.7	72.8	77.8
12 tháng	7.0	8.9	11.5	68.9	74.0	79.2
15 tháng	7.6	9.6	12.4	72.0	77.5	83.0
18 tháng	8.1	10.2	13.2	74.9	80.7	86.5
21 tháng	8.6	10.9	14.0	77.5	83.7	89.8
24 tháng	9.0	11.5	14.8	80.0	86.4	92.9
2.5 tuổi	10.0	12.7	16.5	83.6	90.7	97.7
3 tuổi	10.8	13.9	18.1	87.4	95.1	102.7
3.5 tuổi	11.6	15.0	19.8	90.9	99.0	107.2
4 tuổi	12.3	16.1	21.5	94.1	102.7	11.3
4.5 tuổi	13.0	17.2	23.2	97.1	106.2	115.2
5 tuổi	13.7	18.2	24.9	99.9	109.4	118.9
5.5 tuổi	14.6	19.1	26.2	102.3	112.3	122.0
6 tuổi	15.3	20.2	27.8	104.9	115.1	125.4
6.5 tuổi	16.0	21.2	29.6	107.4	118.0	128.6
7 tuổi	16.8	22.4	31.4	109.9	120.8	131.7
7.5 tuổi	17.6	23.6	33.5	112.4	123.7	134.9
8 tuổi	18.6	25.0	35.8	115.0	126.6	138.2
8.5 tuổi	19.6	26.6	38.3	117.6	129.5	141.4
9 tuổi	20.8	28.2	41.1	120.3	132.5	144.7
9.5 tuổi	20.0	30.0	43.8	123.0	135.5	148.1
10 tuổi	23.3	31.9	46.9	125.8	138.6	151.4

CHÚ THÍCH:

-2SD: Suy dinh dưỡng thể thiếu cân hoặc thấp còi

+ 2SD: Thừa cân béo phì (theo cân nặng) hoặc rất cao (theo chiều cao)

BẢNG CHIỀU CAO - CÂN NẶNG CHUẨN

Nguồn theo tài liệu tổ chức y tế thế giới WHO



BÉ TRAI

THÁNG TUỔI	CÂN NẶNG (kg)			CHIỀU CAO (cm)		
	-2SD	TRUNG BÌNH	+2SD	-2SD	TRUNG BÌNH	+2SD
Sơ sinh	2.5	3.3	4.4	46.1	49.1	52.9
1 tháng	3.4	4.5	5.8	50.8	53.7	57.6
2 tháng	4.3	5.6	7.1	54.4	57.1	61.1
3 tháng	5.0	6.4	8.0	57.3	59.8	64.0
4 tháng	5.6	7.0	8.7	59.7	62.1	66.4
5 tháng	6.0	7.5	9.3	61.7	64.0	68.5
6 tháng	6.4	7.9	9.8	63.3	65.7	70.3
7 tháng	67	8.3	10.3	64.8	67.3	71.9
8 tháng	6.9	8.6	10.7	66.2	68.7	73.5
9 tháng	7.1	8.9	11.0	67.5	70.1	75.0
10 tháng	7.4	9.2	11.4	68.7	71.5	76.4
11 tháng	7.6	9.4	11.7	69.9	72.8	77.8
12 tháng	7.7	9.6	12.0	71.0	74.0	79.2
15 tháng	8.3	10.3	12.8	74.1	77.5	83.0
18 tháng	8.8	10.9	13.7	76.9	80.7	86.5
21 tháng	9.2	11.5	14.5	79.4	83.7	89.8
24 tháng	9.7	12.2	15.3	81.0	86.4	92.9
2.5 tuổi	10.5	13.3	16.9	85.1	90.7	97.7
3 tuổi	11.3	14.3	18.3	88.7	95.1	102.7
3.5 tuổi	12.0	15.3	19.7	91.9	99.0	107.2
4 tuổi	12.7	16.3	21.2	94.9	103.3	111.7
4.5 tuổi	13.4	17.3	22.7	97.8	106.7	115.5
5 tuổi	14.1	18.3	24.2	100.7	110.0	119.2
5.5 tuổi	15.0	19.4	25.5	103.4	112.9	122.4
6 tuổi	15.9	20.5	27.1	106.1	116.0	125.8
6.5 tuổi	16.8	21.7	28.9	108.7	118.9	129.1
7 tuổi	17.7	22.9	30.7	111.2	121.7	132.2
7.5 tuổi	18.6	24.1	32.6	113.6	124.5	135.5
8 tuổi	19.5	25.4	34.7	116.0	127.3	138.6
8.5 tuổi	20.4	26.7	37.0	118.3	129.9	141.6
9 tuổi	21.3	28.1	39.4	120.5	132.6	144.6
9.5 tuổi	22.2	29.6	42.1	122.8	135.2	147.6
10 tuổi	23.2	31.2	45.0	125.0	137.8	150.5

CHÚ THÍCH:

-2SD: Suy dinh dưỡng thể thiếu cân hoặc thấp còi

+ 2SD: Thừa cân béo phì (theo cân nặng) hoặc rất cao (theo chiều cao)

PHIẾU GHI CHỈ SỐ CÂN ĐO

NGÀY	CÂN NẶNG (kg)	CHIỀU DÀI/CAO (cm)	NGƯỜI THỰC HIỆN
...../...../20.....			
...../...../20.....			
...../...../20.....			
...../...../20.....			
...../...../20.....			
...../...../20.....			
...../...../20.....			
...../...../20.....			
...../...../20.....			
...../...../20.....			
...../...../20.....			
...../...../20.....			
...../...../20.....			
...../...../20.....			
...../...../20.....			
...../...../20.....			
...../...../20.....			
...../...../20.....			
...../...../20.....			
...../...../20.....			
...../...../20.....			

PHIẾU GHI CHỈ SỐ CÂN ĐO

NGÀY	CÂN NẶNG (kg)	CHIỀU DÀI/CAO (cm)	NGƯỜI THỰC HIỆN
...../...../20.....			
...../...../20.....			
...../...../20.....			
...../...../20.....			
...../...../20.....			
...../...../20.....			
...../...../20.....			
...../...../20.....			
...../...../20.....			
...../...../20.....			
...../...../20.....			
...../...../20.....			
...../...../20.....			
...../...../20.....			
...../...../20.....			
...../...../20.....			
...../...../20.....			
...../...../20.....			
...../...../20.....			
...../...../20.....			
...../...../20.....			

PHIẾU GHI CHỈ SỐ CÂN ĐO

NGÀY	CÂN NẶNG (kg)	CHIỀU DÀI/CAO (cm)	NGƯỜI THỰC HIỆN
...../...../20.....			
...../...../20.....			
...../...../20.....			
...../...../20.....			
...../...../20.....			
...../...../20.....			
...../...../20.....			
...../...../20.....			
...../...../20.....			
...../...../20.....			
...../...../20.....			
...../...../20.....			
...../...../20.....			
...../...../20.....			
...../...../20.....			
...../...../20.....			
...../...../20.....			
...../...../20.....			
...../...../20.....			
...../...../20.....			
...../...../20.....			

PHIẾU GHI CHỈ SỐ CÂN ĐO

NGÀY	CÂN NẶNG (kg)	CHIỀU DÀI/CAO (cm)	NGƯỜI THỰC HIỆN
...../...../20.....			
...../...../20.....			
...../...../20.....			
...../...../20.....			
...../...../20.....			
...../...../20.....			
...../...../20.....			
...../...../20.....			
...../...../20.....			
...../...../20.....			
...../...../20.....			
...../...../20.....			
...../...../20.....			
...../...../20.....			
...../...../20.....			
...../...../20.....			
...../...../20.....			
...../...../20.....			
...../...../20.....			
...../...../20.....			
...../...../20.....			



TRUNG TÂM TIÊM CHỦNG TÂM TRÍ
TAM TRI VACCINATION CENTER

Địa chỉ: 424 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Quy Nhơn Nam, T.Gia Lai
Tổng đài tư vấn: *3979 (nhánh 4)
Website: tamtrihealthcare.vn