Table 6. Performance of the Proposed Model in Clinical Subgroups

Subgroup	Patients	OS			PFS		
		C-index (95% CI)	HR (95% CI)	P_{int}	C-index (95% CI)	HR (95% CI)	P_{int}
All patients	238	0.723 (0.683–0.760)	2.32 (1.74–3.10)		0.647 (0.602–0.691)	2.03 (1.54–2.67)	
Age				0.023			0.715
< 70 years	111	0.696 (0.626–0.758)	1.67 (1.10–2.54)		0.616 (0.541–0.689)	2.01 (1.34–3.01)	
≥ 70 years	127	0.755 (0.692–0.807)	3.13 (2.08–4.69)		0.668 (0.608–0.724)	2.04 (1.39–2.98)	
Sex				0.585			0.071
Male	208	0.722 (0.681–0.764)	2.36 (1.73–3.22)		0.654 (0.608–0.699)	2.18 (1.62–2.94)	
Female	30	0.733 (0.544–0.891)	3.30 (1.42–7.67)		0.606 (0.397–0.813)	1.08 (0.52–2.26)	
ECOG performance status				0.365			0.483
0–1	209	0.707 (0.663–0.748)	2.21 (1.63–2.99)		0.641 (0.592–0.684)	1.96 (1.46–2.63)	
≥ 2	29	0.863 (0.679–1.000)	4.06 (1.36–12.14)		0.737 (0.542–0.900)	2.95 (1.14–7.61)	
Stage				0.145			0.025
Limited	72	0.682 (0.567–0.790)	1.34 (0.72–2.47)		0.633 (0.534–0.722)	1.16 (0.67–2.02)	
Extensive	166	0.690 (0.642–0.739)	2.26 (1.60–3.20)		0.614 (0.555–0.671)	2.26 (1.62–3.17)	
Liver metastasis				0.861			0.282
Absent	185	0.693 (0.642–0.738)	2.01 (1.45–2.79)		0.604 (0.551–0.655)	1.71 (1.25–2.35)	
Present	53	0.722 (0.605–0.829)	2.18 (1.01–4.70)		0.669 (0.546–0.780)	2.25 (1.06–4.77)	
Brain metastasis				0.973			0.920
Absent	190	0.710 (0.664–0.755)	2.24 (1.62–3.09)		0.644 (0.594–0.695)	2.04 (1.49–2.78)	
Present	48	0.740 (0.635–0.835)	2.26 (1.13–4.52)		0.607 (0.446–0.763)	1.80 (0.98–3.30)	
Atezolizumab				0.215			0.145
Not used	143	0.743 (0.691–0.794)	1.93 (1.34–2.79)		0.670 (0.611–0.726)	1.71 (1.20–2.43)	
Used	95	0.664 (0.588–0.739)	2.91 (1.81–4.69)		0.619 (0.527–0.711)	2.65 (1.68–4.20)	

C-index from patient pairs within the same test fold and subgroup (95% CI, bootstrap). HR, high versus low risk (Table 5); P_{int}, Cox interaction test. CI = confidence interval, ECOG = Eastern Cooperative Oncology Group, HR = hazard ratio, OS = overall survival, PFS = progression-free survival