

# 拉格朗日插值

黄知远

2025 年 10 月 18 日

## 目录

1 拉格朗日插值的代数形式	1
2 单点拉格朗日插值	2
2.1 已知值取值连续时的做法	2
2.2 已知值不连续时的做法	2

## 1 拉格朗日插值的代数形式

引理 1. 对于  $n$  次多项式  $f(x)$ , 只需要  $n + 1$  个不同函数值就能确定  $f(x)$  的各项系数.

证明. 设  $n$  次多项式

$$P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$$

若已知其在  $n + 1$  个互不相同点上的取值

$$P(x_i) = y_i \quad (i = 0, 1, \dots, n)$$

则有线性方程组

$$\begin{bmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \cdots & x_0^n \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$

左矩阵为 Vandermonde 矩阵，其行列式

$$\prod_{0 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i) \neq 0$$

当  $x_i$  互异时可逆，方程组唯一可解。

故  $n$  次多项式由  $n+1$  个点唯一确定。  $\square$

对于  $n$  次多项式  $P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$ ，如果已知  $P(x_0), P(x_2), \dots, P(x_n)$  的值，我们可以构造：

$$P(x) = \sum_0^n P(x_i) \prod_{j \neq i} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

带入  $(x_i, P(x_i))$  验证，发现这个形式是正确的，因此这是对  $P(x)$  一种合法表示。

## 2 单点拉格朗日插值

### 2.1 已知值取值连续时的做法

若已知量  $x_0 \dots x_n$  连续，且按照大小顺序排序，我们可以将第一节提到的合法表示改写成下面的形式：

$$P(x) = \sum_0^n (-1)^{n-i} y_i \frac{pre_{i-1} \cdot suf_{i+1}}{fac_i \cdot fac_{n-i}}$$

$$pre_i = \prod_0^i x - x_i$$

$$suf_i = \prod_i^n x - x_i$$

$$fac_i = \prod_1^i j$$

通过前后缀优化，我们可以  $O(n \log n)$  计算这个式子，其中  $\log n$  来源于计算逆元，当然你可以用  $O(1)$  逆元的技巧将其优化到  $O(n)$ 。

### 2.2 已知值不连续时的做法

笔者只知道朴素的  $O(n^2)$  做法，不做赘述。