Appunti di Probabilità

Carbone Davide [1]

A.A. 2026/2027

[1]Lezioni della prof.ssa P. Siri.

Indice

1 Complementi all'esame di Metodi Matematici per l'Ingegneria **2**
- 1.1 Funzione Gamma di Eulero . . . 2
- 1.2 Variabile aleatoria Gamma . . . 2

2 Spazi prodotto e misura prodotto **6**

3 Vettori aleatori **15**
- 3.1 Vettori aleatori discreti . . . 18
- 3.2 Vettori aleatori assolutamente continui . . . 23
- 3.3 Variabili aleatorie indipendenti . . . 28
- 3.4 Valori attesi . . . 40
- 3.5 Covarianza e correlazione . . . 41

4 Trasformazioni di variabili e vettori aleatori **50**
- 4.1 Trasformazioni di variabili aleatorie . . . 50
  - 4.1.1 Caso discreto . . . 50
  - 4.1.2 Caso assolutamente continuo . . . 51
- 4.2 Trasformazioni di vettori aleatori . . . 56
  - 4.2.1 Caso discreto . . . 56
  - 4.2.2 Caso assolutamente continuo . . . 58

Capitolo 1

Complementi all'esame di Metodi Matematici per l'Ingegneria

1.1 Funzione Gamma di Eulero

Definizione 1.1.1. Definiamo la funzione Gamma di Eulero come $\Gamma : (0, +\infty) \to (0, +\infty)$

$$\alpha \mapsto \Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} y^{\alpha-1} e^{-y}\, dy$$

Calcoliamo alcuni valori della funzione Gamma.

- $$\Gamma(1) = \int_0^{+\infty} y^{1-1} e^{-y}\, dy = \int_0^{+\infty} e^{-y}\, dy = \int_{-\infty}^{+\infty} f_Y(y)\, dy = 1,$$

  dove

  $$f_Y(y) = e^{-y} \mathbb{1}_{(0,+\infty)}(y),$$

  cioè

  $$Y \sim \text{Exp}(1).$$

- Per $\alpha > 0$,

$$\Gamma(\alpha+1) = \int_0^{+\infty} y^{\alpha} e^{-y}\, dy \overset{\text{I.P.P.}}{=} \underbrace{\left(-y^{\alpha} e^{-y}\right)\Big|_0^{+\infty}}_{=0} + \int_0^{+\infty} \alpha y^{\alpha-1} e^{-y}\, dy$$

$$= \alpha \int_0^{+\infty} y^{\alpha-1} e^{-y}\, dy = \alpha\Gamma(\alpha).$$

- $$\Gamma(n) = (n-1)\Gamma(n-1) = (n-1)(n-2)\Gamma(n-2) = \dots$$
$$= (n-1)(n-2)\cdots 1 \underbrace{\Gamma(1)}_{=1} = (n-1)!, \qquad \forall\, n \in \mathbb{N}^* = \mathbb{N} \setminus \{0\}.$$

1.2 Variabile aleatoria Gamma

Definizione 1.2.1. Diciamo che la variabile aleatoria assolutamente continua X ha legge gamma di parametri $\alpha > 0$ (parametro di forma) e $\lambda > 0$ (parametro di scala) e denotiamo con

$$X \sim \Gamma(\alpha, \lambda) \qquad \text{oppure} \qquad X \sim \text{Gamma}(\alpha, \lambda)$$

se ha funzione di densità

$$f_X(x) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x} \mathbb{1}_{(0,+\infty)}(x)$$

Osservazione: f_X è una funzione di densità:

- f_X è misurabile
- $f_X \geq 0$
- $$\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)\,dx = \int_0^{+\infty} \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x}\,dx \overset{y=\lambda x}{=} \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^{+\infty} y^{\alpha-1} e^{-y}\,dy = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \cdot \Gamma(\alpha) = 1$$

Osservazione:

$$\mathbb{P}(X \geq 0) = \int_{(0,+\infty)} f_X(x)\,dx = 1 \qquad \Rightarrow \qquad X \geq 0 \text{ q.o.}$$

Vediamo i seguenti casi particolari

- Se $\alpha = 1$

  $$X \sim \Gamma(1, \lambda)$$

  $$f_X(x) = \frac{\lambda^1}{\Gamma(1)} x^{1-1} e^{-\lambda x} \mathbb{1}_{(0,+\infty)}(x) = \lambda e^{-\lambda x} \mathbb{1}_{(0,+\infty)}(x)$$

  ovvero X è un'esponenziale di parametro λ

  $$X \sim \text{Exp}(\lambda).$$


- Se $\alpha = n \in \mathbb{N}^*$

  $$X \sim \Gamma(n, \lambda)$$

  $$f_X(x) = \frac{\lambda^n}{(n-1)!} x^{n-1} e^{-\lambda x} \mathbb{1}_{(0,+\infty)}(x)$$

  Chiamiamo la variabile Gamma ristretta ai parametri interi positivi variabile Erlang e indichiamo

  $$X \sim \text{Erlang}(n, \lambda).$$



Calcoliamo ora media e varianza di $X \sim \Gamma(\alpha, \lambda)$.

- $$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x)\,dx = \int_0^{+\infty} x \cdot \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x}\,dx$$
$$= \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \frac{\Gamma(\alpha+1)}{\lambda^{\alpha+1}} \underbrace{\int_0^{+\infty} \frac{\lambda^{\alpha+1}}{\Gamma(\alpha+1)} x^\alpha e^{-\lambda x}\,dx}_{\substack{\text{densità di } \Gamma(\alpha+1,\lambda) \\ =1}}$$
$$= \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \cdot \frac{\Gamma(\alpha+1)}{\lambda^{\alpha+1}} = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \cdot \frac{\alpha\Gamma(\alpha)}{\lambda^{\alpha+1}} = \frac{\alpha}{\lambda} \qquad \Rightarrow \qquad \mathbb{E}[X] = \frac{\alpha}{\lambda}.$$

- $$\mathbb{E}[X^2] = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_X(x)\,dx = \int_0^{+\infty} x^2 \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x}\,dx$$
$$= \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \frac{\Gamma(\alpha+2)}{\lambda^{\alpha+2}} \underbrace{\int_0^{+\infty} \frac{\lambda^{\alpha+2}}{\Gamma(\alpha+2)} x^{\alpha+1} e^{-\lambda x}\,dx}_{\substack{\text{densità di } \Gamma(\alpha+2,\lambda) \\ =1}}$$
$$= \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \cdot \frac{\alpha(\alpha+1)\Gamma(\alpha)}{\lambda^{\alpha+2}} = \frac{\alpha(\alpha+1)}{\lambda^2}$$
$$\Rightarrow \quad \operatorname{var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2 = \frac{\alpha(\alpha+1)}{\lambda^2} - \frac{\alpha^2}{\lambda^2} \Rightarrow \operatorname{var}(X) = \frac{\alpha}{\lambda^2}.$$

Sia $T_n \sim \text{Erlang}(n, \lambda)$ ($T_n \sim \Gamma(n, \lambda)$).

$$\forall\, t \leq 0 \qquad F_{T_n}(t) = 0.$$

$$\forall\, t > 0 \qquad F_{T_n}(t) = \int_0^t \frac{\lambda^n}{(n-1)!} x^{n-1} e^{-\lambda x}\,dx \overset{\text{IPA}}{=}$$
$$= \frac{\lambda^n}{(n-1)!} \left[x^{n-1} \left(-\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda x} \right) \right]_0^t + \int_0^t \frac{\lambda^n}{(n-1)!} (n-1) x^{n-2} \frac{1}{\lambda} e^{-\lambda x}\,dx$$

$$= -\frac{\lambda^{n-1}}{(n-1)!}t^{n-1}e^{-\lambda t} + \underbrace{\int_0^t \frac{\lambda^{n-1}}{(n-2)!}x^{n-2}e^{-\lambda x}\,dx}_{F_{T_{n-1}}(t) \text{ con } T_{n-1}\sim\Gamma(n-1,\lambda)}$$

$$= -\frac{\lambda^{n-1}}{(n-1)!}t^{n-1}e^{-\lambda t} - \frac{\lambda^{n-2}}{(n-2)!}t^{n-2}e^{-\lambda t} + \underbrace{\int_0^t \frac{\lambda^{n-2}}{(n-3)!}x^{n-3}e^{-\lambda x}\,dx}_{F_{T_{n-2}}(t) \text{ con } T_{n-2}\sim\Gamma(n-2,\lambda)}$$

$$= -\frac{\lambda^{n-1}}{(n-1)!}t^{n-1}e^{-\lambda t} - \frac{\lambda^{n-2}}{(n-2)!}t^{n-2}e^{-\lambda t} - \dots$$

$$\dots - \frac{\lambda^1}{1!}t^1e^{-\lambda t} + F_{T_1}(t)$$

con $T_1 \sim \Gamma(1,\lambda)$ cioè $T_1 \sim \text{Exp}(\lambda)$

$$\Rightarrow F_{T_1}(t) = 1 - e^{-\lambda t} = 1 - \frac{\lambda^0}{0!}t^0e^{-\lambda t} \qquad (\text{se } t > 0)$$

$$\Rightarrow F_{T_n}(t) = 1 - \sum_{k=0}^{n-1}\frac{\lambda^k}{k!}t^ke^{-\lambda t} = 1 - \sum_{k=0}^{n-1}\frac{(\lambda t)^k}{k!}e^{-\lambda t} \text{ se } t > 0.$$

Poniamo $N_t \sim P(\lambda t) \Rightarrow \mathbb{P}(N_t = k) = e^{-(\lambda t)}\frac{(\lambda t)^k}{k!} \quad \forall k \in \mathbb{N}$. Otteniamo quindi che

- $$F_{T_n}(t) = \mathbb{P}(T_n \le t) = 1 - \sum_{k=0}^{n-1}\mathbb{P}(N_t = k)$$
$$= 1 - \mathbb{P}(N_t \le n-1) = \mathbb{P}(N_t > n-1) = S_{N_t}(n-1)$$
$$= \mathbb{P}(N_t \ge n) \qquad \forall\, t > 0.$$

- $$S_{T_n}(t) = \mathbb{P}(T_n > t) = \mathbb{P}(N_t < n) = F_{N_t}(n-1) \qquad \forall\, t > 0.$$

Considerando anche il fatto che il numero medio di eventi in $[0,t]$ è λt e che $N_1 \sim P(\lambda)$ rappresnta il numero di eventi in $[0,1]$ possiamo concludere che $N_t \sim P(\lambda t)$ rappresenta il numero di eventi in $[0,t]$. Sappiamo quindi che la probabilià che in $[0,t]$ ci siano stati più di $n-1$ eventi è $S_{N_t}(n-1) = F_{T_n}(t) = \mathbb{P}(T_n \le t)$ ovvero è uguale alla probabilità che T_n sia minore o uguale a t. T_n deve quindi rappresentare l'istante in cui succede l'n-esimo evento. In particolare $T_1 \sim \text{Exp}(\lambda)$ rappresenta l'istante in cui accade il primo evento. Ancora una volta identifichiamo quindi l'esponenziale come un analogo continuo della geometrica.

Capitolo 2

Spazi prodotto e misura prodotto

Siano $(X_1, \mathcal{A}_1, \mu_1)$ e $(X_2, \mathcal{A}_2, \mu_2)$ spazi di misura.


Vogliamo dotare l'insieme $X_1 \times X_2$ di una struttura di spazio di misura che sia in un certo senso indotta dalla struttura di spazio di misura delle componenti.

Definizione 2.0.1. Si dice rettangolo misurabile un insieme del tipo $A \times B$ con $A \in \mathcal{A}_1$ e $B \in \mathcal{A}_2$.

L'insieme dei rettangoli misurabili non è una σ-algebra, perché in generale

$$(A_1 \times B_1) \cup (A_2 \times B_2)$$

non è un rettangolo misurabile:



Definizione 2.0.2. Si definisce σ-algebra prodotto la σ-algebra generata dai rettangoli misurabili

$$\mathcal{A}_1 \otimes \mathcal{A}_2 = \sigma\left(\{A \times B : A \in \mathcal{A}_1,\, B \in \mathcal{A}_2\}\right).$$

Siano π_1 e π_2 le proiezioni canoniche:


$$\begin{aligned} \pi_1 : X_1 \times X_2 &\longrightarrow X_1 \\ (x, y) &\longmapsto x \end{aligned} \qquad \begin{aligned} \pi_2 : X_1 \times X_2 &\longrightarrow X_2 \\ (x, y) &\longmapsto y \end{aligned}$$

Proposizione 2.0.3.

$$\mathcal{A}_1 \otimes \mathcal{A}_2 = \sigma(\pi_1, \pi_2) = \sigma\left(\left\{\pi_1^{-1}(A), \pi_2^{-1}(B) : A \in \mathcal{A}_1,\ B \in \mathcal{A}_2\right\}\right)$$
$$= \left\{\pi_1^{-1}(A) : A \in \mathcal{A}_1\right\} \vee \left\{\pi_2^{-1}(B) : B \in \mathcal{A}_2\right\}.$$


Dimostrazione. "$\supset$": Sia

$$\pi_1^{-1}(A) = A \times X_2, \qquad A \in \mathcal{A}_1,$$
$$\Rightarrow \pi_1^{-1}(A) \in \mathcal{A}_1 \otimes \mathcal{A}_2.$$



Sia


$$\pi_2^{-1}(B) = X_1 \times B, \qquad B \in \mathcal{A}_2,$$
$$\Rightarrow \pi_2^{-1}(B) \in \mathcal{A}_1 \otimes \mathcal{A}_2.$$



"$\subset$": Sia $A \times B$ rettangolo misurabile,

$$A \in \mathcal{A}_1, \qquad B \in \mathcal{A}_2.$$

$$A \times B = \pi_1^{-1}(A) \cap \pi_2^{-1}(B)$$



$$\Rightarrow A \times B \in \sigma(\pi_1, \pi_2).$$


□

Per costruzione $(X_1 \times X_2, \mathcal{A}_1 \otimes \mathcal{A}_2)$ è uno spazio misurabile. Costruiamo una misura su di esso.

Definizione 2.0.4. Sia $E \in \mathcal{A}_1 \otimes \mathcal{A}_2$. Definiamo le sezioni di E come

$$E_x^2 = \{y \in X_2 : (x, y) \in E\} \quad \forall\, x \in X_1$$

$$E_y^1 = \{x \in X_1 : (x, y) \in E\} \quad \forall\, y \in X_2$$



Proposizione 2.0.5. Siano $(X_1, \mathcal{A}_1, \mu_1)$ e $(X_2, \mathcal{A}_2, \mu_2)$ spazi di misura e siano μ_1 e μ_2 misure σ-finite.

Sia $E \in \mathcal{A}_1 \otimes \mathcal{A}_2$. Allora:

1. $$\forall\, x \in X_1 \qquad E_x^2 \in \mathcal{A}_2 \qquad \text{e} \qquad \forall\, y \in X_2 \qquad E_y^1 \in \mathcal{A}_1.$$

2. Le funzioni
$$\begin{array}{ccc} X_1 & \longrightarrow & [0, +\infty] \\ x & \longmapsto & \mu_2(E_x^2) \end{array}$$
$$\begin{array}{ccc} X_2 & \longrightarrow & [0, +\infty] \\ y & \longmapsto & \mu_1(E_y^1) \end{array}$$
sono misurabili e ≥ 0.

3. $$\int_{X_1} \mu_2(E_x^2)\, d\mu_1(x) = \int_{X_2} \mu_1(E_y^1)\, d\mu_2(y).$$

Dimostrazione. Verifichiamolo nel caso in cui

$$E = A \times B, \qquad A \in \mathcal{A}_1, \qquad B \in \mathcal{A}_2.$$

1.
$$E_x^2 = \begin{cases} B & \text{se } x \in A, \\ \varnothing & \text{se } x \notin A, \end{cases}$$
$$E_y^1 = \begin{cases} A & \text{se } y \in B, \\ \varnothing & \text{se } y \notin B. \end{cases}$$
$$\Rightarrow \quad \forall\, x \in X_1 \qquad E_x^2 \in \mathcal{A}_2 \qquad \text{e} \qquad \forall\, y \in X_2 \qquad E_y^1 \in \mathcal{A}_1.$$

2.
$$\forall\, x \in X_1 \qquad \mu_2(E_x^2) = \mu_2(B)\mathbb{1}_A(x),$$
$$\forall\, y \in X_2 \qquad \mu_1(E_y^1) = \mu_1(A)\mathbb{1}_B(y),$$
misurabili ≥ 0.

3.
$$\int_{X_1} \mu_2(E_x^2)\, d\mu_1(x) = \int_{X_1} \mu_2(B)\mathbb{1}_A(x)\, d\mu_1(x)$$
$$= \mu_2(B) \int_{X_1} \mathbb{1}_A(x)\, d\mu_1(x) = \mu_2(B)\mu_1(A).$$
$$\int_{X_2} \mu_1(E_y^1)\, d\mu_2(y) = \int_{X_2} \mu_1(A)\mathbb{1}_B(y)\, d\mu_2(y)$$
$$= \mu_1(A) \int_{X_2} \mathbb{1}_B(y)\, d\mu_2(y) = \mu_1(A)\mu_2(B) \Rightarrow \underline{\text{ok}}$$

□

Teorema 2.0.6. $(X_1, \mathcal{A}_1, \mu_1)$, $(X_2, \mathcal{A}_2, \mu_2)$ spazi di misura e siano μ_1 e μ_2 misure σ-finite. Allora

1.
$$\mu_1 \otimes \mu_2 : \mathcal{A}_1 \otimes \mathcal{A}_2 \longrightarrow [0, +\infty] \qquad \text{t.c. } \forall E \in \mathcal{A}_1 \otimes \mathcal{A}_2$$
$$\mu_1 \otimes \mu_2(E) = \int_{X_1} \mu_2(E_x^2)\, d\mu_1(x) = \int_{X_2} \mu_1(E_y^1)\, d\mu_2(y)$$
è una misura σ-finita definita su
$$(X_1 \times X_2, \mathcal{A}_1 \otimes \mathcal{A}_2)$$
ed è detta misura prodotto.

2. Inoltre se $E = A \times B$ con $A \in \mathcal{A}_1$ e $B \in \mathcal{A}_2$ allora
$$\mu_1 \otimes \mu_2(E) = \mu_1 \otimes \mu_2(A \times B) = \mu_1(A)\mu_2(B).$$

3. Infine se
$$\lambda : \mathcal{A}_1 \otimes \mathcal{A}_2 \longrightarrow [0, +\infty]$$

è una misura σ-finita definita su

$$(X_1 \times X_2, \mathcal{A}_1 \otimes \mathcal{A}_2)$$

t.c.

$$\forall A \in \mathcal{A}_1,\ B \in \mathcal{A}_2 \qquad \lambda(A \times B) = \mu_1(A)\mu_2(B)$$

allora

$$\lambda = \mu_1 \otimes \mu_2.$$


Osservazione:

1. Se


$$X_1 = X_2 = \mathbb{R}, \qquad \mathcal{A}_1 = \mathcal{A}_2 = \mathcal{B}(\mathbb{R}),$$
$$X_1 \times X_2 = \mathbb{R}^2.$$

   - Si può provare che
   $$\mathcal{A}_1 \otimes \mathcal{A}_2 = \mathcal{B}(\mathbb{R}) \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R}) = \mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$$
   ed è generata da rettangoli misurabili del tipo
   $$(a,b) \times (c,d), \qquad [a,b] \times (c,d], \dots$$
   $$(-\infty, a] \times (b, +\infty), \dots$$
   - Su $\mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$ possiamo definire la misura prodotto
   $$\underline{m} = m \otimes m \qquad \text{t.c.} \qquad \underline{m}(A \times B) = m(A)m(B).$$
   $\underline{m}$ è detta misura di Borel-Lebesgue.

2. Se
$$E \in \mathcal{A}_1 \otimes \mathcal{A}_2 \qquad \text{t.c.} \qquad \mu_1 \otimes \mu_2(E) = 0,$$
$$\Rightarrow \qquad \mu_2(E_x^2) = 0 \quad \text{per quasi ogni } x \in X_1 \qquad (\mu_1 \text{ q.o.})$$
$$\mu_1(E_y^1) = 0 \quad \text{per quasi ovunque } y \in X_2 \qquad (\mu_2 \text{ q.o.}).$$



$\mu_2(E_x^2) = 0$
$\forall x \in X_1$



$\mu_2(E_x^2) = 0$
$\forall x \neq x_0$

$\mu_2(E_{x_0}^2) \neq 0$ ma $\{x_0\}$ è trascurabile

Teorema 2.0.7 (di Tonelli)**.** Siano $(X_1, \mathcal{A}_1, \mu_1)$, $(X_2, \mathcal{A}_2, \mu_2)$ spazi di misura e siano μ_1 e μ_2 misure σ-finite.

Sia

$$f : X_1 \times X_2 \longrightarrow \overline{\mathbb{R}}$$

f misurabile e $f \geq 0$. Allora

1. $\forall\, x \in X_1$

$$\begin{aligned} f(x, \cdot) : X_2 &\longrightarrow \overline{\mathbb{R}} \\ y &\longmapsto f(x, y) \end{aligned}$$

   $\forall\, y \in X_2$

$$\begin{aligned} f(\cdot, y) : X_1 &\longrightarrow \overline{\mathbb{R}} \\ x &\longmapsto f(x, y) \end{aligned}$$

   sono misurabili e ≥ 0.

2. Le funzioni

$$\begin{aligned} X_1 &\longrightarrow \overline{\mathbb{R}} \\ x &\longmapsto \int_{X_2} f(x, y)\, d\mu_2(y) \\ X_2 &\longrightarrow \overline{\mathbb{R}} \\ y &\longmapsto \int_{X_1} f(x, y)\, d\mu_1(x) \end{aligned}$$

   sono misurabili e ≥ 0.

3.

$$\begin{aligned} &\int_{X_1} \left(\int_{X_2} f(x, y)\, d\mu_2(y) \right) d\mu_1(x) = \\ &\int_{X_2} \left(\int_{X_1} f(x, y)\, d\mu_1(x) \right) d\mu_2(y) \\ &= \int_{X_1 \times X_2} f(x, y)\, d(\mu_1 \otimes \mu_2)(x, y). \end{aligned}$$

Teorema 2.0.8 (di Fubini)**.** Siano $(X_1, \mathcal{A}_1, \mu_1)$, $(X_2, \mathcal{A}_2, \mu_2)$ spazi di misura e siano μ_1 e μ_2 misure σ-finite.

Sia

$$f : X_1 \times X_2 \longrightarrow \overline{\mathbb{R}}$$

f integrabile rispetto a $\mu_1 \otimes \mu_2$. Allora

1. $\forall\, x \in X_1$

$$\begin{aligned} f(x, \cdot) : X_2 &\longrightarrow \overline{\mathbb{R}} \\ y &\longmapsto f(x, y) \end{aligned}$$

   $\forall\, y \in X_2$

$$\begin{aligned} f(\cdot, y) : X_1 &\longrightarrow \overline{\mathbb{R}} \\ x &\longmapsto f(x, y) \end{aligned}$$

   integrabili rispetto a μ_2 e μ_1 rispettivamente.

2. Le funzioni

$$\begin{aligned} X_1 &\longrightarrow \overline{\mathbb{R}} \\ x &\longmapsto \int_{X_2} f(x,y)\, d\mu_2(y) \\ X_2 &\longrightarrow \overline{\mathbb{R}} \\ y &\longmapsto \int_{X_1} f(x,y)\, d\mu_1(x) \end{aligned}$$

integrabili rispetto a μ_1 e μ_2 rispettivamente.

3.

$$\int_{X_1} \left(\int_{X_2} f(x,y)\, d\mu_2(y) \right) d\mu_1(x) = \int_{X_2} \left(\int_{X_1} f(x,y)\, d\mu_1(x) \right) d\mu_2(y) = \int_{X_1 \times X_2} f(x,y)\, d(\mu_1 \otimes \mu_2)(x,y).$$

Diamo ora un'applicazione dei teoremi di Fubini-Tonelli nel calcolo delle probabilità. In particolare siamo interessati nel calcolare la media di una variabile aleatoria come intergrale della sua funzione di sopravvivenza.

Proposizione 2.0.9. Sia $X \geq 0$ q.o. t.c.

$$X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}).$$

Allora

$$\mathbb{E}[X] = \int_0^{+\infty} S_X(x)\, dx = \int_0^{+\infty} \mathbb{P}(X > x)\, dx.$$

ricordando che

$$\mathbb{E}[X] = \int_\Omega X\, d\mathbb{P} = \int_{\mathbb{R}} x\, d\mathbb{P}_X(x).$$

Dimostrazione. Consideriamo la misura prodotto su

$$\left(\mathbb{R}^2, \mathcal{B}(\mathbb{R}^2)\right)$$

data da

$$\mathbb{P}_X \otimes m = \mu.$$

$\forall\, E \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$ le sue sezioni sono

$$\forall\, x \in \mathbb{R} \qquad E_x^2 = \{y \in \mathbb{R} : (x,y) \in E\},$$

$$\forall\, y \in \mathbb{R} \qquad E_y^1 = \{x \in \mathbb{R} : (x,y) \in E\}.$$


$$\mu(E) = (\mathbb{P}_X \otimes m)(E) = \int_{\mathbb{R}} m(E_x^2)\, d\mathbb{P}_X(x) = \int_{\mathbb{R}} \mathbb{P}_X(E_y^1)\, dm(y).$$

Sia

$$E = \left\{(x,) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq y < x\right\}.$$

- $$\forall\, x \le 0 \qquad E_x^2 = \varnothing \qquad m(E_x^2) = 0.$$

$$\forall\, x > 0 \qquad E_x^2 = [0, x) \qquad m(E_x^2) = x.$$



$$\mu(E) = \int_{\mathbb{R}} m(E_x^2)\, d\mathbb{P}_X(x) = \int_0^{+\infty} x\, d\mathbb{P}_X(x) =$$

dal momento che

$$X \ge 0 \text{ q.o.}, \qquad \mathbb{P}_X((-\infty, 0)) = 0.$$

si ottiene

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x\, d\mathbb{P}_X(x). = \int_\Omega X\, d\mathbb{P} = \mathbb{E}[X].$$

- $$\forall\, y \le 0 \qquad E_y^1 = \varnothing \qquad \mathbb{P}_X(E_y^1) = 0.$$

$$\forall\, y > 0 \qquad E_y^1 = (y, +\infty) \qquad \mathbb{P}_X(E_y^1) = \mathbb{P}_X((y, +\infty)) = \mathbb{P}(X > y).$$

$$\mu(E) = \int_{\mathbb{R}} \mathbb{P}_X(E_y^1)\, dm(y) = \int_0^{+\infty} \mathbb{P}(X > y)\, dy = \int_0^{+\infty} S_X(y)\, dy.$$

da cui la tesi. □

Osservazione:

- Vale anche
$$\mathbb{E}[X] = \int_0^{+\infty} \mathbb{P}(X \ge x)\, dx.$$
- Se X ha segno qualsiasi
$$\mathbb{E}[X] = \int_0^{+\infty} S_X(x)\, dx - \int_{-\infty}^0 F_X(x)\, dx.$$
- Se X è una v.a. discreta con $X(\Omega) \subseteq \mathbb{N}$
$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=0}^{\infty} S_X(k).$$

Esempio 2.0.10. 1. Sia $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ $\quad S_X(x) = e^{-\lambda x} \quad \forall\, x > 0.$

$$\mathbb{E}[X] = \int_0^{+\infty} S_X(x)\, dx = \frac{1}{\lambda} \underbrace{\int_0^{+\infty} \lambda e^{-\lambda x}\, dx}_{1 \text{ perché è la densità di } X} = \frac{1}{\lambda}.$$

2. Sia $X \sim \text{Geo}(p)$ $\quad S_X(k) = (1-p)^k \quad \forall\, k \in \mathbb{N}.$

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=0}^{\infty} S_X(k) = \sum_{k=0}^{\infty} (1-p)^k = \frac{1}{1-(1-p)} = \frac{1}{p}.$$

dal momento che $0 \leq 1-p < 1$ la serie geometrica di ragione geometrica $(1-p)$ converge.

Capitolo 3

Vettori aleatori

Definizione 3.0.1. Sia $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ spazio di probabilità.
Un vettore aleatorio o variabile aleatoria vettoriale a valori in $\mathbb{R}^N$ è una funzione misurabile

$$\underline{X} : (\Omega, \mathcal{F}) \longrightarrow \left(\mathbb{R}^N, \mathcal{B}(\mathbb{R}^N)\right)$$

Possiamo indicare un vettore aleatori con

$$\underline{X} = (X_1, \dots, X_N).$$

dove $X_i = \pi_i \circ X$ e le π_i sono le proiezioni canoniche del prodotto cartesiano.

Esempio 3.0.2. Estraggo n palline da un'urna che contiene palline di 4 colori: Bianco, Giallo, Verde, Rosso.
Mi interessa il numero di palline Bianche e Gialle che sono state estratte. Posso usare il vettore aleatorio

$$\underline{X} = (X_1, X_2)$$

con

$$X_1 = n^\circ \text{ palline Bianche}, X_2 = n^\circ \text{ palline Gialle}.$$

Esempio 3.0.3. Immaginiamo di tirare ad un bersaglio circolare. Ci interessa il punto colpito. Possiamo usare il vettore aleatorio $\underline{X} = (X_1, X_2)$ dove

$$X_i,\ i = 1, 2 \qquad \text{coordinate del punto (cartesiane e polare)}$$

Osservazione: Le proiezione canoniche viste come funzioni tra spazi misurabili

$$\forall\, i = 1, \dots, N \quad \pi_i : \left(\mathbb{R}^N, \mathcal{B}(\mathbb{R}^N)\right) \longrightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R})) \quad \underline{x} = (x_1, \dots, x_N) \longmapsto x_i$$

sono funzioni misurabili.
Consideriamo

$$X_i : \Omega \longrightarrow \mathbb{R} \qquad : \qquad X_i = \pi_i \circ \underline{X}$$

$$\Omega \xrightarrow{\underline{X}} \mathbb{R}^N \xrightarrow{\pi_i} \mathbb{R}$$

Otteniamo che le X_i sono misurabi perché composizione di misurabili. In particolare sono variabilili aleatorie.

Viceversa $X_1, \dots, X_N$ siano variabili aleatorie.Sia

$$A = A_1 \times \cdots \times A_N$$

un rettangolo misurabile ovvero

$$A_i \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) \qquad \forall\, i = 1, \dots, N.$$

Allora

$$\underline{X}^{-1}(A) = \underline{X}^{-1}(A_1 \times \cdots \times A_N) = (\underline{X} \in A_1 \times \cdots \times A_N) =$$

$$= (X_1 \in A_1) \cap \cdots \cap (X_N \in A_N) = (X_1 \in A_1, \dots, X_N \in A_N) =$$

$$= \underbrace{X_1^{-1}(A_1)}_{\in \mathcal{F}} \cap \cdots \cap \underbrace{X_N^{-1}(A_N)}_{\in \mathcal{F}} \in \mathcal{F}$$

$$\Rightarrow \underline{X}^{-1}(A) \in \mathcal{F}.$$

Ma i rettangoli misurabili generano $\mathcal{B}(\mathbb{R}^N)$

$$\Rightarrow \quad \forall\, A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^N) \qquad \underline{X}^{-1}(A) \in \mathcal{F}$$

$$\Rightarrow \quad \underline{X} \text{ è misurabile e quindi un vettore aleatorio}$$

Possiamo quindi dare una definizione equivalente di variabile aleatoria.

Definizione 3.0.4. Dato $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ spazio di probabilità. Un vettore aleatorio a valori in $\mathbb{R}^N$ è una funzione vettoriale

$$\underline{X} = (X_1, \dots, X_N), \qquad \underline{X} : \Omega \to \mathbb{R}^N$$

le cui componenti sono variabili aleatorie reali.

Definizione 3.0.5. Sia

$$\underline{X} = (X_1, \dots, X_N)$$

un vettore aleatorio.

Si dice legge congiunta di $\underline{X}$ (legge congiunta delle variabili $X_1, \dots, X_N$) la misura immagine di $\mathbb{P}$ mediante $\underline{X}$ ovvero la misura di probabilità $\mathbb{P}_{\underline{X}}$ t.c.

$$\forall\, A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^N) \qquad \mathbb{P}_{\underline{X}}(A) = \mathbb{P}\left(\underline{X}^{-1}(A)\right) = \mathbb{P}(\underline{X} \in A).$$

Si dicono invece leggi marginali le leggi delle componenti ovvero $\mathbb{P}_{X_i}$ t.c.

$$\forall\, B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) \qquad \mathbb{P}_{X_i}(B) = \mathbb{P}\left(X_i^{-1}(B)\right) = \mathbb{P}(X_i \in B).$$

Per semplicità da qui alla fine della lezione consideriamo $N = 2$ e scriviamo $Z = (X, Y)$.

Definizione 3.0.6. Sia

$$\underline{Z} = (X, Y)$$

un vettore aleatorio.


Si dice funzione di ripartizione (o di distribuzione cumulata) congiunta di $\underline{Z}$ la funzione

$$F_{\underline{Z}} = F_{(X,Y)} : \mathbb{R}^2 \longrightarrow [0,1]$$

$$z = (x, y) \longmapsto F_{\underline{Z}}(z) = F_{\underline{Z}}(x, y)$$

dove

$$\begin{aligned} F_{\underline{Z}}(z) = F_{\underline{Z}}(x, y) &= \mathbb{P}\big((X \leq x) \cap (Y \leq y)\big) \\ &= \mathbb{P}(X \leq x, Y \leq y) \\ &= \mathbb{P}\left(X^{-1}((-\infty, x]) \cap Y^{-1}((-\infty, y])\right) \\ &= \mathbb{P}\left(\underline{Z}^{-1}\left((-\infty, x] \times (-\infty, y]\right)\right) = \mathbb{P}_{\underline{Z}}\left((-\infty, x] \times (-\infty, y]\right). \end{aligned}$$



Le funzioni di ripartizione marginali sono le funzioni di ripartizioni delle componenti ovvero

$$F_X, F_Y : \mathbb{R} \longrightarrow [0,1] \qquad \text{t.c.}$$

$$F_X(x) = \mathbb{P}_X((-\infty, x]) = \mathbb{P}\left(X^{-1}((-\infty, x])\right) = \mathbb{P}(X \leq x) \qquad \forall x \in \mathbb{R}.$$

$$F_Y(y) = \mathbb{P}_Y((-\infty, y]) = \mathbb{P}\left(Y^{-1}((-\infty, y])\right) = \mathbb{P}(Y \leq y) \qquad \forall y \in \mathbb{R}.$$

Proposizione 3.0.7. 1.

$$\forall\, x \in \mathbb{R} \qquad F_X(x) = \lim_{y \to +\infty} F_{\underline{Z}}((x, y)).$$

2.

$$\forall\, y \in \mathbb{R} \qquad F_Y(y) = \lim_{x \to +\infty} F_{\underline{Z}}((x, y)).$$

Dimostrazione. Sia


$$y_n \to +\infty$$

e sia

$$A_n = (-\infty, x] \times (-\infty, y_n].$$

$$y_n \leq y_{n+1} \qquad \Rightarrow \qquad A_n \subseteq A_{n+1}.$$

$$A = \bigcup_{n \geq 1} A_n = (-\infty, x] \times \mathbb{R}.$$



$$\Rightarrow \lim_{n\to\infty} F_{\underline{Z}}(x, y_n) = \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}_{\underline{Z}}\left((-\infty, x] \times (-\infty, y_n]\right) =$$

$$= \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}_{\underline{Z}}(A_n) = \mathbb{P}_{\underline{Z}}(A) = \mathbb{P}_{\underline{Z}}\left((-\infty, x] \times \mathbb{R}\right)$$

$$= \mathbb{P}(X \leq x) = F_X(x) \qquad \Rightarrow \qquad \lim_{y\to+\infty} F_{\underline{Z}}(x, y) = F_X(x).$$

analogo per F_Y. □

Osservazione: In generale F_X e F_Y non si può ricavare $F_{\underline{Z}}$.

3.1 Vettori aleatori discreti

Definizione 3.1.1. Un vettore aleatorio

$$\underline{Z} = (X, Y)$$

si dice discreto se l'insieme dei valori assunti da $\underline{Z}$, $\underline{Z}(\Omega)$, è un insieme discreto.
Questo succede se e solo se sono discrete le componenti X e Y.
In particolare

$$\underline{Z}(\Omega) \subseteq X(\Omega) \times Y(\Omega) = \{(x_i, y_j) : i \in I,\ j \in J\}$$

con I e J al più numerabili.

- La legge di $\underline{Z}$, $\mathbb{P}_{\underline{Z}}$, è una misura discreta concentrata su $\underline{Z}(\Omega)$
  è definita su $\{(x_i, y_j)\}$ con $(x_i, y_j) \in \underline{Z}(\Omega)$
  e poi estesa ai Boreliani:

$$\forall\, B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^2) \qquad \mathbb{P}_{\underline{Z}}(B) = \mathbb{P}(\underline{Z} \in B) = \sum_{(x_i,y_j)\in B\cap\underline{Z}(\Omega)} \mathbb{P}_{\underline{Z}}\big(\{(x_i, y_j)\}\big)$$

$$= \sum_{(x_i,y_j)\in B\cap \underline{Z}(\Omega)} \mathbb{P}\big(\underline{Z} = (x_i, y_j)\big) = \sum_{(x_i,y_j)\in B\cap \underline{Z}(\Omega)} \mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j).$$

La funzione di densità discreta congiunta di $\underline{Z}$ è la funzione

$$p_{\underline{Z}} = p_{(X,Y)} : \mathbb{R}^2 \longrightarrow [0,1]$$

t.c.

$$p_{\underline{Z}}(z) = p_{\underline{Z}}((x,y)) = \mathbb{P}\big(\underline{Z} = (x,y)\big) = \mathbb{P}(X = x, Y = y)$$

$$= \begin{cases} \mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j) & \text{se } (x,y) = (x_i, y_j) \in \underline{Z}(\Omega), \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Le funzioni di densità discrete delle componenti X e Y sono dette marginali e si possono ricavare dalla densità discreta congiunta (non viceversa).

Osservazione: Fissiamo $x_i \in X(\Omega)$, $i \in I$.

Osserviamo che

$$\{(Y = y_j) : j \in J\}$$

è una partizione dell'evento certo $\Rightarrow$ possiamo utilizzare la formula della probabilità totale, ovvero

$$\forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) \qquad \mathbb{P}(B) = \sum_{j\in J} \mathbb{P}\big(B \cap (Y = y_j)\big).$$

$$p_X(x_i) = \mathbb{P}(X = x_i) = \mathbb{P}(B) = \sum_{j\in J} \mathbb{P}\big(B \cap (Y = y_j)\big)$$

$$= \sum_{j\in J} \mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j) = \sum_{j\in J} p_{(X,Y)}(x_i, y_j).$$

$$\Downarrow$$

$$\forall x_i \in X(\Omega) \qquad p_X(x_i) = \sum_{j\in J} p_{(X,Y)}(x_i, y_j)$$

$$\forall y_j \in Y(\Omega) \qquad p_Y(y_j) = \sum_{i\in I} p_{(X,Y)}(x_i, y_j).$$

Variabile aleatoria multinomiale

Come primo vettore aleatorio discreto presentiamo una diretta estensione della variabile discreta binomiale.

Definizione 3.1.2. Consideriamo n prove ripetute e indipendenti dello stesso esperimento aleatorio, ciascuna delle quali può produrre $N + 1$ possibili risultati.

Indichiamo con

$$p_i, \qquad i = 1, \ldots, N,$$

la probabilità di ottenere il risultato di tipo i. La probabilità di ottenere il risultato di tipo

$N+1$ è quindi

$$p_{N+1} = 1 - \sum_{i=1}^{N} p_i.$$

Definiamo il vettore aleatorio

$$\underline{X} = (X_1, \dots, X_N),$$

dove

$$X_i = \text{n}^\circ \text{ di risultati di tipo } i, \qquad i = 1, \dots, N.$$

Il numero di risultati di tipo $N+1$ non deve essere incluso esplicitamente nel vettore, poiché è determinato dagli altri:

$$X_{N+1} = n - \sum_{i=1}^{N} X_i.$$

Si scrive

$$\underline{X} \sim M(n, p_1, \dots, p_N),$$

e si dice che $\underline{X}$ è una variabile aleatoria multinomiale di parametri

$$n, p_1, \dots, p_N.$$

Lo spazio dei valori assunti da $\underline{X}$ è

$$\underline{X}(\Omega) = \left\{ (n_1, \dots, n_N) : n_i \in \{0, \dots, n\}, \quad \sum_{i=1}^{N} n_i \leq n \right\}.$$

Infatti, fissato

$$(n_1, \dots, n_N) \in \underline{X}(\Omega),$$

il numero di risultati di tipo $N+1$ è

$$n_{N+1} = n - \sum_{i=1}^{N} n_i.$$

La funzione di densità discreta congiunta è quindi

$$\begin{aligned} p_{\underline{X}}(n_1, \dots, n_N) &= \mathbb{P}\left(X_1 = n_1, \dots, X_N = n_N\right) \\ &= \mathbb{P}\left(\underline{X} = (n_1, \dots, n_N)\right) \\ &= \frac{n!}{n_1! \cdots n_N! \left(n - \sum_{i=1}^{N} n_i\right)!} p_1^{n_1} \cdots p_N^{n_N} \left(1 - \sum_{i=1}^{N} p_i\right)^{n - \sum_{i=1}^{N} n_i}. \end{aligned}$$

Il coefficiente

$$\binom{n}{n_1, \dots, n_{N+1}} = \frac{n!}{n_1! \cdots n_N! n_{N+1}!}$$

è detto coefficiente multinomiale.

Osservazione: Possiamo ricavare le distribuzioni marginali delle componenti X_i.

Fissato $i \in \{1, \dots, N\}$ e $n_i \in \{0, \dots, n\}$,

$$p_{X_i}(n_i) = \mathbb{P}(X_i = n_i) = \sum_{\substack{n_j,\, j \neq i \\ (n_1,\dots,n_N) \in \underline{X}(\Omega)}} p_{\underline{X}}(n_1, \dots, n_N).$$

Sommando rispetto a tutti i possibili valori delle altre componenti si ottiene

$$p_{X_i}(n_i) = \binom{n}{n_i} p_i^{n_i} (1 - p_i)^{n - n_i}.$$

Quindi

$$X_i \sim B(n, p_i).$$

Ogni componente X_i può dunque essere vista come una variabile aleatoria binomiale associata allo schema di Bernoulli in cui il "successo" consiste nell'ottenere un risultato di tipo i, evento che in ogni prova ha probabilità p_i.

Esempio 3.1.3. Facciamo 10 estrazioni con reinserimento da un'urna con 100 palline di cui 50 nere, 20 rosse, 20 bianche e 10 verdi.

a) Con quale probabilità ottengo 5 nere, 3 rosse e 1 bianca?

$$N = 3 \qquad \underline{X} = (X_N, X_R, X_B) \qquad X_V = n - (X_N + X_R + X_B)$$

$$n = 10$$

$$p_N = \frac{1}{2} \qquad p_R = \frac{1}{5} \qquad p_B = \frac{1}{5} \qquad p_V = 1 - (p_N + p_R + p_B) = \frac{1}{10}$$

$$p_{\underline{X}}((5,3,1)) = \mathbb{P}(\underline{X} = (5,3,1)) = \mathbb{P}(X_N = 5, X_R = 3, X_B = 1)$$

$$= \frac{10!}{5!\,3!\,1!\,1!} \left(\frac{1}{2}\right)^5 \left(\frac{1}{5}\right)^3 \left(\frac{1}{5}\right)^1 \left(\frac{1}{10}\right)^1 = 0.0252$$

b) Con quale probabilità ottengo 5 nere e 3 rosse?
Due possibili strade:

1) $$\mathbb{P}\big((\underline{X} = (5,3,0)) \cup (\underline{X} = (5,3,1)) \cup (\underline{X} = (5,3,2))\big)$$

$$= p_{\underline{X}}((5,3,0)) + p_{\underline{X}}((5,3,1)) + p_{\underline{X}}((5,3,2)) = 0.056$$

2) $$\widetilde{N} = 2 \qquad \underline{\widetilde{X}} = (X_N, X_R) \qquad X_{BV} = n - (X_N + X_R)$$

$$n = 10$$

$$p_N = \frac{1}{2} \qquad p_R = \frac{1}{5} \qquad p_{BV} = 1 - (p_N + p_R) = \frac{3}{10}$$

$$\mathbb{P}\big(\underline{\widetilde{X}} = (5,3)\big) = p_{\underline{\widetilde{X}}}((5,3)) = \mathbb{P}(X_N = 5, X_R = 3)$$

$$= \frac{10!}{5!\,3!\,2!}\left(\frac{1}{2}\right)^5\left(\frac{1}{5}\right)^3\left(\frac{3}{10}\right)^2 = 0.056$$

c) Con quale probabilità ottengo 5 palline nere?

$$X_N \sim B(n, p_N) \qquad n = 10 \qquad p_N = \frac{1}{2}$$

$$\mathbb{P}(X_N = 5) = p_{X_N}(5) = \frac{10!}{5!\,5!}\left(\frac{1}{2}\right)^5\left(\frac{1}{2}\right)^5 = 0.2461$$

Esempio 3.1.4. Da un'urna contenente 3 palline bianche, 4 palline nere e 5 palline rosse vengono estratte $n = 3$ palline senza reinserimento. Si definiscono X e Y come il numero di palline bianche e nere ottenute nelle tre estrazioni, rispettivamente.

a) Determinare la densità discreta congiunta della coppia (X, Y).

b) Determinare le densità discrete marginali delle variabili aleatorie X e Y.

c) Calcolare la probabilità che il numero di palline bianche estratte sia minore del numero di palline nere estratte.

Soluzione

$$X = \text{n° di palline bianche estratte} \qquad X(\Omega) = \{0,1,2,3\}$$

$$Y = \text{n° di palline nere estratte} \qquad Y(\Omega) = \{0,1,2,3\}$$

a)

$$Z = (X, Y) \qquad Z(\Omega) \subseteq X(\Omega) \times Y(\Omega)$$

$$\forall (i,j) \in Z(\Omega)$$

$$\begin{aligned} p_Z((i,j)) &= \mathbb{P}(Z = (i,j)) \\ &= \mathbb{P}(X = i, Y = j) \\ &= \frac{\binom{3}{i}\binom{4}{j}\binom{5}{3-i-j}}{\binom{12}{3}}. \end{aligned}$$

$X(\Omega)$ \ $Y(\Omega)$

$i\backslash j$	0	1	2	3	p_X
0					
1					
2					
3					
p_Y					1

b)

$$\forall i \in X(\Omega)$$

$$p_X(i) = \mathbb{P}(X = i) = \sum_{j=0}^{3} p_Z((i,j)) = \ldots = \frac{\binom{3}{i}\binom{9}{3-i}}{\binom{12}{3}}.$$

$$X \sim \text{Ipergeometrica}(12, 3, 3)$$

Analogamente

$$\forall j \in Y(\Omega)$$

$$p_Y(j) = \mathbb{P}(Y = j) = \sum_{i=0}^{3} p_Z((i,j)) = \ldots = \frac{\binom{4}{j}\binom{8}{3-j}}{\binom{12}{3}}.$$

$$Y \sim \text{Ipergeometrica}(12, 4, 3)$$

c)

$$\mathbb{P}(X < Y) = \mathbb{P}((X,Y) \in C) = \mathbb{P}_Z(C) = *$$

dove

$$C = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x < y\} \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$$

$$\begin{aligned} * &= \sum_{(i,j)\in C} p_Z((i,j)) \\ &= p_Z((0,1)) + p_Z((0,2)) + p_Z((0,3)) \\ &\quad + p_Z((1,2)) + \cancel{p_Z((1,3))} \\ &\quad + \cancel{p_Z((2,3))} \end{aligned}$$

3.2 Vettori aleatori assolutamente continui

Definizione 3.2.1. Un vettore aleatorio $Z = (X,Y)$ si dice assolutamente continuo se la sua legge $\mathbb{P}_Z$ è una misura assolutamente continua rispetto alla misura di Lebesgue su

$$\left(\mathbb{R}^2, \mathcal{B}(\mathbb{R}^2)\right): \qquad \mathbb{P}_Z \ll \underline{m} = m \otimes m.$$

La derivata di Radon-Nikodym

$$\frac{d\mathbb{P}_Z}{d\underline{m}} = f_Z$$

si dice funzione di densità congiunta di $Z = (X, Y)$.

Osservazione: Ricordiamo che f_Z essendo una derivata di Radeon-Nykodim deve essere

$$f_Z \text{ misurabile}, \qquad f_Z \geq 0.$$

$$\forall\, C \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^2) \qquad \mathbb{P}_Z(C) = \mathbb{P}(Z \in C) = \int_C f_Z \, d\underline{m}.$$

e in particolare

$$\begin{aligned}\mathbb{P}_Z(\mathbb{R}^2) = 1 &= \int_{\mathbb{R}^2} f_Z \, d\underline{m} \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f_Z(x,y)\, dx \right) dy \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f_Z(x,y)\, dy \right) dx.\end{aligned}$$

Proposizione 3.2.2. Sia $Z = (x, y)$ un vettore aleatorio assolutamente continuo.

Allora le componenti X e Y sono variabili aleatorie assolutamente continue (diciamo che sono congiuntamente assolutamente continue) e le loro densità, dette marginali, si ricavano dalla densità congiunta:

$$\forall x \in \mathbb{R} \qquad f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{(x,y)}(x,y)\, dy$$

$$\forall y \in \mathbb{R} \qquad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{(x,y)}(x,y)\, dx$$

Dimostrazione. Sia $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$.

$$\begin{aligned}\mathbb{P}_X(A) = \mathbb{P}(x \in A) &= \mathbb{P}(x \in A,\, y \in \mathbb{R}) = \mathbb{P}\big((x,y) \in A \times \mathbb{R}\big) \\ &= \underbrace{\mathbb{P}_Z(A \times \mathbb{R})}_{\substack{Z \text{ è a.c.} \\ \mathbb{P}_Z \ll \underline{m} \text{ e } f_Z = \frac{d\mathbb{P}_Z}{d\underline{m}}}} = \int_{A\times\mathbb{R}} f_Z \, d\underline{m} \\ &= \int_{\mathbb{R}^2} \underbrace{\mathbb{1}_A(x) f_Z(x,y)}_{\substack{\geq 0 \text{ misurabile} \\ \text{integrabile}}} d\underline{m}(x,y) \\ &\overset{\text{Fubini-Tonelli}}{=} \int_A \underbrace{\left(\int_{-\infty}^{+\infty} f_Z(x,y)\, dy \right)}_{\text{poniamo } f_X(x)} dx = \int_A f_X \, dm.\end{aligned}$$

dal momento che

$$\int_A (\cdots)\, dx \qquad \text{corrisponde a} \qquad \int_{\mathbb{R}} \mathbb{1}_A(x)(\cdots)\, dx.$$

Ho trovato una funzione

$$\underbrace{\text{misurabile e } \geq 0}_{\text{Tonelli}} \qquad \underbrace{(\text{integrabile})}_{\text{Fubini}}$$

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_Z(x,y)\,dy.$$

t.c.

$$\forall A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) \qquad \mathbb{P}_X(A) = \int_A f_X\,dm \qquad \Rightarrow \qquad \mathbb{P}_X \ll m$$

e

$$f_X = \frac{d\mathbb{P}_X}{dm} \quad \text{q.o.}$$

ovvero X è assolutamente continua e f_X è la densità di X.
Analogo per Y. □

Osservazione:
Se X e Y sono variabili aleatorie assolutamente continue non posso dire che (X,Y) è assolutamente continuo.

Quindi non ha senso pensare di poter ricavare f_Z da f_X e f_Y a meno di ipotesi più forti.

Esempio 3.2.3. Si considerino due variabili aleatorie X e Y aventi densità congiunta

$$f_{(X,Y)}(x,y) = 2e^{-(x+2y)}\,\mathbb{1}_D(x,y),$$

con

$$D = (0,+\infty) \times (0,+\infty).$$

a) Calcolare $\mathbb{P}(X > 1, Y < 1)$.

b) Calcolare $\mathbb{P}(X < Y)$.

c) Ricavare le leggi marginali di X e Y.


Soluzione

a)

$$\mathbb{P}(X > 1, Y < 1) = \mathbb{P}\big((x,y) \in C\big) = \int_C f_{(X,Y)}(x,y)\,dx\,dy = *$$

dove

$$C = \big\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x > 1,\ y < 1\big\} \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^2).$$




$$
\begin{aligned}
* &= \int_{C\cap D} 2e^{-(x+2y)}\,dx\,dy \\
&= \int_0^1 \left(\int_1^{+\infty} 2e^{-(x+2y)}\,dx \right) dy \\
&= \int_0^1 2e^{-2y} \underbrace{\left(\int_1^{+\infty} e^{-x}\,dx \right)}_{\substack{S_T(1)=e^{-1} \\ T\sim \mathrm{Exp}(1)}} dy \\
&= e^{-1} \int_0^1 2e^{-2y}\,dy \\
&= e^{-1}(1-e^{-2}).
\end{aligned}
$$

b)

$$\mathbb{P}(X<Y) = \mathbb{P}\big((x,y)\in C\big) = \int_C f_{(X,Y)}(x,y)\,dx\,dy = *$$

dove

$$C = \big\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 : x<y\big\}.$$



$$
\begin{aligned}
* &= \int_{C\cap D} 2e^{-(x+2y)}\,dx\,dy \\
&= \int_0^{+\infty} \left(\int_0^y 2e^{-(x+2y)}\,dx \right) dy \\
&= \int_0^{+\infty} 2e^{-2y} \underbrace{\left(\int_0^y e^{-x}\,dx \right)}_{F_T(y)=1-e^{-y}} dy \\
&= \int_0^{+\infty} 2e^{-2y}\,dy - \int_0^{+\infty} 2e^{-3y}\,dy \\
&= 1 - \frac{2}{3} \underbrace{\int_0^{+\infty} 3e^{-3y}\,dy}_{\substack{1 \\ V\sim \mathrm{Exp}(3)}} \\
&= 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}.
\end{aligned}
$$

In alternativa avremmo potuto anche calcolare l'integrale ricordandoci del rapporto tra media e funzione di sopravvivenza di V.

$$
2\int_0^{+\infty} e^{-3y}\,dy = 2\int_0^{+\infty} S_V(y)\,dy = 2\mathbb{E}[V] = \frac{2}{3}
$$


c)

$$
\forall x \in \mathbb{R} \qquad f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{(X,Y)}(x,y)\,dy
$$

$$
\text{se } x \le 0 \qquad f_X(x) = 0
$$

$$
\begin{aligned}
\text{se } x > 0 \qquad f_X(x) &= \int_0^{+\infty} 2e^{-(x+2y)}\,dy \\
&= e^{-x} \underbrace{\int_0^{+\infty} 2e^{-2y}\,dy}_{\substack{1 \\ U\sim \mathrm{Exp}(2)}} = e^{-x}
\end{aligned}
$$

$$
\Rightarrow \qquad f_X(x) = e^{-x}\mathbb{1}_{(0,+\infty)}(x) \qquad \Rightarrow \qquad X \sim \mathrm{Exp}(1)
$$



$$\forall y \in \mathbb{R} \qquad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{(X,Y)}(x,y)\,dx$$

$$\text{se } y \le 0 \qquad f_Y(y) = 0$$

$$\text{se } y > 0 \qquad f_Y(y) = \int_0^{+\infty} 2e^{-(x+2y)}\,dx = 2e^{-2y} \underbrace{\int_0^{+\infty} e^{-x}\,dx}_{\substack{1 \\ T\sim \text{Exp}(1)}}$$

$$= 2e^{-2y}$$

$$\Rightarrow \qquad f_Y(y) = 2e^{-2y}\mathbb{1}_{(0,+\infty)}(y) \qquad \Rightarrow \qquad Y \sim \text{Exp}(2)$$

3.3 Variabili aleatorie indipendenti

Ricoridamo che una famiglia di σ-algebre $(\mathcal{A}_i)_{i\in I}$ si dice indipendente se, per ogni scelta finita di indici distinti

$$i_1, \dots, i_n \in I$$

e per ogni

$$A_{i_k} \in \mathcal{A}_{i_k},$$

vale

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{k=1}^{n} A_{i_k}\right) = \prod_{k=1}^{n} \mathbb{P}(A_{i_k}).$$

Definizione 3.3.1. Diciamo che le variabili aleatorie $(X_i)_{i\in I}$ sono indipendenti, se sono indipendenti le σ-algebre

$$\big(\sigma(X_i)\big)_{i\in I}$$

dove

$$\sigma(X_i) = \left\{X_i^{-1}(A) : A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\right\}.$$

Esempio 3.3.2. Consideriamo uno schema di Bernoulli (binomiale)

$$X \sim B(n,p).$$

$$X = \sum_{i=1}^{n} Y_i \qquad \text{con } Y_i \sim b(p).$$

Osserviamo che

$$Y_i = \mathbb{1}_{A_i} \qquad \text{con } A_i = \text{ho successo alla prova } i\text{-esima}.$$

$$\sigma(Y_i) = \left\{Y_i^{-1}(A) : A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\right\} = \{\Omega, \emptyset, A_i, A_i^c\} = \sigma(A_i).$$

$$(A_i)_{i=1,\dots,n} \text{ sono indipendenti} \quad \Rightarrow \quad \text{sono indipendenti le}$$

$$\left(\sigma(A_i)\right)_{i=1,\dots,n} = \left(\sigma(Y_i)\right)_{i=1,\dots,n} \quad \Rightarrow \quad \text{sono indipendenti le}$$

$$(Y_i)_{i=1,\dots,n}.$$

Ogni volta che avremo un set di variabili aleatorie con stessa densità e indipendenti scriveremo

$$Y_i \underset{\text{iid}}{\sim} b(p) \qquad \text{iid} = \text{indipendenti e identicamente distribuite.}$$

Osservazione: Siano

$$Z = (X, Y).$$

osserviamo che

$$X \perp\!\!\!\perp Y \quad \text{(indipendenti)} \iff \sigma(X) \perp\!\!\!\perp \sigma(Y)$$

$$\iff \left\{X^{-1}(A) : A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\right\} \perp\!\!\!\perp \left\{Y^{-1}(B) : B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\right\}$$

$$\iff \forall A, B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) \qquad X^{-1}(A) \perp\!\!\!\perp Y^{-1}(B)$$

$$\iff \forall A, B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) \qquad \mathbb{P}\left(X^{-1}(A) \cap Y^{-1}(B)\right) = \mathbb{P}\left(X^{-1}(A)\right)\mathbb{P}\left(Y^{-1}(B)\right)$$

$$\iff \forall A, B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) \qquad \underbrace{\mathbb{P}(X \in A, Y \in B)}_{\substack{\mathbb{P}\left((X,Y)\in A\times B\right) \\ = \mathbb{P}_Z(A\times B)}} = \underbrace{\mathbb{P}(X \in A)}_{\mathbb{P}_X(A)} \cdot \underbrace{\mathbb{P}(Y \in B)}_{\mathbb{P}_Y(B)}$$

$$\iff \forall A, B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) \qquad \mathbb{P}_Z(A \times B) = \mathbb{P}_X(A) \cdot \mathbb{P}_Y(B)$$

$$\iff \mathbb{P}_Z = \mathbb{P}_X \otimes \mathbb{P}_Y.$$

essendo la misura prodotto l'unica che fattorizza le misure.

Proposizione 3.3.3. Sia $Z = (X, Y)$ un vettore aleatorio. Allora

$$X \perp\!\!\!\perp Y \iff F_Z(x, y) = F_X(x) \cdot F_Y(y) \qquad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Dimostrazione. Segue da

$$\begin{aligned} F_Z(x, y) &= \mathbb{P}(X \le x, Y \le y) \\ &= \mathbb{P}\left(Z \in \underbrace{(-\infty, x]}_{A} \times \underbrace{(-\infty, y]}_{B}\right) \\ &= \mathbb{P}_Z\left(\underbrace{(-\infty, x] \times (-\infty, y]}_{A\times B}\right). \end{aligned}$$

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \le x) = \mathbb{P}_X\left(\underbrace{(-\infty, x]}_{A}\right)$$

$$F_Y(y) = \mathbb{P}(Y \le y) = \mathbb{P}_Y\left(\underbrace{(-\infty, y]}_{B}\right).$$

□

Proposizione 3.3.4. 1) Sia $Z = (X, Y)$ un vettore aleatorio discreto, con densità congiunta

$$p_Z = p_{(X,Y)}$$

e marginali p_X e p_Y.

$$X \perp\!\!\!\perp Y \iff p_{(X,Y)}(x_i, y_j) = p_X(x_i)\, p_Y(y_j) \qquad \forall x_i \in X(\Omega), \quad \forall y_j \in Y(\Omega).$$

2a) Sia $Z = (X, Y)$ un vettore aleatorio assolutamente continuo, con densità congiunta

$$f_Z = f_{(X,Y)}$$

e marginali f_X e f_Y.

Supponiamo che valga

$$f_{(X,Y)}(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y) \qquad \text{per } \underline{m}\text{-q.o. } (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

$$\Rightarrow \qquad X \perp\!\!\!\perp Y.$$

2b) Siano X, Y variabili aleatorie assolutamente continue, con densità f_X e f_Y rispettivamente,

$$X \perp\!\!\!\perp Y.$$

Allora $Z = (X, Y)$ è assolutamente continuo con densità

$$f_Z = f_{(X,Y)} = f_X(x) \cdot f_Y(y)$$

Dimostrazione. **1)**

$$\begin{aligned} p_{(X,Y)}(x_i, y_j) &= \mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j) \\ &= \mathbb{P}\left((X, Y) \in \{x_i\} \times \{y_j\}\right) \\ &= \mathbb{P}_Z\left(\underbrace{\{x_i\}}_{A} \times \underbrace{\{y_j\}}_{B}\right). \end{aligned}$$

$$p_X(x_i) = \mathbb{P}(X = x_i) = \mathbb{P}(X \in \{x_i\}) = \mathbb{P}_X\left(\underbrace{\{x_i\}}_{A}\right)$$

$$p_Y(y_j) = \mathbb{P}(Y = y_j) = \mathbb{P}(Y \in \{y_j\}) = \mathbb{P}_Y\left(\underbrace{\{y_j\}}_{B}\right).$$

L'implicazione $\Leftarrow$ è immediata. Facciamo l'implicazione $\Rightarrow$. Siano $A, B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$

$$\mathbb{P}_Z(A \times B) = \sum_{(x_i,y_i)\in A\times B} \mathbb{P}_Z(\{x_i, y_i\}) = \sum_{(x_i,y_i)\in A\times B} p_Z(x_i, y_i) = \sum_{(x_i,y_i)\in A\times B} p_X(x_i) \cdot p_Y(y_i) =$$

$$= \left(\sum_{x_i\in A} p_X(x_i)\right) \cdot \left(\sum_{y_i\in B} p_Y(y_i)\right) = \mathbb{P}_X(x_i) \cdot \mathbb{P}(y_i)$$

2)

$$\forall A, B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$$

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_X(A) \cdot \mathbb{P}_Y(B) &= \int_A f_X \, dm \cdot \int_B f_Y \, dm \\ &\overset{\text{Tonelli}}{=} \int_{A\times B} (f_X \cdot f_Y) \, d\underline{m}, \qquad \underline{m} = m \otimes m. \end{aligned} \tag{$\star$}$$

2a)
Per ipotesi

$$f_Z = f_X \cdot f_Y \qquad \underline{m}\text{-q.o.}$$

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_X(A) \cdot \mathbb{P}_Y(B) &\overset{\star}{=} \int_{A\times B} (f_X \cdot f_Y) \, d\underline{m} \\ &= \int_{A\times B} f_Z \, d\underline{m} \\ &= \mathbb{P}_Z(A \times B). \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \qquad \mathbb{P}_Z = \mathbb{P}_X \otimes \mathbb{P}_Y \qquad \Rightarrow \qquad X \perp\!\!\!\perp Y.$$

2b)
Per ipotesi

$$X \perp\!\!\!\perp Y \qquad \Rightarrow \qquad \mathbb{P}_Z = \mathbb{P}_X \otimes \mathbb{P}_Y.$$

Definiamo su

$$\left(\mathbb{R}^2, \mathcal{B}(\mathbb{R}^2)\right)$$

una misura μ come

$$\mu(C) = \int_C (f_X \cdot f_Y) \, d\underline{m} \qquad \forall C \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^2).$$

Ben definita perchè

$$f_X \cdot f_Y \geq 0 \qquad \text{misurabile.}$$

$$\Rightarrow \qquad \mu \ll \underline{m} \qquad \text{con} \qquad \frac{d\mu}{d\underline{m}} = f_X \cdot f_Y \qquad \underline{m}\text{-q.o.}$$

Consideriamo

$$C = A \times B \qquad \text{con } A, B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) \qquad \Rightarrow$$

$$\mu(A\times B)=\int_{A\times B}(f_X\cdot f_Y)\,d\underline{m}\overset{\star}{=}\mathbb{P}_X(A)\cdot\mathbb{P}_Y(B).$$

$$\Rightarrow\qquad \mu=\mathbb{P}_X\otimes\mathbb{P}_Y=\mathbb{P}_Z\qquad \text{per ipotesi}$$

$$\Rightarrow\qquad \mathbb{P}_Z\ll\underline{m}\qquad (\Rightarrow Z=(X,Y)\text{ è assolutamente continuo})$$

e

$$f_Z:=\frac{d\mathbb{P}_Z}{d\underline{m}}=f_X\cdot f_Y\qquad \underline{m}\text{-q.o.}$$

□

Osservazione: Sia $Z=(X,Y)$ vettore assolutamente continuo tale che

$$f_Z(x,y)=h(x)\cdot g(y)\qquad \underline{m}\text{-q.o.}\Rightarrow\qquad X\perp\!\!\!\perp Y.$$

Infatti

$$\begin{aligned}
f_X(x)&=\int_{-\infty}^{+\infty}f_Z(x,y)\,dy=\int_{-\infty}^{+\infty}h(x)\cdot g(y)\,dy\\
&=\left(\underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty}g(y)\,dy}_{c}\right)\cdot h(x)=c\cdot h(x).\\
f_Y(y)&=\int_{-\infty}^{+\infty}f_Z(x,y)\,dx=\int_{-\infty}^{+\infty}h(x)\cdot g(y)\,dx\\
&=\left(\underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty}h(x)\,dx}_{c'}\right)\cdot g(y)=c'\cdot g(y).\\
f_X(x)\cdot f_Y(y)&=\big(c\cdot h(x)\big)\big(c'\cdot g(y)\big)\\
&=\left(\int_{-\infty}^{+\infty}g(y)\,dy\right)\left(\int_{-\infty}^{+\infty}h(x)\,dx\right)\cdot h(x)\cdot g(y)\\
&\overset{\text{Fubini}}{=}\underbrace{\int_{\mathbb{R}^2}\underbrace{h(x)\cdot g(y)}_{f_Z(x,y)\text{ q.o.}}\,dx\,dy}_{c\cdot c'=1}\cdot\underbrace{h(x)\cdot g(y)}_{f_Z(x,y)\text{ q.o.}}\\
&=f_Z(x,y)\qquad \underline{m}\text{-q.o.}\Rightarrow\qquad X\perp\!\!\!\perp Y
\end{aligned}$$

Proposizione 3.3.5. Siano $X\perp\!\!\!\perp Y$ e $h,g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ misurabili.
Allora

$$h(X)\perp\!\!\!\perp g(Y).$$

Dimostrazione. Siano

$$A,B\in\mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\big(h(X)\in A, g(Y)\in B\big) &= \mathbb{P}\left(X\in \underbrace{h^{-1}(A)}_{\in\mathcal{B}(\mathbb{R})}, Y\in \underbrace{g^{-1}(B)}_{\in\mathcal{B}(\mathbb{R})}\right)\\ &= \mathbb{P}\left(X\in h^{-1}(A)\right)\cdot\mathbb{P}\left(Y\in g^{-1}(B)\right)\\ &= \mathbb{P}\big(h(X)\in A\big)\cdot\mathbb{P}\big(g(Y)\in B\big)\\ &\Rightarrow h(X)\perp\!\!\!\perp g(Y).\end{aligned}$$

□

Esempio 3.3.6.

$$X\perp\!\!\!\perp Y \qquad\Rightarrow\qquad X^2\perp\!\!\!\perp e^{-Y}.$$

Si può generalizzare facilmente generalizzare ad un numero finito n di variabili aleatorie.

Proposizione 3.3.7. Siano

$$X_1,\dots,X_n\perp\!\!\!\perp Y_1,\dots,Y_n.$$

Siano

$$h:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R} \qquad \text{e} \qquad g:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$$

misurabili.

$$\Rightarrow \qquad h(X_1,\dots,X_n)\perp\!\!\!\perp g(Y_1,\dots,Y_n).$$

Esempio 3.3.8. Siano X_i indipendenti.


$$X_1X_2-X_3^2\perp\!\!\!\perp X_4+X_5^3-e^{X_6}\cdot X_7^2.$$

Esempio 3.3.9. *Siano X e Y due variabili aleatorie con funzione di densità congiunta*

$$f_{(X,Y)}(x,y)=4xy\,\mathbb{1}_D(x,y),$$

dove $D=(0,1)\times(0,1)$.
Determinare le leggi marginali e dire se X e Y sono indipendenti.

Soluzione



- $$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{(X,Y)}(x,y)\,dy$$

  se $x \leq 0$ oppure $x \geq 1$

  $$f_X(x) = 0.$$

  se $x \in (0,1)$

  $$f_X(x) = \int_0^1 4xy\,dy = 4x \cdot \frac{y^2}{2}\Big|_0^1 = 2x.$$

  $$\Rightarrow f_X(x) = 2x\,\mathbb{1}_{(0,1)}(x).$$

- per simmetria

  $$f_Y(y) = 2y\,\mathbb{1}_{(0,1)}(y).$$

$$\Rightarrow f_X(x) \cdot f_Y(y) = 4xy\,\mathbb{1}_{(0,1)\times(0,1)}(x,y) = f_{(X,Y)}(x,y) \qquad \forall (x,y) \in \mathbb{R}.$$

Avremmo potuto osservare che osservare che, per simmetria,

$$f_{(X,Y)}(x,y) = h(x) \cdot g(y) \qquad \text{con}$$

$$h(x) = g(x) = 2x\,\mathbb{1}_{(0,1)}(x) \Rightarrow X \perp Y \quad \text{e inoltre}$$

$$f_X(x) = f_Y(x) = 2x\,\mathbb{1}_{(0,1)}(x)$$

Esempio 3.3.10. *Siano X e Y due variabili aleatorie con funzione di densità congiunta*

$$f_{(X,Y)}(x,y) = kxy\,\mathbb{1}_D(x,y),$$

dove

$$D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 0 < x \leq y < 1\}$$


e $k \in \mathbb{R}$.

a) *Calcolare k.*
b) *Dire se X e Y sono indipendenti.*

soluzione

a)

- $f_{(X,Y)}$ è misurabile
- $f_{(X,Y)} \geq 0$ se $k \geq 0$



- $$1 = \int_{\mathbb{R}^2} f_{(X,Y)}\, d\underline{m}$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f_{(X,Y)}(x,y)\, dx\, dy = \int_D kxy\, dx\, dy$$

$$= \int_0^1 \left(\int_0^y kxy\, dx \right) dy = \int_0^1 ky \cdot \frac{y^2}{2}\, dy =$$

$$= \frac{k}{2} \int_0^1 y^3\, dy = \frac{k}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{k}{8} \Rightarrow \boxed{k = 8}$$

b)

- $$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{(X,Y)}(x,y)\, dy$$

se $x \leq 0$ oppure $x \geq 1$

$$f_X(x) = 0$$

se $0 < x < 1$

$$f_X(x) = \int_x^1 8xy\, dy = 8x \cdot \frac{y^2}{2}\Big|_x^1 =$$

$$= 4x - 4x^3 = 4x(1 - x^2)$$

$$\Rightarrow f_X(x) = 4x(1 - x^2)\, \mathbb{1}_{(0,1)}(x)$$

- $$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{(X,Y)}(x,y)\, dy$$

se $y \leq 0$ oppure $y \geq 1$

$$f_Y(y) = 0$$

se $0 < y < 1$

$$f_Y(y) = \int_0^y 8xy\,dx = 8y \cdot \frac{y^2}{2} = 4y^3$$

$$\Rightarrow f_Y(y) = 4y^3\,\mathbb{1}_{(0,1)}(y)$$

- $$f_X(x) \cdot f_Y(y) = 4x(1-x^2)\,\mathbb{1}_{(0,1)}(x) \cdot 4y^3\,\mathbb{1}_{(0,1)}(y)$$

$$= 16xy^3(1-x^2)\,\mathbb{1}_Q(x,y)$$

$$\text{con } Q = (0,1) \times (0,1)$$

$$\neq f_{(X,Y)}(x,y)$$

$$= 8xy\,\mathbb{1}_D(x,y)$$

$$\Rightarrow X \not\perp\!\!\!\perp Y$$

Osservazione: Posso osservare che

$$f_X \cdot f_Y \neq 0 = f_{(X,Y)} \qquad \text{su } Q \setminus D \quad (q.o.)$$

ma

$$\underline{m}(Q \setminus D) > 0$$

$$\Rightarrow X \not\perp\!\!\!\perp Y$$

Esempio 3.3.11. *Siano X e Y variabili aleatorie discrete, a valori in $\mathbb{N}$, con densità congiunta*

$$p_{(X,Y)}(n,m) = c \cdot \frac{\nu^n \mu^m}{n!m!} \cdot \alpha^{nm}$$

dove $\nu, \mu > 0$, $0 < \alpha \leq 1$, e c è la costante di normalizzazione.

a) *Calcolare le densità marginali di X e Y.*
b) *Calcolare le probabilità condizionate $\mathbb{P}(X = n \mid Y = m)$.*
c) *Provare che, se $\alpha = 1$, le variabili aleatorie X e Y sono indipendenti.*

Soluzione

a)

$$\forall n \in \mathbb{N} \qquad p_X(n) = \sum_{m \in \mathbb{N}} p_{(X,Y)}(n,m) =$$

$$= \sum_{m=0}^{\infty} c \cdot \frac{\nu^n \mu^m}{n! \cdot m!} \alpha^{nm} = c \frac{\nu^n}{n!} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(\mu \alpha^n)^m}{m!}$$

$$= c \cdot \frac{\nu^n}{n!} e^{\mu \alpha^n}$$

Per simmetria

$$\forall m \in \mathbb{N} \qquad p_Y(m) = c \cdot \frac{\mu^m}{m!} e^{\nu \alpha^m}$$

b)

$$\mathbb{P}(X = n \mid Y = m) = \frac{\mathbb{P}(X = n, Y = m)}{\mathbb{P}(Y = m)} = \frac{p_{(X,Y)}(n, m)}{p_Y(m)}$$

$$= \frac{c \cdot \frac{\nu^n \mu^m}{n! \cdot m!} \alpha^{nm}}{c \frac{\mu^m}{m!} e^{\nu \alpha^m}}$$

$$= \frac{\nu^n}{n!} \alpha^{nm} e^{-\nu \alpha^m} = \frac{(\nu \alpha^m)^n}{n!} e^{-\nu \alpha^m}$$

c) se $\alpha = 1$

$$p_{(X,Y)}(n, m) = c \frac{\nu^n \mu^m}{n!\, m!} = c \left(\frac{\nu^n}{n!} \right) \left(\frac{\mu^m}{m!} \right)$$

$$p_X(n) = c e^{\mu} \frac{\nu^n}{n!}$$

$$p_Y(m) = c e^{\nu} \frac{\mu^m}{m!}$$

$$X \perp\!\!\!\perp Y \Leftrightarrow p_{(X,Y)}(n, m) = p_X(n) \cdot p_Y(m) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow c \frac{\nu^n}{n!} \cdot \frac{\mu^m}{m!} = c e^{\mu} \frac{\nu^n}{n!} \cdot c e^{\nu} \frac{\mu^m}{m!}$$

$$c = c^2 e^{\mu + \nu}$$

$$(c \neq 0) \Rightarrow 1 = c e^{\mu + \nu} \Rightarrow \boxed{c = e^{-(\nu + \mu)}}$$

$$\Rightarrow p_{(X,Y)}(n, m) = e^{-(\nu + \mu)} \frac{\nu^n}{n!} \frac{\mu^m}{m!}$$

$$p_X(n) = c e^{\mu} \frac{\nu^n}{n!} = e^{-(\nu + \mu)} e^{\mu} \frac{\nu^n}{n!} = e^{-\nu} \frac{\nu^n}{n!}$$

analogamente

$$p_Y(m) = e^{-\mu} \frac{\mu^m}{m!}$$


$$\Rightarrow \boxed{X \sim P(\nu) \quad \perp\!\!\!\perp \quad Y \sim P(\mu)}$$

Esempio 3.3.12. *Sia (X, Y) un vettore aleatorio distribuito uniformemente sull'insieme*

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 9\}.$$

a) *Scrivere esplicitamente la densità congiunta.*
b) *Determinare le densità marginali.*
c) *X e Y sono indipendenti? Sono scorrelate?*

Soluzione



a)

$$f_{(X,Y)}(x, y) = k\, \mathbb{1}_D(x, y)$$

$$= \frac{1}{\text{area}\, D}\, \mathbb{1}_D(x, y) = \frac{1}{8\pi}\, \mathbb{1}_D(x, y)$$

$$\text{area}\, D = \pi R^2 - \pi r^2 = 8\pi$$

b)

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{(X,Y)}(x, y)\, dy \qquad \forall x \in \mathbb{R}$$

- se $x < -3$ oppure $x > 3$

$$f_X(x) = 0$$

- se $-3 \leq x < -1$ oppure $1 < x \leq 3$

$$f_X(x) = \int_{-\sqrt{9-x^2}}^{+\sqrt{9-x^2}} \frac{1}{8\pi}\, dy = \frac{1}{8\pi}\left[\sqrt{9-x^2} + \sqrt{9-x^2}\right] = \frac{1}{4\pi}\sqrt{9-x^2}$$

- se $-1 \leq x \leq 1$

$$f_X(x) = \int_{-\sqrt{9-x^2}}^{-\sqrt{1-x^2}} \frac{1}{8\pi}\, dy + \int_{\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{9-x^2}} \frac{1}{8\pi}\, dy =$$

$$= \frac{1}{8\pi}\left[-\sqrt{1-x^2} + \sqrt{9-x^2}\right] + \frac{1}{8\pi}\left[\sqrt{9-x^2} - \sqrt{1-x^2}\right]$$

$$= \frac{1}{4\pi}\left[\sqrt{9-x^2} - \sqrt{1-x^2}\right]$$

$$\Rightarrow f_X(x) = \frac{1}{4\pi}\left[\sqrt{9-x^2} - \sqrt{1-x^2}\right] \mathbb{1}_{[-1,1]}(x) + \frac{1}{4\pi}\sqrt{9-x^2}\, \mathbb{1}_{[-3,-1)\cup(1,3]}(x,y)$$

Per simmetria possiamo porre

$$f_Y(x) = f_X(x) \forall x \in \mathbb{R}$$

c)

$$f_X(x) \cdot f_Y(y) \neq \frac{1}{8\pi}\mathbb{1}_D(x,y) = f_{(X,Y)}(x,y) \Rightarrow X \not\perp\!\!\!\perp Y$$

Esempio 3.3.13. *Ugo e Zoe si danno appuntamento davanti ad un locale, concordando di aspettarsi fuori per non più di 10 minuti (dopodiché il primo arrivato inizia ad entrare nel locale).*

Si supponga che Ugo e Zoe arrivino, in maniera indipendente l'uno dall'altra, in un istante distribuito uniformemente tra le 21:00 e le 22:00.

Con quale probabilità entrano insieme nel locale?

Soluzione

Ugo arriva alle 21 e U minuti

$$U \sim U((0,60))$$

Zoe arriva alle 21 e Z minuti


$$Z \sim U((0,60))$$

$$U \perp Z$$

$$f_U(u) = \frac{1}{60}\mathbb{1}_{(0,60)}(u)$$

$$f_Z(z) = \frac{1}{60}\mathbb{1}_{(0,60)}(z)$$

$$\Rightarrow f_{(U,Z)}(u,z) = f_U(u) \cdot f_Z(z) = \frac{1}{3600}\mathbb{1}_{(0,60)\times(0,60)}(u,z)$$



$$\mathbb{P}(\text{entrare insieme}) = \mathbb{P}\big(|U - Z| < 10\big) = \mathbb{P}\big((U, Z) \in C\big)$$

con

$$C = \big\{(u, z) \in \mathbb{R}^2 : |u - z| < 10\big\}$$

$$= \big\{(u, z) \in \mathbb{R}^2 : u - 10 < z < u + 10\big\}$$

$$\mathbb{P}\big((U, Z) \in C\big) = \int_C f_{(U,Z)}(u, z)\, du\, dz = \int_{C \cap Q} \frac{1}{3600}\, du\, dz$$

$$= \frac{1}{3600} \operatorname{area}(C \cap Q) = \frac{1}{3600} (\operatorname{area} Q - \operatorname{area} T_1 - \operatorname{area} T_2)$$

$$= \frac{1}{3600} \left(3600 - \frac{2500}{2} - \frac{2500}{2}\right) = \frac{1100}{3600} = \boxed{\frac{11}{36}}$$

3.4 Valori attesi

Definizione 3.4.1. Sia $Z = (X, Y)$ un vettore aleatorio e sia

$$g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$$

misurabile.

Si dice valore atteso della variabile aletoria

$$g \circ Z = g(Z) = g(X, Y)$$

la quantità seguente (se ben definita)

$$\mathbb{E}\left[\underbrace{g(X,Y)}_{g(Z)}\right] = \int_\Omega \underbrace{g(X,Y)}_{g(Z)}\, d\mathbb{P} = \int_{\mathbb{R}^2} g\, d\mathbb{P}_Z =$$

$$= \int_{\mathbb{R}^2} g(x,y)\, d\mathbb{P}_Z(x,y) = \begin{cases} \displaystyle\sum_{(x_i,y_j)\in Z(\Omega)} g(x_i,y_j)\, p_Z(x_i,y_j) & \text{se } Z \text{ discreta} \\ \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} g(x,y) f_Z(x,y)\, dx\, dy & \text{se } Z \text{ assoluamente continua} \end{cases}$$

Diciamo che $g(x,y)$ ammette momento finito di ordine 1
se

$$g(x,y) \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$$

ovvero

$$g \in L^1\big(\mathbb{R}^2, \mathcal{B}(\mathbb{R}^2), \mathbb{P}_Z\big).$$

Proposizione 3.4.2 (Disuguaglianza di Cauchy-Schwarz)**.** Siano $X, Y \in L^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$

$$\Rightarrow XY \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$$

inoltre

$$|\mathbb{E}[XY]| \le \mathbb{E}[|XY|] \le \sqrt{\mathbb{E}[X^2]\cdot\mathbb{E}[Y^2]}$$

Osservazione: Possiamo riscrivere in forma più astratta la disuaguaglianza del modo seguente

$$|\langle X, Y\rangle \le \|XY\|_{L_1}| \le \|X\|_{L_2}\|Y\|_{L_2}$$

ovvero usando il prodotto scalare e la sua norma indotta di L_2.

3.5 Covarianza e correlazione


Sono indici numerici del legame che intercorre fra due variabili aleatorie.

Definizione 3.5.1 (Covarianza)**.** Siano $X, Y \in L^2$ (o $X, Y, XY \in L^1$). Si dice covarianza tra X e Y la quantità

$$\mathrm{Cov}(X,Y) = \mathbb{E}\left[(X - \mathbb{E}[X])\,(Y - \mathbb{E}[Y])\right].$$

Osservazione:

- se $\mathrm{cov}(X,Y) > 0$ diciamo che X e Y sono positivamente correlate
- se $\mathrm{cov}(X,Y) < 0$ diciamo che X e Y sono negativamente correlate
- se $\mathrm{cov}(X,Y) = 0$ diciamo che X e Y sono scorrelate o non correlate



Le figure ci aiutano a capire a livello intutivo il significato pratico del segno della covarianza. Quando questo è positivo aumentando la X aumenta anche la Y e se diminuisce la X diminuisce anche la Y. Quando è negativo accade il viceversa ovvero se la X aumenta la Y tende a diminuire mentre se la X diminuisce la Y tende ad aumentare. Nel caso di covarianza nulla non c'è una relazione predominante tra le due. È importante precisare che il comporatmento descritto avviene in media probabilistica e quindi potrebbero esserci singoli casi in cui X e Y sembrano scorrelate anche se la covarianza è non nulla.

Osservazione: Possiamo interpretare la varianza in modo più astratto. Immaginiamo una variabile aleatoria X come un "vettore" di infinite coordinate date da $X(\omega) \quad \forall \omega \in \Omega$. Il prodotto scalare in $L_2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ allora di venta l'analogo di un prodotto scalare in $\mathbb{R}^n$, ovvero sto sommando i prodotti delle corrispettive coordinate di X e Y.Nel caso della covarianza facciamo il prodotto scalare di $X - \mathbb{E}[X]$ e $Y - \mathbb{E}[Y]$, ovvero possiamo immaginare di "sommare" su tutti gli $\omega \in \Omega$ il prodotto di quanto X si distacca dalla sua media in ω per quanto si distacca dalla sua media Y in ω. Siamo più che altro interessati al segno del prodotto scalare: se questo è positivo vuol dire che X, Y assumono valori sopra o sotto la media in maniera concorde, o per lo meno la "quantità" di punti di Ω in cui questo accade supera la "quantità" di punti dove non accade. Se il prodotto scalare è negativo succede essattamente il contrario ovvero la "quantità" di punti in cui assumono valori sopra o sotto la media in maniera discorde supera la "quantità" di punti in cui questo avviene in maniera concorde. Nel caso di prodotto scalare nullo non c'è una prevalenza di uno dei due comportamenti e quindi non si possono individuare tendenze globali.

Proposizione 3.5.2. Siano $X, Y \in L^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ due variabili aleatorie reali. Allora

$$\mathrm{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y].$$

Dimostrazione. Per definizione,

$$\mathrm{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}\left[(X - \mu_X)\,(Y - \mu_Y)\right],$$

dove

$$\mu_X = \mathbb{E}[X], \qquad \mu_Y = \mathbb{E}[Y].$$

Sviluppando il prodotto,

$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(X,Y) &= \mathbb{E}\left[XY - X\mu_Y - \mu_X Y + \mu_X\mu_Y\right] \\ &= \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mu_Y - \mu_X\mathbb{E}[Y] + \mu_X\mu_Y \\ &= \mathbb{E}[XY] - \mu_X\mu_Y - \mu_X\mu_Y + \mu_X\mu_Y \\ &= \mathbb{E}[XY] - \mu_X\mu_Y \\ &= \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y].\end{aligned}$$

□

Proposizione 3.5.3. Siano $X, Y \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ e

$$X \perp\!\!\!\perp Y.$$

Allora

$$XY \in L^1 \qquad \text{e} \qquad \mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y].$$

$$(\text{ovvero } \operatorname{cov}(X,Y) = 0 \text{ cioè } X, Y \text{ scorrelate})$$

Soluzione. Sia

$$g(x,y) = |xy|.$$

Sia

$$Z = (X,Y).$$

$$\underbrace{\mathbb{E}[|XY|]}_{\mathbb{E}[g(X,Y)]} = \int_\Omega \underbrace{|XY|}_{g(X,Y)}\, d\mathbb{P} = \int_{\mathbb{R}^2} \underbrace{|xy|}_{g(x,y)}\, d\mathbb{P}_Z(x,y)$$

$$= \int_{\mathbb{R}^2} |xy|\, d(\mathbb{P}_X \otimes \mathbb{P}_Y)(x,y).$$

Dal momento che

$$g(x,y) \geq 0 \quad \text{misurabile in } \left(\mathbb{R}^2, \mathcal{B}(\mathbb{R}^2)\right).$$

applico Tonelli

$$= \left(\int_{\mathbb{R}} |x|\, d\mathbb{P}_X(x)\right)\left(\int_{\mathbb{R}} |y|\, d\mathbb{P}_Y(y)\right) = \int_\Omega |X|\, d\mathbb{P} \cdot \int_\Omega |Y|\, d\mathbb{P}$$

$$= \mathbb{E}[|X|] \cdot \mathbb{E}[|Y|].$$

$$\Rightarrow g(x,y) = |xy| \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$$

$$\Leftrightarrow h(X,Y) = XY \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}) \Leftrightarrow h \in L^1\left(\mathbb{R}^2, \mathcal{B}(\mathbb{R}^2), \mathbb{P}_Z\right).$$

Allora

$$\mathbb{E}[XY] = \cdots = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y].$$

facendo gli stessi passaggi di prima da applicando Fubini al posto di Tonelli. □

Osservazione:

$$X \perp\!\!\!\perp Y \quad \Rightarrow \quad \operatorname{cov}(X,Y) = 0,$$

ma in generale non vale il viceversa.

Esempio 3.5.4.

$$X \sim U((-1,1)) \qquad Y = X^2$$

$$X \not\perp\!\!\!\perp Y$$

$$\operatorname{cov}(x,y) = \mathbb{E}[xy] - \mathbb{E}[x]\mathbb{E}[y]$$

$$\mathbb{E}[X] = \frac{a+b}{2} = 0$$

- $$\mathbb{E}[Y] = \mathbb{E}[X^2] = \operatorname{var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12} = \frac{1}{3}$$
- $$\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X^3] = \int_{-\infty}^{+\infty} x^3 f_X(x)\,dx = \int_{-1}^{1} x^3 \cdot \frac{1}{2}\,dx = 0$$

$$\Rightarrow \operatorname{cov}(x,y) = 0$$

Proposizione 3.5.5 (Proprietà della covarianza)**.** Siano $X, Y, Z, X_1, X_2, Y_1, Y_2 \in L^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ e siano $a, b, c, a_1, a_2, b_1, b_2, c_1, c_2 \in \mathbb{R}$. Allora valgono le seguenti proprietà:

1. $$\operatorname{cov}(X,X) = \operatorname{var}(X).$$
2. $$\operatorname{cov}(X,Y) = \operatorname{cov}(Y,X).$$
3. $$\operatorname{cov}(aX + bY + c, Z) = a\,\operatorname{cov}(X,Z) + b\,\operatorname{cov}(Y,Z).$$
4. $$\begin{aligned}&\operatorname{cov}(a_1X_1 + b_1Y_1 + c_1,\ a_2X_2 + b_2Y_2 + c_2)\\ &= a_1a_2\operatorname{cov}(X_1,X_2) + a_1b_2\operatorname{cov}(X_1,Y_2) + b_1a_2\operatorname{cov}(Y_1,X_2) + b_1b_2\operatorname{cov}(Y_1,Y_2).\end{aligned}$$

   Quindi la covarianza è bilineare.
5. $$\operatorname{var}(aX + bY + c) = a^2\operatorname{var}(X) + 2ab\,\operatorname{cov}(X,Y) + b^2\operatorname{var}(Y).$$
6. Se $X \perp\!\!\!\perp Y$ o X, Y sono scorrelate,
   $$\operatorname{var}(aX + bY + c) = a^2\operatorname{var}(X) + b^2\operatorname{var}(Y).$$

In particolare, se $X \perp\!\!\!\perp Y$ (o scorrelate),

$$\operatorname{var}(X+Y) = \operatorname{var}(X) + \operatorname{var}(Y),$$

$$\operatorname{var}(X-Y) = \operatorname{var}(X) + \operatorname{var}(Y).$$

Altrimenti,

$$\operatorname{var}(X+Y) = \operatorname{var}(X) + \operatorname{var}(Y) + 2\operatorname{cov}(X,Y),$$
$$\operatorname{var}(X-Y) = \operatorname{var}(X) + \operatorname{var}(Y) - 2\operatorname{cov}(X,Y).$$

Dimostrazione. Per la prima proprietà,

$$\operatorname{cov}(X,X) = \mathbb{E}\left[(X-\mathbb{E}[X])(X-\mathbb{E}[X])\right] = \mathbb{E}\left[(X-\mathbb{E}[X])^2\right] = \operatorname{var}(X).$$

Per la seconda proprietà,

$$\begin{aligned}\operatorname{cov}(X,Y) &= \mathbb{E}\left[(X-\mathbb{E}[X])(Y-\mathbb{E}[Y])\right] \\ &= \mathbb{E}\left[(Y-\mathbb{E}[Y])(X-\mathbb{E}[X])\right] \\ &= \operatorname{cov}(Y,X).\end{aligned}$$

Per la terza proprietà,

$$\begin{aligned}\operatorname{cov}(aX+bY+c,Z) &= \mathbb{E}\left[(aX+bY+c-\mathbb{E}[aX+bY+c])(Z-\mathbb{E}[Z])\right] \\ &= \mathbb{E}\left[(aX+bY+c-a\mathbb{E}[X]-b\mathbb{E}[Y]-c)\,(Z-\mathbb{E}[Z])\right] \\ &= \mathbb{E}\left[(a(X-\mathbb{E}[X])+b(Y-\mathbb{E}[Y]))\,(Z-\mathbb{E}[Z])\right] \\ &= a\mathbb{E}\left[(X-\mathbb{E}[X])(Z-\mathbb{E}[Z])\right] + b\mathbb{E}\left[(Y-\mathbb{E}[Y])(Z-\mathbb{E}[Z])\right] \\ &= a\,\operatorname{cov}(X,Z) + b\,\operatorname{cov}(Y,Z).\end{aligned}$$

Considerando le proprietà 2) e 3), otteniamo

$$\begin{aligned}&\operatorname{cov}(a_1X_1+b_1Y_1+c_1,\, a_2X_2+b_2Y_2+c_2) \\ &= a_1a_2\operatorname{cov}(X_1,X_2) + a_1b_2\operatorname{cov}(X_1,Y_2) + b_1a_2\operatorname{cov}(Y_1,X_2) + b_1b_2\operatorname{cov}(Y_1,Y_2).\end{aligned}$$

Quindi la covarianza è bilineare.
Per la quinta proprietà,

$$\begin{aligned}\operatorname{var}(aX+bY+c) &= \operatorname{cov}(aX+bY+c, aX+bY+c) \\ &= a^2\operatorname{cov}(X,X) + ab\operatorname{cov}(X,Y) + ab\operatorname{cov}(Y,X) + b^2\operatorname{cov}(Y,Y) \\ &= a^2\operatorname{var}(X) + 2ab\,\operatorname{cov}(X,Y) + b^2\operatorname{var}(Y).\end{aligned}$$

Se $X \perp\!\!\!\perp Y$ o X, Y sono scorrelate, allora

$$\operatorname{cov}(X,Y) = 0,$$

e dunque

$$\operatorname{var}(aX+bY+c) = a^2\operatorname{var}(X) + b^2\operatorname{var}(Y).$$

□

Osservazione: In particolare,

$$\operatorname{var}(X+Y) = \operatorname{var}(X) + \operatorname{var}(Y),$$

e

$$\operatorname{var}(X-Y)=\operatorname{var}(X)+\operatorname{var}(Y).$$

Altrimenti,

$$\operatorname{var}(X+Y)=\operatorname{var}(X)+\operatorname{var}(Y)+2\operatorname{cov}(X,Y),$$

e

$$\operatorname{var}(X-Y)=\operatorname{var}(X)+\operatorname{var}(Y)-2\operatorname{cov}(X,Y).$$

Esempio 3.5.6.

$$X\sim B(n,p)\qquad X=\sum_{i=1}^{n}Y_i\qquad Y_i\sim b(p)\quad \text{iid}$$

$$\mathbb{E}[X]=\mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^{n}Y_i\right]=\sum_{i=1}^{n}\mathbb{E}[Y_i]=\sum_{i=1}^{n}p=np$$

$$\operatorname{var}(X)=\operatorname{var}\left(\sum_{i=1}^{n}Y_i\right)\overset{\text{indip}}{=}\sum_{i=1}^{n}\operatorname{var}(Y_i)=\sum_{i=1}^{n}p(1-p)=np(1-p)$$

Definizione 3.5.7. Sia

$$\underline{X}=\begin{pmatrix}X_1\\ \vdots\\ X_N\end{pmatrix}$$

un vettore aleatorio a valori in $\mathbb{R}^N$.

- Si dice vettore delle medie (media) di $\underline{X}$ il vettore

$$\underline{\mu}=\begin{pmatrix}\mu_1\\ \vdots\\ \mu_N\end{pmatrix}\qquad \text{dove } \mu_i=\mathbb{E}[X_i]\qquad \forall i=1\dots N.$$

- Si dice matrice di varianza e covarianza di $\underline{X}$ la matrice

$$C=(C_{ij})_{i,j=1\dots N}\qquad \text{dove } C_{ij}=\operatorname{cov}(X_i,X_j)$$

$$\forall i,j=1\dots N\qquad \text{e in particolare}\qquad C_{ii}=\operatorname{var}(X_i)\qquad \forall i=1\dots N.$$

Proposizione 3.5.8. La matrice di varianza e covarianza di un vettore aleatorio $\underline{X}$ è una matrice simmetrica e semidefinita positiva.

Dimostrazione.

$$C_{ij}=\operatorname{cov}(X_i,X_j)=\operatorname{cov}(X_j,X_i)=C_{ji}\qquad\Rightarrow\ \text{ok.}$$

Sia

$$\underline{a}\in\mathbb{R}^N.$$

$$\begin{aligned}
\underline{a}^T C \underline{a} &= \sum_{i,j=1}^{N} a_i a_j C_{ij} \\
&= \sum_{i=1}^{N} a_i^2 C_{ii} + 2 \sum_{i<j} a_i a_j C_{ij} \\
&= \sum_{i=1}^{N} a_i^2 \operatorname{var}(X_i) + \sum_{i<j} a_i a_j \operatorname{cov}(X_i, X_j) \\
&= \operatorname{var}\left(\sum_{i=1}^{N} a_i X_i \right) \geq 0 \qquad \Rightarrow \text{ ok.}
\end{aligned}$$

□

Definizione 3.5.9. Chiamiamo coefficiente di correlazione lineare (correlazione) tra X e Y la quantità (quando ben definita)

$$\rho(X,Y) = \frac{\operatorname{cov}(X,Y)}{\sqrt{\operatorname{var}(X)\operatorname{var}(Y)}}.$$

Osservazione:

$$\rho(X,Y) = \frac{\operatorname{cov}(X,Y)}{\sqrt{\operatorname{var}(X)} \cdot \sqrt{\operatorname{var}(Y)}} = \frac{\operatorname{cov}(X,Y)}{\sigma_X \cdot \sigma_Y} = \frac{\langle X - \mathbb{E}[X], Y - \mathbb{E}[Y] \rangle_{L^2}}{\|X - \mathbb{E}[X]\|_{L^2} \cdot \|Y - \mathbb{E}[Y]\|_{L^2}} = \cos\theta$$

ovvero la correlazione è il coseno dell' "angolo" tra i due vettori e misura quindi in modo adimensionato e senza scala la stessa proprietà misurata dalla covarianza. La correlazione però ci dà maggiori informazioni rispetto al semplice segno. È infatti indipendente da riscalamenti delle variabili aleatorie e quindi possiamo usare il suo valore numerico oltre al segno per misurare l'andamento comune delle due variabili aleatorie.

Proposizione 3.5.10 (Proprietà di $\rho(X,Y)$)**.**

1. $a, b > 0$

$$\rho(aX, bY) = \rho(X,Y)$$

(ρ è un n° puro che non si fa condizionare dai cambi di scala)

2.
$$-1 \leq \rho(X,Y) \leq 1$$

3.
$$\rho(X,Y) = \pm 1 \iff Y = aX + b \quad \text{q.o.} \qquad a, b \in \mathbb{R}, \quad a \neq 0$$

Dimostrazione. 1.

$$\rho(aX, bY) = \frac{\operatorname{cov}(aX, bY)}{\sqrt{\operatorname{var}(aX)\operatorname{var}(bY)}} = \frac{ab \operatorname{cov}(X,Y)}{\sqrt{a^2 \operatorname{var}(X)\, b^2 \operatorname{var}(Y)}}$$

$$= \frac{ab\,\operatorname{cov}(X,Y)}{ab\sqrt{\operatorname{var}(X)\operatorname{var}(Y)}} = \rho(X,Y)$$

2.
$$|\rho(X,Y)| = \frac{|\operatorname{cov}(X,Y)|}{\sqrt{\operatorname{var}(X)\operatorname{var}(Y)}} = \frac{|\mathbb{E}\left[(X-\mathbb{E}[X])(Y-\mathbb{E}[Y])\right]|}{\sqrt{\mathbb{E}\left[(X-\mathbb{E}[X])^2\right]\mathbb{E}\left[(Y-\mathbb{E}[Y])^2\right]}}$$

$$= \frac{|\langle X-\mathbb{E}[X],\, Y-\mathbb{E}[Y]\rangle|}{\|X-\mathbb{E}[X]\|_{L^2}\cdot\|Y-\mathbb{E}[Y]\|_{L^2}}$$

$$\leq \frac{\|(X-\mathbb{E}[X])(Y-\mathbb{E}[Y])\|_{L^1}}{\|X-\mathbb{E}[X]\|_{L^2}\cdot\|Y-\mathbb{E}[Y]\|_{L^2}} \leq 1 \qquad \text{per Cauchy-Schwarz}$$

3. Sia $y = ax + b$.

$$\begin{aligned}
\rho(x,y) &= \frac{\operatorname{cov}(x,y)}{\sqrt{\operatorname{var}(x)\operatorname{var}(y)}} \\
&= \frac{\operatorname{cov}(x, ax+b)}{\sqrt{\operatorname{var}(x)\cdot\operatorname{var}(ax+b)}} \\
&= \frac{a\operatorname{var}(x)}{\sqrt{\operatorname{var}(x)\cdot a^2\operatorname{var}(x)}} \\
&= \frac{a\operatorname{var}(x)}{|a|\operatorname{var}(x)} = \frac{a}{|a|} = \operatorname{sign}(a) \\
&= \begin{cases} +1 & \text{se } a > 0, \\ -1 & \text{se } a < 0. \end{cases}
\end{aligned}$$

Sia $\rho(x,y) = \pm 1$, denotiamo con σ_x^2, σ_y^2 le varianze di X e Y rispettivamente e con σ_x e σ_y le deviazioni standard.

$$\begin{aligned}
\operatorname{var}\left(\frac{X}{\sigma_x} \mp \frac{Y}{\sigma_y}\right) &= \frac{1}{\sigma_x^2}\operatorname{var}(x) + \frac{1}{\sigma_y^2}\operatorname{var}(y) \mp 2\frac{1}{\sigma_x}\frac{1}{\sigma_y}\operatorname{cov}(x,y) \\
&= 2(1 \mp \rho(x,y)) = 0.
\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \frac{X}{\sigma_x} \mp \frac{Y}{\sigma_y} = c \quad \text{q.o.}$$

$$\Rightarrow Y = \pm\frac{\sigma_y}{\sigma_x}X \mp c\sigma_y$$

$$\Rightarrow y = ax + b \quad \text{q.o. con } a, b \in \mathbb{R}, \quad a > 0 \ (a < 0).$$

□

Esempio 3.5.11.

$$X \sim B\left(4, \frac{1}{4}\right) \qquad Y \sim U([0,2]) \qquad \operatorname{cov}(x,y) = \frac{1}{4}$$

$\rho(x, y)$?

$$\begin{aligned}\rho(x, y) &= \frac{\operatorname{cov}(x, y)}{\sqrt{\operatorname{var}(x)\operatorname{var}(y)}} \\ &= \frac{\frac{1}{4}}{\sqrt{\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{3}}} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}\end{aligned}$$

2) $\mathbb{E}[2x - 3y^2 + 1]$?

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[Y^2] &= \operatorname{var}(Y) + \mathbb{E}[Y]^2 \\ \mathbb{E}[2X - 3Y^2 + 1] &= 2\mathbb{E}[X] - 3\mathbb{E}[Y^2] + 1 \\ &= 2 \cdot 1 - 3\left(\frac{1}{3} + 1\right) + 1 = -1\end{aligned}$$

3) $\operatorname{var}(2x - y + 3)$?

$$\begin{aligned}\operatorname{var}(2x - y + 3) &= \operatorname{var}(2x - y) \\ &= 4\operatorname{var}(x) + \operatorname{var}(y) - 4\operatorname{cov}(x, y) \\ &= 4 \cdot \frac{3}{4} + \frac{1}{3} - 4 \cdot \frac{1}{4} = \frac{7}{3}\end{aligned}$$

4) $\operatorname{cov}(2x - y, 2x + 2y)$?

$$\begin{aligned}\operatorname{cov}(2x - y, 2x + 2y) &= 4\operatorname{cov}(x, x) + 4\operatorname{cov}(x, y) - 2\operatorname{cov}(y, x) - 2\operatorname{cov}(y, y) \\ &= 4\operatorname{var}(x) - 2\operatorname{var}(y) + 2\operatorname{cov}(x, y) \\ &= 4 \cdot \frac{3}{4} - 2 \cdot \frac{1}{3} + 2 \cdot \frac{1}{4} = \frac{17}{6} > 0\end{aligned}$$

Sono positivamente correlate

Capitolo 4

Trasformazioni di variabili e vettori aleatori

4.1 Trasformazioni di variabili aleatorie

Sia X variabile aleatoria reale e sia $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ misurabile.

Allora $Y = g(X) = g \circ X$ è una variabile aleatoria e possiamo calcolare la legge:

$$\begin{aligned} \forall A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) \qquad \mathbb{P}_Y(A) &= \mathbb{P}(Y^{-1}(A)) = \mathbb{P}(Y \in A) = \mathbb{P}(g(X) \in A) \\ &= \mathbb{P}(X \in g^{-1}(A)) = \mathbb{P}\left(X^{-1}(g^{-1}(A))\right) = \mathbb{P}_X(g^{-1}(A)) \end{aligned} \tag{$*$}$$

Osservazione: Nel corso di metodi abbiamo già incontrato variabili aleatorie del tipo $g \circ X$. In quel contesto però non ci siamo interrogati su quale fosse la legge (misura immagine) di $Y = g \circ X$ ma solo di calcolare

$$\mathbb{E}[g(X)] = \int_\Omega g \circ X \, d\mathbb{P} = \int_{\mathbb{R}} g \, d\mathbb{P}_X$$

ovvero abbiamo integrato g sull'immagine di X attraverso la sua misura immagine. Qui invece ci stiamo preoccupando di definire la misura immagine di Y che è una misura sull'immagine di g e sulla quale quindi non ha senso integrare g stessa.

4.1.1 Caso discreto

Se X è una variabile aleatoria discreta allora lo è anche $Y = g(X)$. Infatti $Y(\Omega) = g(X(\Omega))$ e $\forall y \in Y(\Omega)$

$$\begin{aligned} p_Y(y) = \mathbb{P}(Y = y) = \mathbb{P}_Y\left(\overbrace{\{y\}}^{A}\right) &\overset{(*)}{=} \mathbb{P}_X\left(\overbrace{g^{-1}(\{y\})}^{B}\right) \\ = \mathbb{P}\left(X \in \underbrace{g^{-1}(\{y\})}_{B}\right) &= \sum_{x \in g^{-1}(\{y\}) \cap X(\Omega)} p_X(x) \end{aligned}$$

Esempio 4.1.1. Sia $X \sim U(\{-2, -1, 0, 1\})$ e sia $Y = X^2 = g(x)$ con $g(x) = x^2$.

$$X(\Omega) = \{-2, -1, 0, 1\} \quad \Rightarrow \quad Y(\Omega) = g(X(\Omega)) = \{0, 1, 4\}$$

Ricordiamo che $p_X(x) = \frac{1}{4} \quad \forall x \in X(\Omega)$.

$$p_Y(0) = \sum_{x \in g^{-1}(\{0\})} p_X(x) = p_X(0) = \frac{1}{4}$$

$$p_Y(1) = \sum_{x \in g^{-1}(\{1\})} p_X(x) = p_X(-1) + p_X(1) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

$$p_Y(4) = \sum_{x \in g^{-1}(\{4\})} p_X(x) = p_X(-2) + \underbrace{\cancel{p_X(2)}}_{2 \notin X(\Omega)} = p_X(-2) = \frac{1}{4}$$

4.1.2 Caso assolutamente continuo

Sia X variabile aleatoria assolutamente continua, $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ misurabile. $Y = g(X)$.

$$\forall y \in \mathbb{R} \qquad F_Y(y) = \mathbb{P}(Y \leq y) = \mathbb{P}_Y\left(\overbrace{(-\infty, y]}^{A}\right) \overset{(*)}{=} \mathbb{P}_X\left(g^{-1}((-\infty, y])\right)$$

$$= \mathbb{P}\left(X \in \overbrace{g^{-1}((-\infty, y])}^{B}\right) = \int_{\underbrace{g^{-1}((-\infty, y])}_{B}} f_X \, dm$$

A questo punto possiamo ottenere la densità $f_Y(y)$ semplicemente derivando $F_Y(y)$ ovvero

$$f_Y(y) = \frac{dF_y(y)}{dy}$$

Chiamiamo questo modo di ottenere la densità metodo della funzione di ripartizione. Un altro metodo di calcolo della densità è dato dalla seguente proposizione.

Proposizione 4.1.2. Sia X variabile aleatoria assolutamente continua con densità f_X. Sia $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tale che $g \in C^1$, $g' \neq 0$ ($\Rightarrow g$ strettamente monotona e quindi invertibile) tale che $g^{-1} \in C^1$. Allora $Y = g(X)$ è una variabile aleatoria assolutamente continua con densità:

$$f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \left| \frac{d}{dy} g^{-1}(y) \right| \mathbb{1}_{g(\mathbb{R})}(y)$$

Dimostrazione. Facciamo la dimostrazione nel caso in cui f_X continua $\Rightarrow F_X$ è derivabile

1) $g' > 0$ (g strettamente crescente)

   Sia $y \in g(\mathbb{R})$.

$$F_Y(y) = \mathbb{P}(Y \leq y) = \mathbb{P}(g(X) \leq y) = \mathbb{P}(X \leq g^{-1}(y))$$
$$= F_X(g^{-1}(y)) = \mathbb{P}\left(X \in (-\infty, g^{-1}(y)]\right)$$
$$= \int_{\underbrace{(-\infty, g^{-1}(y)]}_{g^{-1}((-\infty, y])}} f_X \, dm$$

   F_X è derivabile $\Rightarrow F_Y$ è derivabile $\Rightarrow Y$ è assolutamente continua

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy}F_Y(y) = \frac{d}{dy}F_X(g^{-1}(y))$$
$$= f_X(g^{-1}(y)) \cdot \underbrace{\frac{d}{dy}g^{-1}(y)}_{>0}$$

2) $g' < 0$ (g strettamente decrescente)

$$F_Y(y) = \mathbb{P}(Y \leq y) = \mathbb{P}(g(X) \leq y) = \mathbb{P}(X \geq g^{-1}(y))$$
$$= 1 - F_X(g^{-1}(y))$$

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy}F_Y(y) = \frac{d}{dy}\left(1 - F_X(g^{-1}(y))\right)$$
$$= -f_X(g^{-1}(y)) \cdot \underbrace{\frac{d}{dy}g^{-1}(y)}_{<0}$$

$$\Downarrow$$

$$f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \left|\frac{d}{dy}g^{-1}(y)\right| \mathbb{1}_{g(\mathbb{R})}(y)$$

□

Definizione 4.1.3. Una funzione $g : A \to \mathbb{R}$ si dice a tratti di classe C^1 e invertibile (strettamente monotona) se esiste una partizione quasi certa di A ovvero esistono $I_1, \ldots, I_n$ aperti t.c. $I_i \cap I_j = \varnothing$ se $i \neq j$ ed esiste I_0 t.c. $m(I_0) = 0$ per cui


$$A = I_1 \cup \ldots \cup I_n \cup I_0$$

t.c. $\forall i = 1, \ldots, n$, $g_i = g|_{I_i}$ è di classe C^1 e strettamente monotona (quindi invertibile).

Corollario 4.1.4. Sia X v.a. assolutamente continua con densità f_X. Sia $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ t.c. $\mathbb{P}(X \in A) = 1$. Sia $g : A \to \mathbb{R}$ a tratti di classe C^1 e invertibile. Supponiamo inoltre che $\forall i = 1, \ldots, n$, g_i^{-1} sia di classe C^1. Allora $Y = g(X)$ è assolutamente continua con densità:

$$f_Y(y) = \sum_{i=1}^{n} f_X\left(g_i^{-1}(y)\right) \left|\frac{d}{dy}g_i^{-1}(y)\right| \mathbb{1}_{I_i}(y)$$

Esempio 4.1.5. Siano $X \sim \mathcal{N}(0,1)$, $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ t.c. $g(x) = x^2$, $Y = g(X) = X^2$. Determiniamo la legge di Y.



Essendo $X \sim \mathcal{N}(0,1)$ questa è concentrata su $A = \mathbb{R}$. Possiamo partizionare $A = I_0 \cup I_1 \cup I_2$ con

$$I_0 = \{0\} \quad \text{e} \quad m(I_0) = 0 \qquad I_1 = (-\infty, 0) \qquad I_2 = (0, +\infty) \qquad g(I_1) = g(I_2) = (0, +\infty)$$

Allora

$$\begin{aligned} g_1(x) = g|_{I_1}(x) = x^2 \Rightarrow g_1^{-1}(y) = -\sqrt{y} \Rightarrow \frac{d}{dy} g_1^{-1}(y) = -\frac{1}{2\sqrt{y}} \\ g_2(x) = g|_{I_2}(x) = x^2 \Rightarrow g_2^{-1}(y) = +\sqrt{y} \Rightarrow \frac{d}{dy} g_2^{-1}(y) = +\frac{1}{2\sqrt{y}} \end{aligned} \qquad \text{se } y > 0$$

La formula generale è

$$f_Y(y) = \sum_{i=1}^{2} f_X(g_i^{-1}(y)) \left| \frac{d}{dy} g_i^{-1}(y) \right| \mathbb{1}_{g(I_i)}(y)$$

Nel nostro caso

- Se $y \leq 0$:
$$f_Y(y) = 0$$
- Se $y > 0$:
$$\begin{aligned} f_Y(y) &= f_X(-\sqrt{y}) \cdot \left| -\frac{1}{2\sqrt{y}} \right| + f_X(+\sqrt{y}) \cdot \left| +\frac{1}{2\sqrt{y}} \right| \\ &= \frac{1}{2\sqrt{y}} \left[f_X(\sqrt{y}) + f_X(-\sqrt{y}) \right] \end{aligned}$$

Calcoliamola anche con il metodo della funzione di ripartizione.

$$\forall y \in \mathbb{R} F_Y(y) = \mathbb{P}(Y \leq y) = \mathbb{P}(X^2 \leq y)$$

- Se $y \leq 0$:
$$F_Y(y) = 0$$
- Se $y > 0$:
$$\begin{aligned} F_Y(y) &= \mathbb{P}(X^2 \leq y) = \mathbb{P}(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}) \\ &= F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y}) \end{aligned}$$

Dal momento che F_X risulta derivabile quasi ovunque (X è assolutamente continua) possiamo sfruttarla per calcolare la derivata di F_Y.

- Se $y \leq 0$:
$$f_Y(y) = 0$$
- Se $y > 0$:
$$f_Y(y) = \frac{d}{dy} F_Y(y) = \frac{d}{dy} \left[F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y}) \right]$$
$$= f_X(\sqrt{y}) \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} - f_X(-\sqrt{y}) \cdot \left(-\frac{1}{2\sqrt{y}} \right)$$
$$= \frac{1}{2\sqrt{y}} \left[f_X(\sqrt{y}) + f_X(-\sqrt{y}) \right]$$

Possiamo caratterizzare ancora oltre il risultato.Usiamo il fatto che $X \sim \mathcal{N}(0,1)$

$$\Rightarrow f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} \qquad \forall x \in \mathbb{R}$$

- Se $y \leq 0$:
$$f_Y(y) = 0$$
- Se $y > 0$:
$$f_Y(y) = \frac{1}{2\sqrt{y}} \left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y/2} + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y/2} \right]$$
$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{1}{\sqrt{y}} e^{-y/2}$$

$$\Rightarrow f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} y^{\frac{1}{2}-1} e^{-\frac{1}{2}y} \mathbb{1}_{(0,+\infty)}(y)$$

$$\Rightarrow Y \sim \Gamma\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

Dal momento che la costante è univocamente determinata dal fatto che l'integrale debba sommare a uno

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} = \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^{1/2}}{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)} = \frac{1}{\sqrt{2}\,\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}$$

$$\Rightarrow \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi} \qquad \Rightarrow \qquad \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

$$\Rightarrow \ldots \text{ posso conoscere } \Gamma\left(\frac{n}{2}\right) \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$$

Dal momento che il caso n pari è già noto (è il caso intero).
Quando una variabile aleatoria ha legge $\Gamma\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ diciamo anche che ha legge Chi-quadro ad 1 grado di libertà e scriviamo

$$Y \sim \chi^2(1).$$

Esempio 4.1.6. Sia $X \sim \mathcal{N}(0,1)$ e sia $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto \sigma x + \mu$. Chiamiamo $Y = g \circ X = \sigma X + \mu$. Troviamo la densità $f_Y(y)$ con il metodo della funzione di ripartizione.

$$F_Y(y) = \mathbb{P}(Y < y) = \mathbb{P}(\sigma X + \mu < y) = \mathbb{P}(\sigma X < y - \mu)$$

- Se $\sigma > 0$:

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= \mathbb{P}\left(X < \frac{y-\mu}{\sigma}\right) = F_X\left(\frac{y-\mu}{\sigma}\right) \\ &= \int_{-\infty}^{\frac{y-\mu}{\sigma}} e^{-\frac{x^2}{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\, dx \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \frac{dF_Y(y)}{dy} = \frac{1}{\sigma} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(y-\mu)^2}{2\sigma^2}} = f_Y(y)$$

- Se $\sigma < 0$:

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= \mathbb{P}(-\sigma X > \mu - y) = \mathbb{P}\left(X > \frac{\mu - y}{-\sigma}\right) \\ &= \mathbb{P}\left(X > \frac{y-\mu}{\sigma}\right) \\ &= 1 - F_X\left(\frac{y-\mu}{\sigma}\right) \\ &= 1 - \int_{-\infty}^{\frac{y-\mu}{\sigma}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{x^2}{2}}\, dx \end{aligned}$$

$$\Rightarrow f_Y(y) = -\frac{1}{\sigma} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(y-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Mettendo assieme i due casi

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \frac{1}{|\sigma|} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(y-\mu)^2}{2\sigma^2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{\sigma^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(y-\mu)^2}{2\sigma^2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \cdot e^{-\frac{(y-\mu)^2}{2\sigma^2}} \qquad \forall y \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow Y \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma)$$

Usiamo anche il metodo della derivata con $A = \mathbb{R}$, $g(x) = \sigma x + \mu$ è di classe C^1 invertibile ($g' \neq 0$) con inversa di classe C^1,

$$g^{-1}(y) = \frac{y-\mu}{\sigma} \quad \Rightarrow \quad \frac{d}{dy} g^{-1}(y) = \frac{1}{\sigma}$$

$$g(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow \quad f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \cdot \left| \frac{d}{dy} g^{-1}(y) \right|$$

$$= f_X\left(\frac{y-\mu}{\sigma}\right) \cdot \frac{1}{|\sigma|}$$

$$\Rightarrow f_Y(y) = \frac{1}{|\sigma|} f_X\left(\frac{y-\mu}{\sigma}\right) \qquad \forall y \in \mathbb{R}$$

Noi abbiamo $X \sim \mathcal{N}(0,1)$.

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{\sigma^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\left(\frac{y-\mu}{\sigma}\right)^2/2}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(y-\mu)^2}{2\sigma^2}} \qquad \forall y \in \mathbb{R}$$

4.2 Trasformazioni di vettori aleatori

In questa sezione $Z = (X, Y)$ è un vettore aleatorio e $h : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ funzioni misurabili. Fissiamo inoltre

$$T = h(Z) = h \circ Z = h(X, Y)$$

$$W = (U, V) = g \circ Z = g(Z) = g(X, Y)$$

4.2.1 Caso discreto

Sia $Z = (X, Y)$ vettore aleatorio discreto.

a) $T = h \circ Z$ è una v.a. discreta con

$$T(\Omega) = h(Z(\Omega))$$

$\forall t \in T(\Omega)$

$$p_T(t) = \mathbb{P}(T = t) = \mathbb{P}_T(\{t\})$$
$$= \mathbb{P}_Z\left(h^{-1}(\{t\})\right) = \mathbb{P}\left(Z \in h^{-1}(\{t\})\right)$$
$$= \sum_{z \in h^{-1}(\{t\})} p_Z(z)$$

con $z = (x, y)$.

b) $W = (U, V) = g \circ Z$ è un vettore aleatorio discreto

con

$$W(\Omega) = g(Z(\Omega))$$

$\forall w \in W(\Omega)$, con $w = (u, v)$

$$p_W(w) = \mathbb{P}(W = w) = \mathbb{P}_W(\{w\})$$
$$= \mathbb{P}_Z\left(g^{-1}(\{w\})\right) = \mathbb{P}\left(Z \in g^{-1}(\{w\})\right)$$
$$= \sum_{z \in g^{-1}(\{w\})} p_Z(z)$$

Merita di essere riportato per la sua utilità il seguente caso. Sia $Z = (X, Y)$, $h : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ misurabile.

$$h(z) = h(x, y) = x + y \qquad \forall z = (x, y) \in \mathbb{R}^2$$

$$T = h(Z) = h(X, Y) = X + Y$$

Supponiamo che $X(\Omega) = Y(\Omega) = \mathbb{N} \Rightarrow T(\Omega) = \mathbb{N}$.
$\forall t \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned} p_T(t) &= \sum_{z \in h^{-1}(\{t\})} p_Z(z) \\ &= \sum_{\substack{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \\ x+y=t}} p_Z(x, y) \\ &= \sum_{x \in \mathbb{R}} p_Z(x, t-x) = \sum_{x=0}^{t} p_Z(x, t-x) \end{aligned}$$

Posso fare il calcolo diretto:

$$\begin{aligned} p_T(t) &= \mathbb{P}(T = t) = \mathbb{P}(X + Y = t) \\ &= \sum_{x \in \mathbb{N}} \mathbb{P}(X + Y = t, X = x) \\ &= \sum_{x \in \mathbb{N}} \mathbb{P}(X = x, Y = t - x) \\ &= \sum_{x \in \mathbb{N}} p_Z(x, t-x) = \sum_{x=0}^{t} p_Z(x, t-x) \end{aligned}$$

Dove abbiamo usato la formula della probabilità totale con la partizione dell'evento certo

$$\{(X = x) : x \in \mathbb{N}\}.$$

Allora per simmetria

$$\boxed{p_{X+Y}(t) = \mathbb{P}(X + Y = t) = \sum_{x=0}^{t} p_Z(x, t-x) = \sum_{y=0}^{t} p_Z(t-y, y)} \qquad \forall t \in \mathbb{N}$$

Se $X \perp\!\!\!\perp Y$

$$p_Z(x, y) = p_X(x) \cdot p_Y(y)$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \quad p_{X+Y}(t) &= \sum_{x=0}^{t} p_X(x) p_Y(t-x) \\ &= \sum_{y=0}^{t} p_X(t-y) \cdot p_Y(y) \\ &= (p_X * p_Y)(t) \end{aligned}$$

Abbiamo quindi ottenuto che se $X+Y$ sono discrete a valori naturali e indipendenti la densità della somma è la convoluzione delle densità degli addendi.

Esempio 4.2.1. Sia $X \perp Y$ con $X \sim P(\lambda)$, $Y \sim P(\mu)$, $\lambda, \mu > 0$.
Determiniamo la legge di $T = X + Y$.

$$T(\Omega) = \mathbb{N} \qquad \forall k \in \mathbb{N}$$

$$\begin{aligned} p_T(k) = p_{X+Y}(k) &= (p_X * p_Y)(k) \\ &= \sum_{i=0}^{k} p_X(i) p_Y(k-i) \\ &= \sum_{i=0}^{k} \left(e^{-\lambda}\frac{\lambda^i}{i!}\right)\left(e^{-\mu}\frac{\mu^{k-i}}{(k-i)!}\right) \\ &= \frac{e^{-(\lambda+\mu)}}{k!}\sum_{i=0}^{k}\binom{k}{i}\lambda^i\mu^{k-i} \\ &= \frac{e^{-(\lambda+\mu)}}{k!}(\lambda+\mu)^k \end{aligned}$$

$$\Rightarrow T(\Omega) = \mathbb{N} \quad \text{e} \quad \forall k \in \mathbb{N} \qquad p_T(k) = e^{-(\lambda+\mu)} \cdot \frac{(\lambda+\mu)^k}{k!}$$

$$\Rightarrow T = X + Y \sim P(\lambda + \mu)$$

In questo caso X, Y potrebbero rappresentare il numero di clienti serviti in un'ora da due sportelli di un ufficio postale e $X + Y$ potrebbe rappresentare il numero di clienti serviti in un'ora dall'intero ufficio postale.

Osservazione: Seguendo i passi dell'esempio precedenti si possono ottenere le seguenti proprietà

1)
$$X \sim P(\lambda) \perp Y \sim P(\mu) \quad \Rightarrow \quad X + Y \sim P(\lambda + \mu)$$

2)
$$X \sim B(n, p) \perp Y \sim B(m, p) \quad \Rightarrow \quad X + Y \sim B(n + m, p)$$

3)
$$X \sim G(p) \perp Y \sim G(p) \quad \Rightarrow \quad X + Y \sim \text{Pascal}(2, p)$$

4)
$$X \sim \text{Pascal}(r, p) \perp Y \sim \text{Pascal}(s, p)$$
$$\Rightarrow \quad X + Y \sim \text{Pascal}(r + s, p)$$

4.2.2 Caso assolutamente continuo

Iniziamo con il caso di trasformazioni $g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ misurabile.

Definizione 4.2.2. Sia $A \subseteq \mathbb{R}^2$ aperto, sia $g : A \to \mathbb{R}^2$.Diciamo che g è un C^1-diffeomorfismo da A in $g(A)$ se g è di classe C^1, è invertibile con determinante Jacobiano non nullo e g^{-1} è di classe C^1.

Teorema 4.2.3. Sia $Z = (X, Y)$ un vettore aleatorio assolutamente continuo con densità f_Z. Sia $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$ t.c. $\mathbb{P}(Z \in B) = 1$ (la legge di Z è concentrata su B). Sia $g : B \to \mathbb{R}^2$ e supponiamo che esista una partizione quasi certa $\{A_1, \dots, A_n\}$ t.c. $g_i := g|_{A_i}$ sia un C^1-diffeomorfismo da A_i a $g(A_i)$ $\forall i = 1, \dots, n$.
Sia $W = (U, V) = g(Z) = g(X, Y)$. Allora W è un vettore aleatorio assolutamente continuo con densità

$$f_W(w) = \sum_{i=1}^{n} f_Z\left(g_i^{-1}(w)\right) \left|\det J_{g_i^{-1}}(w)\right| \mathbb{1}_{g(A_i)}(w) \qquad \forall w \in \mathbb{R}^2$$

Osservazione: Chiamiamo il metodo introdotto dal precedente teorema "metodo dello Jacobiano".

Trasformazioni lineari

Sia $Z = \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}$ un vettore aleatorio assolutamente continuo con densità f_Z.

Sia $g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ t.c. $\forall \underline{z} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$

$$g(\underline{z}) = A\underline{z} + \underline{b} \qquad \text{con } A \in \mathbb{R}^{2,2}, \quad \underline{b} \in \mathbb{R}^2, \quad \det A \neq 0$$

Notiamo che g è un C^1-diffeomorfismo da $\mathbb{R}^2$ in $\mathbb{R}^2$.
Sia

$$W = \begin{pmatrix} U \\ V \end{pmatrix} = g(Z) = g\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = AZ + \underline{b}$$

Per il teorema W è un vettore aleatorio assolutamente continuo con densità

$$f_W(\underline{w}) = f_Z(g^{-1}(\underline{w}))\, |\det J_{g^{-1}}(\underline{w})|\, \mathbb{1}_{g(\mathbb{R}^2)}(\underline{w})$$

Nello specifico

$$g(\underline{z}) = A\underline{z} + \underline{b} = \underline{w} \quad \Rightarrow \quad g^{-1}(\underline{w}) = A^{-1}(\underline{w} - \underline{b})$$

$$\det J_{g^{-1}}(\underline{w}) = \det A^{-1} = \frac{1}{\det A}$$

Ovvero $\forall \underline{w} \in \mathbb{R}^2$

$$f_W(\underline{w}) = f_Z\left(A^{-1}(\underline{w} - \underline{b})\right) \cdot \left|\frac{1}{\det A}\right|$$

$$= \frac{1}{|\det A|} \cdot f_Z\left(A^{-1}(\underline{w} - \underline{b})\right)$$

Osservazione: Nel caso reale si ha, se $Y = aX + b$, $a, b \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$,

$$f_Y(y) = \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right) \qquad \forall y \in \mathbb{R}$$

ovvero ritroviamo quanto già detto per le trasfromazioni di variabili aleatorie.

Esempio 4.2.4. Sia $X, Y \underset{\text{iid}}{\sim} \mathcal{N}(0,1)$, sia $Z = \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}$.

Sia $g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ t.c. $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2$

$$g(x,y) = \begin{pmatrix} x+y \\ x-y \end{pmatrix}$$

Sia

$$W = \begin{pmatrix} U \\ V \end{pmatrix} = g(X,Y) = \begin{pmatrix} X+Y \\ X-Y \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} + \underline{b}$$

con

$$\underline{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \qquad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \det A = -2 \quad \Rightarrow \quad A^{-1} = -\frac{1}{2}\begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \quad A^{-1}(\underline{w} - \underline{b}) = A^{-1}\underline{w}$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{1}{2}(u+v) \\ \frac{1}{2}(u-v) \end{pmatrix}$$

$$f_W(u,v) = \frac{1}{|-2|} \cdot f_Z\left(\frac{u+v}{2}, \frac{u-v}{2}\right)$$

$X, Y \underset{\text{iid}}{\sim} \mathcal{N}(0,1)$

$$\Rightarrow \quad f_Z(x,y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$$

$$= \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}\right)\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y^2/2}\right)$$

$$= \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{1}{2}(x^2+y^2)}$$

$$\Rightarrow \quad f_W(u,v) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2\pi} \exp\left\{-\frac{1}{2}\left[\left(\frac{u+v}{2}\right)^2 + \left(\frac{u-v}{2}\right)^2\right]\right\}$$

$$= \frac{1}{4\pi} \exp\left\{-\frac{1}{2}\left(\frac{u^2}{4} + \frac{v^2}{4} + \frac{1}{2}uv + \frac{u^2}{4} + \frac{v^2}{4} - \frac{1}{2}uv\right)\right\}$$

$$= \frac{1}{4\pi} \exp\left(-\frac{u^2+v^2}{4}\right)$$

$\forall (u,v) \in \mathbb{R}^2$

$$f_W(u,v) = \frac{1}{4\pi} e^{-\frac{u^2+v^2}{4}}$$
$$= \underbrace{\left(\frac{1}{\sqrt{4\pi}} e^{-\frac{u^2}{4}}\right)}_{f_U(u)} \underbrace{\left(\frac{1}{\sqrt{4\pi}} e^{-\frac{v^2}{4}}\right)}_{f_V(v)}$$

per simmetria

$$\Rightarrow U, V \underset{\text{iid}}{\sim} \mathcal{N}(0,2)$$

Passiamo al caso di trasformazioni del tipo $h : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ misurabile.
Sia $Z = (X,Y)$ vettore aleatorio assolutamente continuo e sia $T = h(Z) = h(X,Y)$.
Vogliamo determinare la legge di T.Abbiamo 2 alternative:

1) Metodo della funzione di ripartizione:$\forall t \in \mathbb{R}$

$$F_T(t) = \mathbb{P}(T \le t) = \mathbb{P}(h(X,Y) \le t) = \mathbb{P}_T((-\infty, t])$$
$$= \mathbb{P}_Z\left(h^{-1}((-\infty,t])\right) = \mathbb{P}\left(Z \in \underbrace{h^{-1}((-\infty,t])}_{C}\right)$$
$$= \int_{\underbrace{h^{-1}((-\infty,t])}_{C}} f_Z \, dm$$

Da qui otteniamo

$$f_T(t) = \frac{dF_T(t)}{dt}$$

2) Sia $g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ C^1-diffeomorfismo dato da

$$g(x,y) = \big(h(x,y), \ell(x,y)\big)$$

con $l(x,y) = x$ oppure $l(x,y) = y$ (o qualsiasi altra funzione che renda g un C^1-diffeomorfismo ma conviene avere espressioni facili). Sia $W = (T,V)$ con $T = h(X,Y)$ e $V = \ell(X,Y)$. Possiamo pensare di usare il metodo dello Jacobiano su W ottenendo f_W. A questo punto

$$f_T(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_W(t,v) \, dv$$

Massimi e minimi

Sia $Z = (X,Y)$. Vogliamo calcolare la legge di

$$U = \min(X,Y)$$
$$V = \max(X,Y)$$

a) $V = \max(X,Y)$
$\forall v \in \mathbb{R}$

$$F_V(v) = \mathbb{P}(V \le v) = \mathbb{P}(\max(X,Y) \le v)$$
$$= \mathbb{P}(X \le v, Y \le v) = F_Z(v,v)$$
$$\overset{X \perp\!\!\!\perp Y}{=} \mathbb{P}(X \le v)\mathbb{P}(Y \le v) = F_X(v) \cdot F_Y(v)$$

b) $U = \min(X, Y)$

$\forall u \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} F_U(u) &= \mathbb{P}(U \leq u) = \mathbb{P}(\min(X, Y) \leq u) \\ &= 1 - \mathbb{P}(\min(X, Y) > u) \\ &= 1 - \mathbb{P}(X > u, Y > u) \\ &\overset{X \perp\!\!\!\perp Y}{=} 1 - \mathbb{P}(X > u)\mathbb{P}(Y > u) = 1 - S_X(u) \cdot S_Y(u) \\ &= 1 - (1 - F_X(u))(1 - F_Y(u)) \end{aligned}$$


In particolare

$$S_U(u) \overset{X \perp\!\!\!\perp Y}{=} S_X(u) \cdot S_Y(u)$$

Una diretta applicazione di questi concetti è lo studio dell'affidabilità di sistemi. Siano T_i = Tempo di vita dei componenti C_i di un sistema e T_S = Tempo di vita del sistema S.

Consideriamo $i = 1, 2$.


1) **Serie**



$$T_S = \min(T_1, T_2)$$

$$T_1 \perp\!\!\!\perp T_2 \quad \Rightarrow \quad S_{T_S}(t) = S_{T_1}(t) \cdot S_{T_2}(t)$$

2) **Parallelo**



$$T_S = \max(T_1, T_2)$$

$$T_1 \perp\!\!\!\perp T_2 \quad \Rightarrow \quad F_{T_S}(t) = F_{T_1}(t) \cdot F_{T_2}(t)$$

Esempio 4.2.5. Siano $X \sim \text{Exp}(\lambda) \perp\!\!\!\perp Y \sim \text{Exp}(\mu)$,$U = \min(X, Y)$. Determiniamo la legge di U.

- Se $t \leq 0$

$$F_U(t) = 0, \qquad S_U(t) = 1$$

- Se $t > 0$

$$S_U(t) = S_X(t)S_Y(t) = e^{-\lambda t} \cdot e^{-\mu t}$$

$$\Rightarrow S_U(t) = e^{-(\lambda+\mu)t}, \qquad F_U(t) = 1 - e^{-(\lambda+\mu)t}$$

$$\Rightarrow U = \min(X, Y) \sim \text{Exp}(\lambda + \mu)$$