量子情報入門から Single-Shot の量子熱力学まで

森

2025年2月22日

目次

第1章	量子情報の枠組みミニマム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
1.1	状態 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
1.2	量子操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
1.3	測定 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	5
1.4	複合系 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
1.5	量子状態間の尺度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
1.6	色々なエントロピー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
第2章	量子仮説検定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
2.1	状況設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
2.2	量子 Neyman-Pearson 検定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
2.3	漸近論と量子相対エントロピーの創発・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
第3章	Single-Shot の量子熱力学・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
3.1	状況設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
3.2	Exact Case · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7
3.3	Approximate Case · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7
3.4	Asymptotic Case · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7
付録 A	CPTP 写像の 3 つの表現の同値性の証明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
付録 B	i.i.d. での量子 Stein の補題の証明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9

第1章 量子情報の枠組みミニマム

まず量子情報分野の基本的なルールについて、以降の章で使うものについて簡単な説明をする. 基本的に有限次元の量子力学が舞台になっている。主に [1], [2] を参考にした。怪しげなことを書いていたら教えて欲しいです。 あと「演算子」, 「オペレータ」は適宜「行列」にでも読み替えてもらって大丈夫です。

1.1 状態

まず量子状態を線型代数の言葉を使って表すことから始める. 量子システムは Hilbert 空間 $\mathcal H$ で記述される $^{1)}$. $\mathcal H$ に作用する演算子の集合を $\mathcal L(\mathcal H)$ と書く. d を $\mathcal H$ の次元とする.

一般の量子状態は以下で定める密度演算子によって表される.

定義 1.1.1 (量子状態). 系の量子状態は $\mathcal H$ に作用する $\mathrm{tr}[\rho]=1$ かつ半正定値な演算子 $\rho\in\mathcal L(\mathcal H)$ によって表され, ρ を密度演算子と呼ぶ.

ここで半正定値とは任意のベクトル $|\psi\rangle\in\mathcal{H}$ について $\langle\psi|\,\rho\,|\psi\rangle\geq0$ が成立することを意味し、これを $\rho\geq0$ と表す.

 \mathcal{H} 上の量子状態の集合を $\mathcal{S}(\rho)$ と表すことにする. これは凸集合になっている.

命題 1.1.2. $S(\mathcal{H})$ は凸集合.

証明 $p \in [0,1], \rho, \sigma \in \mathcal{S}(\mathcal{H})$ とする.

1.2 量子操作

物理的に実現可能な量子操作は次の写像で表現されると考える.

¹⁾ 内積の入った複素数上の線型空間と思ってもらって大丈夫だと思う...

定義 1.2.1 (CP 写像). $\mathcal{E}: \mathcal{L}(\mathcal{H}) \to \mathcal{L}(\mathcal{H}')$ は線型写像とする. \mathcal{E} が以下の 3 つを満たすとき、これを CP 写像と呼ぶ(Complete-Positive).

- 1. X, Yを演算子とする. このとき, $X \ge 0$ ならば $\mathcal{E}(X) \ge 0$. この条件を満たせば, その写像は Positive であるという.
- 2. $\mathcal{E} \otimes I_n$ が Positive である. これを n-positive と呼ぶ.
- 3. 任意の $n \in \mathbb{N}$ について, \mathcal{E} は n-positive.

参考のために、Positive だが CP ではない写像の例を挙げる.

例 1 (Positive but not CP). 簡単のために qubit 空間 \mathcal{H}_2 上で考える. いつも通り $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ を正規 直交基底とする. $\mathcal{E}_T: \mathcal{L}(\mathcal{H}_2) \to \mathcal{L}(\mathcal{H}_2)$ を $\mathcal{E}_T: |i\rangle\langle j| \mapsto |j\rangle\langle i|$ な線型写像とする. これは Positive で ある²⁾. 次に, $I \otimes \mathcal{E}_T$ を例えば $|\psi\rangle = |00\rangle + |11\rangle$ (規格化は無視)に作用させることを考える.

$$\rho_{\psi} = \left|0\right\rangle \left\langle 0\right| \otimes \left|0\right\rangle \left\langle 0\right| + \left|0\right\rangle \left\langle 1\right| \otimes \left|0\right\rangle \left\langle 1\right| + \left|1\right\rangle \left\langle 0\right| \otimes \left|1\right\rangle \left\langle 0\right| + \left|1\right\rangle \left\langle 1\right| \otimes \left|1\right\rangle \left\langle 1\right|$$

とかけることに注意すれば,

$$I \otimes \mathcal{E}_{T}(\rho_{\psi}) = |0\rangle \langle 0| \otimes |0\rangle \langle 0| + |0\rangle \langle 1| \otimes |1\rangle \langle 0| + |1\rangle \langle 0| \otimes |0\rangle \langle 1| + |1\rangle \langle 1| \otimes |1\rangle \langle 1| \stackrel{\cdot}{=} \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 0 & 1 & \\ & & 1 & 0 \\ & & & 1 \end{pmatrix}$$

となる. この行列の固有値は 1,1,1,-1 なので、確かにこれは CP ではない.

次に TP (Trace Preserving) を定義する.

定義 1.2.2 (TP 写像). 線型写像 ε が任意の演算子 X について

$$\operatorname{tr}(\mathcal{E}(X)) = \operatorname{tr}(X)$$

を満たすとき、これを TP という.また、任意の $X \geq 0$ について $\mathrm{tr}(\mathcal{E}(X)) \leq \mathrm{tr}(X)$ のとき、 \mathcal{E} は trace-nonincreasing という.

CPTP 写像には、理解が深まる同値な表現がある.

$$2)\quad \left(\alpha^* \quad \beta^*\right) \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \geq 0 \text{ であるとき両辺転置を取れば} \begin{pmatrix} \alpha & \beta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha^* \\ \beta^* \end{pmatrix} \geq 0$$

定理 1.2.3 (CPTP 写像の同値な表現). 線型写像 $\mathcal E$ について, 以下は同値:

- (a). *E* は CPTP 写像.
- (b). \mathcal{E} は $\sum_k M_k^\dagger M_k = I$ を満たす Kraus 演算子で $\mathcal{E}(\rho) = \sum_k M_k \rho M_k^\dagger$ とかける.
- (c). 環境系を表す量子状態 $\sigma \in \mathcal{S}(\mathcal{H}_A)$ が存在して、ある Unitary 演算子 $U:\mathcal{H}\otimes\mathcal{H}_A\to\mathcal{H}'\otimes\mathcal{H}'_A$ を使って $\mathcal{E}(\rho)=\operatorname{tr}_{A'}(U\rho\otimes\sigma U^\dagger)$ とかける.これを Stinespring 表現という.

証明 Appendix にかけたら書く.

(b) は使い勝手の良い性質で、写像が Kraus 演算子を使ってかけていたらそれは量子操作を記述する CPTP 写像になっているとわかる. (c) は物理的な意味をより明確にしてくれていて、結局視野を環境系にまで広げれば知っているようにユニタリ時間発展をしていて、CPTP 写像は環境系をトレースアウトした着目系の間の時間発展の記述をしているとわかる.

- 1.3 測定
- 1.3.1 量子測定
- 1.3.2 **POVM**
- 1.3.3 応用例:量子状態の識別
- 1.4 複合系
- 1.5 量子状態間の尺度
- 1.5.1 トレース距離
- 1.5.2 忠実度
- 1.5.3 応用例:クローン不可能定理
- 1.6 色々なエントロピー
- 1.6.1 von Neumann エントロピー
- 1.6.2 量子相対エントロピー
- 1.6.3 Rényi- α ダイバージェンス
- 1.6.4 平滑化 Rényi- αダイバージェンス

第2章 量子仮説検定

- 2.1 状況設定
- 2.2 量子 Neyman-Pearson 検定
- 2.3 漸近論と量子相対エントロピーの創発

第3章 Single-Shot の量子熱力学

- 3.1 状況設定
- 3.2 Exact Case
- 3.3 Approximate Case
- 3.4 Asymptotic Case

付録 A CPTP 写像の3つの表現の同値性の証明

付録 B i.i.d. での量子 Stein の補題の証明

参考文献

- [1] Michael A Nielsen and Isaac L Chuang. Quantum computation and quantum information. Cambridge university press, 2010.
- [2] Takahiro Sagawa. Entropy, Divergence, and Majorization in Classical and Quantum Thermodynamics. Springer Singapore, 2022.