

Matemáticas discretas II

Delgado S.

los árboles

Recorridos en

Matemáticas discretas II Árboles carlos.andres.delgado@correounivalle.edu.co

Carlos Andrés Delgado S.

Facultad de Ingeniería. Universidad del Valle

Octubre de 2017



Contenido

Matemáticas discretas II

Carlos Andrés Delgado S.

Introducción los árboles

Recorridos en árboles 1 Introducción a los árboles



Contenido

Matemáticas discretas II

Carlos André Delgado S.

Introducción a los árboles

Recorridos en

1 Introducción a los árboles



Matemáticas discretas II

Delgado S.

Introducción a los árboles

Recorridos en

Introducción

Un árbol es un grafo conexo que no contiene circuitos simples. Los árboles son utilizados en un gran número de problemas computaciones, como es el caso de algoritmos de codificación, programación dinámica, entre otros.



Matemáticas discretas II


Delgado S.

Introducción a los árboles

Recorridos en árboles

Definición 1

Un árbol no tiene ningún circuito simple. Esto quiere decir que no puede contener aristas múltiples ni ciclos.





Matemáticas discretas II


Delgado S.

Introducción a los árboles

Recorridos en

Teorema 1

Un grado no dirigido es un árbol si y sólo si hay un único camino entre cada par de $\sqrt[N]{Pr}$ (P









Matemáticas discretas II

Carlos Andrés Delgado S.

Introducción a los árboles

Recorridos en árboles

Definición 2

Un árbol con raíz es un árbol con un vértice que ha sido designado como raíz y cada arista se puede acceder desde un camino directo desde la raíz.





Matemáticas discretas II


Delgado S.


Introducción a los árboles

Recorridos en árboles

Definición 2

Un árbol con raíz es un árbol con un vértice que ha sido designado como raíz y cada arista se puede acceder desde un camino directo desde la raíz.







Matemáticas discretas II

Carlos André Delgado S.

Introducción a los árboles

Recorridos en árboles

Definición 3

La terminología de los árboles tiene orígenes botánicos y genealógicos. Suponga que \mathcal{T} es un árbol con raíz.

- El **padre** de *v* es el único vertice *u*, tal que hay una arista dirigida de *u* a *v*
- El caso contrario anterior, se dice v es hijo de u
- Los vértices con el mismo padre son llamados hermanos
- Los antecesores de cualquier vértices, son el camino desde la raiz hasta el vértices, pero excluyéndolo a él
- Los descendientes de un vértice son todos aquellos que tienen a v como antecesor



Matemáticas discretas II

Delgado S.

Introducción a los árboles

Recorridos en

Definición 4

- Un vértice es llamado hoja si no tiene hijos
- Los vértices des hijos son llamados **vértices internos** hod que tiranos hod

Definición 5

El **nivel de un vértice** es la longitud del único camino desde la raíz que hasta él. El nivel de la raiz es 0



Matemáticas discretas II

Deigado 3.

Introducción a los árboles

Recorridos en árboles

Definición 6

La **altura** de un árbol es la **longitud del camino más largo** desde la raíz hasta cualquier vértice

Definición 7

Un árbol de altura (h), está **equilibrado** o **balancedo** si todas sus hojas están en los niveles h o h-1




Matemáticas discretas II

Carlos André Delgado S.

Introducción a los árboles

Recorridos en árboles

Ejemplo de árbol equilibrado



- 1 El árbol esta equilibrado
- 2 Su altura es 3
- 3 j es el **padre** de p
- 4 Los antecesores de n son $\{i, d, a\}$
- 5 los descendientes de \emptyset son $\{i, j, m, n, o, p\}$
- 6 Los vértices $\{e, k, l, f, g, h, m, n, o, p\}$ son hojas
- 7 Los vértices $\{a, b, c, d, i, j\}$ son **vértices internos**

h= 3



Matemáticas discretas II


Delgado S.

Introducción a los árboles

Recorridos en

Definición 8

Un árbol con raíz es llamado m-ario si cada vértice interno no tiene más de m hijos. Un árbol es llamado un árbol m-ario completo si cada vértice interno tiene exactamente m hijos. Un árbol m-ario con m=2 es llamado árbol binario.





Matemáticas discretas II


Delgado S.

Introducción a los árboles

Recorridos en árboles

Definición 9

Un **árbol m-ario completo** es aquel donde los vértices internos tienen <u>exac</u>tamente <u>m</u> hijos y es equilibrado.





Matemáticas discretas II

Delgado S.

Introducción a los árboles

Recorridos en árboles

Propiedades de los árboles

Un árbol con n vértices tiene n-1 aristas.

Demostración

Paso base: Con n = 1 se tiene 0 aristas.

Paso inductivo: Si se supone que para n existen n-1 aristas, ahora miramos para n+1 para conectar el nuevo vértice se necesita una nueva arista



Matemáticas discretas II

Delgado S.

Introducción a los árboles

Recorridos en árboles

$$M_{p} = 2^{2}$$
 4^{2}
 3^{2}
 3^{2}
 4^{2}
 3^{2}

Propiedades de los árboles

Un árbol m-ario completo con i vértices internos contiene n = m*i + 1 vértices.

Demostración

Puesto que el número de nodos internos es i y cada uno tiene m hijos diferentes de la raiz.x



Matemáticas discretas II

Carlos Andro Delgado S

Introducción a los árboles

Recorridos en árboles

Propiedades de los árboles

Un árbol m-ario de altura h, tiene máximo m^h hojas.

Demostración


- Paso base Con h = 1 se tiene m hijos
- Paso inductivo Tomando h cualquier se tienen m^h hijos. Para h+1 cada hijo tiene m hijos, por lo tanto, se tienen en total $m*m^h=m^{h+1}$ hijos.



Matemáticas discretas II

Carlos Andrés Delgado S.

Introducción a los árboles





Matemáticas discretas II


Delgado 5.

Introducción a los árboles

Recorridos en

Propiedades de los árboles

Un **subárbol** es un árbol que se obtiene al tomar uno de los nodos internos de un árbol como raíz.





Contenido

Matemáticas discretas II

Carlos André Delgado S.

Introducción los árboles

Recorridos en árboles

1 Introducción a los árboles



Matemáticas discretas II

Delgado S.

Recorridos en

Definición

Los árboles con raíz se utilizan frecuentemente para almacenar información. Existen algoritmos de recorrido para visitar cada uno de los vértices para acceder a los datos. Los algoritmos más conocidos de recorrido de árboles son:

- Recorrido en preorden
- Recorrido en inorden
- Recorrido en postorden



Matemáticas discretas II

Delgado S.

los árboles

Recorridos en árboles

Recorrido en preorden

Para realizar el recorrido en preorden:

- I Visite la raíz. muestre la raíz
- 2 Visite los subárboles de izquierda a derecha (repita el procedimiento hasta llegar a las hojas)




Matemáticas discretas II

Carlos André Delgado S.

Introducción a los árboles

Recorridos en árboles



El recorrido preorden es a, b, e, f, I, m, g, c, h, i, d, j, n, o, k, p, q



Matemáticas discretas II

Carlos Andr Delgado S

los árboles

Recorridos en árboles

Recorrido en inorden

Para realizar el recorrido en inorden:

- Visite el sub-arbol más izquierdo (primer hijo de izquierda a la derecha)
- 2 Visite la raíz. muestre la raíz
- 3 Visite los subárboles restantes de izquierda a derecha (repita el procedimiento hasta llegar a las hojas)




Matemáticas discretas II

Delgado S.

Introducción a los árboles

Recorridos en árboles



El recorrido en inorden es:

e, b, I, f, m, g, a, h, c, i, n, j, o, d, p, k, q



Matemáticas discretas II

Delgado S

Recorridos en

árboles

Recorrido en postorden

Para realizar el recorrido en postorden:

- Visite el sub-arbol más izquierdo (primer hijo de izquierda a la derecha)
- Visite los subárboles restantes de izquierda a derecha (repita el procedimiento hasta llegar a las hojas)
- 3 Visite la raíz. muestre la raíz




Matemáticas discretas II

Delgado S.

Introducción a los árboles

Recorridos en árboles



El recorrido en postorden es:

e, I, m, f, g, b, h, i, c, n, o, j, p, q, k, d, a



Matemáticas discretas II


Delgado S.

Introducción a los árboles

Recorridos en árboles

Expresiones aritméticas

Las expresiones matemáticas pueden ser representadas usando árboles:




- En preorden: (* (* (+ x y) (- x 5)) (/ (* x 6) 10))
- En inorden: ((x + y) * (x 5)) * ((x * 6) / 10))
- En postorden: (((x y +) (x 5 -) *) ((x 6 *) 10 /) *)



Matemáticas discretas II

Carlos Andrés Delgado S.

Introducción los árboles





Matemáticas discretas II

Delgado S.

Introducción a los árboles

Scheme
$$(*(3+2)/8)(+(-53)6))$$


 $((3+2)/8)*((5-3)+6))$
 $((3+2)/8)*((5-3)+6))$



Matemáticas discretas II

Delgado S.

Introducción los árboles






Matemáticas discretas II

Carlos Andrés Delgado S.

Introducción a los árboles






Matemáticas discretas II

Deigado 3.

Introducción a los árboles





Referencias

Matemáticas discretas II

Carlos Andrés Delgado S.

los árboles

Recorridos en árboles



🔋 Kenneth H. Rosen.

Discrete Mathematics and Its Applications.

McGraw-Hill Higher Education, 7th edition, 2011.

Chapter 11. Graphs.



Gracias

Matemáticas discretas II

Carlos Andrés Delgado S.

Introducción los árboles

Recorridos en árboles

Próximo tema: Lenguajes y gramáticas