



Primer examen parcial Matemáticas discretas II Duración 1.5 horas

Carlos Andres Delgado S, Msc *

25 de Junio de 2019

Importante: Debe explicar el procedimiento realizado en cada uno de los puntos, no se considera válido únicamente mostrar la respuesta.

particular y exprese la solución como la suma de la homogénea más la particular.

Ayudas

1. [30 puntos] Se tira una moneda al aire 20 veces y los resultados posibles son cara y sello. Indique cuantos resultados hay

- Con exactamente 3 caras
- Con al menos 4 sellos

2. [30 puntos] El examen que realice el IC-FES tiene dos partes, una general y otra por una especialidad elegida por el estudiante, el cual tiene 4 opciones: matemáticas, química, literatura y sociales. La general tiene notas entre 0 y 300, y la especialidad entre 0 y 100. ¿Cuántas personas se presentaron en el ICFES para que al menos 6 personas obtengan el mismo puntaje total y el mismo puntaje en la especialidad elegida?

3. [40 puntos] Resuelva la siguiente relación de recurrencia mediante el método de cambio de variable $T(n) = 4T(\frac{n}{3}) - 4T(\frac{n}{9}) + 2n$. Realice el cambio $n = 3^k$. Como no hay condiciones iniciales encuentre los valores de las constantes de la solución

Conceptos básicos

Ecuación cuadrática de $ax^2 + bx + c$:

$$r = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad (1)$$

Principio de Palomar

$$\left\lceil \frac{N}{k} \right\rceil$$

Tenemos N palomas para k nidos.

Combinatoria y permutación

Permutación:

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!} \quad (2)$$

Combinatoria:

$$C(n, r) = \frac{n!}{r!(n-r)!} \quad (3)$$

Permutación con objetos indistinguibles:

$$P_n^{a,b,c} = \frac{n!}{a!b!c!} \quad (4)$$

* carlos.andres.delgado@correounivalle.edu.co

Combinatoria con repetición:

$$C(n + r - 1, r) \quad (5)$$

Forma solución particular

$F(n)$	$a_n^{(p)}$
C_1	A
n	$A_1 n + A_0$
n^2	$A_2 n^2 + A_1 n + A_0$
$n^t, t \in \mathbb{Z}^+$	$A_t n^t + A_{t-1} n^{t-1} + \dots + A_1 n + A_0$
$r^n, r \in \mathbb{R}$	Ar^n
$\sin(\alpha n)$	$A \sin(\alpha n) + B \cos(\alpha n)$
$\cos(\alpha n)$	$A \sin(\alpha n) + B \cos(\alpha n)$
$n^t r^n, t \in \mathbb{Z}^+, r \in \mathbb{R}$	$r^n (A_t n^t + A_{t-1} n^{t-1} + \dots + A_1 n + A_0)$
$r^n \sin(\alpha n)$	$Ar^n \sin(\alpha n) + Br^n \cos(\alpha n)$
$r^n \cos(\alpha n)$	$Ar^n \sin(\alpha n) + Br^n \cos(\alpha n)$

Cuadro 1: Forma de la solución particular dado $f(n)$

Método del maestro

$$T(n) = aT(n/b) + cn^d$$

Siempre que $n = b^k$, donde k es un entero positivo, $a \geq 1$, b es un entero mayor que 1 y c y d son números reales tales que $c > 0$ y $d \geq 0$, Entonces,

$$T(n) \text{ es } \begin{cases} O(n^d) & \text{si } a < b^d \\ O(n^d \log n) & \text{si } a = b^d \\ O(n^{\log_b a}) & \text{si } a > b^d \end{cases}$$

¡Éxitos!