

Técnicas de conteo

Matemáticas Discretas II

Raúl E Gutiérrez de Piñerez R, Ph.D
Carlos Andres Delgado Saavedra, Msc.

Universidad del Valle
EISC

Enero 2020

- 1 Principio de palomar
- 2 Permutaciones y combinaciones
 - Permutaciones
 - Permutaciones con repetición
 - Permutaciones con objetos indistinguibles
 - Combinaciones
 - Combinaciones con repetición
- 3 Distinción de objetos y cajas
 - Objetos y cajas distinguibles
 - Objetos indistinguibles y cajas distinguibles
 - Objetos distinguibles y cajas indistinguibles
 - Objetos y cajas indistinguibles
- 4 Coeficiente binomial

1 Principio de palomar

2 Permutaciones y combinaciones

- Permutaciones
- Permutaciones con repetición
- Permutaciones con objetos indistinguibles
- Combinaciones
- Combinaciones con repetición

3 Distinción de objetos y cajas

- Objetos y cajas distinguibles
- Objetos indistinguibles y cajas distinguibles
- Objetos distinguibles y cajas indistinguibles
- Objetos y cajas indistinguibles

4 Coeficiente binomial

Principio del Palomar (P.P) (**Principio de Dirichlet**)

El principio del palomar asegura que **si hay más palomas que nidos**, debe haber algún nido con al menos dos palomas.

Teorema

*Si $k + 1$ o más objetos se colocan en k cajas, **existe al menos una caja que contiene dos o más objetos.***

Demostración Suponemos que ninguna de las cajas contiene más de un objeto. En tal caso, el número total de objetos es como máximo k , lo que contradice el hecho de que hay al menos $k + 1$ objetos.



(a)



(b)



(c)

Una segunda forma del P.P

$$\begin{array}{ccc} \rightarrow & x & \xrightarrow{f} & y \\ & \bigcirc & & \bigcirc \end{array} \quad |x| > |y|$$
$$\exists x_i \exists x_j \mid f(x_i) = f(x_j), i \neq j$$

P.P

Si f es una función de un conjunto finito X a un conjunto finito Y y $|X| > |Y|$, entonces $f(x_1) = f(x_2)$ para $x_1, x_2 \in X$ y $x_1 \neq x_2$.


X es el conjunto de palomas.

Y es el conjunto de nidos.

Entonces asignamos la paloma x_i al nido $f(x_i)$.

Formalización de la segunda forma usando la primera definición

Por el P.P al menos dos palomas $x_1, x_2 \in X$, se asignan al mismo nido, es decir, $f(x_1) = f(x_2)$ $x_1, x_2 \in X$ y $x_1 \neq x_2$.



Ejemplo

En un grupo de 367 personas debe haber al menos dos que cumplen años el mismo día, ya que hay sólo 366 posibles fechas de cumpleaños.

Ejemplo

En cualquier grupo de 27 palabras del inglés debe haber al menos dos que comiencen por la misma letra, ya que hay 26 letras del alfabeto.

Ejemplo

¿Cuántos estudiantes debe haber en la clase de matemáticas discretas para garantizar que al menos dos estudiantes reciben la misma nota?. Las notas son 0.0 y entre 1.0 y 5.0 incluidos.

Handwritten diagram illustrating the pigeonhole principle:

- A vertical arrow points down to the number 1, representing the grade 0.0.
- A bracket groups the numbers 4 and 1, representing the grades 1.0 to 5.0.
- The number 42 is circled, representing the total number of students.

Ejemplo

¿Cuántos estudiantes debe haber en la clase de matemáticas discretas para garantizar que al menos dos estudiantes reciben la misma nota?. Las notas son 0.0 y entre 1.0 y 5.0 incluidos.

Solución

Existen en total 42 notas, por lo tanto deben existir al menos 43 estudiantes para garantizar que al menos dos estudiantes reciban la misma nota.

¿Qué se puede demostrar usando el P.P. ?

$$\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$$

Ejemplo

Demuestre que si se escoge cinco números cualesquiera del 1 al 8, entonces dos de éstos sumarán 9.

Solución.

- 1 Construimos cuatro conjuntos de la siguiente manera:

$$\hookrightarrow A_1 = \{1, 8\}, A_2 = \{2, 7\}, A_3 = \{3, 6\}, A_4 = \{4, 5\}$$

- 2 Cada uno de los cinco números debe pertenecer a uno de estos conjuntos.
- 3 Como sólo hay cuatro conjuntos por P.P se dice que **dos de los números escogidos pertenecen al mismo conjunto.**
- 4 Es decir, a uno de estos cuatro conjuntos.

Generalización del Principio del Palomar

Definición

Si se colocan N objetos en k cajas, existe al menos una caja que contiene al menos $\lceil N/k \rceil$

Ejemplo

En un grupo de 100 personas siempre hay al menos $\lceil 100/12 \rceil = 9$ que nacieron en el mismo mes.

$$\left\lceil \frac{100}{12} \right\rceil = 9$$


¿Cuál es el número mínimo de estudiantes que debe haber en una clase para estar seguro de que al menos **seis** reciben la misma calificación, si las calificaciones posibles son **Suspenseo**, **Aprobado**, **Notable**, **Sobresaliente**, y **Matrícula de Honor**?

$$N = \# \text{ est}$$

$$K = \text{Notas}$$

$$K = 5$$

$$\left\lceil \frac{N}{5} \right\rceil = 6$$



$$\left\lceil \frac{N}{K} \right\rceil = 6$$

$$\left\lceil \frac{6}{5} \right\rceil = 6$$

$$N = (6 - 1) \times 5 + 1 = 26$$

$$\left\lceil \frac{N}{K} \right\rceil = C \quad \boxed{N = (C - 1) \times K + 1} \quad \underline{\text{Enteros}}$$

* Mínimo de algo

Solución.

- 1 Para asegurar que al menos **seis** estudiantes reciben la misma calificación es el menor entero N tal que $\lceil N/5 \rceil = 6$
- 2 Si $N = 25$, es posible que cada una de las cinco calificaciones sea asignada a cinco estudiantes, de forma que **NO** haya **seis** que reciban la misma.
- 3 Por tanto, $N = 26$ es el número mínimo de estudiantes para garantizar que al menos **seis** reciben la misma calificación.

Ejercicio 1

Demuestra que en un conjunto de seis clases debe haber dos que tienen lugar el mismo día, suponiendo que las clases solo se ven de lunes a viernes.

Solución

Como hay seis clases, pero solo cinco días laborales, el principio de palomar demuestra que hay que repetir al menos dos clases el mismo día.

$$\lceil \frac{6}{5} \rceil = 2$$

Principio de palomar

$$x \bmod 4 \left\{ \begin{array}{l} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{array} \right.$$

Ejercicio 2

Demuestra que en cualquier grupo de cinco enteros cualesquiera hay dos que dan el mismo resto cuando se dividen entre cuatro

Solución

Como hay cuatro posibles restos al dividir un número por cuatro, el principio de palomar asegura que para cinco números enteros cualesquiera, al menos dos dan el mismo resto cuando se dividen por cuatro.

Ejercicio 3

Cuántos enteros se deben escoger en el conjunto $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ para asegurar que al menos una pareja de ellos sume 7.

Solución

Las parejas que suman 7 son: $\{1, 6\}$, $\{2, 5\}$, $\{3, 4\}$, escogiendo 4 enteros se asegura al menos tener 2 dentro de un conjunto que suma 7.

Ejercicio 4

Demuestra que hay al menos seis personas en California (Cuya población es 34 millones) que tienen la mismas tres letras iniciales en su nombre y cumplen años el mismo día.

Solución

Hay 6432816 posibilidades para los nombres y el cumpleaños. Las posibilidades se calculan así: $26 * 26 * 26 * 366$. ¡Recuerde los años bisiestos!.

Por lo tanto, según el principio de palomar generalizado

$\lceil \frac{34000000}{6432816} \rceil = 6$ personas que tienen las mismas iniciales de nombre y fecha de cumpleaños.

Refuta cuando lo menos
 ≥ 6

¿Cuántas personas deben vivir en Tuluá para que al menos 7 personas vivan en el mismo barrio (30 barrios), tengan la misma inicial del nombre (26 letras), tenga el mismo trabajo (120 trabajos) y tengan el mismo dilecto (12 dilectos)

$$\left\lceil \frac{N}{K} \right\rceil = 7$$

$$\left\lceil \frac{N}{K} \right\rceil = c$$


$$N = (c - 1)K + 1$$

$$K = 30 \times 26 \times 120 \times 12 = 30 \times 26 \times 1440 = 43200 \times 26$$

$$K = 1123200$$

$$N = 6 \times 1123200 + 1 = 6739201$$

¿Cuántos elementos deben haber en B para que al menos 3 elementos de A tengan la misma imagen? A tiene 12 elementos.



$$\left\lceil \frac{N}{K} \right\rceil = 3$$

$$N = (3-1)K + 1$$

$$K = \left\lceil \frac{N-1}{(3-1)} \right\rceil$$

$$K = \frac{11}{2} = 5.5$$

$$\left\lceil \frac{12}{5} \right\rceil = 3$$

9. De entre un alfabeto de 26 letras. Cuántas cadenas de ocho caracteres existen

- (a) ¿Que no contengan vocales si las letras se pueden repetir?
- (b) ¿Que no contengan vocales si las letras no se pueden repetir?
- (c) ¿Que comiencen con una vocal si la letras se pueden repetir?
- (d) ¿Que comiencen con una vocal si las letras no se pueden repetir?

$$\text{Total } 26^8$$

$$a) 21^8$$

$$b) 21 \times 20 \times 19 \times 18 \times 17 \times 16 \times 15 \times 14$$

$P(21, 8)$

$$c) 5 \times 26^7$$

$$d) (5) \times 26 \times 25 \times 24 \times 23 \times 22 \times 21 \times 20$$

11. Cuántas funciones hay entre el conjunto $\{1, 2, \dots, n\}$, donde n es un entero positivo, y el conjunto $\{0, 1\}$

(a) Que sean inyectivas?


(b) Que asignen el 0 (codominio) a 1 y n (dominio)?

(c) Que asignen el 1 (codominio) a exactamente un elemento menor que n (dominio)



9) $n=1$
 $n=2$

$\begin{matrix} 2 \\ 2 \end{matrix} \} 4$





$\begin{cases} 2^{n-2} \\ 1 \end{cases}$

$n > 1$

$n=1$

c)



$2(n-1)$

15. Un palíndromo es una cadena que se lee igual de derecha a izquierda que de izquierda a derecha. Cuántas cadenas de n caracteres son palíndromos?

ama pop/op



n par

$$26^{\frac{n}{2}}$$



$$26 \times 26^{\frac{n-1}{2}}$$

n impar

$$26^{\frac{n-1}{2} + 1} = 26^{\frac{n-1}{2} + \frac{2}{2}} = 26^{\frac{n+1}{2}}$$

1 Principio de palomar

2 Permutaciones y combinaciones

- Permutaciones
- Permutaciones con repetición
- Permutaciones con objetos indistinguibles
- Combinaciones
- Combinaciones con repetición

3 Distinción de objetos y cajas

- Objetos y cajas distinguibles
- Objetos indistinguibles y cajas distinguibles
- Objetos distinguibles y cajas indistinguibles
- Objetos y cajas indistinguibles

4 Coeficiente binomial

Pensamos en una combinación descuidadamente, sin pensar en el orden de las cosas:

Observación

Mi ensalada de frutas es una combinación de manzanas, uvas y bananas: No importa el orden en qué pusimos las frutas:

- bananas, uvas y manzanas
uvas, bananas y manzanas

De todas formas es la misma ensalada.

- La combinación de una clave; por ejemplo, 472
Si importa el orden porque 724 no serviría, ni 247 tendría que ser 4-7-2

1 Principio de palomar

2 Permutaciones y combinaciones

■ Permutaciones

- Permutaciones con repetición
- Permutaciones con objetos indistinguibles
- Combinaciones
- Combinaciones con repetición


3 Distinción de objetos y cajas

- Objetos y cajas distinguibles
- Objetos indistinguibles y cajas distinguibles
- Objetos distinguibles y cajas indistinguibles
- Objetos y cajas indistinguibles

4 Coeficiente binomial

Definición


Una permutación de un conjunto de objetos distintos, es una *ORDENACION* de esos objetos. Una *lista ordenada* de r elementos de un conjunto se llama r -permutación o variación de r elementos.



Cuántas secuencias diferentes, cada una de longitud r , puede formarse utilizando los elementos n elementos del conjunto A

Si T_1 puede efectuarse de n maneras, en vista que se puede escoger cualquier elemento de A para la primera posición, sólo quedan $(n - 1)$ elementos, de manera que T_2 puede realizarse de $(n - 1)$ maneras, y así sucesivamente, hasta que finalmente T_r puede efectuarse de $(n - (r - 1))$, o $(n - r + 1)$ maneras. En consecuencia, por el principio extendido de la multiplicación, una secuencia de r **elementos distintos** tomados de A puede formarse de

$$n(n - 1)(n - 2) \cdots (n - r + 1)$$



$$\frac{n \times (n-1) \times (n-2) \times (n-3) \times (n-4) \times \dots \times (n-(r-1))}{1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times \dots \times r}$$



$$\frac{n \times (n-1) \times (n-2) \times (n-3) \times (n-4) \times \dots \times 2 \times 1}{n!}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} n \times (n-1) \times (n-2) \times (n-3) \times \dots \times (n-r+1) \\ \times (n-r-2) \times \dots \times 2 \times 1 \end{array} \right\} \times \boxed{(n-r) \times (n-r-1)} = (n-r)!$$

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

A una secuencia de r elementos distintos de A suele llamársela permutación de A tomados r a la vez.

Teorema

El número de r -permutaciones de un conjunto de n elementos distintos es:

$$P(n, r) = n(n-1)(n-2) \dots (n-r+1) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

Ejemplo

Escriba todas las permutaciones de $\{a, b, c\}$

Solución. **abc,acb,bac,bca,cab,cba**, en este caso $P(n, n) = n!$, es decir, $3!=6$.

Permutaciones de n elementos y la regla del producto

Teorema

Existen $n!$ permutaciones de n elementos.

Demostración.

- 1 Una permutación de n elementos se puede construir en n pasos.
- 2 El primer elemento puede elegirse de n formas.
- 3 Una vez elegido el 1er elemento, el segundo puede elegirse de $n - 1$ formas.
- 4 Una vez elegido el 2do elemento, el tercero puede elegirse de $n - 2$ formas.
- 5 Por la **regla del producto**, existen:

$$n(n - 1)(n - 2) \cdots 2 \cdot 1 = n!$$

Permutaciones

Ejemplo

Escriba todas las 2-permutaciones de $\{a, b, c\}$

Solución. **ab, ac, ba, bc, ca, cb** en este caso $P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}$, es decir, $3!/1!=6$.

Ejemplo

¿Cuántas formas existen de escoger el primer, segundo y tercer clasificado de un concurso si hay un total de 100 concursantes?

Solución. Es el número de listas ordenadas de tres elementos:

nCr
 nPr

$$P(100, 3) = \frac{100!}{(100-3)!} = 970,200$$

100 sh/lf $nCr\ 3 = 100P3$


Más permutaciones

¿Cuántas permutaciones de las letras **ABCDEF** contienen la subcadena DEF? Solución. Para garantizar la presencia del patrón DEF en la subcadena, estas tres letras deben estar juntas. Por teorema $4! = 24$



Más permutaciones

¿Cuántas permutaciones de las letras **ABCDEF** contienen las letras DEF juntas en cualquier orden?



La primera tarea se puede hacer en $3!=6$ y el segundo tarea puede realizarse de 24 formas. Por lo tanto, por la regla del producto tenemos $6 \cdot 24 = 144$ permutaciones.

Más permutaciones

¿De cuántas formas pueden formarse en una fila siete marcianos distintos y cinco jupiterianos distintos sin ninguna pareja de jupiterianos puede estar junta?

$$_M_1_M_2_M_3_M_4_M_5_M_6_M_7_$$

- 1 La primera tarea: Los Marcianos pueden formarse de $7!=5040$ maneras.
- 2 Segunda tarea: Como ninguna pareja de jupiterianos puede estar junta vamos a tener 8 posiciones posibles. Entonces, tenemos $P(8, 5) = \frac{8!}{(8-5)!} = 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 = 6720$ maneras
- 3 Por la regla del producto tenemos:

$$5040 \cdot 6720 = 33,868,800$$

7 marcos

8 jupitinos

$\downarrow m_1 \downarrow m_2 \downarrow m_3 \downarrow m_4 \downarrow m_5 \downarrow m_6 \downarrow m_7$

8 7 6 5 4

$7! P(8, 5)$

1 Principio de palomar

2 Permutaciones y combinaciones

- Permutaciones

- **Permutaciones con repetición**

- Permutaciones con objetos indistinguibles

- Combinaciones

- Combinaciones con repetición

3 Distinción de objetos y cajas

- Objetos y cajas distinguibles

- Objetos indistinguibles y cajas distinguibles

- Objetos distinguibles y cajas indistinguibles

- Objetos y cajas indistinguibles

4 Coeficiente binomial

Permutaciones con repetición

Definición

El número de r -permutaciones con repetición, o variaciones con repetición, de un conjunto de n elementos es n^r talque $r \leq n$.

Ejemplo. El número de 2-permutaciones con repetición de $\{a, b, c\}$ sería $3^2 = 9$

$aa, ab, ac, ba, bb, bc, ca, cb, cc$

Ejemplo. ¿Cuántas cadenas de longitud n se pueden formar con las 26 letras del alfabeto inglés? Rta: 26^n

Permutaciones con repetición

¿Cuántos billetes de la lotería del Valle se ponen en juego cada miércoles en el sorteo, si juega con cuatro cifras y dos números para la serie?

Aquí **si importa el orden** de colocación de las cifras y existen repeticiones, es decir, El número de r -permutaciones es n^r , donde $n = 10$, y $r = 4$

$$\boxed{10} \quad \boxed{10} \quad \boxed{10} \quad \boxed{10} = 10.000$$

$$\boxed{10} \quad \boxed{10} = 100$$

El total de billetes se puede calcular con la regla del producto
 $(10^4)(10^2) = 1.000.000$

1 Principio de palomar

2 Permutaciones y combinaciones

- Permutaciones
- Permutaciones con repetición
- Permutaciones con objetos indistinguibles
- Combinaciones
- Combinaciones con repetición

3 Distinción de objetos y cajas

- Objetos y cajas distinguibles
- Objetos indistinguibles y cajas distinguibles
- Objetos distinguibles y cajas indistinguibles
- Objetos y cajas indistinguibles

4 Coeficiente binomial

Permutaciones con objetos INDISTINGUIBLES

Definición

Llamamos a las permutaciones con repetición de n elementos tomados de a en a , b en b , de c en c , etc, en los n elementos repetidos (un elemento aparece a veces, otro b veces, otro c veces, etc) verificándose que $a + b + c + \dots = n$ donde los objetos del mismo tipo son **INDISTINGUIBLES** entonces el número de permutaciones con repetición es:

$$P_n^{a,b,c} = \frac{n!}{a!b!c!}$$

99

Ejemplo. ¿Cuántas permutaciones se pueden obtener con a, b de forma que la a y la b se repitan dos veces?

$$P_4^{a,b} = \frac{4!}{2!2!} = 6$$

$a+b$ veces=4, **aabb, abab, abba, baab, baba, bbaa**

Permutaciones con objetos INDISTINGUIBLES

¿Cuánto es el número de disposiciones de cuatro letras de la palabra *BALL*?

A B L L

A L B L

A L L B

B A L L

B L A L

B L L A

L A B L

L A L B

L B A L

L B L A

L L A B

L L B A

Es **INDISTINGUIBLE**

¿Cuántas cadenas distintas se pueden formar reordenando las letras de la palabra *PAPAYA*?

$$P_{A \text{ PA YA}} \begin{cases} P=2 \\ A=3 \end{cases}$$

$$\frac{6!}{2!3!} = \frac{6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{1 \times 2 \times 3 \times 2 \times 1} = 60$$

GLÉCC IÒNES

$$\begin{aligned} \bar{C} &= 3 \\ C &= 2 \end{aligned}$$

$$\frac{10!}{3!2!} = 302400$$

PROJECTO

$$0=2$$

$\left. \begin{matrix} p \\ k \\ v \\ e \\ f \end{matrix} \right\}^6$

$$8) \frac{8!}{2!}$$

$$7) \quad 10) \quad 7!$$

$$P) \quad \frac{7!}{2!}$$

$$1) \quad \frac{7!}{2!}$$

$$4) \quad \frac{7!}{2!}$$

$$6) \quad \frac{7!}{2!}$$

$$5) \quad \frac{7!}{2!}$$

$$7) \quad \frac{7!}{2!}$$

$$6)$$

$$2) \quad 00$$

$$6!$$

$$1) \quad 0,$$

$$6 \times 6!$$

$$3)$$

?

1 Principio de palomar

2 Permutaciones y combinaciones

- Permutaciones
- Permutaciones con repetición
- Permutaciones con objetos indistinguibles
- **Combinaciones**
- Combinaciones con repetición

3 Distinción de objetos y cajas

- Objetos y cajas distinguibles
- Objetos indistinguibles y cajas distinguibles
- Objetos distinguibles y cajas indistinguibles
- Objetos y cajas indistinguibles

4 Coeficiente binomial

Combinaciones mediante el uso de permutaciones

Podemos construir las r -permutaciones de un conjunto X con n elementos en dos pasos:

- 1 Primero se elige una r -combinación de X (un subconjunto no ordenado de r elementos)
- 2 Luego se ordena


o i d e n



$$P(n, r) = C(n, r)r!, \text{ Entonces,}$$
$$C(n, r) = \frac{P(n, r)}{r!}, \therefore C(n, r) = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

Combinaciones

2-permutaciones de $\{a,b,c,d\}$



Combinaciones por regla del producto

Combinatorio desde una permutación

Las permutaciones r del conjunto se obtienen formando primero las $C(n, r)$ combinaciones r del conjunto y arreglando (**ordenando**) después los elementos en cada combinación r , lo cual puede efectuarse en $P(r, r)$ maneras. De tal modo que

$$\begin{aligned} P(n, r) &= C(n, r) \cdot \cancel{P(r, r)} \\ C(n, r) &= \frac{P(n, r)}{P(r, r)} = \frac{n!/(n-r)!}{r!/(r-r)!} \\ &= \frac{n!}{r!(n-r)!} \end{aligned}$$

Caso particular: $C(n, n) = 1$

Definición

El número de r -combinaciones de un conjunto de n elementos, donde n es un entero no negativo y r un entero talque $0 \leq r \leq n$, es:

$$C(n, r) = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$


Ejemplo

¿Cuánto es el número de 2-combinaciones sin repetición de a, b, c ?

$$C(3, 2) = \frac{3!}{2!(3-2)!} = 3$$


Combinaciones

Si importa el orden



ab, ac, ba, bc, ca, cb

No importa el orden



ab, ac, bc


Ejemplos de Combinaciones

r -combinaciones

¿Cuáles son las 2-combinaciones de $\{a, b, c, d\}$?

$$C(4, 2) = \frac{4!}{2!(4-2)!} = 6$$

Son los seis subconjuntos $\{a, b\}$, $\{a, c\}$, $\{a, d\}$, $\{b, c\}$, $\{b, d\}$, $\{c, d\}$



Ejemplo

Un estudiante que realiza un examen de Historia recibe la instrucción de responder siete de 10 preguntas.

Aquí **No importa el orden**, como el estudiante puede responder:

$$C(10, 7) = \frac{10!}{7!3!} = 120 \text{ formas}$$

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Ejemplo

- 1 Si un estudiante debe responder tres preguntas de las primeras cinco y cuatro preguntas de las últimas cinco.

- Puede elegir tres preguntas de las primeras cinco.

$$C(5, 3) = \frac{5!}{3!2!} = 10 \text{ formas}$$

- Puede elegir cuatro preguntas de las últimas cinco:

$$C(5, 4) = \frac{5!}{4!1!} = 5 \text{ formas}$$

- Por regla del producto el estudiante puede realizar el examen de 50 formas.

$$C(45, 6) = \frac{45!}{6! 39!} \quad 45C6$$

BALOTO

Obtenga el número de combinaciones para ganarse el BALOTO al sacar 6 números diferentes en cualquier orden de 45 balotas posibles.

$$C(45, 6) = \frac{45!}{6! 39!} = 8,145,060$$

Ejemplo

¿Cuántas manos de póquer de cinco cartas (no ordenadas), pueden elegirse de una baraja de 52 cartas?

$$C(52, 5) = \frac{52!}{5!47!} = 2,598,960$$

Ejemplo

¿Cuántas manos de póquer tiene todas las cartas del mismo palo? Hay 4 palos de 13 cartas: tréboles, diamantes, corazones y espadas. El primer paso puede realizarse de 4 formas, y el segundo paso de $C(13, 5)$ por lo tanto, tenemos $4 \cdot C(13, 5) = 5148$.

1 Principio de palomar

2 Permutaciones y combinaciones

- Permutaciones
- Permutaciones con repetición
- Permutaciones con objetos indistinguibles
- Combinaciones
- **Combinaciones con repetición**

3 Distinción de objetos y cajas

- Objetos y cajas distinguibles
- Objetos indistinguibles y cajas distinguibles
- Objetos distinguibles y cajas indistinguibles
- Objetos y cajas indistinguibles

4 Coeficiente binomial

Combinaciones con repeticiones

Se obtiene el combinatorio como se viene haciendo

En un conjunto de n elementos hay $C(n + r - 1, r)$ r -combinaciones con repetición.

Ejemplo

El número de 2-combinaciones con repetición de los elementos a y b se obtienen así: ($n = 2$ y $r = 2$)

$$C(2 + 2 - 1, 2) = C(3, 2) = \frac{3!}{2!1!} = 3$$

Las combinaciones son $\underline{aa, ab, bb}$

Más sobre combinaciones

$$r = 4$$
$$n = 3$$

$C(n + r - 1, r)$ combinaciones

¿De cuántas formas se pueden seleccionar cuatro piezas de fruta de una cesta que contiene manzanas, naranjas y peras, si el orden no interesa y hay al menos cuatro piezas de cada tipo en la cesta?

Hay 4-combinaciones con repetición de un conjunto de tres elementos $\{manzana, naranja, pera\}$.

$$C(3 + 4 - 1, 4) = C(6, 4) = \frac{6!}{4!2!} = 15$$

4 manzanas

3 manzanas, 1 naranja

3 naranjas, 1 pera

2 manzanas, 2 naranjas

2 manzanas, 1 naranja, 1 pera

4 naranjas

3 manzanas, 1 pera

3 peras, 1 manzana

2 manzanas, 2 peras

2 naranjas, 1 manzana, 1 pera

4 peras

3 naranjas, 1 manzana

3 peras, 1 naranja

2 naranjas, 2 peras

2 peras, 1 manzana, 1 naranja

¿Cuántas soluciones enteras no negativas tiene la ecuación?

$$\begin{array}{ccc} \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ x_1 + x_2 + x_3 = 15 \end{array}$$

que satisfagan las siguientes restricciones: $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0$

Cada solución de la ecuación es equivalente a elegir 15 elementos, x_i de tipo i , $i = 1, 2, 3$. Por lo tanto, el número de soluciones es igual al número de 15-combinaciones con repetición de un conjunto de 3 elementos.

$$C(3 + 15 - 1, 15) = C(17, 15) = \frac{17!}{15!2!} = \frac{17 \cdot 16}{2} = 136$$

¿Cuántas soluciones enteras no negativas que satisfagan $x_1 \geq 0, x_2 > 0, x_3 = 1$ tiene la ecuación

$$x_1 + x_2 + x_3 = 15$$

Aplicando el valor de $x_3 = 1$ se obtiene:

$$x_1 + x_2 = 14$$

Y tomamos $x_2 > 0$, es decir $x_2 \geq 1$ entonces:

$$x_1 + x_2 = 13$$

$x_2 > 0$
 $x_1 + x_2 + 1 = 14$

Por lo tanto, tenemos 13-combinaciones de 2 elementos

$$C(2 + 13 - 1, 13) = C(14, 13) = \frac{14!}{13!1!} = 14$$

Combinaciones en solución de ecuaciones

¿Cuántas soluciones enteras no negativas tiene la ecuación?

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 29$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$

Cada solución de la ecuación es equivalente a elegir 29 elementos, x_i de tipo i , $i = 1, 2, 3, 4$, por tanto el número de selecciones es:

$$C(4 + 29 - 1, 29) = C(32, 29) = \frac{32!}{29!3!} = 4960$$

$$x_1 + 1 + x_2 + 2 + x_3 + 3 + x_4 = 29$$

Combinaciones en solución de ecuaciones

¿Cuántas soluciones enteras que satisfagan
 $x_1 > 0, x_2 > 1, x_3 > 2, x_4 \geq 0$ tiene la ecuación

$$x_1 > 1 \quad x_2 > 2 \quad x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 29$$

Una solución de esta ecuación: $x_1 > 0 = 1, x_2 > 1 = 2, x_3 > 2 = 3$
Por lo tanto se eligen 23 elementos.

$$C(4 + 23 - 1, 23) = C(26, 23) = 2600$$

$$X_1 + X_2 + X_3 + X_4 = 50$$

$$X_i \geq 0$$

$$X_1 \geq 2, X_2 \geq 0, X_3 \geq 3, X_4 \geq 5$$

$$X_1 + 3 + X_2 + X_3 + 4 + X_4 + 5 = 50$$

$$X_1 + X_2 + X_3 + X_4 = 38$$

$$C(4+38-1, 38) = C(41, 38) \checkmark$$

$$X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5 + X_6 + X_7 = 100$$

$$X_1, X_3, X_4, X_6 \geq 0$$

$$X_2 \geq 9$$

$$X_5 \geq 7$$

$$X_7 \geq 0$$

$$X_1 + X_2 + 9 + X_3 + X_4 + X_5 + 8 + X_6 + X_7 + 1 = 100$$

$$X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5 + X_6 + X_7 = 82$$

$$C(7 + 82 - 1, 82) = C(88, 82)$$

Otra forma de solucionar las cadenas de reordenar las letras de *PAPAYA*

¿Cuántas cadenas distintas se pueden formar reordenando las letras de la palabra *PAPAYA*?

- Las tres letras *A* se pueden colocar en las seis posiciones de $C(6, 3)$ formas distintas, dejando tres posiciones libres.
- Luego las dos letras *P* se pueden colocar en estos tres lugares de $C(3, 2)$ formas.
- Queda un sólo lugar para la letra *Y*, es decir $C(1, 1)$ formas.
- Según la regla del producto, el número de cadenas distintas es:

$$C(6, 3)C(3, 2)C(1, 1) = \frac{6!}{3!3!} \cdot \frac{3!}{2!1!} \cdot \frac{1!}{1!0!} = 60 \quad \text{similar a:}$$

$$P_6^{A,P,Y} = \frac{6!}{3!2!1!} = 60$$

MALTA

A=2

S)

$$P_r = \frac{5!}{2!} = 60$$

APr

ncr

sc2r

$$C_r = C(5, 2) C(3, 1) C(2, 1) C(1, 1) = 60$$

A M L T

$$C_r = C(5, 1) C(4, 2) C(2, 1) C(1, 1) = 60$$

Con bolas de colores

Supongamos que existen pilas de pelotas rojas, azules y verdes, y que cada pila contiene al menos ocho pelotas.

- 1 ¿De cuántas formas podemos elegir ocho pelotas?

$C(24, 8) = 735471$. En este caso se suponen que existen 3 pilas con 8 pelotas cada una, para un total de 24 elementos.

- 2 ¿De cuántas formas podemos elegir ocho pelotas si debemos tener al menos una pelota de cada color?

$C(3 + 8 - 1, 8) = C(10, 8) = \frac{10!}{2!8!} = 45$, n son los elementos (rojas, azules y verdes), r es el número de elementos que vamos a tomar con repetición, osea 8.

Ejercicio 1

Determina el número de 5-permutaciones de un conjunto de nueve elementos

Solución

$$\frac{9!}{(9-5)!} = 15120$$

.

Ejercicios

Ejemplo

¿Cuántos subconjuntos de tamaño 2 o mas tiene un conjunto de 100 elementos?

Si recuerdan es el conjunto potencia, que tiene una cardinalidad de 2^{100}

Solución

- El número de conjuntos de un elemento es $\frac{100!}{1!(100-1)!} = 100$ $C(100, 1)$
- Debido a que el orden no es importante el número de conjuntos de dos elementos es $\frac{100!}{2!(100-2)!} = \frac{100*99}{2} = 4950$ $C(100, 2)$
- Nos falta considerar el conjunto vacío.

Por lo tanto la respuesta para el ejercicio es:

$$2^{100} - 100 - 4950 - 1 = 2^{100} - 5051$$

P' L A T A N O

$$7) \frac{7!}{2!} +$$

$$6) \quad A) + 6! \\ + C(5, 1) \frac{6!}{2!}$$

$$5) \quad A A) \quad 5! + \\ A \{ + C(5, 1) 5!$$

$$C(5, 2) \frac{5!}{2!}$$

CONTROESPERANZA

$$G=3$$

$$A=2$$

$$R=2$$

$$N=2$$

C, T, S, P, O, Z

$$15) \frac{15!}{2!2!2!3!}$$

$$E) \frac{14!}{2!2!2!2!}$$

$$14) \begin{matrix} A \\ R \\ N \end{matrix} C(3,1) \frac{14!}{2!2!3!}$$

$$otru) C(6,1) \frac{14!}{2!2!2!3!}$$

$$13) EE) \frac{13!}{2!2!2!}$$

$$E \begin{matrix} A \\ R \\ N \end{matrix} C(3,1) \frac{13!}{2!2!2!}$$

$$\begin{matrix} A \\ R \\ N \end{matrix} \} 3 \times \frac{13!}{3!2!2!}$$

$$\left. \begin{array}{l} AR \\ AN \\ RN \end{array} \right\} 3 \times \frac{13!}{3!2!}$$

$$C(3,1) C(6,1) \frac{13!}{3!2!2!}$$

$$E \left\{ \begin{array}{c} \circ \\ + \\ \circ \end{array} \right\} C(6,1) \frac{13!}{2!2!2!2!}$$

$$C(6,2) \frac{13!}{3!2!2!2!}$$

REGISTRADURIA

$$R=3 \quad A=2 \quad I=2$$

$$E, G, T, D, U, S$$

$$13) \quad \frac{13!}{3!2!2!}$$

$$12) \left\{ \begin{array}{l} 1R \quad \frac{12!}{2!2!2!} \\ A \quad 2 \times \frac{12!}{3!2!} \\ I \quad C(6,1) \frac{12!}{3!2!2!} \end{array} \right.$$

11)

$$RR \quad \frac{11!}{2!2!}$$

$$AT \quad \frac{11!}{3!}$$

$$AA \quad 2 \times \frac{11!}{3!2!}$$

$$A \quad \frac{11!}{3!2!} \quad C(2,1)C(6,1) \times \frac{11!}{3!2!}$$

$$RI \quad 2 \times \frac{11!}{2!2!}$$

$$R \left\{ \begin{array}{l} 0 \\ 1 \\ 2 \end{array} \right. \quad C(6,1) \frac{11!}{2!2!2!}$$

$$2 \text{ adiac } C(6,2) \frac{11!}{3!2!2!}$$

1 Principio de palomar

2 Permutaciones y combinaciones

- Permutaciones
- Permutaciones con repetición
- Permutaciones con objetos indistinguibles
- Combinaciones
- Combinaciones con repetición

3 Distinción de objetos y cajas

- Objetos y cajas distinguibles
- Objetos indistinguibles y cajas distinguibles
- Objetos distinguibles y cajas indistinguibles
- Objetos y cajas indistinguibles

4 Coeficiente binomial

1 Principio de palomar

2 Permutaciones y combinaciones

- Permutaciones
- Permutaciones con repetición
- Permutaciones con objetos indistinguibles
- Combinaciones
- Combinaciones con repetición

3 Distinción de objetos y cajas

- Objetos y cajas distinguibles
- Objetos indistinguibles y cajas distinguibles
- Objetos distinguibles y cajas indistinguibles
- Objetos y cajas indistinguibles

4 Coeficiente binomial

Introducción

Este aplica cuando tenemos objetos y cajas que son distinguibles entre sí. Un buen ejemplo es:

¿De cuántas formas se pueden distribuir 5 cartas a cada uno de 6 jugadores en un juego estándar de 52 cartas de póker?

Observación: Las cartas son diferentes entre sí y los jugadores son diferentes entre sí, es decir se pueden distinguir.

Ejemplo

¿De cuántas formas se pueden distribuir 5 cartas a cada uno de 6 jugadores en un juego estándar de 52 cartas de póquer?

La estrategia es empezar a distribuir las cartas a cada uno de los jugadores, dado que no nos interesa el orden en que les damos a cada jugador aplicamos combinación y regla de la multiplicación, dado que para completar la tarea debemos dar las cartas a todos los jugadores, tenemos:

$$C(52, 5)C(47, 5)C(42, 5)C(37, 5)C(32, 5)$$



1 Principio de palomar

2 Permutaciones y combinaciones

- Permutaciones
- Permutaciones con repetición
- Permutaciones con objetos indistinguibles
- Combinaciones
- Combinaciones con repetición

3 Distinción de objetos y cajas

- Objetos y cajas distinguibles
- **Objetos indistinguibles y cajas distinguibles**
- Objetos distinguibles y cajas indistinguibles
- Objetos y cajas indistinguibles

4 Coeficiente binomial

Objetos indistinguibles y cajas distinguibles

Introducción

Este caso aplica cuando tenemos problemas de colocar n objetos que son indistinguibles entre sí en k cajas que son distinguibles.

- Los objetos no los podemos distinguir entre sí, por lo que aplica combinación
- La repetición de elementos es permitida, ya que no podemos distinguir los objetos entre sí
- Existe una correspondencia de uno a uno entre objetos y caja (función inyectiva)
- Aplicamos combinación con repetición $C(n + r - 1, r)$

Objetos indistinguibles y cajas distinguibles



Ejemplo

¿De cuantas formas podemos colocar 10 bolas indistinguibles en 8 papeleras distinguibles?

$$C(\overset{N}{\underbrace{8}_{\text{cajas}}} + \overset{r}{\underbrace{10}_{\text{bolas}}} - 1, 10) = C(17, 10)$$

En total tenemos $n = 8$ cajas distinguibles y $r = 10$ elementos con repetición.

Como podemos repartir 8 peras, 10 manzanas y 15 mangos entre 6 niños de tal manera cada niño reciba 2 mangos.

T1: Reparto los mangos, me quedan 3 mangos

T2: Repartir peras 8 peras, 6 niños
 $C(6+8-1,8) = C(13,8)$

T3: Repartir 10 manzanas a 6 niños
 $C(6+10-1,10) = C(15,10)$

T4: Repartir 3 mangos a 6 niños
 $C(6+3-1,3) = C(8,3) = 56$

$$C(13,8) \times C(15,10) \times C(8,3)$$

1 Principio de palomar

2 Permutaciones y combinaciones

- Permutaciones
- Permutaciones con repetición
- Permutaciones con objetos indistinguibles
- Combinaciones
- Combinaciones con repetición

3 Distinción de objetos y cajas

- Objetos y cajas distinguibles
- Objetos indistinguibles y cajas distinguibles
- **Objetos distinguibles y cajas indistinguibles**
- Objetos y cajas indistinguibles

4 Coeficiente binomial

Objetos distinguibles y cajas indistinguibles

Introducción

Este es uno de los casos de conteo más complicados, ya que requiere analizar cómo se distribuyen los objetos en las cajas. No existe una fórmula cerrada que permita contar cómo se distribuyen objetos distinguibles en cajas indistinguibles.

Objetos distinguibles y cajas indistinguibles

Ejemplo

¿De cuantas formas podemos asignar tres oficinas a cuatro empleados diferentes A,B,C y D?

Para tratar este caso, debemos enumerar las posibilidades
 $\{\{A, B, C, D\}, \{\}, \{\}\}, \{\{A, B, C\}, \{D\}, \{\}\}, \dots, \{\{\}, \{\}, \{A, B, C, D\}\}$
en total tenemos 14 formas de asignar.

Objetos distinguibles y cajas indistinguibles

Solución

Una forma de resolver el problema es usar la forma de los números de Strling de primera clase, la cual permite realizar el conteo de n objetos distinguibles en k cajas indistinguibles.

$$\sum_{j=1}^k S(n, j)$$

Para cada caja, la formula es:

$$S(n, j) = \frac{1}{j!} \sum_{i=0}^{j-1} (-1)^i C(j, i) (j - i)^n$$

Objetos distinguibles y cajas indistinguibles

Ejemplo

¿De cuantas formas podemos asignar tres oficinas a cuatro empleados diferentes A,B,C y D?

$$S(4, 1) = \frac{1}{1!} ((-1)^0 C(1, 0)(1 - 0)^4) = 1$$

$$S(4, 2) = \frac{1}{2!} ((-1)^0 C(2, 0)(2 - 0)^4 + (-1)^1 C(2, 1)(2 - 1)^4) = \frac{1}{2!} * 14 = 7$$

$$S(4, 3) = \frac{1}{3!} ((-1)^0 C(3, 0)(3 - 0)^4 + (-1)^1 C(3, 1)(3 - 1)^4 + (-1)^2 C(3, 2)(3 - 2)^4) = \frac{1}{3!} * 36 = 6$$

En total tenemos $S(4, 1) + S(4, 2) + S(4, 3) = 1 + 7 + 6 = 14$

1 Principio de palomar

2 Permutaciones y combinaciones

- Permutaciones
- Permutaciones con repetición
- Permutaciones con objetos indistinguibles
- Combinaciones
- Combinaciones con repetición

3 Distinción de objetos y cajas

- Objetos y cajas distinguibles
- Objetos indistinguibles y cajas distinguibles
- Objetos distinguibles y cajas indistinguibles
- Objetos y cajas indistinguibles

4 Coeficiente binomial

Objetos y cajas indistinguibles

Introducción

En este tipo de problemas, necesariamente se debe realizar un conteo de las diferentes formas de colocar n objetos indistinguibles en k cajas indistinguibles.

Ejemplo

¿De cuantas formas se pueden colocar seis copias del mismo libro dentro de cuatro cajas idénticas?

Para resolver el problema ¡Debemos evaluar todas las posibilidades!

Objetos y cajas indistinguibles

¿De cuantas formas se pueden colocar seis copias del mismo libro dentro de cuatro cajas idénticas?

6

5, 1

4, 2

4, 1, 1

3, 3

3, 2, 1

3, 1, 1, 1

2, 2, 2

2, 2, 1, 1

En total tenemos 9 formas. Este problema es conocido como el problema de la **partición**. Este será tratado en el curso de complejidad y optimización :')

1 Principio de palomar

2 Permutaciones y combinaciones

- Permutaciones
- Permutaciones con repetición
- Permutaciones con objetos indistinguibles
- Combinaciones
- Combinaciones con repetición

3 Distinción de objetos y cajas

- Objetos y cajas distinguibles
- Objetos indistinguibles y cajas distinguibles
- Objetos distinguibles y cajas indistinguibles
- Objetos y cajas indistinguibles

4 Coeficiente binomial

Definición

Estos ofrecen el desarrollo de potencias de expresiones binomiales. Una expresión binomial es la suma de dos términos por ejemplo $(x + y)^2$.

Teorema del binomio

Sean x e y variables y n un entero no negativo. Se cumple que:

$$(x + y)^n = \sum_{j=0}^n C(n, j) x^{n-j} y^j$$

$$= C(n, 0)x^n + C(n, 1)x^{n-1}y + C(n, 2)x^{n-2}y^2 + \dots + C(n, n-1)xy^{n-1} + C(n, n)y^n$$

Coeficiente binomial

Ejemplo

Cual es el desarrollo de $(x + y)^4$

Solución

Según el teorema del binomio:

$$(x + y)^4 = C(4, 0)x^4 + C(4, 1)x^3y + C(4, 2)x^2y^2 + C(4, 3)xy^3 + C(4, 4)y^4$$

$$(x + y)^4 = \frac{4!}{0!4!}x^4 + \frac{4!}{1!3!}x^3y + \frac{4!}{2!2!}x^2y^2 + \frac{4!}{3!1!}xy^3 + \frac{4!}{4!0!}y^4$$

$$(x + y)^4 = 4x^4 + 6x^3y + 6x^2y^2 + 4xy^3 + y^4$$

$$\begin{aligned}(x+y)^8 = & C(8,0)x^8 + C(8,1)x^7y + C(8,2)x^6y^2 \\ & + C(8,3)x^5y^3 + C(8,4)x^4y^4 + C(8,5)x^3y^5 \\ & + C(8,6)x^2y^6 + C(8,7)xy^7 + C(8,8)y^8\end{aligned}$$

Coeficiente binomial

Ejercicio 1

Cual es el coeficiente $x^{12}y^{13}$ de $(x + y)^{25}$ $C(25, 13)$

Ejercicio 2

Cual es el coeficiente $x^{12}y^{13}$ de $(2x - 3y)^{25}$

$$C(25, 13) (2)^{12} (-3)^{13}$$

Solución ejercicio 1

Según el teorema del binomio:

$$C(25,13) * x^{12}y^{13} = 5200300 * x^{12}y^{13}$$

Solución ejercicio 2

Reemplazando en la expresión del binomio:

$$(2x - 3y)^n = \sum_{j=0}^n C(n, j)(2x)^{n-j}(-3y)^j$$

El coeficiente de $x^{12}y^{13}$ se obtiene cuando $j = 13$ debido a que $n - j = 25 - 13 = 12$ es decir:

$$C(25, 13)(2x)^{25-13}(-3y)^{13} = \frac{25!}{13!12!}(-3)^{13}2^{12}x^{12}y^{13}$$

Identidad de pascal

Sean n y k positivos tales que $n \geq k$ entonces:

$$C(n, k) = C(n - 1, k - 1) + C(n - 1, k) \quad (1)$$

Con $C(n, 0) = 1$ y $C(n, n) = 1$.

Coeficiente binomial

Identidad de pascal

	k=0	k=1	k=2	k=3	k=4	k=5	k=6	k=7	k=8	k=9
n=0	1									
n=1	1	1								
n=2	1	2	1							
n=3	1	3	3	1						
n=4	1	4	6	4	1					
n=5	1	5	10	10	5	1				
n=6	1	6	15	20	15	6	1			
n=7	1	7	21	35	35	21	7	1		
n=8	1	8	28	56	70	56	28	8	1	
n=9	1	9	36	84	126	126	84	36	9	1

$$C(5, 2) = C(4, 1) + C(4, 2) \quad C(3, 1) = C(2, 0) + C(2, 1)$$

Coeficiente binomial

Ejercicio 3

Escribe el desarrollo de $(x + y)^6$

Ejercicio 4

Cual es el coeficiente de $x^{101}y^{99}$ en el desarrollo de $(2x - 3y)^{200}$

✓
$$C(200, 99)(2)^{101}(-3)^{99}$$

Coeficiente binomial

Solución ejercicio 3

$$x^6 + 6x^5y + 15x^4y^2 + 20x^3y^3 + 15x^2y^4 + 6xy^5 + y^6$$

Solución ejercicio 4

$$C(200, 99) * (2)^{101} (-3)^{99}$$



Kenneth H. Rosen.

Discrete Mathematics and Its Applications.

McGraw-Hill Higher Education, 7th edition, 2011.

Chapter 6.

.

.

¿Cuántas personas tienen que vivir en Tuluá para que al menos 3 personas tengan la misma letra de nombre (inicial) y estudien en el mismo colegio (50 colegios)? Supongo alfabeto inglés en minúsculas.

$$\left\lceil \frac{N}{K} \right\rceil = 3 \quad N = 26 \times 50 \times 26 + 1 = 2601$$

¿De cuántas formas puedo distribuir 10 libros del señor de los anillos, 4 libros de crepusculo, 20 libros de Harry Potter en 3 estantes distintos?

$$C(12, 10) C(6, 4) C(22, 20) = \frac{C(n+r-1, r)}{3!} = \frac{C(31, 2)}{3!}$$

Gracias

Próximo tema:
Recurrencias.