GUIA PRÁTICO REBANHO

Os 4 capins mais usados no Brasil

Braquiária, Panicum, Tifton e Capim-elefante: como escolher, plantar e manejar cada um, com os números de manejo da Embrapa.



APRESENTAÇÃO

Capim certo no lugar certo

No Brasil, a produção de carne e de leite é baseada no pasto. É a comida que o gado colhe sozinho, todos os dias, e a forma mais barata de alimentar o rebanho. Escolher e manejar bem o capim pesa direto no resultado da fazenda.

Existem dezenas de capins no mercado, mas quatro grupos formam a base das pastagens brasileiras. Este guia explica cada um: de onde vem, como cresce, onde rende mais, como plantar e, principalmente, como manejar.

1. **Braquiária**
   Rústica e versátil. É a mais plantada do país.



2. **Panicum**
   Alta produção com solo fértil, adubação e pastejo rotacionado.



3. **Tifton**
   Folha fina e de alto valor nutritivo. Referência em feno.



4. **Capim-elefante**
   Grande volume de forragem para o cocho e o silo.



1984
Ano de lançamento do Marandu, hoje a gramínea mais cultivada do país.

85 cm
Altura de entrada do Mombaça no pastejo rotacionado.

28–35 dias
Intervalo de corte do Tifton para feno, nas águas.

50 t/ha
Matéria seca por ano da BRS Capiaçu, em média.

Nenhum capim é o melhor em tudo. O certo é o que combina com o seu solo, o seu clima e o seu objetivo, e é isso que as próximas páginas ajudam a decidir.

Como ler este guia

Você sabia?
Contexto, história e curiosidades.

Atenção
Riscos e erros mais comuns.

Dica de campo
O que fazer na prática, no dia a dia.

Na régua
Alturas e números de manejo.

Os números de manejo são referências de pesquisa, principalmente da Embrapa. Solo, clima e adubação mudam o resultado: use como ponto de partida e ajuste com o seu técnico.

SUMÁRIO

O que tem neste guia



1 **Braquiária** p. 7

Rústica, versátil e a mais plantada do país



2 **Panicum** p. 10

Alta produção para quem aduba e faz rodízio



3 **Tifton** p. 13

Folha fina e nutritiva, referência em feno



4 **Capim-elefante** p. 16

Volume de forragem para o cocho e o silo

Fundamentos do capim 4

A régua do pasto 19

Comparativo dos 4 capins 20

Qual capim escolher 21

Formação do pasto 22

Calendário do pasto 23

Erros comuns e boas práticas 24

Diagnóstico do seu pasto 25

Glossário 26

Resumo e fontes 27

Por que esses quatro?

As braquiárias e os panicuns estão na maior parte dos pastos plantados do Brasil, e o capim Marandu é a gramínea mais cultivada do país. O Tifton e o capim-elefante são os mais procurados quando o capim vai virar feno, ir para o cocho ou para o silo.

DICA DE CAMPO Está escolhendo capim para uma área nova? Comece pela página 21: em quatro perguntas, o guia indica o grupo mais adequado.

Capim é planta de sol, e veio da África

Antes de conhecer cada capim, vale entender o que todos eles têm em comum.

Uma família só


Todos os capins deste guia são gramíneas, a mesma família do milho, da cana e do arroz. Folhas compridas, caule com nós e raízes em cabeleira.

Origem africana

A maior parte dos capins dos nossos pastos é de origem africana. Eles chegaram ao Brasil em épocas diferentes e se adaptaram tão bem ao clima tropical que viraram a base da pecuária.

Feitos para o calor

São plantas do tipo C4. Com calor, sol forte e água, transformam luz em folha mais depressa do que as plantas de clima frio. Por isso o pasto dispara nas águas e quase para no inverno seco, quando faltam chuva, calor e horas de sol.



As partes de um capim (desenho esquemático, fora de escala).

Folha

Mais proteína
Mais fácil de digerir
É a parte que o gado escolhe

VERSUS

Colmo (talo)

Mais fibra
Digere devagar
Costuma sobrar no pasto

O pasto funciona em ciclo

1

Pastejo

O gado come as folhas de cima. A folha que sobra é o "painel solar" da planta.

2

Rebrota

Essa folha faz fotossíntese e as reservas da base ajudam a soltar folhas novas.

3


Ponto certo

O capim volta à altura de entrada e fica pronto para um novo pastejo.

DICA DE CAMPO Repare no que sobra depois do pastejo. Muito talo e pouca folha é sinal de que o capim passou do ponto antes de o gado entrar.


Cada capim ocupa o terreno de um jeito

A forma de crescer muda a altura de pastejo, o jeito de plantar e até a proteção do solo.




Touceira

Cresce em moitas, para cima. **Ex.:** Panicum, capim-elefante e Marandu.



Decumbente

Os colmos deitam, encostam no chão e soltam raízes nos nós. **Ex.:** braquiária decumbens.



Rasteiro

Espalha por estolões, sobre o chão, e rizomas, debaixo da terra, até formar um tapete. **Ex.:** Tifton e humidícola.

Por que isso importa

- Capim de touceira precisa sair do pastejo mais alto. Rapado, a moita enfraquece e o chão fica descoberto entre uma touceira e outra.
- Capim rasteiro aguenta pastejo mais baixo e cobre melhor o solo, o que ajuda contra erosão e plantas daninhas.
- Touceira se planta por semente ou por colmo. O tapete de Tifton se planta por mudas.

Perfilho: a renovação do pasto

Perfilho é cada brotação nova que nasce na base da planta. Pasto bom tem muitos perfilhos: quando um envelhece ou é comido, outro ocupa o lugar.

Pastejar na altura certa deixa a luz chegar na base da touceira e estimula novos perfilhos.

Você sabia?

Uma cultivar nova de capim pode levar até 20 anos para chegar ao mercado. São etapas de coleta, cruzamentos, testes em vários estados e avaliação com animais, até o registro no Ministério da Agricultura.

DICA DE CAMPO Pasto ralo, com chão aparecendo, é sinal de poucos perfilhos. Onde o capim não ocupa, a planta daninha ocupa.

Cinco números para entender qualquer capim

Estas siglas aparecem no laudo da semente, na conversa com o técnico e neste guia. São mais simples do que parecem.

MS

Matéria seca

É o que sobra do capim depois de tirar toda a água. O capim verde tem de 70% a 90% de água; o que alimenta o boi está na matéria seca. Por isso a produção de capim é medida em toneladas de MS por hectare por ano (t MS/ha/ano).



Exemplo: 100 kg de capim verde com 20% de MS. A BRS Capiaçu cortada aos 50 dias tem só 9,3% de MS (Embrapa Gado de Leite).

PB

Proteína bruta

Medida em % da matéria seca. Folha nova tem mais proteína que folha velha e que colmo. Abaixo de 7% de PB, os microrganismos do rúmen trabalham mal e o animal come menos.

DIGEST.

Digestibilidade


Quanto do capim o animal consegue aproveitar. Capim passado, cheio de talo, enche a barriga e engorda pouco.

UA

Unidade animal

Um animal-padrão de 450 kg de peso vivo. Lotação de 2 UA/ha quer dizer 900 kg de animal por hectare. Um bezerro desmamado de 225 kg vale meia UA.






ha

Hectare

A área de um quadrado de 100 m por 100 m: 10.000 m². Dá cerca de 1,4 campo de futebol oficial.






CAPÍTULO 1

Braquiária

Rústica, versátil e a mais plantada do país

Não tem a maior produção nem a folha mais nobre entre os quatro, mas se adapta a quase todo tipo de terreno, aguenta solo mais fraco e perdoa erros de manejo. Por isso está na maior parte dos pastos do Brasil.

- O Marandu, lançado pela Embrapa em 1984, é a gramínea mais cultivada do Brasil.
- Há opções para solo fraco, solo encharcado e integração com lavoura.
- No pastejo contínuo, o Marandu fica entre 20 e 35 cm de altura.



1 FICHA TÉCNICA
Braquiária

NOME CIENTÍFICO	*Urochloa* spp. (antes *Brachiaria*)
ORIGEM	África
NOMES COMUNS	Braquiarão, braquiarinha, humidícola
PORTE	De 0,4 m (BRS Ipyporã) a 2,5 m (Marandu florido)
PLANTIO	Por semente
INDICADA PARA	Pastejo de cria, recria e engorda; integração lavoura-pecuária

Produção	●●●○○
Valor nutritivo	●●●○○
Rusticidade	●●●●●
Facilidade de manejo	●●●●●
Facilidade de plantio	●●●●●

Notas de 1 a 5, comparando os quatro capins entre si.

CAPÍTULO 1 · BRAQUIÁRIA

Uma família grande, cada cultivar com seu ponto forte

Braquiária é o nome de um grupo de espécies. Escolher a cultivar certa faz tanta diferença quanto escolher entre braquiária e outro capim.

CULTIVAR	DESTAQUE	INDICADA PARA
Marandu *U. brizantha · o braquiarão*	Robusta e resistente às cigarrinhas mais comuns do Cerrado. É a gramínea mais cultivada do Brasil.	Solo de média a boa fertilidade e bem drenado
Xaraés *U. brizantha*	Alta produção de folhas. Foi coletada no Burundi, na África, e lançada pela Embrapa em 2003.	Solo de média fertilidade para cima
BRS Piatã *U. brizantha*	Boa produção e bom valor nutritivo. Boa opção para diversificar a fazenda junto com o Marandu.	Solo de média fertilidade
BRS Paiaguás *U. brizantha*	A brizantha mais rústica. Fica verde por mais tempo na seca. Lançada em 2013.	Solo de média fertilidade e integração lavoura-pecuária
BRS Ipyporã *híbrido de braquiárias*	Resiste a todas as espécies de cigarrinha-das-pastagens e tem 13% mais proteína que o Marandu.	Solo bem drenado, de média fertilidade
Decumbens *U. decumbens · a braquiarinha*	Muito rústica e cobre bem o chão. Sofre com a cigarrinha e pode causar fotossensibilização (lesões de pele que pioram ao sol) em bezerros e ovinos.	Solo de baixa fertilidade
Humidícola *U. humidicola · ex.: BRS Tupi*	Rasteira, forma tapete. É a braquiária que mais tolera solo encharcado, mas tem valor nutritivo menor.	Baixadas e solos mal drenados
Ruziziensis *U. ruziziensis*	Folha macia, de boa qualidade e fácil de dessecar. Sensível à cigarrinha.	Integração lavoura-pecuária e palhada para plantio direto

Você sabia?

Marandu quer dizer "novidade" em guarani. O capim veio de uma estação de pesquisa no Zimbábue, chegou ao Brasil por volta de 1967 pelas mãos de um produtor de sementes, foi cultivado por anos em Ibirarema (SP) e lançado pela Embrapa em 1984.

Atenção: cigarrinha-das-pastagens

As ninfas se escondem numa espuma branca na base da planta, e os adultos sugam a seiva. O pasto amarela e seca em manchas. Cultivares resistentes ajudam: o BRS Ipyporã resiste a todas as espécies, e o Marandu, às mais comuns do Cerrado.

Como manejar a braquiária

Pontos fortes

- Aceita solo ácido e de fertilidade média; algumas, até solo fraco.
- Semente fácil de achar e pasto fácil de formar.
- Cobre bem o chão e tolera erros de manejo melhor que os outros três capins.
- Combina com lavoura na integração lavoura-pecuária.

Pontos fracos

- Produz menos e tem menos proteína que Panicum e Tifton bem adubados.
- O Marandu não tolera solo encharcado.
- Algumas cultivares sofrem com a cigarrinha.
- Uma braquiária só na fazenda inteira vira alvo fácil de praga e doença.

Na régua: pastejo contínuo

CULTIVAR	MÁXIMA	MÍNIMA
Xaraés	**40 cm**	**20 cm**
BRS Piatã	**40 cm**	**20 cm**
Marandu	**35 cm**	**20 cm**
BRS Paiaguás	**35 cm**	**20 cm**
BRS Ipyporã	**35 cm**	**20 cm**
Decumbens	**30 cm**	**15 cm**
BRS Tupi	**20 cm**	**10 cm**

Fonte: Embrapa Gado de Corte, Régua de manejo de pastagens (2017).

Como usar a régua

No pastejo contínuo, o gado fica sempre no mesmo pasto. A altura do capim diz quando mexer na lotação:

- Chegou na altura **máxima**: coloque mais animais.
- Chegou na **mínima**: tire animais ou deixe o pasto descansar.
- Entre as duas: o pasto está no ponto.

No pastejo rotacionado, uma referência da Embrapa Rondônia para Marandu e BRS Piatã é colocar o gado com 35 cm e tirar com 20 cm.

Atenção: síndrome da morte do Marandu

Em solos mal drenados, principalmente no Norte e no Centro-Oeste, o Marandu pode morrer em reboleiras na época das chuvas, com aspecto de capim fenado. O excesso de água enfraquece as raízes e abre caminho para fungos. Nessas áreas, troque por um capim mais tolerante ao encharcamento e não deixe a fazenda inteira com um capim só.

DICA DE CAMPO Rapar a braquiária abaixo da altura mínima tira o "painel solar" da planta. Ela gasta a reserva da raiz para rebrotar e, se isso se repete, o pasto degrada.

CAPÍTULO 2

Panicum

Alta produção para quem aduba e faz rodízio

Mombaça, Tanzânia, Zuri, Quênia e outros formam touceiras grandes e muito produtivas. Com solo corrigido, adubação e pastejo rotacionado, estão entre os capins que mais produzem por hectare. Sem esse cuidado, perdem rendimento rápido.

- Seis cultivares principais, do Tamani (porte baixo) ao Mombaça (porte alto).
- Rende mais em pastejo rotacionado, com alturas de entrada e de saída.
- BRS Quênia: 32,5 arrobas por hectare por ano, sem suplementação, em Campo Grande (MS).



2 FICHA TÉCNICA
Panicum

NOME CIENTÍFICO	*Megathyrsus maximus* (antes *Panicum maximum*)
ORIGEM	África: Tanzânia, Quênia e vizinhos
NOME COMUM	Família dos coloniões
PORTE	De baixo (BRS Tamani) a alto (Mombaça)
PLANTIO	Por semente, bem rasa
INDICADO PARA	Pastejo rotacionado intensivo, de corte e de leite

Produção	●●●●●
Valor nutritivo	●●●●○
Rusticidade	●●○○○
Facilidade de manejo	●●○○○
Facilidade de plantio	●●●○○

Notas de 1 a 5, comparando os quatro capins entre si.

As cultivares de Panicum

Todas são da mesma espécie, mas cada cultivar tem um porte. E o porte define a altura de manejo: quanto maior a touceira, mais alto o gado entra e sai do piquete.

Mombaça — 1993

PORTE ALTO

Touceiras grandes e produção muito alta. Exige rodízio bem ajustado para não passar do ponto.

Entrada 85 cm **Saída 45 cm**

BRS Zuri — 2014

PORTE MÉDIO-ALTO

Folhas muito largas, rebrota rápida e alta resistência à mancha-das-folhas, causada pelo fungo *Bipolaris maydis*.

Entrada 80 cm **Saída 40 cm**

Tanzânia — 1990

PORTE MÉDIO

A primeira cultivar lançada da grande coleção de capins trazida da África. Um clássico do pastejo rotacionado.

Entrada 70 cm **Saída 35 cm**

BRS Quênia — 2017

PORTE MÉDIO

Híbrido de folhas macias e colmos tenros. Rendeu 32,5 arrobas por hectare por ano, sem suplementação, em Campo Grande (MS).

Entrada 65 cm **Saída 35 cm**

Massai

PORTE BAIXO A MÉDIO

Folhas finas, muitos perfilhos e touceiras menores que as do Tanzânia e do Mombaça.

Entrada 55 cm **Saída 30 cm**

BRS Tamani — 2015

PORTE BAIXO

Muitas folhas longas e finas e ótima cobertura do solo. Floresce cedo e entra na seca com bom valor nutritivo.

Entrada 50 cm **Saída 25 cm**

Alturas de entrada e saída no pastejo rotacionado: Embrapa Gado de Corte, Régua de manejo de pastagens (2017). Ano = lançamento da cultivar.

Você sabia?


Zuri quer dizer "bom" e "bonito", e Tamani, "precioso" e "desejado", em suaíle, língua falada no Quênia e na Tanzânia, de onde vem a espécie. E o velho capim-colonião deu o nome à família toda: os coloniões.

O que o Panicum exige

- Solo de média a alta fertilidade e bem drenado. Quênia e Tamani não toleram encharcamento.
- Calagem e adubação de manutenção todo ano.
- Pastejo rotacionado, com controle das alturas de entrada e saída.
- Plantio raso: a semente é pequena e não pode ficar enterrada fundo.

Pastejo rotacionado: como funciona

O pasto é dividido em piquetes. O gado entra na altura de entrada, sai na altura de saída e passa para o próximo, enquanto os outros descansam e rebrotam.



Sentido do rodízio: 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → volta ao 1. Exemplo com 5 piquetes, 7 dias de ocupação e 28 dias de descanso.

Quantos piquetes?

Piquetes = descanso ÷ ocupação + 1

Com 28 dias de descanso e 7 de ocupação:
28 ÷ 7 + 1 = **5 piquetes**.

Com 1 dia de ocupação, comum no leite:
28 ÷ 1 + 1 = **29 piquetes**.

O descanso depende do capim, do clima e da adubação. Na Embrapa Rondônia, por exemplo, varia de 21 a 35 dias.

Na régua: rotacionado

CULTIVAR	ENTRADA	SAÍDA
Mombaça	**85 cm**	**45 cm**
BRS Zuri	**80 cm**	**40 cm**
Tanzânia	**70 cm**	**35 cm**
BRS Quênia	**65 cm**	**35 cm**
Massai	**55 cm**	**30 cm**
BRS Tamani	**50 cm**	**25 cm**

A lotação certa baixa o capim da entrada até a saída em 1 a 7 dias. Fonte: Embrapa Gado de Corte (2017).

⚠ Atenção: entrada e saída fora da altura

Se o gado entra tarde, o colmo do Panicum alonga (é o envaretamento): sobra talo, o gado pisa e desperdiça. Se sai tarde, a touceira é rapada, perde força e abre espaço para as invasoras.

DICA DE CAMPO O capim que fica no piquete depois do pastejo é a poupança do pasto. Quem saca tudo hoje fica sem rebrota amanhã.

CAPÍTULO 3

Tifton

Folha fina e de alto valor nutritivo, referência em feno

O Tifton e os parentes do gênero *Cynodon* formam um tapete denso de folhas finas e macias. São muito usados para feno, pastejo de gado de leite e cavalos. Em troca, exigem solo fértil, adubação e água.

- O Tifton 85 foi lançado em 1992 nos Estados Unidos e é plantado por mudas.
- Para feno, o corte é feito a cada 28 a 35 dias nas águas.
- Aguenta pastejo baixo: perto de 15 cm no pastejo contínuo.



3 FICHA TÉCNICA
Tifton

NOME CIENTÍFICO	*Cynodon* spp. (o Tifton 85 é um híbrido)
ORIGEM	Gênero africano; o Tifton 85 foi criado nos Estados Unidos
PARENTES	Tifton 68, Coastcross, Jiggs, estrela-africana
PORTE	Baixo, rasteiro: estolões e rizomas
PLANTIO	Por mudas (o Tifton 85 não forma semente viável)
INDICADO PARA	Feno e pré-secado; pastejo de leite, cavalos e ovinos

Produção	●●●●○
Valor nutritivo	●●●●●
Rusticidade	●○○○○
Facilidade de manejo	●●●○○
Facilidade de plantio	●●○○○

Notas de 1 a 5, comparando os quatro capins entre si.

CAPÍTULO 3 · TIFTON

Um capim desenvolvido nos Estados Unidos

O Tifton 85 foi desenvolvido pelo pesquisador Glenn Burton e sua equipe, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), na cidade de Tifton, na Geórgia. Lançado em 1992, ele é o cruzamento entre o Tifton 68 e uma grama trazida da África do Sul.

Onde o Tifton rende mais

Feno

Colmos finos e muita folha: seca rápido no campo e vira feno de alta qualidade. Também serve para pré-secado.

Gado de leite

Pastejo intensivo de vacas em piquetes bem adubados, muitas vezes irrigados.

Cavalos e ovinos

Folha macia e pastejo baixo combinam com cavalos, ovinos e bezerros, que pastam rente ao chão.

Você sabia?

O Tifton 85 é estéril: não forma semente viável. Por isso, todo Tifton 85 é plantado com mudas, ou seja, pedaços da própria planta.

Em testes nos Estados Unidos, ele produziu cerca de 26% mais matéria seca que a grama Coastal, e essa matéria seca era 11% mais digestível.

Plantio em 4 passos

1. **Prepare o terreno**
   Análise de solo, calcário e fósforo, como para qualquer pasto.
2. **Escolha boas mudas**
   Novas, viçosas e com vários nós. É dos nós que saem raízes e brotos.
3. **Plante com chuva**
   No início das águas, com o solo úmido, cobrindo parte da muda com terra.
4. **Proteja o começo**
   Controle as plantas daninhas até o tapete fechar.

O que o Tifton exige


- ✓ Solo fértil e corrigido, com adubação de manutenção, principalmente de nitrogênio.
- ✓ Chuva bem distribuída ou irrigação.
- ✓ Corte ou pastejo frequente, para não passar do ponto.

DICA DE CAMPO O Tifton lembra grama de jardim, mas é capim de alto rendimento. Só entrega esse rendimento com adubação e manejo frequente.

Do pasto ao fardo

Feno é capim desidratado ao sol para ser guardado. Bem feito, mantém boa parte do valor do capim verde e vira reserva para a seca.

1. **Corte na hora certa**
   Nas águas, a cada 4 a 5 semanas (28 a 35 dias). Cortar antes enfraquece a planta; depois, sobra talo e cai a qualidade.
2. **Escolha dias firmes**
   Corte baixo, com sol e sem previsão de chuva para os próximos dias.
3. **Seque e vire**
   Espalhe e vire o capim no campo para secar por igual.
4. **Enfarde no ponto**
   Com cerca de 80% a 85% de matéria seca, ou seja, 15% a 20% de umidade.
5. **Guarde bem**
   Em galpão coberto, seco e ventilado, com os fardos longe do chão. Feno guardado úmido mofa, esquenta e perde qualidade.



Teste da torção

Torça um punhado de capim. Se os talos quebram e não sai umidade, está no ponto de enfardar.

Na régua: pastejo

O Tifton aguenta pastejo mais baixo que os outros três capins. Faixas citadas em pesquisas:

- **Contínuo:** pasto perto de 15 cm, entre 10 e 20 cm.
- **Rotacionado:** entrada com 20 a 25 cm e saída com 10 a 15 cm.

Não há uma régua oficial única para o Tifton: confirme a meta com o seu técnico.

Atenção

Sem adubação, o Tifton perde rápido: a produção cai, o tapete abre e as invasoras entram.

E ele se espalha por estolões e rizomas. Perto de lavouras, pode virar invasor difícil de eliminar.

DICA DE CAMPO Feno bom tem cheiro de capim, cor esverdeada e muita folha. Feno marrom, empoeirado ou com mofo perde valor e pode fazer mal aos animais.


CAPÍTULO 4

Capim-elefante

Grande volume de forragem para o cocho e o silo

É o maior dos quatro: algumas cultivares passam de 4 metros. Produz muita forragem para cortar e servir no cocho ou guardar como silagem, e vira a reserva que sustenta o rebanho quando o pasto para de crescer.

- A BRS Capiaçu produz, em média, 50 t de matéria seca por hectare por ano.
- Para silagem, o corte é feito com 90 a 110 dias de rebrota.
- As cultivares anãs, como a BRS Kurumi, foram feitas para pastejo.



4 FICHA TÉCNICA

Capim-elefante

NOME CIENTÍFICO	*Cenchrus purpureus* (antes *Pennisetum purpureum*)
ORIGEM	África tropical; chegou ao Brasil em 1920, com estacas vindas de Cuba
CULTIVARES	Napier, Cameroon, BRS Capiaçu, BRS Kurumi
Pporte	Alto, até 4,2 m (BRS Capiaçu); a BRS Kurumi é anã
PLANTIO	Por colmos (mudas), em sulcos
INDICADO PARA	Capineira, silagem e, nas cultivares anãs, pastejo

Produção	●●●●●
Valor nutritivo	●●●○○
Rusticidade	●○○○○
Facilidade de manejo	●●○○○
Facilidade de plantio	●●○○○

Notas de 1 a 5, comparando os quatro capins entre si.

Cocho, silo ou pasto: três formas de uso

O que muda entre elas é a cultivar e a idade de corte.

NO COCHO

Capineira

Corta, pica e serve verde. É o uso mais comum, principalmente para reforçar a alimentação do gado na seca em pequenas propriedades.

BRS Capiaçu: corte com 2,5 a 3,0 m, cerca de 50 a 70 dias de rebrota nas águas.

NO SILO

Silagem

O capim picado fermenta sem ar dentro do silo e fica guardado para o período seco.

BRS Capiaçu: corte com 3,5 a 4,0 m, perto de 90 a 110 dias. Passou de 120 dias, perde valor nutritivo.

NO PASTO

Pastejo


As cultivares anãs, como a BRS Kurumi, foram feitas para o gado colher sozinho, em pastejo rotacionado.

BRS Kurumi: entrada com 75 a 80 cm, saída com 35 a 40 cm e descanso perto de 22 dias nas águas.

CULTIVAR	DESTAQUE
Napier e Cameroon *tradicionais*	Clássicas nas capineiras brasileiras.
BRS Capiaçu *registrada em 2015*	Porte alto (4,2 m), touceira ereta, colmo grosso e boa resistência ao tombamento. Não tem joçal, os pelos que irritam a pele de quem corta. Produz em média 50 t de matéria seca por hectare por ano.
BRS Kurumi *anã, para pastejo*	Entrenós curtos e muitos perfilhos. Bem manejada, suporta de 4 a 7 UA/ha e permite de 18 a 19 litros de leite por vaca por dia, só com suplementação energética.

Plantio: colmo deitado no sulco


Plante no início das chuvas, em sulcos de 20 a 30 cm de profundidade e espaçados de 0,8 a 1,2 m. Deite os colmos no fundo do sulco, a ponta de um junto ao pé do outro, e cubra com terra.



DICA DE CAMPO Na seca, quando o pasto para de crescer, uma capineira bem planejada garante comida no cocho. Dimensione a área pelo número de animais e pelos meses de seca.

Idade de corte: volume ou qualidade?

Quanto mais tempo o capim cresce, mais forragem ele dá e menos proteína ela tem. Veja o que acontece com a BRS Capiaçu.



Idade de corte, altura da planta, produção e proteína da BRS Capiaçu. Fonte: Embrapa Gado de Leite, Comunicado Técnico 79 (2016).

Como decidir a hora do corte

Para o cocho, corte mais novo, quando a folha ainda tem mais proteína.

Para o silo, corte mais maduro. O capim jovem tem água demais: fermenta mal e escorre no silo. Aos 50 dias, a BRS Capiaçu tem só 9,3% de matéria seca; aos 110, quase 20%.

Silagem de capim-elefante: 3 cuidados

- ✓ Pique em pedaços de 1 a 2 cm.
- ✓ Compacte muito bem e vede o silo.
- ✓ Se precisar, use aditivos para melhorar a fermentação.

Você sabia?

A BRS Capiaçu e a BRS Kurumi são meio-irmãs: as duas têm o capim-elefante Roxo como um dos pais. E *purpureum*, o antigo sobrenome científico da espécie, quer dizer "cor de púrpura" em latim.

Atenção


Cada corte leva nutrientes embora. Sem adubação depois dos cortes (química ou com esterco de curral), a capineira enfraquece. E o capim-elefante não tolera solo encharcado.

DICA DE CAMPO Capim-elefante cortado novo e bem picado é bem aproveitado. Passado do ponto, vira talo duro que sobra no cocho.

NA RÉGUA

A régua do pasto

Altura é o jeito mais simples de saber se o pasto está no ponto. A Embrapa criou uma régua com faixas para cada capim: dentro da faixa, o manejo está certo; abaixo dela, o pasto está sendo rapado; acima, o capim está passando do ponto.



Por que essas alturas?

Na altura de entrada, o capim está no auge da produção de folhas novas e ainda perde pouca folha velha. A altura de saída deixa folha suficiente para a planta rebrotar rápido.

Como medir

Segure a régua em pé, com a ponta no chão, e leia a altura das folhas em vários pontos: a Embrapa sugere 30 medições em áreas de até 5 ha, 40 até 10 ha e 50 ou mais acima disso. Sem régua, marque as alturas num bambu.

Fontes: Embrapa Gado de Corte, Régua de manejo de pastagens (2017); Embrapa Gado de Leite, BRS Kurumi; pesquisas brasileiras com Tifton 85.

COMPARATIVO

Os 4 capins lado a lado

Um resumo para consulta rápida. As notas são as mesmas das fichas técnicas e comparam os quatro entre si.

	1 Braquiária	2 Panicum	3 Tifton	4 Capim-elefante
FORMA DE CRESCER	Touceira ou rasteira, conforme a espécie	Touceira	Rasteiro, em tapete	Touceira alta, parecida com cana
PLANTIO	Semente	Semente, bem rasa	Mudas	Colmos
FERTILIDADE DO SOLO	Baixa a média	Média a alta	Alta	Muito alta
USO PRINCIPAL	Pastejo de cria, recria e engorda; ILP	Pastejo rotacionado intensivo	Feno, leite e cavalos	Capineira e silagem; pastejo nas anãs
MANEJO	Contínuo ou rotacionado	Rotacionado	Contínuo baixo, rotacionado ou corte	Corte; rotacionado nas anãs
PONTO FORTE	Rusticidade	Produção	Qualidade	Volume
CUIDADO COM	Encharcamento (Marandu) e cigarrinha	Passar do ponto	Falta de adubo e de água	Reposição de nutrientes e mão de obra
PRODUÇÃO	●●●○○	●●●●●	●●●●○	●●●●●
VALOR NUTRITIVO	●●●○○	●●●●○	●●●●●	●●●○○
RUSTICIDADE	●●●●●	●●○○○	●○○○○	●○○○○
FACILIDADE DE MANEJO	●●●●●	●●○○○	●●●○○	●●○○○
FACILIDADE DE PLANTIO	●●●●●	●●●○○	●●○○○	●●○○○

Exemplos de uso na fazenda

Cria e recria a pasto
Braquiária como base; Panicum nas áreas mais férteis.

Gado de leite
Tifton, Panicum ou BRS Kurumi no pasto; capim-elefante na capineira.

Engorda intensiva
Panicum em pastejo rotacionado e reserva de silagem para a seca.

Cavalos
Tifton, no pasto e no feno.

DICA DE CAMPO A maioria das fazendas ganha quando usa mais de um capim: cada área com o capim que combina com ela, e menos risco de pragas e doenças.

ESCOLHA

Qual capim escolher?

Comece pela pergunta 1 e siga as respostas. É um ponto de partida para conversar com o seu técnico, não uma receita pronta.

PERGUNTA 1

O gado vai colher o capim direto no pasto?

Sim, é para pastejo.
→ Vá para a pergunta 2

Não, vou cortar para fazer feno.
3 **Indicado: Tifton**

Não, vou cortar para o cocho ou para o silo.
4 **Indicado: capim-elefante, como a BRS Capiaçu**

PERGUNTA 2

O solo está corrigido e você vai adubar todo ano?

Sim: solo de média a alta fertilidade, com adubação.
→ Vá para a pergunta 4

Não, ou pouco: solo mais fraco e pouca adubação.
→ Vá para a pergunta 3

PERGUNTA 3

A área encharca na época das chuvas?

Sim: é baixada ou solo mal drenado.
1 **Indicada: braquiária humidícola**

Não: o solo drena bem.
1 **Indicada: braquiária rústica. Decumbens no solo mais fraco; Paiaguás ou Marandu no solo médio**

PERGUNTA 4

Vai dividir o pasto em piquetes e controlar a altura?

Sim: pastejo rotacionado.
2 **Indicado: Panicum (Mombaça, Zuri, Quênia ou Tamani). No leite, Tifton e BRS Kurumi também rendem bem**

Não: o gado fica no mesmo pasto.
1 **Indicada: braquiária brizantha (Marandu, Xaraés ou Piatã)**

⚠ **Vale para qualquer escolha**

- → Faça a análise de solo antes de decidir.
- → Área que encharca: evite Marandu, Quênia, Tamani e capim-elefante.
- → Diversifique: mais de um capim na fazenda reduz o risco de pragas e doenças.

Formação do pasto em 6 etapas

Pasto bem formado dura anos. Pasto mal formado vira problema já no primeiro ano. A ordem das etapas importa.

1 **Análise de solo**

Colete amostras da área, normalmente na camada de 0 a 20 cm, e mande para um laboratório. Toda recomendação de calcário e de adubo parte dela.

2 **Correção com antecedência**

Aplique o calcário, e o gesso se for indicado, com tempo para reagir no solo, de preferência antes das chuvas.

3 **Preparo e limpeza**

Prepare o solo e controle as plantas daninhas antes de plantar. No começo, elas competem forte com o capim.

4 **Semente ou muda certa**

Compre semente com laudo e confira o valor cultural (VC). Para Tifton e capim-elefante, use mudas sadias.

5 **Plantio na hora certa**

No início das chuvas, com o solo úmido. Semente pequena, como a do Panicum, fica bem rasa: coberta demais, não nasce.

6 **Primeiro pastejo leve**

Quando o capim chegar perto da altura de entrada, faça um pastejo rápido e leve, de preferência com animais mais leves. Ele estimula o perfilhamento e fecha o pasto.

A conta da semente

O **valor cultural (VC)** diz quanto do saco é semente pura e viva.

VC = pureza × germinação ÷ 100

Pureza de 80% e germinação de 75%:
80 × 75 ÷ 100 = **60%**.

kg/ha = SPV × 100 ÷ VC

SPV são os quilos de sementes puras viáveis recomendados por hectare. Para o Marandu, a referência fica perto de 3 kg. Com VC de 60%:
3 × 100 ÷ 60 = **5 kg/ha**.

Referências comerciais de SPV (kg/ha): Marandu 2,8 · Xaraés 4,5 · Piatã 4,0 · Mombaça 1,8 · Tanzânia 1,6. Fonte: Embrapa Amazônia Ocidental (2019).

Você sabia?

Quanto menor o VC, mais quilos vão para a terra. Com VC de 40%, você planta 2,5 vezes o peso de SPV recomendado. Com VC de 80%, só 1,25 vez.

Atenção


Plantar no fim das águas deixa o capim pequeno para enfrentar a seca, e o pasto nasce ralo.

DICA DE CAMPO Semente barata com VC baixo sai cara: você paga por impureza e por semente que não nasce. Compare sempre o preço por ponto de VC.

PLANEJAMENTO

Calendário do pasto

O pasto segue as chuvas. O que se faz antes e durante as águas define quanto capim vai sobrar para a seca.



Calendário típico do Brasil Central. Em regiões com chuvas em outros meses, desloque as atividades junto com o início das águas.

Você sabia?

Vedar é tirar o gado de uma parte do pasto no fim das águas para o capim acumular volume para a seca. A Embrapa sugere escalonar: vedar cerca de um terço da área em fevereiro, para usar no começo da seca, e o restante em março, para o fim.

Atenção

Pasto vedado garante volume, mas o capim fica velho e com pouca proteína. Converse com o seu técnico sobre suplementação na seca, como o sal proteinado.

DICA DE CAMPO

Faça a conta da seca em março: quantos animais, quantos meses e quanto de reserva você tem. Se faltar, ainda dá tempo de vedar mais área ou ajustar a lotação.

ERROS COMUNS

7 erros que degradam o pasto

A degradação quase nunca vem de um erro só. É a soma de pequenos descuidos, ano após ano.

1. Rapar o pasto

Pastejar abaixo da altura de saída. A planta perde as folhas que fazem fotossíntese, gasta a reserva e enfraquece. É a porta de entrada da degradação.

2. Deixar passar do ponto

Colocar o gado tarde demais. Sobra talo, falta folha e o gado desperdiça capim pisando.

3. Plantar sem análise de solo

Sem corrigir a acidez e o fósforo, nenhum capim rende o que pode.

4. Esquecer a adubação de manutenção

Todo pasto exporta nutrientes em carne, leite e forragem. Sem reposição, a produção cai ano após ano.

5. Capim errado no lugar errado

Marandu em baixada encharcada, Panicum em solo fraco sem adubo, capim-elefante sem ninguém para cortar.

6. Escolher semente pelo preço do saco

O que vale é o VC. Semente barata com VC baixo sai cara no fim da conta.

7. Fazenda de um capim só

Se uma praga ou doença pega aquele capim, pega a fazenda inteira. A síndrome da morte do Marandu mostrou isso no Norte e no Centro-Oeste. Ter mais de um capim é o seguro do pasto.

✓ 4 hábitos de quem tem pasto bom

Medir sempre
Ande no pasto com a régua e ajuste a lotação pela altura do capim.

Adubar nas águas
Reponha os nutrientes quando tem chuva para o capim responder.

Planejar a seca
Separe reserva: feno, silagem, capineira ou pasto vedado no fim das águas.

Anotar tudo
Datas de entrada e saída, lotação e adubação: o histórico mostra o que funciona.

DICA DE CAMPO A degradação começa devagar: falhas no chão, mais plantas daninhas e menos animais por hectare a cada ano. Quanto antes corrigir, mais barato fica.

DIAGNÓSTICO

Seu pasto está bem manejado?

Responda com sinceridade e conte quantos "sim" você marcou. É uma conversa inicial com o seu técnico, não uma nota.

1	Você fez análise de solo nos últimos 2 anos?	☐ Sim	☐ Não
2	O capim de cada área combina com o solo e com a drenagem dela?	☐ Sim	☐ Não
3	Você mede a altura do pasto para decidir quando o gado entra e sai?	☐ Sim	☐ Não
4	O gado sai antes de o capim baixar da altura de saída ou da mínima?	☐ Sim	☐ Não
5	O pasto quase não tem falhas de chão descoberto nem manchas de plantas daninhas?	☐ Sim	☐ Não
6	Você repõe nutrientes com adubação de manutenção?	☐ Sim	☐ Não
7	Há reserva planejada para a seca: pasto vedado, feno, silagem ou capineira?	☐ Sim	☐ Não
8	A fazenda tem mais de um capim ou mais de uma cultivar?	☐ Sim	☐ Não
9	Você acompanha o aparecimento de cigarrinha no início das chuvas?	☐ Sim	☐ Não
10	Você anota as datas de entrada e saída, a lotação e as adubações?	☐ Sim	☐ Não

8 a 10 "sim"

Pasto bem conduzido. Mantenha a rotina e continue medindo.

5 a 7 "sim"

Há pontos a ajustar. Comece pelos "não" que custam pouco, como medir a altura e anotar o manejo.

0 a 4 "sim"

Risco de degradação. Vale chamar um técnico para rever solo, capim e manejo.

DICA DE CAMPO Refaça este diagnóstico uma vez por ano, de preferência antes das águas. Assim dá tempo de corrigir o solo e planejar a adubação.

GLOSSÁRIO

Termos do pasto, sem complicação

Altura de entrada e de saída
Alturas do capim para colocar e tirar o gado do piquete no pastejo rotacionado.

Bainha
Parte da folha que abraça o colmo.

Calagem
Aplicação de calcário para corrigir a acidez do solo e fornecer cálcio e magnésio.

Capineira
Área de capim plantada para corte e fornecimento no cocho.

Colmo
O "talo" do capim, onde ficam os nós.

Cultivar
Variedade melhorada e registrada de uma espécie. Ex.: o Marandu é uma cultivar de *Urochloa brizantha*.

Degradação
Perda de vigor e de produção do pasto, com falhas no chão e plantas daninhas.

Envaretamento
Alongamento do colmo quando o capim passa do ponto.

Estolão
Caule que cresce rente ao chão e solta raízes nos nós.

Feno
Capim cortado e desidratado ao sol para ser guardado.

ILP
Integração lavoura-pecuária: lavoura e pasto na mesma área, em rotação ou consórcio.

Lotação
Quantidade de animais por área, geralmente em UA por hectare.

MS
Matéria seca: o que sobra do capim sem a água.

Pastejo contínuo
O gado fica no mesmo pasto o tempo todo.

Pastejo rotacionado
O pasto é dividido em piquetes e o gado muda de um para outro conforme a altura do capim.

PB
Proteína bruta, em porcentagem da matéria seca.

Perfilho
Brotação nova que nasce da base da planta.

Piquete
Cada divisão do pasto no pastejo rotacionado.

Pré-secado
Capim cortado, murcho até perder parte da água e conservado sem ar, como uma silagem mais seca.

Rizoma
Caule que cresce debaixo da terra.

Silagem
Forragem picada e fermentada sem ar, dentro de um silo.

SPV
Sementes puras viáveis: a parte do lote que é semente pura e capaz de nascer.

Superpastejo e subpastejo
Pastejo forte demais (capim rapado) ou fraco demais (capim passando do ponto).

Touceira
Moita formada por muitos perfilhos juntos.

UA
Unidade animal: 450 kg de peso vivo.

VC
Valor cultural da semente: pureza × germinação ÷ 100.

Vedação (diferimento)
Tirar o gado de uma área no fim das águas para o capim acumular volume e ser usado na seca.

RESUMO

O capim certo no lugar certo

Nenhum capim resolve tudo sozinho. Para guardar:

1. **Braquiária**
   Rústica e versátil, a base do pasto brasileiro. Respeite a altura mínima.



2. **Panicum**
   Produção alta com solo fértil, adubação e rodízio. Entre e saia na altura certa.



3. **Tifton**
   Folha de qualidade para feno, leite e cavalos. Adube e corte na hora certa.



4. **Capim-elefante**
   Volume para o cocho e o silo na seca. Reponha os nutrientes depois de cada corte.



PRÓXIMO PASSO Meça a altura dos seus pastos esta semana e compare com a régua da página 19. É o jeito mais rápido de saber se o manejo está no caminho certo.

Fontes

Embrapa Gado de Corte. Régua de manejo de pastagens: edição revisada. Comunicado Técnico 135. Campo Grande, MS, 2017.

Embrapa Rondônia. Pastejo rotacionado: metas de manejo e planejamento do sistema rotativo (folder).

Embrapa (CNPGC). *Brachiaria brizantha* cv. Marandu. Documentos. Campo Grande, MS, 1984.

Embrapa. Novas cultivares de pastagem. Pasto Extraordinário, 2018.

Dias-Filho, M. B. (Embrapa Amazônia Oriental). Entendendo a síndrome da morte do capim-marandu, 2005.

Embrapa Gado de Leite. BRS Capiaçu: cultivar de capim-elefante de alto rendimento para produção de silagem. Comunicado Técnico 79. Juiz de Fora, MG, 2016.

Embrapa Gado de Leite. Informações sobre a cultivar de capim-elefante BRS Kurumi. Comunicado Técnico 75.

Embrapa Amazônia Ocidental. Densidades de semeadura no estabelecimento de cultivares de gramíneas forrageiras no Amazonas. Comunicado Técnico 142. Manaus, AM, 2019.

Embrapa. Publicações sobre épocas de vedação (diferimento) de pastagens e sobre o controle das cigarrinhas-das-pastagens.

USDA-ARS. Tifton 85 Bermudagrass. Tifton, Geórgia, Estados Unidos.

Os 4 capins mais usados no Brasil · 1ª edição, novembro de 2026 · Rebanho. Este guia tem caráter educativo: cultivar, adubação e manejo devem ser ajustados por um técnico para cada propriedade.

REBANHO

Cada animal, cada quilo.

Quer mais conteúdo como este? Toda segunda-feira, a **Porteira**, newsletter gratuita do Rebanho, traz mercado do boi, clima e gestão da fazenda.

