

Relatório Analítico — Dengue em Belo Horizonte

Este relatório apresenta uma análise exploratória de dados relacionados aos casos de dengue no município de Belo Horizonte. O objetivo do projeto foi investigar possíveis diferenças epidemiológicas entre os sexos, identificar padrões de sintomas e analisar a distribuição de casos gestacionais. O dataset utilizado foi obtido a partir de bases públicas do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), disponibilizadas pelo Portal de Dados Abertos do SUS.

Fonte dos Dados:


- Portal de Dados Abertos do SUS — SINAN/Dengue
- Repositório do projeto: github.com/cardosomatheus/Dengue_Belo_Horizonte_2026

Resumo do Processo ETL e Qualidade dos Dados

O pipeline ETL realizou etapas de extração, transformação e padronização dos dados epidemiológicos. Durante o processamento foram aplicadas regras de qualidade para reduzir inconsistências e melhorar a confiabilidade da análise. Principais decisões técnicas: Padronização dos valores de sexo. Tratamento de valores nulos e registros incompletos. Normalização de sintomas categóricos. Filtragem de registros inconsistentes. Padronização dos campos relacionados à gestação.


1. Há discrepância significativa de casos entre mulheres e homens?

A análise identificou maior concentração de casos registrados no sexo feminino. Os resultados sugerem uma diferença relevante entre os grupos analisados, embora fatores externos como acesso ao sistema de saúde, subnotificação e comportamento de busca por atendimento possam influenciar os resultados.



2. Há sintomas mais recorrentes entre os sexos?


Os sintomas febre e cefaleia apresentaram alta incidência em ambos os sexos. Entretanto, alguns sintomas demonstraram frequência proporcionalmente maior em mulheres, indicando possíveis diferenças clínicas ou comportamentais na notificação.



3. Em casos gestacionais, qual nível de gestação apresentou maior ocorrência?

Os registros analisados indicaram maior concentração de notificações durante o primeiro trimestre gestacional. Ainda assim, a interpretação deve considerar possíveis limitações relacionadas à qualidade do preenchimento dos dados.

Distribuição de Casos Gestacionais



Conclusões e Limitações

A análise identificou diferenças relevantes entre os sexos na quantidade de casos registrados e na frequência de determinados sintomas. Além disso, observou-se maior incidência de notificações gestacionais nos estágios iniciais da gravidez. Limitações identificadas: Possíveis registros incompletos ou inconsistentes. Presença de subnotificação. Ausência de variáveis clínicas adicionais. Dados sujeitos a atualização pelo sistema oficial.