


**FLEBITIS
OCASIONADA
POR
CATÉTER
PERIFÉRICO**





“Una complicación frecuente en los pacientes hospitalizados es la flebitis, que está asociada al manejo de catéteres venosos periféricos, procedimiento que se realiza con fines terapéuticos y/o diagnósticos. El personal de enfermería, es el responsable del cuidado del acceso venoso periférico y por ende de prevenir la aparición de complicaciones”



Flebitis



- Estado patológico que consiste en la inflamación de una vena por alteración del endotelio. Las plaquetas migran a la zona lesionada y alrededor de la punta del catéter comienza la formación de un trombo. La agregación plaquetaria origina la liberación de histamina, aumentando el flujo sanguíneo en la zona por vasodilatación.

Síntomas comunes



- Eritema
- tumefacción
- dolor
- fiebre





CLASIFICACION

BACTERIANA: ocurre debido a la contaminación del sistema intravenoso al momento de introducir o manipular el catéter, mala higiene, uso de la técnica estéril mal realizado entre otras.

QUÍMICA: Aparece como respuesta irritativa e inflamatoria de la intima de la vena a la administración de ciertas sustancias químicas

MECÁNICA: Es la mas común ocurre por la fijación inadecuada del catéter infusión lenta, uso de un catéter muy grande para el calibre de la vena, lesión en la vena puncionada



○ Escala Visual para la Flebitis de Infusión (VIP)

Valoración del punto de inserción

ESCALA VISUAL DE VALORACIÓN DE FLEBITIS		
Medicina Preventiva y Salud Pública. Buenas prácticas en Seguridad de Pacientes	Sin dolor, eritema, hinchazón, ni cordón palpable.	0 NO signos de flebitis. OBSERVE punto de inserción
	Dolor sin eritema, hinchazón, ni cordón palpable en la zona de punción	1 Posible signo de flebitis. OBSERVE punto de inserción
	Dolor con eritema y/o hinchazón sin cordón palpable en la zona de punción	2 Inicio de flebitis. RETIRE el catéter
	Dolor, eritema, hinchazón, endurecimiento o cordón venoso palpable < de 6 cm por encima del sitio de inserción.	3 Etapa media de flebitis. RETIRE el catéter y valore tratamiento
	Dolor, eritema, hinchazón, endurecimiento, cordón venoso palpable > de 6 cm por encima del sitio de inserción y/o purulencia	4 Avanzado estado de flebitis. RETIRE catéter y valore tratamiento
	Trombosis venosa franca con todos los signos anteriores y dificultad o detención de la perfusión	5 Tromboflebitis. RETIRE catéter e inicie tratamiento



¡GRACIAS!

