



Sabrina Critzmann
Médica Pediatra

Preparados,
listos...
¡¡¡A COMER!!!

[#AlimentacionSC](#)

Queda prohibida la copia, reproducción total o parcial, alteración y/o distribución de este documento sin la autorización previa del propietario de los derechos Sabrina Critzmann.

www.sabrinapediatra.com



La comida es un momento social. Seguro que tu bebé hace meses te está mirando comer asombrado, haciendo gestos con la boca y la carita, y hasta a veces manoteando lo que tenés en la mano.

Pues bien, ¡ha llegado el momento de empezar a comer! Tu bebé debe haber alcanzado ciertas pautas neuromadurativas adecuadas para este momento, generalmente a partir de los 6 meses de edad.

Como mínimo, se recomienda que los bebés que empiezan la alimentación complementaria:

- 1) Puedan permanecer sentados, con o sin ayuda**
- 2) muestren interés en los alimentos**
- 3) hayan perdido el reflejo de extrusión**
- 4) que puedan tomar los alimentos con sus manos**

Durante el taller charlaremos de estas pautas.

La alimentación en un inicio es COMPLEMENTARIA.

Es decir, la leche, sea materna o de fórmula, seguirá siendo la primera fuente de nutrición para este bebé y la comida, un momento de exploración.

Las primeras comidas (y cuando digo primeras, me refiero a ¡MESES!) son un mundo de sensaciones, texturas, colores, sabores y temperaturas. Todo eso. Sí, a mi también me cuesta imaginarlo. Para ellos CADA comida es como si nosotros, adultos, probáramos comidas étnicas variadas día tras día.

Es posible que aplasten todo con la mano y se nieguen a abrir la boca. Que lo más cercano que hagan a comer sea arrojar la comida al piso y que la limpie la mascota.

¿Existe el “enseñar a comer”?

Los bebés se alimentan desde su primera hora de vida (idealmente), y nadie les explica cómo. Con la alimentación complementaria, idealmente debería pasar lo mismo. Nos esforzamos en que usen plato, cuchara y babero cuando el niño está empeñado en destruir todo con sus manos... ¡como corresponde!

En una sociedad con alto grado de enfermedades asociadas a la alimentación, con vínculos muy insanos con la comida, mostrarle a nuestros hijos que pueden disfrutar y amar su cuerpo y que la alimentación es parte de ese amor, es primordial. Es la piedra angular de una nutrición adecuada, que incluya al placer.

Vamos a algunos tips antes de detallar las comidas:

1

Es aconsejable que el ambiente esté relajado, con la tele y otros dispositivos apagados, y el bebé de buen humor, sin mucha hambre.

2

Está bueno instaurar rutinas, por ejemplo, explicarle que ahora vamos a comer, ponerle su “ropa de comer”, babero, pintorcito o lo que sea, sentarlo y limpiarle las manos con un trapo húmedo. Hay bebes para los cuales el babero es un obstáculo: no hace falta ponérselo si es así.

3

Explicarle. Tu bebé entiende. Tal vez no las palabras, pero sí entiende tu tono de voz y gestos. Decirle: “Ahora, Robertito, vamos a comer” no está de más.

4

Integrar al bebé a la mesa familiar.

Muy bien, ya hice todo eso... ¿y ahora? ¿Qué le doy?

Durante décadas los pediatras hemos sugerido comenzar la alimentación complementaria con preparados triturados o pisados. Lo seguimos haciendo, y no está mal exactamente. Sin embargo, hace unos años empezó a hacerse conocida la “movida” BLW o Baby Led Weaning/BLISS (Baby Introduction to Solids), o “darle comida al bebé para que la autogestione”

La idea es ofrecerle al bebé lo mismo que se come en la mesa familiar (exceptuando preparaciones con miel y otros ingredientes que detallaremos al final). **Colocarle la comida al alcance de sus manitos y que, con las mismas, experimente.** Sin necesidad de cucharas, platos, preparaciones especiales y otras cuestiones.

Calendario orientativo de incorporación de alimentos

Alimento	0-6 meses	6-12 meses	12-24 meses	> 2 años
Leche materna				
Fórmulas adaptadas (en caso de no estar con LM)				
Cereales, frutas, hortalizas, legumbres, huevo, carne, pollo, pescado, aceite de oliva				
Leche entera, yogur, queso tierno (pueden ofrecerse en pequeñas cantidades a partir de los 9 o 10 meses)				
Sólidos con riesgo de atragantamiento (frutos secos enteros, manzanas o zanahoria cruda, etc.)				Por encima de los 3 años
Alimentos superfluos (azúcares, miel, cacao, bollería, galletas, embutidos y charcutería)	Cuanto más tarde y en menor cantidad mejor (siempre a partir de los 12 meses)			

Siendo así, tu bebe puede comer, **ADAPTADO** y desde el inicio de la alimentación complementaria:



FRUTAS, TODAS:

naranja, manzana, banana, mandarina, frutilla, pera, durazno, damasco, etcétera.



VERDURAS, TODAS:

palta, brócoli, zapallo, zapallito, papa, batata, zanahoria, tomate, cebolla, espárragos, etc, EXCEPTO acelga, espinaca y remolacha, las cuales si se las damos, no deben superar el 20% del plato.



HUEVO

clara y yema.



LEGUMBRES

también todas, siempre adaptadas: lentejas, garbanzos, porotos, etc.



CEREALES Y

PSEUDOCEREALES, todos: trigo, avena, mijo, centeno, quinoa, arroz, etc.



FRUTOS SECOS:

maní, nueces, almendras, girasol... (NUNCA ENTEROS, en harinas o cremas)



DIVERSOS TIPOS DE

HARINAS: algarroba, cebada, centeno, arroz, trigo integral, etc.



Si la familia consume derivados animales:
CARNE DE VACA, DE CERDO, DE POLLO
O DE PESCADO (pescados sugeribles: pollo de mar, gallo de mar, gatucho).



HONGOS

comestibles: champignones, gírgolas, etc.



GRASAS SALUDABLES: aceite de oliva, aceite de girasol prensado en frío, aceite de coco, palta, frutos secos adaptados (ver mas adelante)



Pueden consumir preparaciones (muffins, tortillas, panqueques, etc) una vez que hayan probado por separado los ingredientes.



AGUA

¿Qué no deberíamos ofrecerle a un bebé?



MIEL hasta los dos años (bibliográficamente, se sugiere no ofrecer hasta el año por riesgo de botulismo. El extenderlo hasta los dos años es una apreciación personal.)



EMBUTIDOS (salchichas, jamón, etc.), por su alto contenido de colorantes, conservantes, sal y demases.



AZÚCAR agregado.



SAL agregada.



CARNE PICADA hasta mínimo los 5 años, por riesgo de Síndrome Urémico Hemolítico. Elegir un trozo y que lo pique delante nuestro es lo mismo, y picarla cruda en casa es lo mismo. No se recomienda.



POSTRECITOS industrializados.



LECHE DE VACA no se sugiere incorporar hasta el año de vida, luego puede consumir leche entera.



Alimentos que puedan aspirarse e ir fácilmente a la vía aérea (maní, tutuca, garrapiñada, pipas de girasol).



GALLETITAS INDUSTRIALES, puflitos, snacks.



GASEOSAS, JUGOS INDUSTRIALES, JUGOS DE SOJA INDUSTRIALES.



Los JUGOS EXPRIMIDOS tampoco se aconsejan. Cuentan con el azúcar de la fruta pero no con la fibra, y con menos nutrientes que el trozo entero. Si los ofrecemos, es esporádico y como golosina.



TÉ DE "YUYOS": anís estrellado, payco, boldo, manzanilla, etc. No se recomienda en niños por alto riesgo de toxicidad.


¿Y cómo se lo doy?

La idea es que **el bebé pueda agarrar el trozo de comida** y que esta **sobresalga de su manito**, y que la explore y experimente. Algunos bebés van a llevárselo a la boca enseguida y masticarlo (si, aún sin dientes). Otros no lo tocarán. Y otros lo aplastarán felices sobre la mesa y nada más.

Se sugiere comida del largo del dedo meñique del adulto, de alrededor de 5 cm de largo.

Siempre retirar las semillas duras (las de las manzanas, mandarinas...las semillas del tomate, del kiwi y de la frutilla no hacen falta sacar).


Algunos ejemplos:



Batata, papa y zanahoria al vapor.



Huevo



Hummus de garbanzos

Ejemplos:

- Vegetales al vapor cortados a lo largo (zapallo – zanahoria – zapallito)
- Arbolitos de brócoli´
- Cuando ya hacen pinza, se pueden cortar las uvas, o el tomate cherry a lo largo y ofrecerlos de esa manera.
- Los alimentos “duros” (manzana) se pueden hacer asadas o al vapor para que los bebés no tengan posibilidad de “morder” un pedacito y atragantarse sino que los desmenucen.
- Las legumbres como pasta, hummus, o en harinas.

El alimento se tiene que desmenuzar cuando lo aplastamos entre dos dedos. La forma de ofrecer en un inicio los alimento en BLW, y que me perdonen los fundamentalistas, no es más que presentar puré en barritas.



Textura adecuada para iniciar BLW

¿Y todo eso que pusiste en la “lista”, como harinas, frutos secos, legumbres...?

Se pueden ofrecer en preparaciones estilo hamburguesas de lentejas, muffins de calabaza, panquequitos, galletitas caseras de avena, barritas de polenta, fideos con salsa de tomate natural, crema de maní, pan, galletitas caseras. También como postrecitos caseros. Ejemplo: leche materna o leche de fórmula + fécula de maíz + esencia de vainilla + algún puré de frutas (todo eso se cocina, se deja enfriar, ¡y magia!)

¿Cómo ofrezco carne? ¡No tiene dientes!

Los bebés no necesitan dientes para empezar a comer. Van a deshacer todo (lo que tengan ganas) con sus encías. Para ayudarlos, la carne se corta en contra de sus vetas. Las vetas son las “rayitas” que tiene la carne. Cortamos de tal manera que las vetas queden una arriba de otra y no a lo largo, lo que le permite al bebé arrancar pedacitos más fácil. Otra opción es ofrecer la carne desmenuzada. Otra, usar algo como “acarradeador” de la carne: por ejemplo, un puré.



¿Cuán grande es la porción que debo darle? ¿Un plato? ¿Medio plato? ¿Cuánto debería comer para que esté “bien”?

Ahí está la magia de este asunto. ¿Alguna vez pudiste decidir en tu infancia cuánto comer del plato? Generalmente, las comidas se acompañaban de frases como "hasta que no terminas el plato no te levantas".

Esto, junto al auge de productos ultraprocesados, creó vínculos muy insanos con la comida, tales que sufrimos una enorme epidemia de obesidad y de trastornos de la alimentación que se cobra vidas todos los días.

La idea es que el bebé elija la cantidad que desea comer. Que si un día se come una palta entera, un huevo y tres fideos, esté perfecto; y que si otro día decide solamente tomar teta y un bocadito de zanahoria, también esté bien.

Su cuerpito sabe qué nutrientes necesita.

El BLW consiste en dejar explorar, y permitir decidir, no “qué vamos a comer”, dado que eso es patrimonio del adulto (quién selecciona los alimentos buscando una buena nutrición), sino “cuánta hambre tengo hoy”.

CANTIDADES



¿Qué son los productos ultraprocesados?

Son **productos creados por la industria, con ingredientes muy baratos y altamente adictivos**, que suelen incluir importantes resaltadores del sabor y varios tipos de azúcares. Suelen ser fáciles de adquirir y tener una publicidad impactante, y se nos hace difícil abstraernos de ellos. Nutren poco, siendo generosos, y dañan mucho. En este grupo de productos, hay un subgrupo de ultraprocesados para bebés: los cereales en caja tipo Nestum, las papillitas en frasquito, las galletitas, los yogures “primeros sabores”. **Ningún bebé necesita eso.** Cuidemos su salud, y también, por que no, nuestro bolsillo, dado que nada de eso es económico.



¿Cuántas veces al día le doy de comer?

Como la idea es incorporar al bebé a la mesa, podés presentarle todas las comidas. Ahora, tal vez prefieras empezar de a una. **No hay una regla.** Importa que cada familia se sienta cómoda.

Adjuntamos un pdf con “ideas” para el inicio de la alimentación complementaria.

Ok, ya entendí qué es el BLW. ¿Y el BLISS?

Empezar a dar de comer a los 6 meses (antes se daba a los 2, 3, 4...) parte de estudios científicos variados de años. Parecidos a los que están haciendo con el BLW.

¿Cuáles son los grandes problemas del BLW?

Que si la familia no cambia sus hábitos poco saludables y el bebé se incorpora a la mesa familiar con las comidas familiares, estará en riesgo de no recibir los nutrientes adecuados, sobre todo el hierro.

¿Qué propone el BLISS?

Asegurarse que cada comida que se le presente al niño (no, probablemente no la coma toda, hay que presentársela) tenga:

- **Un alimento rico en hierro**
- **Un alimento rico en energía**
- **Una fruta o verdura**

Es decir, un plato balanceado.



Tomate, huevo en omelette, palta y naranja



Pera, batata, pollo

Alimentos ricos en hierro



CARNES



LEGUMBRES



CEREALES



SEMILLAS



FRUTOS
SECOS



BRÓCOLI /
KALE

Grasas saludables



ACEITE DE OLIVA



PESCADO



PALTA



SEMILLAS DE LINO
Y CHÍA



MANTEQUILLA
DE MANÍ



NUECES

¿Y qué pasa si no come a la hora de la comida y me pide comida dos horas después?

Primero de todo, no reemplazar esa hambre por productos de picoteo (galletitas, el gran drama), sino volverle a ofrecer lo que sobró de la comida o un equivalente. Sí, estoy diciendo que **podés ofrecerle un arbolito de brócoli y un pedazo de pechuga de pollo a las 4 de la tarde**. No pasa nada. Va a ser más sano que darle una vainilla.

¿Pero si no come, va a estar bien nutrido?

Sí, porque **hasta el año los bebés son lactantes**. La leche los provee gran parte de los nutrientes necesarios. Y seguirán yendo al pediatra para evaluar cómo está creciendo, así que no hay riesgo.

¿Puedo hacerle puré?

Por supuesto, si toda la familia come puré... ¡adelante todos con el puré!

Gracias doctora por la información, pero yo prefiero darle los alimentos hechos puré.

¡Perfecto! Lo importante es contar con toda la información para poder decidir. Lo ideal es que no sea una pasta de cosas mezcladas, sino que se presenten por separado, que conserven **texturas** y que esas texturas se vayan volviendo cada vez mas sólidas a medida que pasan los meses.

¿Y las alergias?

Durante muchos años se planteó incorporar los alimentos de a uno y retrasar algunos alimentos como el huevo por el riesgo de alergias. Actualmente ese concepto está en desuso. **Se pueden incorporar la mayoría de los alimentos que consumimos a diario sin riesgo**, con algunas excepciones detalladas al final.

Los **frutos rojos**, como las frutillas y cerezas, consumidas en gran cantidad, pueden causar un **leve enrojecimiento o picazón alrededor de la boca**, que no es una alergia sino una respuesta a un componente de dichos frutos (la histamina). **SÍ, los frutos rojos se pueden introducir desde el inicio de la alimentación complementaria sin problemas.**

Cabe aclarar que estas recomendaciones son para la población en general, y que luego habrá que evaluar cada caso en particular.

ALIMENTOS ALERGÉNICOS



HUEVO



PESCADO



FRUTILLA



MANÍ

¿Y la “regla de los 3 días”?

En mucha bibliografía figura la sugerencia de ofrecer en 3 comidas consecutivas o 3 días seguidos un mismo alimento “nuevo”, a veces acompañado de otro que ya sabemos que tolera, para evaluar alergias e intolerancias.

Esta recomendación puede no seguirse a rajatabla, aunque yo sugiero, sí, seguirla para la introducción de **huevo, que es la segunda alergia alimentaria más común** después de la Alergia a la proteína de leche de vaca (APLV).

También sugiero **presentar huevo durante el día** y no durante la noche, donde es más difícil ubicar o concurrir a un servicio médico en caso de alergia que lo requiera.

¿Y el gluten?

Según la Guía de Práctica Clínica sobre Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Celíaca, desarrollada por el Ministerio de Salud en 2017, no se retrasa la introducción del gluten en ninguna persona, tampoco en parientes de personas con celiacía. Retrasar su introducción generaría mayor intolerancia, y **se sugiere presentar alimentos con trigo, avena, cebada y centeno a partir de los 6 meses.**

No come NADA. Le di manzana, banana, palta, zapallito y hasta yogur (noooo) y no lo quiere probar. Lo escupe. No le interesa.

Las papilas gustativas del bebé están en desarrollo. Uno no espera que un bebé de 3 meses camine, ¿no? Tampoco podemos esperar que un bebé que está empezando a comer acepte todo pues su lengua y su sistema de deglución se está desarrollando también y cada sabor es una novedad.

La neofobia es la resistencia de los niños pequeños a probar nuevos alimentos o incluso rechazar aquellos que antes aceptaban con naturalidad. Es normal y es parte del crecimiento.

Se dice que un niño se tiene que exponer de 15 a 20 veces a un mismo alimento para terminar de aceptarlo. **Lo importante es ofrecer sin forzar ni obligar.**

También tiene que ver con cuestiones culturales. Si yo QUIERO que mi hijo coma palta pero en mi vida comí una palta porque no me gustan y nunca fueron parte de la dieta familiar..es poco probable que las vaya a aceptar.

¿Y si se ahoga?

Se están haciendo estudios acerca de cuáles bebés se “ahogan” más, si aquellos que comen solo papillas o los que comen trocitos. Por el momento, se sabe que los que hacen BLW tienen un mejor manejo de los alimentos dado que se acostumbran a autogestionarlos y no se les mete comida en la boca a la fuerza.

El cuerpo responde rápidamente a un alimento que va a la vía aérea, mediante la tos o la arcada. Esto es normal y natural, y no es necesario intervenir. Lo más probable es que el niño tosa una o dos veces, se ponga rojo, uno se asuste mucho, y a los 10 segundos gestione ese trocito y siga jugando como si nada.

¿Cuándo nos asustamos?

Cuando no hay tos, no hay respiración ni sonido. Eso es un ahogo y puede ocurrir con cualquier tipo de alimentación.

¿Cómo prevenimos?

No damos pedazos pequeños ni partículas que puedan ir fácil a la vía aérea (maní, pochoclo).

Siempre es útil hacer un curso de primeros auxilios donde nos enseñen la maniobra de Heimlich. Ojalá nunca la usemos, pero los niños son exploradores natos, y la primera exploración siempre es con la boca. Es más probable que se atragante con tierra que comió del jardín que con la comida.

El cuerpo de tu hijo es sabio y está listo para comer. Confiá en él.

Maniobra de desobstrucción en lactantes (maniobra de Heimlich)



Hay que tener en cuenta a la hora de realizar las maniobras de desobstrucción el peso del niño. Por este motivo es muy importante utilizar las piernas como sostén cuando sujetamos al lactante y no hacerlo “en el aire”.

1. Observar la boca del bebé. Si el objeto se observa fácilmente y se puede extraer, hacerlo. Si está en el fondo de la garganta o no se visualiza, no intentar sacarlo por el riesgo de empujarlo más adentro en la vía aérea y empeorar la situación.
2. Tomar al lactante con un brazo y colocarlo boca abajo.
3. Sentarse y apoyarlo sobre la pierna del mismo lado, que estará levemente estirada y hacia abajo.
4. El rostro debe ser tomado sosteniendo el mentón, con cuidado de no presionar los ojos ni el cuello.
5. Realizar 5 golpes secos y moderadamente fuertes entre ambos omóplatos.
La alimentación complementaria
6. Si no escupe el cuerpo extraño, girar al bebé boca arriba sobre el otro brazo y realizar presión torácica con dos dedos en el medio del tórax (sobre el esternón a la altura de las tetillas). Hacer 5 compresiones.

Esta secuencia (5 golpes boca abajo, 5 compresiones boca arriba) se debe repetir hasta que se expulse el cuerpo extraño o que el bebé pierda la conciencia. De suceder esto, es necesario comenzar maniobras de RCP.

Texto e imagen extraídos de Critzmann, S. Hoy no es siempre. Guía pediátrica para una crianza respetuosa. Editorial Planeta, Buenos Aires, 2019



Sabrina Critzmann
Médica Pediatra

TIPS ÚTILES

Se aconseja acompañar el consumo de alimentos fuente de hierro con alimentos fuente de vitamina C: cítricos (siempre mejor la fruta entera, no el jugo) como naranja, pomelo, limón, mandarina, tomate, frutillas, morrón, kiwi.



Las leches vegetales no son “leches”. Son un tipo de jugos. Tienen diversas propiedades nutricionales (sobre todo la de almendras), si son caseras. Las industriales suelen tener alto contenido de azúcares agregados. Se puede “dar a probar” o cocinar con ellas desde el inicio de la alimentación complementaria, pero como si fueran un jugo más.



Sabrina Critzmann
Médica Pediatra

TIPS ÚTILES

La soja es un disruptor endócrino, es decir, en cantidades excesivas puede actuar sobre los receptores de algunas hormonas y producir cambios, por ejemplo, en los caracteres sexuales secundarios (aparición temprana de tejido mamario, entre otros).

El problema no son los porotos de soja ni las barritas de tofu, es el altísimo contenido de soja utilizado para “estirar” productos ultraprocesados como las salchichas, hamburguesas, “patitas de pollo”, las famosas milanesas de sojas...

Si evitamos los ultraprocesados, podemos ofrecer tanto preparaciones con tofu o con brotes o porotos de soja sin problemas si son parte esporádica de la alimentación.

TIPS ÚTILES

Las infusiones (té, café, mate) y el cacao tienen xantinas, compuestos que estimulan al sistema nervioso central y tienen cierto efecto diurético. Interfieren en la absorción del hierro (por eso “tomarse un cafecito” después de la comida no es para nada beneficioso en ese sentido).

Muchas familias consultan acerca de darles a probar mate, por una cuestión cultural, y sí, se puede! La cantidad que ingieran seguramente sea mínima.

Lo sugerible es no fomentar el consumo de infusiones (menos antes de dormir).

Se puede tomar té, café y mate amamantando, habría que tomar litros y litros y litros (de acuerdo con la composición corporal de cada madre) para ver algún efecto en el bebé.

El cacao amargo se puede usar en preparaciones sin problemas desde el inicio de la alimentación complementaria. Si deseamos ofrecer chocolate, lo ideal es racionalizarlo, que sea sin azúcar y con alto contenido de cacao (algo bastante difícil de encontrar en un kiosco).



Sabrina Critzmann
Médica Pediatra

La alimentación del niño es la alimentación de la familia. Será muy difícil que un niño coma sano si su familia no tiene esa costumbre. Los adultos arrastramos hábitos insanos de años, pero la llegada de un nuevo integrante a la familia a veces es una chance de cambiar. Servirá de poco que un bebé coma bien en su primer año de vida y que luego nos relajemos y volvamos la gaseosa a la mesa familiar.

¡A disfrutar!



Sabrina Critzmann
Médica Pediatra

*Queda prohibida la copia, reproducción total o parcial, alteración y/o
distribución de este documento sin la autorización previa del
propietario de los derechos Sabrina Critzmann.*

www.sabrinapediatra.com