

GUÍA RÁPIDA PARA URGENCIAS EN CASA

¡GUARDALO EN EL BOTIQUÍN!

Esta guía es un resumen. Recordá mirar el curso completo.

SITUACIÓN	QUÉ PASOS HACER	CUÁNDO IR A LA GUARDIA/ LLAMAR AL 911
Golpe en la cabeza	Mantener la calma. Revisar cómo fue el golpe. Acostar o sentar al niño tranquilo. Colocar un paño frío o hielo envuelto en tela sobre la zona golpeada durante 10–15 minutos. Vigilarlo de cerca.	Si pierde el conocimiento, vomita varias veces, está muy somnoliento, convulsiona, sangra por nariz/oídos, cambia su conducta o su forma de hablar/moverse, cayó desde más del doble de su altura o tiene menos de 1 año y el golpe fue fuerte.
Herida con sangrado	Lavar las manos. Presionar firme con una gasa o toalla limpia durante 5–10 minutos sin levantarla. Elevar la zona sangrante. Una vez controlado, lavar con agua y jabón. Cubrir con gasa limpia.	Si el sangrado no se detiene en 15 minutos, la herida es profunda, hay objetos clavados, sangra por boca/orina/heces/vómito, o el niño se pone pálido o pierde el conocimiento.
Sangrado de nariz	Sentar al niño, inclinar la cabeza levemente hacia adelante. Comprimir la nariz con los dedos durante 10 minutos seguidos. ✗ No recostar ni inclinar la cabeza hacia atrás.	Si no se detiene en 15 minutos, si se repite con frecuencia o el sangrado es muy abundante.

SITUACIÓN	QUÉ PASOS HACER	CUÁNDO IR A LA GUARDIA/ LLAMAR AL 911
Fractura (sospecha o confirmada)	Mantener la calma y contener al niño. No enderezar el hueso. Inmovilizar con una férula casera (cartón, regla, toalla). Colocar frío local envuelto en tela durante 15–20 minutos. No permitir que apoye o camine si es en pierna o pie.	Siempre consultar. Si el hueso asoma por la piel, cubrir con gasa limpia sin apretar y acudir urgente al hospital.
Quemadura	Alejar al niño de la fuente de calor. Enfriar de inmediato la zona con agua corriente (no helada) durante 10–15 minutos. Retirar ropa si no está pegada. Cubrir con film. ✗ No aplicar manteca, aceite ni pasta dental.	Si la quemadura es extensa, profunda, afecta cara, manos, pies, genitales o articulaciones, o si el niño tiene menos de 1 año.
Electrocución	No tocar al niño si sigue conectado a la corriente. Cortar la electricidad. Separarlo solo con un objeto de madera o plástico si no se puede co. Revisar si respira y está consciente. Cubrir quemaduras con un paño limpio y seco.	Siempre llevar a hospital, aunque parezca estar bien. Si no respira, llamar al 911 e iniciar RCP.
Picadura de insecto	Retirar el aguijón con una tarjeta, por arrastre inverso al mecanismo de ingreso. Lavar con agua y jabón. Aplicar frío en la zona. Si pica mucho, se puede dar el antihistamínico indicado por el médico.	Si tiene dificultad para respirar, hinchazón en cara/cuello, ronchas en todo el cuerpo o antecedentes de alergia grave.

SITUACIÓN	QUÉ PASOS HACER	CUÁNDO IR A LA GUARDIA/ LLAMAR AL 911
Mordedura de animal	Lavar de inmediato la herida con abundante agua y jabón durante varios minutos. Detener el sangrado con gasa limpia. Cubrir suavemente sin apretar.	Siempre consultar si la piel se rompió, si la mordedura fue en cara/manos/pies/genitales, si el animal es desconocido/no vacunado o el niño no tiene vacunas al día.
Broncoespasmo	Colocar al niño sentado semi-erguido. Darle el broncodilatador indicado (ej. Salbutamol con aerocámara). Tranquilizarlo y observar cómo respira.	Si no mejora con el tratamiento, si los labios o uñas se ponen morados, o si no puede hablar o caminar sin agitarse.
Croup (tos perruna)	Mantener al niño erguido. Hacer vapor en el baño o salir al aire fresco. Ofrecer líquidos solo si puede tragar sin dificultad.	Consultar urgente si tiene dificultad para respirar, coloración morada o un ruido fuerte al respirar (estridor) incluso en reposo.
Pérdida de conocimiento (desmayo)	Acostar al niño boca arriba y elevarle las piernas. Aflojarle la ropa. No darle agua ni sacudirlo. Revisar respiración.	Consultar si fue la primera vez, ocurrió durante ejercicio, duró más de 2 minutos o se acompañó de convulsiones.
Convulsiones	Acostar al niño de lado para que no se ahogue con saliva o vómito. No meter nada en su boca. No sujetar los movimientos. Anotar cuánto dura la convulsión.	Consultar urgente si dura más de 5 minutos, si es la primera vez, si no respira bien o si no despierta después.
Intoxicación	Retirar al niño del contacto con la sustancia. No inducir el vómito ni dar agua/leche. Identificar qué tomó y llevar el envase al hospital.	Siempre acudir. Llamar al Centro de Toxicología.

SITUACIÓN	QUÉ PASOS HACER	CUÁNDO IR A LA GUARDIA/ LLAMAR AL 911
Monóxido de carbono (CO)	Ventilar abriendo puertas y ventanas. Apagar estufas y calefones. Sacar a todos al aire libre.	Siempre consultar urgente. Sospechar si hay dolor de cabeza, mareos, vómitos, somnolencia o convulsiones.
SUH (Síndrome Urémico Hemolítico)	Sospechar si hay diarrea con sangre, vómitos, palidez o poca orina. Mantener hidratación y acudir al hospital.	Consultar de inmediato, es una urgencia.
Reacción alérgica	Retirar el alérgeno si se identifica. Lavar la zona. Aplicar frío local. Dar antihistamínico solo si está indicado por su médico.	Consultar urgente si hay dificultad para respirar, hinchazón en labios o cara, vómitos intensos o pérdida de conciencia.
Dolor de pecho	Mantener al niño en reposo. Si parece muscular, se puede aplicar calor local.	Consultar urgente si se acompaña de palpitaciones, desmayo, dificultad respiratoria o hay antecedentes cardíacos en la familia.
Incendio / humo	Evacuar la casa inmediatamente. Gatear si hay humo. Cubrir nariz y boca con un paño húmedo.	Consultar si presenta tos ya
Atragantamiento	- Menores de 1 año: alternar 5 golpes en la espalda con 5 compresiones en el pecho. - Mayores de 1 año: hacer maniobra de Heimlich (compresiones abdominales).	Siempre llevar al hospital aunque expulse el objeto, para verificar que no haya quedado nada en vías respiratorias.