

RESUMEN DEL WORKSHOP ONLINE

SENTANDO BASES SALUDABLES DE SUEÑO DESDE UN INICIO

Bebés 0 a 4 meses

Lucila Pistiner

CONSULTORA EN SUEÑO INFANTIL

Todos los derechos de este material se encuentran reservados. Prohibida su reproducción, distribución o transmisión, total o parcial, sin la previa autorización de Lucila Pistiner.



IMPORTANCIA DE DORMIR EN LOS NIÑOS:

El sueño es una necesidad fisiológica y vital para el crecimiento y desarrollo de tu bebé.

- Mientras tu bebé duerme se recarga la batería del cerebro y del cuerpo y se segrega hormona de crecimiento.
- El sueño ayuda a procesar y a consolidar la memoria y los nuevos aprendizajes.
- Estudios demostraron que niños más descansados previenen la depresión materna.
- Los niños que descansan lo suficiente tienen un sistema inmune más fuerte.
- Investigaciones determinaron que los niños en edad preescolar que no duermen la cantidad de horas suficientes, tienen el doble de predisposición a padecer trastornos de déficit de atención y conductas agresivas.

OBJETIVOS DEL TALLER:

- 1- Sueño seguro
 - 2- Identificar cambios biológicos en tu bebé. (Expectativas realistas)
 - 3- No saltees siestas: Reconocer signos de cansancio
 - 4- Evitar sobreestimulación
 - 5- Calmar un bebé con llanto inconsolable
 - 6- Cómo sentar bases de sueño
 - 7- Organizarte en una rutina diaria flexible
 - 8- Mejorar su sueño nocturno
- Que disfrutes esta etapa!

Lucila Pistiner





1- SUEÑO SEGURO

Recomendaciones

- Acostá a tu bebé boca arriba sobre su espalda
- En la cuna sólo una sábana ajustable (no mantas, peluches, nidito, protectores de cuna).
- Vestilo con ropa liviana, sin gorros ni baberos.
- Habitación ventilada y fresca
- Ofrecele chupete
- Lactancia materna
- Habitación compartida por lo menos primeros 6 meses
- No dormirlo en huevito, sillita mecedora (supervisararlo en caso que se haya dormido).

COLECHO SEGURO

Pautas de Unicef

Importante: cuando no dormir con tu bebé

Fumar aumenta el riesgo de muerte en la cuna. Deberías asegurarte de que no te quedas dormido con tu bebé en tu cama si tú (o cualquier persona en la cama) eres fumadora, incluso si nunca fumas en la cama.

Nunca te duermas con tu bebé en un sofá o butaca.

Quedarse dormido con tu bebé también es peligroso si tú o cualquier persona en la cama no podéis responder por el bebé. Por ejemplo si:

- has bebido alcohol
- has tomado alguna droga (legal o ilegal) que pueda provocarte somnolencia
- tienes alguna enfermedad o condición que afecte a tu conciencia para con el bebé
- estás cansado/a de manera inusual hasta el punto de que te sería difícil responder ante tu bebé


También es más seguro no compartir cama con tu bebé si ha sido prematuro, o pequeño aunque haya nacido a término, o si tiene fiebre alta.

- Colchón firme.
- Asegurarse que tu bebé no quede atrapado entre el colchón y la pared y no se caiga de la cama.
- Habitación fresca.
- No sobreabrigar.
- No cubrir al bebé con mantas.
- Ubicar al bebé al costado de uno de los padres, no en el medio.

Lucila Pistiner

QUE ESPERAR DE SU SUEÑO- EXPECTATIVAS REALES

2- CAMBIOS BIOLOGICOS DE TU BEBÉ HASTA LOS 4 MESES



Utilizar la FECHA PROBABLE DE PARTO si nació antes de la semana 37


Ej: Si tu bebé nació 4 semanas antes de la FPP (nació en semana 36) , entonces restale 4 semanas a su edad para cambios biológicos, hitos de desarrollo, ventanas de sueño.

Lucila Pistiner

CÓMO ES EL SUEÑO DE UN BEBÉ MENOR A 4 MESES?

- PATRONES DE SUEÑO IRREGULARES
- RITMO CIRCADIANO NO DESARROLLADO
- BIFÁSICO: 2 FASES DE SUEÑO + INDETERMINADO

ACTIVO (superficial o ligero): sonrisas reflejo, reflejo succión, fruncen frente, respiración irregular, lloran, abren los ojos.



PASIVO (tranquilo): ritmo de respiración regular, pocos movimientos musculares. Difícil de despertar.

1 CICLO DE SUEÑO= 50 A 60min

LOS BEBES TIENEN MAS PROPORCIÓN DE SUEÑO ACTIVO QUE LOS ADULTOS

PRIMERAS 6/8 SEMANAS

- Sueño desorganizado. Promedio 16 a 18 hs diarias de sueño.
- Varias siestas cortitas (4 o 5)
- Ventana de sueño: 45 min-1h aprox
- Primera semana muy adormilados
Luego cae abruptamente.
- Confusión día-noche
- Hora de dormir: alrededor de las 10 u 11 pm.

CONFUSIÓN DÍA-NOCHE A LAS 8 SEMANAS DE VIDA DESAPARECE

Mito: mantenerlo despierto para que duerma más de noche.

Qué hacer?

Noche: luz apagada-silencio-comidas simples-sin estímulo

De día: despertalo cada 3hs para comer.
Exponélo a la luz natural.

CONSEJOS PARA LAS PRIMERAS SEMANAS

- Pedí ayuda
- Si pensas dar el pecho, consolida la lactancia
- Ajustate a esta nueva vida, salí a caminar, respirá aire fresco.
- Dormí cuando el bebé duerma
- Tratá de no recibir muchas visitas, no estás en condiciones de atender a la gente y no es bueno exponer a tu bebé a los gérmenes. Es un momento único para que vos, tu pareja y tu bebé se conozcan.
- No preocuparse por crear hábitos
- Hacer lo que sea necesario para mantener descansado a tu bebé

6/8 SEMANAS

PRIMER HITO DE SUEÑO

COMIENZA A ORGANIZARSE EL SUEÑO NOCTURNO:

Podrían dormir 4 a 6 horas continuas

Señales:

- Sonrisa social
- Pico de irritabilidad (tarde-noche)
- Confusión día-noche comienza a desaparecer

Qué hacer:

- 1.5-2hs max despiertos
- Acostarlos poco a poco más temprano: entre 9 y 10 pm
- Siestas con oscuridad total

LA LUZ Y LA OSCURIDAD

COMO UTILIZARLAS A NUESTRO FAVOR?

HASTA LAS 6-8 SEMANAS

SIESTAS CON LUZ Y RUIDOS
NATURALES DE LA CASA.

DESPUES DE LAS 6-8 SEMANAS

SIESTAS EN OSCURIDAD TOTAL

- DE NOCHE: CERO ESTIMULACION. NO LUZ ARTIFICIAL.OSCURIDAD TOTAL.
- MOMENTOS DESPIERTOS: EXPONERLOS A LA LUZ NATURAL Y AIRE FRESCO.

12/16 SEMANAS APROX

SEGUNDO HITO DE SUEÑO

Se extiende el sueño nocturno.
Comienza a desarrollarse un patrón de siestas

- La duración de siestas todavía es inconsistente.
- Se consolida primero la siesta de la mañana
- 2-3 tomas nocturnas

Qué hacer?

Acostarlos más temprano: 8-8:30pm

Lucila Pistiner



3- NO SALTEAR SIESTAS. EVITAR SOBRECANSANCIO VENTANAS DE SUEÑO

¿Cuántas horas debería estar despierto tu bebé entre siestas?



0-4 semanas: 45-1 hora

4-8 semanas: 1- 1:30 hs

3-4 meses: 1:30-2 hs

5-6 meses: 2-2:30 hs

SEÑALES DE SUEÑO

IDENTIFICA CUÁNDO NECESITA DORMIR TU BEBÉ

ESTOY CANSADO	CEJAS COLORADAS	MIRADA FIJA	VOLTEA LA CABEZA	OJOS CANSADOS
NECESITO DORMIR YA	BOSTEZA	SE FROTA LOS OJOS	SE TIRA O RASCA LAS OREJAS	COMIENZA A ESTAR IRRITABLE
ESTOY SOBRECANSADO	ARQUEA ESPALDA	SE PONE RIGIDO	MUY IRRITABLE	LLANTO FUERTE

4- EVITAR LA SOBREENSTIMULACION

EL SUEÑO TAMBIÉN ES UN ESTADO DE PROTECCIÓN PARA LOS BEBÉS



- Cuida a tu bebé de no exponerlo a demasiados ruidos, personas, juguetes, demasiada actividad.
- No están neurológicamente preparados para codificar tanta información.
- El llanto y a continuación el sueño ocurren como una respuesta protectora (no es sueño reparador)

5- CALMAR A UN BEBÉ CON LLANTO INCONSOLABLE

Dr. Ronald Barr: “Llanto Morado”

- Comienza alrededor de las 2 semanas de edad, pico 6 semanas. Culmina a los 3-4 meses.
- Forma parte de una fase de desarrollo normal

CONSEJO:

Evitar sobreestimulación

Evitar sobrecansancio

Utilizar técnicas de relajación

Aceptá ayuda de amigos/familia



Lucila Pistiner

"PURPLE CRYING O LLANTO MORADO"

The Letters in **PURPLE** Stand for

P U R P L E

PEAK OF CRYING

Your baby may cry more each week, the most in month 2, then less in months 3-5

UNEXPECTED

Crying can come and go and you don't know why

RESISTS SOOTHING

Your baby may not stop crying no matter what you try

PAIN-LIKE FACE

A crying baby may look like they are in pain, even when they are not

LONG LASTING

Crying can last as much as 5 hours a day, or more

EVENING

Your baby may cry more in the late afternoon and evening

The word **Period** means that the crying has a beginning and an end.

Lucila Pistiner

Máximo de llanto – usualmente el llanto del niño llega a su nivel máximo alrededor de los 2 meses de edad y se reduce a los 3 o 4 meses de edad.

Opone consuelo – sus intentos de consolar a el bebe no siempre funcionan.

Repentino – el llanto puede ir y venir sin ninguna causa aparente

Aparenta doler – él bebe puede aparentar estar sintiendo dolor aun cuando no lo está

Duradero – el llanto puede durar en algunos casos 5 horas al día

Ocurre en la tarde – sucede más frecuentemente en las tardes

TEORIA DEL 4to TRIMESTRE PERDIDO

Dr. HARVEY KARP

- Los bebés cuando nacen no están preparados para nacer.
- Necesitan un trimestre más en la panza de la mamá para terminar su desarrollo.
- Si tenes un bebé cambiado, alimentado, sin frío, sin molestias físicas, en contacto con vos, y llora, ese llanto inconsolable se debería a esa necesidad y a su inmadurez neurológica.

CONSEJO:

Recrear un trimestre más, pero fuera de la panza de la mamá (imitando las mismas sensaciones) para activar el **REFLEJO DE CALMA** de los bebés..

Tu bebé necesita ser reconfortado, amamantado, abrazado y tener contacto piel a piel para reforzar su vínculo con vos.

PARA ACTIVAR EL REFLEJO DE CALMA:

TÉCNICA DE LAS 5 S

Para calmar a los bebés y prepararlos para dormir - de día y de noche

- 1- SWADDLE (CONTENERLO)
- 2- SIDE/STOMACH (DE COSTADO O BOCA ABAJO). NO PARA DORMIR
- 3- SHUSH (SHH SONIDO BLANCO)
- 4- SWAY (MOVIMIENTO SUAVE)
- 5- SUCH (SUCCIÓN)

Lucila Pistiner

PARA ACTIVAR EL REFLEJO DE CALMA:

TÉCNICA DE LAS 5 S

Para calmar a los bebés y prepararlos para dormir - de día y de noche
(mi versión)

- 1- C : CONTENERLO
- 2- A: ABAJO O DE COSTADO. NO PARA DORMIR
- 3- L: LA APLICACIÓN SHHH
- 4- M: MOVIMIENTO SUAVE
- 5- A: ACTIVAR LA SUCCIÓN

Lucila Pistiner

1- CONTENERLO

ENVOLVERLO APRETADITO: Hacerlo correctamete mirando un video confiable.

Este paso por sí solo no calma el llanto, es el primer paso



2- ABAJO O DE COSTADO

REDUCIR ESTIMULACIÓN. UNA VEZ DORMIDO BOCA ARRIBA



3- LA APLICACIÓN SHH

RUIDO BLANCO O SHUSHING

4-MOVIMIENTO SUAVE

NO es sacudir al bebé!

5- ACTIVAR LA SUCCIÓN

SUCCION NO NUTRITIVA

- Succionar los relaja, libera endorfinas
- Chupete reduce el riesgo del SMSL



Lucila Pistiner

FULAR

PARA CALMAR O DORMIR AL BEBÉ




- Los bebés que están más tiempo en contacto piel a piel con su mamá tienden a llorar menos.
- Libertad de movimiento
- Es importante utilizarlo correctamente (ver instructivo de cada modelo)

6- SENTAR BASES DE SUEÑO

A PARTIR DE LOS 2 MESES O DEL 1ER
HITO DEL SUEÑO

Empezar a trabajar sobre los
componentes del sueño para
crearle al bebé asociaciones que
sientan sus bases saludables del
sueño.



Evitamos “Crianza accidental”

ASOCIACIONES DE SUEÑO

1) ENVOLVERLO

- Envolverlo para dormir, siestas y noche.
- Calor y swadling: hay que vestir a tu bebé similar a vos. Body y swaddle. O pañal y swaddle.
- Como darte cuenta si tu bebe tiene calor? Le tocas la nuca, el pecho, la frente. Temperatura fresca en casa.
- Cuando terminar con el swaddling? 4 meses o cuando tu bebé esta consistentemente rolando de espalda a la panza.

Lucila Pistiner



ASOCIACIONES DE SUEÑO

2) AMBIENTE DE SUEÑO

a) LUGAR CONSISTENTE:

Intentar que el bebé haga aunque sea una vez al día una de sus siestas en la cuna, que asocie ese lugar con el sueño.

b) OSCURIDAD TOTAL:

- La luz y la oscuridad determinan las pautas de dormir o estar despierto.
- Oscuridad reduce estímulos y ayuda a la producción de melatonina.
- Tomas nocturnas: en oscuridad o si necesitas algo de luz para cambiarle el pañal usar luz muy tenue o comprar una lamparita de color rojo porque ese color (que es el color del atardecer) favorece la secreción de melatonina y relaja.

Dormitorio fresco y ventilado: 20 a 23 C

Lucila Pistiner



ASOCIACIONES DE SUEÑO

2) AMBIENTE DE SUEÑO

C) RUIDO BLANCO: ej. ventilador.

- Induce relajación y camufla sonidos de fondo
- Para las siestas y para la noche
- Encendido durante la totalidad de la siesta y de la noche.
- No música! Estimula el cerebro. Sólo para la rutina.
- Volumen SUAVE

3) RUTINA RELAJANTE

- Mismos pasos en el mismo orden para antes de dormir: relajar al bebé y calmarlo.
- Predictibilidad y seguridad a tu bebé.
- Para siestas: versión muy abreviada.

PRACTICAR TÉCNICAS DE AUTORELAJACIÓN

DARLE LA OPORTUNIDAD DE AUTORELAJARSE- desde las 8 semanas

Aclaración:

No es posible malcriar a un bebe recién nacido (o menor de 3 meses).

Dormir a tu bebe en brazos o en el fular no es contraproducente,
NO TENGAS MIEDO!

Pero si puedes no dejes de practicarlo.

- Practicar, al menos una vez al día (recomiendo primera siesta de la mañana), que tu bebé concilie el sueño solo.
- Acostar al bebé en un estado muy relajado, somnoliento, pero todavía despierto.
- Objetivo: acostarlo adormilado pero despierto, en un 7 de 10 en la escala.


Cómo acostarlo a dormir?

1. Le haces el swaddle
2. Le pones el chupete (si usa)
3. Sonido blanco
4. Lo relajas un poco con el movimiento de costado o sobre tus hombros hasta que sientas que se relaja su cuerpo.
5. La acostas, relajado pero despierto.
6. Esperas----PAUSA

PACIENCIA !

- Los bebés tardan alrededor de 20 minutos en conciliar el sueño, así que demosle la oportunidad de lograrlo solitos sin intervenir. Es prueba y error.
- Si llora relajalo una vez más en brazos, y vuelve a intentarlo. Es un ejercicio. Lo relajas y lo acostas casi dormido. Repetilo las veces que vos quieras.
- Si la siesta es muy corta (menos de 45 min), intentá extender su siesta en brazos.
- Si hoy no lo lograste, no importa! Dormilo en brazos o como prefieras. Mañana lo intentas nuevamente.

7- ORGANIZARTE EN UNA RUTINA DIARIA FLEXIBLE



NOTA: Las rutinas deben ser flexibles para adaptarse a las necesidades de cada bebé. Durante las primeras 2-3 semanas de vida de tu bebé es importante lograr consolidar tu producción de leche, siempre alimentalo a demanda sin horarios rígidos.

1- ALIMENTAR

¿Cómo darse cuenta si un bebé que toma pecho hace tomas completas?

- 1- Cantidad de tiempo que toma
- 2- Escuchas-ves como traga
- 3- El bebé sale del pecho cuando está satisfecho y queda relajado
- 4- Sentis que tus pechos están más blandos
- 4- Moja varios pañales por día
- 5- Puede hacer provechito

ADEMAS TU PEDIATRA TE INDICARA SI TU BEBE ESTA AUMENTANDO DE PESO CORRECTAMENTE.

Lucila Pistiner

- Un bebé descansado y en estado de alerta hará tomas más completas y eficientes que un bebé que toma con sueño.
- Mas estimulación para la producción de leche de la mamá.
- Hace que cada toma cuente!
- En las últimas hs antes de dormir es normal que el bebé pida más seguido.
- Luego de la última toma del día, el bebé te despierta para tomar (a menos indicación contraria pediatra). hará tomas más completas y eficientes que un bebé que toma con sueño.

“Picos de crecimiento”:

- Tu bebé tiene hambre más seguido que lo habitual .Necesita más calorías y (en el caso de lactancia) la leche materna cambia en su composición para adaptarse a las necesidades del bebé.
- Duran entre 1 y 4 días aprox.
- Alimentalo más frecuentemente que lo habitual, cuando te lo demande.

Momentos aproximados:

- **10 días después del nacimiento**
- **3 semanas**
- **6 semanas**
- **3 meses**
- **6 meses**

2- ACTIVIDAD

Cualquier actividad que lo estimule un rato (acorde a la edad):
OJO CON LA SOBREESTIMULACION

3- RUTINA RELAJANTE

- ENVOLVER
- LUGAR CONSISTENTE
- CANCION
- RELAJAR EN BRAZOS
(o dormirlo como quieras)

4- DORMIR

(TU TIEMPO)



- VENTANAS DE SUEÑO
- SEÑALES DE SUEÑO

- No puedes controlar la duración de las siestas, pero sí en qué momentos ofrecerlas y propiciar un ambiente favorecedor.
- Hasta los 5 meses las siestas tienen duración errática: 20 a 120 min.
- Si tu bebé hace una siesta de menos de 20 min te recomiendo intentar dormirlo nuevamente.

HORA DE DORMIR RECOMENDADA POR EDAD:

0-4 semanas: 10-11 pm

4-8 semanas: 9-10 pm

3-4 meses: 8-9 pm

5-6 meses: 7-8 pm

NOTA SOBRE ESTA RUTINA:

“SIEMPRE DESPERTA A UN BEBÉ EN EL DÍA”

- No más de 3 hs sin comer en el día (se cuenta desde el comienzo de la alimentación). A menos indicación contraria pediatra.
- Los bebés hacen un solo tramo largo de sueño en el día y lo que queremos es que ese tramo ocurra de noche!
- Cuando son tan chiquitos, y están comiendo tienden a relajarse y quedarse dormidos y por eso terminan comiendo menos de lo que necesitaban para completar tomas. Por eso mientras coma (de día) intentá que haga una toma bien completa.
- De día: Sacale el swaddle para comer, tocale los pies, despertalo.

RESUMEN DE ESTE PUNTO:

1. Repetir ciclos durante el día de: comer-actividad-dormir
2. Esta rutina se repite todo el día, excepto en la noche, que sólo es comer-dormir.
3. Ofrecéle comer cada 2-3 hs o siempre que tenga hambre.
4. Por la noche SI hacer último paso la toma de leche
5. Ofrecele una siesta cada 60-120 min aprox según edad (ver señales de sueño)
6. Practicá aunque sea 1 vez al día siesta en lugar donde duerme de noche. Otras aupa, en fular, cochecito...balance!
7. **No a la rigidez ! No te estreses si en momentos del día no podes seguir la rutina y se durmió con pecho! Disfrutalo!**

Lucila Pistiner

7- MEJORAR SU SUEÑO NOCTURNO

ESTIRAR TOMAS NOCTURNAS SEGÚN SU EDAD,
SU AUMENTO DE PESO Y EL OK DEL PEDIATRA

Lucila Pistiner

CONSULTORA EN SUEÑO INFANTIL



¿CÓMO MEJORAMOS EL SUEÑO NOCTURNO?

HACE LA PAUSA ! :

PARÁ, OBSERVÁ Y ESPERÁ

Asegurate que este realmente despierto antes de intervenir.

Fase activa del sueño: movimientos, respiración irregular, ruidos...

Si está despierto alimentalo

MÉTODO PARA AYUDAR A TU BEBE A VOLVERSE A DORMIR EN LA NOCHE CON LA MENOR INTERVENCION POSIBLE:

- 1) Pausa-espera-observa si realmente esta despierto
- 2) Aumentar un poquito el sonido del ruido blanco
- 3) Toca el pecho de tu bebé
- 4) Ponele el chupete si usa
- 5) Dormilo en brazos
- 6) Si llora: dale de comer

BONUS

"REGRESIÓN DEL CUARTO MES"

- Cambia el sueño de los bebés. Incorporan fases de sueño.
- Algunos bebés presentan un brote de crecimiento: más hambre que lo habitual. Dura 4-7 días, no es eterno.
- Nuevo hitos de desarrollo afectan sueño: rotar.

CONSEJOS:

- Asegurate que haga todas sus tomas diarias completas: el mundo es demasiado interesante y quiere descubrirlo (buscá un ambiente tranquilo y sin estímulos)
- Cuidá el ambiente para siestas.
- Adelantar hora de dormir : 1.30 a 2hs desde la última siesta.
- No dejes de practicar acostarlo somnoliento.
- Paciencia
- Intentá no alimentarlo más seguido que antes por la noche (excepto en el pico de crecimiento).

Lucila Pistiner



Aviso legal:

Queda expresamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos difundidos por Lucila Pistiner, consultora de sueño infantil, así como su uso comercial, venta, transferencia o distribución a terceros, o su modificación, inspección, copia y/o alteración, edición, reproducción, transmisión, adaptación, transferencia y/o comercialización de ninguna manera por parte de los usuarios. Todos los derechos de propiedad intelectual y su desarrollo pertenecen exclusivamente a Lucila Pistiner. Asimismo, todos los elementos, marcas e isologotipos utilizados con referencia a Lucila Pistiner, forman parte de la propiedad intelectual exclusiva de Lucila Pistiner.