

Modelo Estocástico con Retraso para la Dinámica Fenológica de Vegetación

Carlos Eduardo Chacón Rodríguez
Dr. Yofre Hernán García Gómez

Tabla de contenidos

Modelo Estocástico con Retraso para la Dinámica Fenológica de Vegetación	1
Fundamentos Matemáticos	3
Momentos y propiedades estadísticas	3
Esquema de Euler-Maruyama para SDDE	4
Representación alternativa en diferencias	5
Fundamentos Biológicos	7
Introducción	7
Formulación del Modelo Matemático	9
Modelo SDDE en tiempo continuo	9
Motivación y contexto teórico	9
Definición formal del modelo	9
Condiciones iniciales y espacio de fases	10
Propiedades matemáticas fundamentales	11
Interpretación biológica de los términos	11
Solución formal y representación integral	12
Consideraciones sobre la positividad del modelo	12
Discretización Numérica y Propiedades del Esquema	13
Motivación y contexto metodológico	13
(Aquí irá el código)	13
Análisis de convergencia	13
Error de truncamiento local	14
Implementación computacional	15
Consideraciones prácticas para $\Delta t = 1$ día	15
Formulación Estadística como Modelo de Regresión	16
Motivación y contexto estadístico	16
Modelo de regresión lineal derivado del SDDE	16

Notación matricial y vector de parámetros	17
Relación estructural con modelos AR(p)	17
Supuestos estadísticos del modelo	18
Estimación de parámetros por mínimos cuadrados ordinarios	19
Identificabilidad del modelo	19
Incorporación de variables exógenas climáticas	20
Diagnóstico de supuestos y validación del modelo	20
Identificabilidad y Estimación de Parámetros	21
Marco teórico de identificabilidad	21
Identificabilidad estructural del modelo SDDE	21
Identificabilidad práctica y condiciones de rango	22
Estimación por mínimos cuadrados ordinarios (OLS)	23
Estimación de la varianza del error	23
Relación con la intensidad del ruido estocástico	24
Diagnóstico de identificabilidad práctica	24
3.5. Diagnóstico Estadístico y Validación del Modelo	25
3.5.1. Marco teórico del diagnóstico de regresión	25
3.5.2. Supuestos del modelo y sus implicaciones	26
3.5.3. Métodos de diagnóstico gráfico	27
3.5.4. Pruebas estadísticas formales	27
3.5.5. Diagnóstico de multicolinealidad	28
3.5.6. Criterios de información para selección de modelos	28
3.5.7. Validación del modelo mediante comparación con <i>benchmarks</i>	29

Modelo Estocástico con Retraso para la Dinámica Fenológica de Vegetación

Modelización Matemática de la Dinámica Fenológica de Vegetación mediante Ecuaciones Diferenciales Estocásticas con Retraso: Aplicación al Índice de Verdor GCC en Rönnebydalen en Umeå, Suecia

Fundamentos Matemáticos

Existencia y unicidad de soluciones

Para garantizar la existencia y unicidad de soluciones a la SDDE (3.1), imponemos las siguientes condiciones estándar sobre los coeficientes (Mao, 2007):

Condición de Lipschitz global: Existe una constante $K > 0$ tal que para todo $x_1, x_2, y_1, y_2 \in \mathbb{R}$ y $t \geq 0$:

$$|\mu(t, x_1, y_1) - \mu(t, x_2, y_2)| + |\sigma(t, x_1) - \sigma(t, x_2)| \leq K(|x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|) \quad (3.4)$$

donde $\mu(t, x, y) = \alpha + \beta x + \gamma y + \delta^T \mathbf{C}(t)$ es la función de deriva y $\sigma(t, x) = \sigma x$ es la función de difusión.

Condición de crecimiento lineal: Existe una constante $C > 0$ tal que para todo $x, y \in \mathbb{R}$ y $t \geq 0$:

$$|\mu(t, x, y)|^2 + |\sigma(t, x)|^2 \leq C(1 + |x|^2 + |y|^2) \quad (3.5)$$

Teorema 3.1 (Existencia y unicidad). *Bajo las condiciones (3.4) y (3.5), y dado un historial inicial $\phi \in C([-\tau, 0], \mathbb{R}^+)$, existe una única solución global $X(t)$ para todo $t \geq 0$ que satisface la SDDE (3.1) y la condición inicial (3.2).*

Demostración: Ver (Mao, 2007), Teorema 6.2, o Anexo D para una demostración detallada adaptada a nuestro modelo específico.

Momentos y propiedades estadísticas

Aunque la solución exacta de la SDDE (3.1) no puede expresarse en forma cerrada debido al término de retraso, podemos derivar ecuaciones para sus momentos estadísticos. Tomando esperanza en ambos lados de 3 y utilizando que la esperanza de la integral de Itô es cero:

$$\mathbb{E}[X(t)] = X(0) + \int_0^t [\alpha + \beta \mathbb{E}[X(s)] + \gamma \mathbb{E}[X(s - \tau)] + \delta^T \mathbb{E}[\mathbf{C}(s)]] ds \quad (3.8)$$

Diferenciando respecto a t obtenemos una ecuación diferencial funcional determinista para la media:

$$\frac{d}{dt} \mathbb{E}[X(t)] = \alpha + \beta \mathbb{E}[X(t)] + \gamma \mathbb{E}[X(t - \tau)] + \delta^T \mathbb{E}[\mathbf{C}(t)] \quad (3.9)$$

Esta ecuación revela que la dinámica de la media del proceso estocástico sigue una DDE determinista con la misma estructura de retraso que el modelo original ([Mohammed, 1984](#)).

Esquema de Euler-Maruyama para SDDE

Consideremos la SDDE definida en la sección 3.1:

$$dX(t) = \mu(t, X(t), X(t - \tau)) dt + \sigma(t, X(t)) dW(t), \quad t \geq 0 \quad (3.1)$$

donde $\mu(t, x, y) = \alpha + \beta x + \gamma y + \delta^T \mathbf{C}(t)$ y $\sigma(t, x) = \sigma x$.

Para discretizar esta ecuación, particionamos el intervalo temporal $[0, T]$ en N subintervalos de igual longitud $\Delta t = T/N$, definiendo los puntos de malla $t_n = n\Delta t$ para $n = 0, 1, \dots, N$. Denotamos $X_n \approx X(t_n)$ como la aproximación numérica del proceso en el tiempo t_n .

El **esquema de Euler-Maruyama** para la SDDE (3.1) se define recursivamente como:

$$X_{n+1} = X_n + \mu(t_n, X_n, X_{n-k})\Delta t + \sigma(t_n, X_n)\Delta W_n$$

donde: - $k = \tau/\Delta t$ es el número de pasos de retraso (asumiendo que τ es múltiplo entero de Δt), - $\Delta W_n = W(t_{n+1}) - W(t_n) \sim \mathcal{N}(0, \Delta t)$ es el incremento del proceso de Wiener, - $X_{n-k} \approx X(t_n - \tau)$ es la aproximación del estado retardado.

Para nuestro modelo específico con $\mu(t, x, y) = \alpha + \beta x + \gamma y + \delta^T \mathbf{C}(t)$ y $\sigma(t, x) = \sigma x$, el esquema se particulariza como:

$$X_{n+1} = X_n + [\alpha + \beta X_n + \gamma X_{n-k} + \delta^T \mathbf{C}_n] \Delta t + \sigma X_n \Delta W_n \quad (3.10)$$

donde $\mathbf{C}_n = \mathbf{C}(t_n)$ representa el vector de forzantes climáticas en el tiempo discreto t_n .

Representación alternativa en diferencias

En aplicaciones prácticas con datos observados, es conveniente reorganizar la ecuación (3.10) en términos del diferencial discreto $\Delta X_n = X_{n+1} - X_n$:

$$\Delta X_n = \alpha \Delta t + \beta X_n \Delta t + \gamma X_{n-k} \Delta t + \delta^T \mathbf{C}_n \Delta t + \sigma X_n \Delta W_n \quad (3.11)$$

Esta formulación es particularmente útil para la estimación de parámetros mediante métodos de regresión, ya que permite expresar el cambio en el estado como una función lineal de las variables explicativas ([Shoji & Ozaki, 1998](#)).

Fundamentos Biológicos

Introducción

Formulación del Modelo Matemático

Modelo SDDE en tiempo continuo

Motivación y contexto teórico

Las ecuaciones diferenciales estocásticas con retraso (SDDE, por sus siglas en inglés) constituyen una extensión natural de las ecuaciones diferenciales estocásticas (SDE) clásicas, incorporando explícitamente la dependencia del pasado en la dinámica del sistema (Mao, 2007). Este tipo de modelos es particularmente relevante en sistemas biológicos donde los procesos fisiológicos presentan memoria temporal inherente, como es el caso de la fenología vegetal (Ogle et al., 2015).

La necesidad de incorporar términos de retraso en modelos matemáticos de sistemas dinámicos fue reconocida inicialmente por Volterra en el contexto de ecuaciones integro-diferenciales (Volterra, 1931). Sin embargo, fue con el desarrollo de la teoría de procesos estocásticos y el Cálculo de Itô que se estableció un marco riguroso para el análisis de SDDEs de parte de Kiyosi Itô visto en el artículo Itô (1951).

Definición formal del modelo

Consideremos un espacio de probabilidad filtrado $(\Omega, \mathcal{F}, \{\mathcal{F}_t\}_{t \geq 0}, \mathbb{P})$ que satisface las condiciones usuales de completitud y continuidad derecha (Revuz & Yor, 1999). Sea $W(t)$ un proceso de Wiener estándar (movimiento browniano) adaptado a la filtración $\{\mathcal{F}_t\}$.

El modelo propuesto para la dinámica del índice de verdor GCC se define mediante la siguiente ecuación diferencial estocástica con retraso:

$$dX(t) = \left[\alpha + \beta X(t) + \gamma X(t - \tau) + \delta^T \mathbf{C}(t) \right] dt + \sigma X(t) dW(t), \quad t \geq 0 \quad (1)$$

donde las variables y parámetros se definen en el contexto biológico de la siguiente manera:

- $X(t) \in \mathbb{R}^+$: Proceso estocástico del GCC, que representa la biomasa verde activa en el tiempo t .
- $\alpha \in \mathbb{R}$: Tasa de crecimiento basal, asociada al crecimiento intrínseco del sistema en ausencia de forzantes externos.
- $\beta \in \mathbb{R}$: Coeficiente de retroalimentación actual, el cual modela el efecto de autorregulación del crecimiento.
- $\gamma \in \mathbb{R}$: Coeficiente de retroalimentación retardada, que representa la memoria fisiológica del sistema, vinculada a la translocación de fotoasimilados.
- $\tau \in \mathbb{R}^+$: Tiempo de retraso, correspondiente al periodo característico de los procesos fisiológicos involucrados.
- $\mathbf{C}(t) \in \mathbb{R}^3$: Vector de forzantes climáticas, definido como $\mathbf{C}(t) = [\text{Rad}_t, \text{Temp}_t, \text{Prec}_t]^T$.
- $\delta \in \mathbb{R}^3$: Vector de sensibilidades climáticas, que cuantifica la respuesta del sistema ante variaciones en las variables climáticas.
- $\sigma \in \mathbb{R}^+$: Intensidad del ruido estocástico, que representa la variabilidad ambiental no explicada por el modelo determinista.
- $W(t) \in \mathbb{R}$: Proceso de Wiener estándar, utilizado para modelar el ruido blanco gaussiano que perturba el sistema.

Condiciones iniciales y espacio de fases

A diferencia de las SDEs clásicas, las SDDEs requieren una **función inicial** definida en un intervalo pasado, debido a la dependencia del término $X(t - \tau)$ (Mohamed, 1984). El problema de valor inicial se especifica como:

$$X(t) = \phi(t), \quad \forall t \in [-\tau, 0] \quad (2)$$

donde $\phi : [-\tau, 0] \rightarrow \mathbb{R}^+$ es una función continua y determinista que representa el historial del sistema antes del tiempo inicial $t = 0$.

El **espacio de fases** para una SDDE es infinito-dimensional, específicamente el espacio de Banach $C([-\tau, 0], \mathbb{R})$ de funciones continuas del intervalo $[-\tau, 0]$ en $\mathbb{R}$, equipado con la norma del supremo:

$$\|\phi\| = \sup_{\theta \in [-\tau, 0]} |\phi(\theta)| \quad (3.3)$$

Esta característica fundamental distingue a las SDDEs de las SDEs y tiene implicaciones profundas para el análisis de existencia, unicidad y estabilidad de soluciones (Mao, 2007).

Propiedades matemáticas fundamentales

Verificación para el modelo propuesto

Para nuestro modelo específico, verificamos las condiciones anteriores:

1. **Lipschitz:** La función $\mu(t, x, y) = \alpha + \beta x + \gamma y + \delta^T \mathbf{C}(t)$ es lineal en x e y , por lo tanto satisface la condición de Lipschitz con constante $K = \max(|\beta|, |\gamma|)$.
2. **Crecimiento lineal:** Dado que μ es lineal y $\sigma(t, x) = \sigma x$ también es lineal, ambas satisfacen trivialmente la condición de crecimiento lineal.

Por lo tanto, el modelo propuesto garantiza existencia y unicidad de soluciones para cualquier historial inicial continuo ϕ .

Interpretación biológica de los términos

Término de deriva determinista

El término de deriva en la Ecuación 1 puede descomponerse en cuatro componentes:

$$\mu(t, X(t), X(t - \tau)) = \underbrace{\alpha}_{\text{Crecimiento basal}} + \underbrace{\beta X(t)}_{\text{Retroalimentación actual}} + \underbrace{\gamma X(t - \tau)}_{\text{Memoria fisiológica}} + \underbrace{\delta^T \mathbf{C}(t)}_{\text{Forzantes climáticas}} \quad (3.6)$$

- **Crecimiento basal** (α): Representa la tasa de crecimiento intrínseca del sistema en ausencia de retroalimentación y forzantes externos. En el contexto vegetal, esto corresponde al crecimiento mínimo sostenido por procesos metabólicos básicos (Taiz et al., 2022).
- **Retroalimentación actual** ($\beta X(t)$): Modela la autorregulación del crecimiento basada en el estado actual del sistema. Un valor $\beta > 0$ indica

crecimiento autocatalítico (aceleración), mientras que $\beta < 0$ representa saturación o competencia intraespecífica (Diepenbrock, 2000).

- **Memoria fisiológica** ($\gamma X(t - \tau)$): Captura explícitamente la dependencia del pasado, representando procesos como la translocación de fotoasimilados, acumulación de reservas o respuesta hormonal retardada (Thomas & Ougham, 2014). El signo de γ determina si el efecto es positivo (persistencia) o negativo (agotamiento de recursos).
- **Forzantes climáticas** ($\delta^T \mathbf{C}(t)$): Incorpora la influencia directa de variables ambientales sobre el crecimiento. Cada componente δ_i cuantifica la sensibilidad del sistema a la variable climática correspondiente (Hatfield & Prueger, 2015).

Término de difusión estocástica

El término de difusión $\sigma X(t) dW(t)$ modela la variabilidad ambiental no explicada por las variables climáticas incluidas explícitamente. La forma multiplicativa $\sigma X(t)$ implica que la intensidad del ruido es proporcional al tamaño del sistema, lo cual es biológicamente razonable: sistemas más grandes (mayor GCC) exhiben mayor variabilidad absoluta (Kloeden & Platen, 1992).

Solución formal y representación integral

La solución de la Ecuación 1 puede expresarse en forma integral utilizando el Cálculo de Itô (Särkkä & Solin, 2019):

$$X(t) = X(0) + \int_0^t [\alpha + \beta X(s) + \gamma X(s - \tau) + \delta^T \mathbf{C}(s)] ds + \sigma \int_0^t X(s) dW(s) \quad (3)$$

Esta representación integral es fundamental para el análisis teórico y la discretización numérica del modelo. La integral estocástica $\int_0^t X(s) dW(s)$ se interpreta en el sentido de Itô, lo cual implica que el integrando $X(s)$ es evaluado en el extremo izquierdo de cada subintervalo de partición de acuerdo con la definición formal.

Consideraciones sobre la positividad del modelo

Dado que $X(t)$ representa el índice de verdor GCC, que físicamente debe ser no negativo ($X(t) \geq 0$), es crucial verificar que el modelo preserve esta propiedad. Para SDEs con coeficientes lineales como la nuestra, se puede demostrar que si la

condición inicial satisface $\phi(t) \geq 0$ para todo $t \in [-\tau, 0]$, entonces $X(t) \geq 0$ casi seguramente para todo $t \geq 0$ (Mao, 2007).

Esta propiedad de positividad es esencial para la interpretación biológica del modelo y garantiza que las simulaciones numéricas produzcan resultados físicamente realistas.

Discretización Numérica y Propiedades del Esquema

Motivación y contexto metodológico

La resolución analítica de ecuaciones diferenciales estocásticas con retraso (SD-DE) es generalmente imposible debido a la naturaleza no markoviana del proceso y la dependencia funcional del pasado (Kloeden & Platen, 1992). Por lo tanto, es necesario recurrir a métodos numéricos de discretización para obtener soluciones aproximadas que permitan tanto el análisis teórico como la implementación computacional (Mao, 2007).

El esquema de Euler-Maruyama representa el método más fundamental y ampliamente utilizado para la discretización de SDEs y SDDEs, debido a su simplicidad conceptual, facilidad de implementación y propiedades de convergencia bien establecidas (Platen, 1999).

(Aquí irá el código)

Análisis de convergencia

El análisis de convergencia de esquemas numéricos para SDEs y SDDEs distingue entre dos tipos fundamentales de convergencia: **convergencia fuerte** y **convergencia débil** (Kloeden & Platen, 1992).

Convergencia fuerte

Un esquema numérico tiene **convergencia fuerte de orden γ** si existe una constante $C > 0$ independiente de Δt tal que:

$$\mathbb{E} [|X(T) - X_N|] \leq C(\Delta t)^\gamma$$

donde $X(T)$ es la solución exacta en tiempo T y X_N es la aproximación numérica.

Teorema 3.1 (Convergencia fuerte de Euler-Maruyama). *Bajo las condiciones de Lipschitz global y crecimiento lineal para μ y σ , el esquema de Euler-Maruyama (3.10) tiene convergencia fuerte de orden $\gamma = 1/2$ (Kloeden & Platen, 1992).*

Para nuestro modelo lineal específico, la condición de Lipschitz se satisface trivialmente, garantizando la convergencia fuerte de orden $1/2$.

Convergencia débil

Un esquema numérico tiene **convergencia débil de orden β** si para toda función $g \in C_P^{2(\beta+1)}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ (funciones $2(\beta+1)$ veces continuamente diferenciables con derivadas polinomialmente acotadas), existe una constante $C_g > 0$ tal que:

$$|\mathbb{E}[g(X(T))] - \mathbb{E}[g(X_N)]| \leq C_g(\Delta t)^\beta \quad (3.12)$$

Teorema 3.2 (Convergencia débil de Euler-Maruyama). *Bajo las mismas condiciones del Teorema 3.1, el esquema de Euler-Maruyama tiene convergencia débil de orden $\beta = 1$ (Milstein, 1995).*

Este resultado es particularmente relevante para aplicaciones en finanzas y ciencias naturales, donde el interés radica en calcular esperanzas de funcionales del proceso (precios de opciones, probabilidades de eventos, etc.) (Wilkinson, 2018).

Error de truncamiento local

El **error de truncamiento local** en el paso n se define como la diferencia entre la solución exacta y la aproximación numérica, asumiendo que el estado anterior es exacto:

$$R_n = X(t_{n+1}) - X(t_n) - \mu(t_n, X(t_n), X(t_n - \tau))\Delta t - \sigma(t_n, X(t_n))\Delta W_n \quad (3.17)$$

Para el esquema de Euler-Maruyama aplicado a SDEs con coeficientes suficientemente suaves, se puede demostrar que:

$$\mathbb{E}[|R_n|^2]^{1/2} = \mathcal{O}((\Delta t)^{3/2}) \quad (3.18)$$

Este resultado justifica el orden de convergencia fuerte $\gamma = 1/2$, ya que el error acumulado sobre $N = T/\Delta t$ pasos es de orden $\mathcal{O}((\Delta t)^{1/2})$ (Kloeden & Platen, 1992).

Implementación computacional

La implementación del esquema de Euler-Maruyama para SDDEs requiere especial atención al manejo del historial pasado. El siguiente algoritmo presenta una implementación eficiente:

Entrada: $\tau, \Delta t, T, X_0, \{C_n\}_{n=0}^{N-1}, \alpha, \beta, \gamma, \delta, \sigma$.
Salida: $\{X_n\}_{n=0}^N$ aproximación numérica.

1. $N \leftarrow \frac{T}{\Delta t}$
2. $k \leftarrow \frac{\tau}{\Delta t}$
3. Inicializar vector $X[0..N]$
4. $X[0..k] \leftarrow \phi(t_0..t_k)$ (*Historial inicial*)
5. **Para** $n = k$ **hasta** $N - 1$ **hacer:**
 - a. $\Delta W \leftarrow \sqrt{\Delta t} \cdot \mathcal{N}(0, 1)$
 - b. $\mu \leftarrow \alpha + \beta \cdot X[n] + \gamma \cdot X[n - k] + \delta^T C[n]$
 - c. $X[n + 1] \leftarrow X[n] + \mu \cdot \Delta t + \sigma \cdot X[n] \Delta W$
6. **Retornar** $\{X_n\}_{n=0}^N$

La complejidad computacional del algoritmo es $\mathcal{O}(N)$, lo que lo hace eficiente incluso para simulaciones con horizontes temporales largos ([Andersson, 2017](#)).

Consideraciones prácticas para $\Delta t = 1$ día

En nuestra aplicación específica, el paso temporal de discretización es $\Delta t = 1$ día, correspondiente a la frecuencia de muestreo de los datos PhenoCam. Esta elección tiene implicaciones importantes:

1. **Magnitud del error numérico:** Con $\Delta t = 1$, el error de truncamiento local puede ser significativo comparado con aplicaciones donde $\Delta t < 1$. Sin embargo, dado que los datos observados también tienen una resolución diaria, el error numérico se vuelve comparable al error de observación ([Richardson et al., 2018](#)).
2. **Aproximación del incremento de Wiener:** Para $\Delta t = 1$, tenemos $\Delta W_n \sim \mathcal{N}(0, 1)$, lo que simplifica la generación de números aleatorios en la simulación.
3. **Interpretación de parámetros:** Los parámetros estimados $(\alpha, \beta, \gamma, \delta, \sigma)$ están en escala diaria y deben interpretarse como tasas de cambio por día, no como tasas instantáneas ([Dietze, 2017](#)).
4. **Consistencia dimensional:** Con $\Delta t = 1$, las ecuaciones (3.9) y (3.10) se simplifican al omitir explícitamente el factor Δt , lo que facilita la interpre-

tación y la estimación de parámetros.

Formulación Estadística como Modelo de Regresión

Motivación y contexto estadístico

La discretización del modelo SDDE mediante el esquema de Euler-Maruyama, presentada en la sección 3.2, proporciona una aproximación numérica que facilita la transición desde un marco teórico continuo a un problema de inferencia estadística discreta. Esta formulación permite estimar los parámetros del modelo utilizando técnicas estándar de regresión lineal, lo cual es computacionalmente eficiente y estadísticamente bien fundamentado para el pronóstico de ecosistemas ([Dietze, 2017](#)).

El enfoque de regresión lineal para modelos estocásticos discretizados ha sido ampliamente utilizado en finanzas, ecología y ciencias ambientales, donde la combinación de dinámica determinista y ruido estocástico es inherente a los sistemas naturales ([Kloeden & Platen, 1992](#)).

Modelo de regresión lineal derivado del SDDE

Partiendo del esquema de Euler-Maruyama para nuestro modelo SDDE específico (ecuación 3.9), y considerando un paso temporal $\Delta t = 1$ día, podemos reorganizar la ecuación para expresar el cambio en el estado como una función lineal de las variables explicativas:

$$\Delta X_n = \alpha + \beta X_n + \gamma X_{n-k} + \delta_1 \text{Rad}_n + \delta_2 \text{Temp}_n + \delta_3 \text{Prec}_n + \epsilon_n \quad (3.19)$$

donde: - $\Delta X_n = X_{n+1} - X_n$ es el cambio observado en el índice GCC entre el día n y $n + 1$, - X_n es el valor del GCC en el día n , - X_{n-k} es el valor del GCC en el día $n - k$, donde $k = \tau$ representa el número de días de retraso, - Rad_n , Temp_n , Prec_n son las variables climáticas observadas en el día n , - $\epsilon_n = \sigma X_n \Delta W_n$ es el término de error estocástico.

Esta formulación constituye un **modelo de regresión lineal múltiple** donde la variable dependiente es ΔX_n y las variables independientes son X_n , X_{n-k} , y las tres variables climáticas.

Notación matricial y vector de parámetros

En notación matricial compacta, el modelo (3.19) se expresa como:

$$\mathbf{Y} = \mathbf{X}\theta + \epsilon \quad (3.20)$$

donde:

- $\mathbf{Y} \in \mathbb{R}^N$ es el vector de observaciones de la variable dependiente (ΔX_n),
- $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{N \times p}$ es la matriz de diseño con $p = 6$ columnas,
- $\theta \in \mathbb{R}^p$ es el vector de parámetros desconocidos,
- $\epsilon \in \mathbb{R}^N$ es el vector de errores aleatorios.

La matriz de diseño $\mathbf{X}$ tiene la siguiente estructura:

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} 1 & X_1 & X_{1-k} & \text{Rad}_1 & \text{Temp}_1 & \text{Prec}_1 \\ 1 & X_2 & X_{2-k} & \text{Rad}_2 & \text{Temp}_2 & \text{Prec}_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & X_N & X_{N-k} & \text{Rad}_N & \text{Temp}_N & \text{Prec}_N \end{bmatrix} \quad (3.21)$$

y el vector de parámetros es:

$$\theta = [\alpha \quad \beta \quad \gamma \quad \delta_1 \quad \delta_2 \quad \delta_3]^T \quad (3.22)$$

Relación estructural con modelos AR(p)

El modelo de regresión (3.19) puede reinterpretarse como un modelo autorregresivo con estructura esparsa. Reorganizando la ecuación (3.19):

$$X_{n+1} = \alpha + (1 + \beta)X_n + \gamma X_{n-k} + \delta_1 \text{Rad}_n + \delta_2 \text{Temp}_n + \delta_3 \text{Prec}_n + \epsilon_n \quad (3.23)$$

Comparando con un modelo AR(p) general:

$$X_{n+1} = c + \sum_{i=1}^p \phi_i X_{n+1-i} + \varepsilon_n \quad (3.24)$$

podemos establecer la siguiente correspondencia estructural:

$$\phi_i = \begin{cases} 1 + \beta & \text{si } i = 1 \\ \gamma & \text{si } i = k \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases} \quad (3.25)$$

Esta relación demuestra que nuestro modelo SDDE discretizado es equivalente a un **modelo AR(p) con restricciones estructurales**, donde solo dos coeficientes autorregresivos son no nulos: el correspondiente al rezago inmediato ($i = 1$) y el correspondiente al retraso biológico ($i = k = \tau$). Esta estructura esparsa reduce drásticamente la dimensionalidad del problema de $p + 1$ parámetros a solo 6 parámetros, imponiendo una hipótesis biológicamente significativa sobre la memoria temporal del sistema (Cuddington et al., 2013).

Supuestos estadísticos del modelo

Para que los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios (OLS) tengan propiedades óptimas, se requieren los siguientes supuestos clásicos del modelo lineal (Greene, 2018):

- Supuesto 1: Linealidad en parámetros El modelo es lineal en los parámetros θ , lo cual se satisface por construcción.
- Supuesto 2: Rango completo de la matriz de diseño La matriz $\mathbf{X}$ tiene rango completo ($\text{rank}(\mathbf{X}) = p$), lo que garantiza que $\mathbf{X}^T \mathbf{X}$ sea invertible. Este supuesto requiere que no exista multicolinealidad perfecta entre las variables explicativas.
- Supuesto 3: Esperanza condicional nula

$$\mathbb{E}[\epsilon_n | \mathbf{X}] = 0 \quad (3.26)$$

Este supuesto implica que los errores no están correlacionados con las variables explicativas, lo cual es crucial para la insesgadez de los estimadores.

- Supuesto 4: Homocedasticidad y no autocorrelación

$$\text{Var}(\epsilon | \mathbf{X}) = \sigma^2 \mathbf{I}_N \quad (3.27)$$

donde $\mathbf{I}_N$ es la matriz identidad de dimensión N . Este supuesto implica que los errores tienen varianza constante y no están autocorrelacionados.

- Supuesto 5: Normalidad de los errores (para inferencia exacta)

$$\epsilon | \mathbf{X} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \sigma^2 \mathbf{I}_N) \quad (3.28)$$

Este supuesto es necesario para realizar pruebas de hipótesis y construir intervalos de confianza exactos, aunque no es requerido para la consistencia de los estimadores.

Estimación de parámetros por mínimos cuadrados ordinarios

Bajo los supuestos anteriores, el estimador de mínimos cuadrados ordinarios (OLS) de θ se define como:

$$\hat{\theta} = (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{Y} \quad (3.29)$$

Este estimador tiene las siguientes propiedades fundamentales ([Greene, 2018](#)):

- **Insesgadez:** $\mathbb{E}[\hat{\theta}] = \theta$
- **Consistencia:** $\hat{\theta} \xrightarrow{p} \theta$ cuando $N \rightarrow \infty$
- **Eficiencia:** Entre todos los estimadores lineales insesgados, $\hat{\theta}$ tiene la menor varianza (teorema de Gauss-Markov)

La matriz de varianza-covarianza del estimador es:

$$\text{Var}(\hat{\theta}) = \sigma^2 (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \quad (3.30)$$

donde σ^2 se estima mediante:

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{N-p} \sum_{n=1}^N \hat{\epsilon}_n^2 = \frac{\|\mathbf{Y} - \mathbf{X}\hat{\theta}\|^2}{N-p} \quad (3.31)$$

Identificabilidad del modelo

La **identificabilidad** de un modelo estadístico se refiere a la capacidad de estimar de manera única sus parámetros a partir de los datos observados ([Miao et al., 2011](#)). Para nuestro modelo, la identificabilidad depende de dos factores principales:

1. **Identificabilidad estructural.** El modelo es estructuralmente identificable si la parametrización es única, es decir, si diferentes valores de θ producen distribuciones de probabilidad diferentes para los datos observados. En nuestro caso, la linealidad del modelo y la independencia funcional de las variables explicativas garantizan la identificabilidad estructural.

2. Identificabilidad práctica. La identificabilidad práctica depende de la calidad y cantidad de los datos observados. Específicamente, se requiere que:
 - La matriz $\mathbf{X}^T \mathbf{X}$ sea no singular (rango completo)
 - Las variables climáticas no estén perfectamente colineales con los términos de retraso
 - Exista suficiente variabilidad en los datos para distinguir los efectos individuales de cada parámetro

En la práctica, la identificabilidad se evalúa mediante el **factor de inflación de varianza (VIF)** y el **número de condición** de la matriz $\mathbf{X}^T \mathbf{X}$. Un número de condición elevado (> 1000) indica problemas de identificabilidad práctica debido a multicolinealidad ([Belsley et al., 1980](#)).

Incorporación de variables exógenas climáticas

La inclusión de variables climáticas exógenas en el modelo responde a dos objetivos fundamentales:

1. **Control de factores de confusión:** Las variables climáticas pueden estar correlacionadas tanto con el estado actual del sistema como con su estado pasado, por lo que su inclusión evita sesgos en la estimación de los coeficientes de retroalimentación β y γ .
2. **Mejora de la capacidad predictiva:** Las variables climáticas contienen información adicional sobre los forzantes ambientales que afectan directamente el crecimiento vegetal, lo que mejora la precisión de las predicciones del modelo.

La especificación funcional lineal adoptada para las variables climáticas asume que sus efectos son aditivos y constantes en el tiempo. Esta suposición puede ser relajada en extensiones futuras del modelo mediante la inclusión de términos no lineales o interacciones ([Hastie et al., 2009](#)).

Diagnóstico de supuestos y validación del modelo

La validez de las inferencias estadísticas basadas en el modelo de regresión depende de la verificación de los supuestos establecidos en la sección 3.3.5. Los principales métodos de diagnóstico incluyen:

- **Gráfico de residuos vs valores ajustados:** Para detectar heterocedasticidad y no linealidad

- **Test de Durbin-Watson:** Para detectar autocorrelación serial en los residuos
- **Test de Breusch-Pagan:** Para detectar heterocedasticidad
- **QQ-plot de residuos:** Para evaluar la normalidad de los errores
- **Análisis de influencia:** Para identificar observaciones atípicas que puedan afectar desproporcionadamente los resultados

Estos diagnósticos son esenciales para garantizar la robustez de las conclusiones derivadas del modelo y para identificar posibles violaciones de los supuestos que requieran modificaciones en la especificación del modelo (Fox, 2015).

Identificabilidad y Estimación de Parámetros

Marco teórico de identificabilidad

La **identificabilidad** constituye una propiedad fundamental en la inferencia estadística, ya que garantiza que los parámetros de un modelo puedan ser estimados de manera única a partir de los datos observados (Miao et al., 2011). En el contexto de modelos estocásticos discretizados como el nuestro, la identificabilidad se descompone en dos componentes complementarios: **identificabilidad estructural** e **identificabilidad práctica**.

La identificabilidad estructural se refiere a la unicidad de la parametrización del modelo desde una perspectiva puramente matemática, independientemente de los datos disponibles. Por otro lado, la identificabilidad práctica depende de la calidad, cantidad y estructura de los datos observados, y determina si es posible estimar los parámetros con precisión finita (Bellman, 1970).

Identificabilidad estructural del modelo SDDE

Consideremos el modelo de regresión lineal derivado del SDDE (ecuación 3.19):

$$\Delta X_n = \alpha + \beta X_n + \gamma X_{n-k} + \delta_1 \text{Rad}_n + \delta_2 \text{Temp}_n + \delta_3 \text{Prec}_n + \epsilon_n \quad (3.32)$$

El modelo es **estructuralmente identificable** si la aplicación $\theta \mapsto \mathbb{P}_\theta$ es inyectiva, donde $\mathbb{P}_\theta$ denota la distribución de probabilidad de los datos bajo el parámetro θ (Miao et al., 2011).

Teorema 3.4 (Identificabilidad estructural). *El modelo (3.32) es estructuralmente identificable si y solo si las funciones X_n , X_{n-k} , Rad_n , Temp_n , y Prec_n son*

linealmente independientes en el espacio de funciones generadas por el proceso estocástico.

Demostración. La linealidad del modelo implica que si existen dos vectores de parámetros $\theta_1 \neq \theta_2$ tales que $\mathbb{P}_{\theta_1} = \mathbb{P}_{\theta_2}$, entonces:

$$(\theta_1 - \theta_2)^T \mathbf{x}_n = 0 \quad \text{casi seguramente para todo } n \quad (3.33)$$

donde $\mathbf{x}_n = [1, X_n, X_{n-k}, \text{Rad}_n, \text{Temp}_n, \text{Prec}_n]^T$. Esto ocurre si y solo si las componentes de $\mathbf{x}_n$ son linealmente dependientes, lo cual contradice la hipótesis del teorema.

En la práctica, la independencia lineal se satisface siempre que:

1. Las variables climáticas no son funciones deterministas del estado del sistema (X_n o X_{n-k})
2. El retraso τ es tal que X_n y $X_{n-\tau}$ no son perfectamente correlacionados
3. Existe suficiente variabilidad en los datos para distinguir los efectos individuales

Identificabilidad práctica y condiciones de rango

La identificabilidad práctica se evalúa mediante el **rango de la matriz de información de Fisher** o, equivalentemente, el **rango de la matriz de diseño** $\mathbf{X}$ (Greene, 2018).

Definición 3.2 (Condición de rango completo). *El modelo es prácticamente identificable si la matriz $\mathbf{X}^T \mathbf{X}$ es no singular, es decir, si $\text{rank}(\mathbf{X}) = p = 6$.*

Esta condición es equivalente a requerir que el **determinante de Gram** sea no nulo:

$$\det(\mathbf{X}^T \mathbf{X}) > 0 \quad (3.34)$$

En términos geométricos, esto significa que los vectores columna de $\mathbf{X}$ son linealmente independientes en $\mathbb{R}^N$.

Proposición 3.1 (Condiciones suficientes para identificabilidad práctica). *El modelo (3.32) es prácticamente identificable si:*

1. $N > p$ (más observaciones que parámetros)
2. No existe multicolinealidad perfecta entre las variables explicativas

3. *Las variables climáticas presentan variabilidad suficiente y no están perfectamente correlacionadas con los términos de estado*

La violación de estas condiciones conduce a problemas de **multicolinealidad**, que se manifiestan en varianzas infladas de los estimadores y dificultades numéricas en la inversión de $\mathbf{X}^T \mathbf{X}$ (Belsley et al., 1980).

Estimación por mínimos cuadrados ordinarios (OLS)

Bajo las condiciones de identificabilidad establecidas, el estimador de mínimos cuadrados ordinarios (OLS) se define como la solución al problema de optimización:

$$\hat{\theta} = \arg \min_{\theta \in \mathbb{R}^p} \|\mathbf{Y} - \mathbf{X}\theta\|^2 \quad (3.35)$$

La solución analítica a este problema viene dada por la ecuación normal:

$$\hat{\theta} = (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{Y} \quad (3.36)$$

Este estimador posee propiedades óptimas bajo los supuestos del modelo lineal clásico:

- **Insesgadez:** $\mathbb{E}[\hat{\theta}] = \theta$
- **Consistencia:** $\hat{\theta} \xrightarrow{p} \theta$ cuando $N \rightarrow \infty$
- **Eficiencia:** $\text{Var}(\hat{\theta}) \leq \text{Var}(\tilde{\theta})$ para cualquier otro estimador lineal insesgado $\tilde{\theta}$ (teorema de Gauss-Markov)

La matriz de varianza-covarianza del estimador es:

$$\text{Var}(\hat{\theta}) = \sigma^2 (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \quad (3.37)$$

donde $\sigma^2 = \text{Var}(\epsilon_n)$ es la varianza del error.

Estimación de la varianza del error

La varianza del error σ^2 se estima mediante el estimador insesgado:

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{N-p} \sum_{n=1}^N \tilde{\epsilon}_n^2 = \frac{\|\mathbf{Y} - \mathbf{X}\hat{\theta}\|^2}{N-p} \quad (3.38)$$

donde $\hat{\epsilon}_n = Y_n - \mathbf{x}_n^T \hat{\theta}$ son los residuos estimados.

Este estimador es insesgado bajo el supuesto de homocedasticidad y tiene la propiedad de que $(N - p)\hat{\sigma}^2/\sigma^2 \sim \chi_{N-p}^2$ bajo normalidad de los errores ([Casella & Berger, 2002](#)).

Relación con la intensidad del ruido estocástico

En el contexto del modelo SDDE original, la varianza del error σ^2 está relacionada con la intensidad del ruido estocástico σ_{SDDE} del proceso continuo. Recordando que el término de error en la discretización es $\epsilon_n = \sigma_{\text{SDDE}} X_n \Delta W_n$, y que $\Delta W_n \sim \mathcal{N}(0, \Delta t)$, tenemos:

$$\text{Var}(\epsilon_n | X_n) = \sigma_{\text{SDDE}}^2 X_n^2 \Delta t \quad (3.39)$$

Sin embargo, en nuestra formulación de regresión asumimos homocedasticidad ($\text{Var}(\epsilon_n) = \sigma^2$), lo cual constituye una aproximación válida cuando la variabilidad relativa de X_n es pequeña o cuando se trabaja con tasas de crecimiento relativas en lugar de absolutas ([Shoji & Ozaki, 1998](#)).

Para recuperar una estimación de la intensidad del ruido del proceso continuo, podemos utilizar:

$$\hat{\sigma}_{\text{SDDE}} = \sqrt{\frac{\hat{\sigma}^2}{\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N X_n^2 \Delta t}} \quad (3.40)$$

Esta estimación es consistente bajo condiciones regulares y permite interpretar el parámetro σ_{SDDE} en términos del modelo continuo original.

Diagnóstico de identificabilidad práctica

La identificabilidad práctica se diagnostica mediante métricas numéricas que cuantifican el grado de multicolinealidad en la matriz de diseño:

Factor de inflación de varianza (VIF)

Para cada variable explicativa j , el VIF se define como:

$$\text{VIF}_j = \frac{1}{1 - R_j^2} \quad (3.41)$$

donde R_j^2 es el coeficiente de determinación obtenido al regresar la variable j contra todas las demás variables explicativas. Esta métrica cuantifica cuánto se incrementa la varianza de un coeficiente estimado debido a la correlación lineal entre los predictores. En la práctica, valores de $VIF_j > 10$ se consideran un indicador de multicolinealidad severa, lo que compromete la precisión y estabilidad de las estimaciones del modelo (Montgomery et al., 2021).

Número de condición

El número de condición de la matriz de diseño, evaluado a través de $\mathbf{X}^T\mathbf{X}$, se define como:

$$\kappa(\mathbf{X}^T\mathbf{X}) = \sqrt{\frac{\lambda_{\max}}{\lambda_{\min}}} \quad (3.42)$$

donde $\lambda_{\max}$ y $\lambda_{\min}$ representan los autovalores máximo y mínimo de la matriz, respectivamente. Este índice mide la sensibilidad geométrica y numérica de las estimaciones ante pequeños cambios en los datos. Siguiendo los criterios analíticos establecidos por (Belsley et al., 1980) y respaldados en la literatura estadística moderna (Montgomery et al., 2021), los umbrales de diagnóstico son:

- $\kappa < 10$: Poca o nula multicolinealidad.
- $10 \leq \kappa < 30$: Multicolinealidad moderada.
- $\kappa \geq 30$: Multicolinealidad severa (alta inestabilidad computacional).

En conjunto, el análisis de VIF y el número de condición son esenciales para evaluar la fiabilidad de las estimaciones de los parámetros empíricos. Detectar valores críticos en ambos diagnósticos justifica la necesidad de reformular el modelo, eliminar variables redundantes o aplicar técnicas de regularización para asegurar su identificabilidad práctica.

3.5. Diagnóstico Estadístico y Validación del Modelo

3.5.1. Marco teórico del diagnóstico de regresión

El diagnóstico estadístico constituye una etapa fundamental en el análisis de modelos de regresión lineal, ya que permite verificar la validez de los supuestos subyacentes y evaluar la calidad del ajuste (Fox, 2015). En el contexto de modelos

derivados de ecuaciones diferenciales estocásticas con retraso (SDDE) discretizadas, el diagnóstico adquiere una relevancia adicional: cualquier violación de los supuestos puede comprometer no solo la inferencia estadística, sino también la interpretación biológica y fenomenológica de los parámetros estimados ([Greene, 2018](#)).

Los supuestos clásicos del modelo lineal —linealidad, independencia, homocedasticidad y normalidad— deben ser verificados sistemáticamente para garantizar la robustez de las conclusiones y la estabilidad numérica de la matriz de diseño.

3.5.2. Supuestos del modelo y sus implicaciones

Supuesto de linealidad

El modelo asume que la relación entre la tasa de cambio del índice de verdor (ΔX_n) y las covariables explicativas (estados previos y forzantes climáticas) es estrictamente lineal en los parámetros. La violación de este supuesto suele manifestarse mediante patrones sistemáticos en los residuos frente a los valores ajustados, sugiriendo la necesidad de incorporar interacciones o términos polinomiales.

Supuesto de independencia

Se asume que los errores aleatorios ϵ_n son independientes entre sí, lo cual implica la ausencia de autocorrelación serial. En el análisis de series temporales fenológicas, este supuesto es particularmente crítico; la dependencia temporal residual no modelada puede subestimar las varianzas de los estimadores y sesgar las pruebas de significancia (?).

Supuesto de homocedasticidad

La varianza de los errores debe permanecer constante a lo largo del periodo de observación, es decir, $\text{Var}(\epsilon_n) = \sigma^2$ para todo n . La presencia de heterocedasticidad invalida los errores estándar convencionales de OLS, requiriendo el uso de estimadores de covarianza robustos (?).

Supuesto de normalidad

Aunque el teorema del límite central garantiza la consistencia asintótica de los estimadores sin requerir normalidad estricta, que los errores sigan una distribución gaussiana ($\epsilon_n \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$) es una condición necesaria para realizar inferencia exacta en muestras finitas (pruebas t , F e intervalos de confianza) ([Casella & Berger, 2002](#)).

3.5.3. Métodos de diagnóstico gráfico

El análisis de los residuos estimados $\hat{\epsilon}_n = Y_n - \mathbf{x}_n^T \hat{\theta}$ conforma la base visual empírica del diagnóstico. Las dos herramientas gráficas principales son:

- **Gráfico de residuos vs. valores ajustados:** Permite identificar desviaciones de la linealidad (patrones curvilíneos), heterocedasticidad (forma de embudo o dispersión variable) y observaciones atípicas extremas.
- **Gráfico de probabilidad normal (QQ-plot):** Compara los cuantiles empíricos de los residuos estandarizados contra los cuantiles teóricos de una distribución normal estándar. Las colas pesadas o desviaciones sistemáticas de la línea de identidad (45°) evidencian violaciones al supuesto de normalidad (?).

3.5.4. Pruebas estadísticas formales

Para complementar el análisis gráfico, se emplean contrastes de hipótesis rigurosos:

Test de Durbin-Watson para autocorrelación

Evalúa la hipótesis nula de ausencia de autocorrelación serial de primer orden en los residuos:

$$d = \frac{\sum_{n=2}^N (\hat{\epsilon}_n - \hat{\epsilon}_{n-1})^2}{\sum_{n=1}^N \hat{\epsilon}_n^2} \quad (3.43)$$

Bajo la hipótesis nula, el estadístico ronda un valor de $d \approx 2$. Valores significativamente menores a 2 indican autocorrelación positiva (común en series de tiempo ecológicas), mientras que valores mayores a 2 sugieren autocorrelación negativa (?).

Test de Breusch-Pagan para heterocedasticidad

Este contraste modela la varianza residual en función de las variables explicativas mediante una regresión auxiliar:

$$\hat{\epsilon}_n^2 = \alpha_0 + \sum_{j=1}^p \alpha_j x_{nj} + u_n \quad (3.44)$$

La hipótesis nula de homocedasticidad se rechaza si el estadístico de prueba $LM = N \cdot R_{\text{aux}}^2$ excede el valor crítico de la distribución χ_{p-1}^2 (?).

Test de Jarque-Bera para normalidad

Cuantifica las desviaciones de la normalidad basándose en los momentos de tercer y cuarto orden (asimetría S y curtosis K) de los residuos empíricos:

$$JB = N \left(\frac{S^2}{6} + \frac{(K - 3)^2}{24} \right) \sim \chi_2^2 \quad (3.45)$$

Valores estadísticamente significativos de JB conllevan al rechazo de la hipótesis de normalidad (?).

3.5.5. Diagnóstico de multicolinealidad

Como se estableció en la sección de identificabilidad teórica, la existencia de correlaciones altas entre las covariables climáticas y los rezagos autorregresivos infla las varianzas de los estimadores, dificultando la separación de los efectos biológicos individuales.

La evaluación práctica de este fenómeno se realiza utilizando el **Factor de Inflación de Varianza (VIF)** y el **Número de Condición (κ)**, cuyas definiciones formales se detallan en las ecuaciones (3.41) y (3.42) de la Sección 3.4. Siguiendo la literatura estadística moderna ([Montgomery et al., 2021](#)), se aplican los umbrales críticos previamente justificados ($VIF_j > 10$ y $\kappa \geq 30$) para identificar problemas severos que ameriten la eliminación de forzantes redundantes o la aplicación de técnicas de regularización (como regresión Ridge) para estabilizar la matriz $\mathbf{X}^T \mathbf{X}$.

3.5.6. Criterios de información para selección de modelos

La parsimonia es un principio rector en el modelado estocástico. Los criterios de información permiten comparar modelos con diferentes estructuras de rezago y combinaciones de forzantes climáticas, introduciendo una penalización matemática por la complejidad para evitar el sobreajuste (?).

Criterio de Información de Akaike (AIC)

Fundamentado en la teoría de la información, el AIC estima la pérdida relativa de información al aproximar la realidad con el modelo ajustado:

$$AIC = 2p - 2 \ln(\hat{L}) \quad (3.46)$$

donde p es el número total de parámetros y $\hat{L}$ es la verosimilitud máxima. Para modelos gaussianos de mínimos cuadrados, asumiendo varianza constante, se expresa operativamente como:

$$\text{AIC} = N \ln \left(\frac{\text{RSS}}{N} \right) + 2p \quad (3.47)$$

donde $\text{RSS} = \|\mathbf{Y} - \mathbf{X}\hat{\theta}\|^2$ es la suma de cuadrados residuales.

Criterio de Información Bayesiano (BIC)

El BIC introduce una penalización logarítmica más estricta en función del tamaño muestral N , favoreciendo modelos más simples en conjuntos de datos grandes:

$$\text{BIC} = p \ln(N) - 2 \ln(\hat{L}) \quad (3.48)$$

$$\text{BIC} = N \ln \left(\frac{\text{RSS}}{N} \right) + p \ln(N) \quad (3.49)$$

El BIC es asintóticamente consistente, asegurando la selección del modelo verdadero con probabilidad aproximándose a 1 conforme $N \rightarrow \infty$, siempre que este se encuentre entre las formulaciones candidatas (?).

3.5.7. Validación del modelo mediante comparación con *benchmarks*

La fase final de validación del modelo biológico SDDE se efectúa mediante una comparación estructurada contra *benchmarks* puramente estadísticos (como modelos ARMA/AR(p) genéricos). Esta comparación se ejecuta bajo tres ejes fundamentales:

1. **Ajuste penalizado:** Se evalúa la superioridad algorítmica si la diferencia en los criterios es sustancial ($\Delta\text{AIC} \leq -2$ o $\Delta\text{BIC} \leq -2$) a favor del SDDE (?).
2. **Capacidad predictiva (*Out-of-sample*):** Se contrasta el Error Cuadrático Medio (RMSE) y el Pseudo- R^2 iterando predicciones sobre un conjunto de datos de validación cruzada no visto durante el entrenamiento.
3. **Interpretabilidad biológica:** A diferencia de la naturaleza de “caja negra” de los polinomios autorregresivos profundos, la parametrización esparsa del

SDDE (Ecuación 3.25) se justifica porque ofrece una traducción directa a la dinámica fisiológica de la vegetación (tasas de crecimiento, memoria de fotoasimilados y sensibilidad ambiental empírica) ([Cuddington et al., 2013](#)).

Referencias

- Andersson, S. (2017). Strong Identification in Econometric Models. *Journal of Econometrics*, 198(2), 245-260.
- Bellman, R. (1970). *Introduction to the Mathematical Theory of Control Processes*. Academic Press.
- Belsley, D. A., Kuh, E., & Welsch, R. E. (1980). *Regression Diagnostics: Identifying Influential Data and Sources of Collinearity*. John Wiley & Sons.
- Casella, G., & Berger, R. L. (2002). *Statistical Inference* (2nd ed.). Duxbury Press.
- Cuddington, K., Fortin, M.-J., Gerber, L. R., Hastings, A., Liebhold, A., O'Connor, M., & Ray, C. (2013). Process-based models are required to manage ecological systems in a changing world. *Ecosphere*, 4(2), 1-12. <https://doi.org/10.1890/ES12-00178.1>
- Diepenbrock, W. (2000). Yield formation in field-grown Brassica oleracea L. var. botrytis: A review. *Journal of Horticultural Science & Biotechnology*, 75(4), 395-408. <https://doi.org/10.1080/14620316.2000.11511267>
- Dietze, M. C. (2017). *Ecological Forecasting*. Princeton University Press.
- Fox, J. (2015). *Applied Regression Analysis and Generalized Linear Models* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Greene, W. H. (2018). *Econometric Analysis* (8th ed.). Pearson.
- Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. (2009). *The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction* (2nd ed.). Springer.
- Hatfield, J. L., & Prueger, J. H. (2015). Temperature extremes: Effect on plant growth and development. *Weather and Climate Extremes*, 10, 4-10. <https://doi.org/10.1016/j.wace.2015.08.001>
- Itô, K. (1951). On stochastic differential equations. *Memoirs of the American Mathematical Society*, 4, 1-51. <https://doi.org/10.1090/memo/0004>
- Kloeden, P. E., & Platen, E. (1992). *Numerical Solution of Stochastic Differential Equations* (Vol. 23). Springer-Verlag. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-12616-5>
- Mao, X. (2007). *Stochastic Differential Equations and Applications* (2.^a ed.). Horwood Publishing.

- Miao, H., Xia, X., Perelson, A. S., & Wu, H. (2011). On identifiability of nonlinear ODE models and applications in viral dynamics. *SIAM Review*, 53(1), 3-39. <https://doi.org/10.1137/090757009>
- Milstein, G. N. (1995). *Numerical Integration of Stochastic Differential Equations* (Vol. 313). Kluwer Academic Publishers. <https://doi.org/10.1007/978-94-015-8455-5>
- Mohammed, S.-E. A. (1984). *Stochastic Functional Differential Equations*. 99.
- Montgomery, D. C., Peck, E. A., & Vining, G. G. (2021). *Introduction to Linear Regression Analysis* (6th ed.). John Wiley & Sons.
- Ogle, K., Barber, J. J., Barron-Gafford, G. A., Bentley, L. P., Cable, J. M., Huxman, T. E., Loik, M. E., & Tissue, D. T. (2015). Quantifying ecological memory in plant and ecosystem processes. *Ecology Letters*, 18(3), 221-235. <https://doi.org/10.1111/ele.12399>
- Platen, E. (1999). An introduction to numerical methods for stochastic differential equations. *Acta Numerica*, 8, 197-246. <https://doi.org/10.1017/S0962492900002941>
- Revuz, D., & Yor, M. (1999). *Continuous Martingales and Brownian Motion* (3.^a ed., Vol. 293). Springer.
- Richardson, A. D., Hufkens, K., Milliman, T., Aubrecht, D. M., Furze, M. E., Seyednasrollah, B., et al. (2018). Tracking vegetation phenology across diverse biomes using version 2.0 of the PhenoCam dataset. *Scientific Data*, 6(1), 222. <https://doi.org/10.1038/s41597-018-0164-4>
- Särkkä, S., & Solin, A. (2019). *Applied Stochastic Differential Equations*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108186735>
- Shoji, I., & Ozaki, T. (1998). Estimation for nonlinear stochastic differential equations by a local linearization method. *Stochastic Analysis and Applications*, 16(4), 733-752. <https://doi.org/10.1080/07362999808809559>
- Taiz, L., Zeiger, E., Møller, I. M., & Murphy, A. (2022). *Plant Physiology and Development* (7th ed.). Oxford University Press.
- Thomas, H., & Ougham, H. (2014). The stay-green trait. *Journal of Experimental Botany*, 65(14), 3889-3900. <https://doi.org/10.1093/jxb/eru033>
- Volterra, V. (1931). *Théorie Mathématique de la Lutte pour la Vie*. Gauthier-Villars.
- Wilkinson, D. J. (2018). *Stochastic Modelling for Systems Biology* (3rd ed.). CRC Press.