

Séptima Práctica Dirigida Grupo N°3

ANÁLISIS Y MODELAMIENTO NUMÉRICO I CM4F1 B

Profesor Ángel Enrique Ramírez Gutiérrez.

Aldo Luna Bueno

Alejandro Escobar Mejia

Carlos Aznarán Laos

Brian Huaman Garcia

Khalid Izquierdo Ayllon

Carlos Malvaceda Canales

Facultad de Ciencias


Universidad Nacional de Ingeniería

4 de julio del 2023

Lista de N° de pregunta / estudiante

Pregunta N°5	Khalid Zaid Izquierdo Ayllón
Pregunta N°9	Alejandro Escobar Mejia
Pregunta N°17	Brian Alberto Huamán Garcia
Pregunta N°23	Carlos Alonso Aznarán Laos
Pregunta N°28	Aldo Luna Bueno
Pregunta N°29	Carlos Daniel Malvaceda Canales

5. El pentóxido de dinitrógeno gaseoso puro $N_2O_{5(g)}$ reacciona en un reactor intermitente según la reacción estequiométrica



Calculamos la concentración de pentóxido de dinitrógeno existente en ciertos instantes, obteniendo los siguientes datos:

Tiempo (s)	0	200	400	650	1100	1900	2300
Concentración (mm)	5.5	5.04	4.36	3.45	2.37	1.32	0.71

Si lo tenemos en el reactor un tiempo máximo de 35 minutos (2100 segundos), determine la concentración de pentóxido de dinitrógeno que queda sin reaccionar, usando el polinomio de Taylor, Lagrange y Newton por diferencias divididas implementado.

Solución

9. Dada la tabla de valores:

x_i	-1	0	1
y_i	13	7	9

- a) Determine el spline cúbico natural que interpola estos datos, imponiendo las condiciones requeridas y resolviendo el sistema.
- b) Dibujar el spline completo que interpola los datos, suponiendo que las derivadas primeras del spline en los nodos inicial y final son -5 y 5, respectivamente.

Solución

a) .

18. Sea $f(x) = \exp(x)$ para $0 \leq x \leq 2$.

- a) Aproxime $f(0.25)$ mediante la interpolación lineal con $x_0 = 0$ y $x_1 = 0.5$.
- b) Aproxime $f(0.75)$ mediante interpolación lineal con $x_0 = 0.5$ y $x_1 = 1$.
- c) Aproxime $f(0.25)$ y $f(0.75)$ mediante el segundo polinomio de Lagrange con $x_0 = 0$, $x_1 = 1$ y $x_2 = 2$.

Solución

a)

b)

c)

Forma de Lagrange del polinomio de interpolación

$$p(x) = y_0 \ell_0(x) + y_1 \ell_1(x) + \cdots + y_n \ell_n(x) = \sum_{k=0}^n y_k \ell_k(x).$$

Here $\ell_0, \ell_1, \dots, \ell_n$ are polynomials that depend on the nodes x_0, x_1, \dots, x_n but not on the ordinates y_0, y_1, \dots, y_n . Since all the ordinates could be 0 except for a 1 occupying the i -th position, we see that

$$\delta_{ij} = p_n(x_j) = \sum_{k=0}^n y_k \ell_k(x_j) = \sum_{k=0}^n \delta_{ki} \ell_k(x_j) = \ell_i(x_j).$$

(Recall that the Kronecker delta is defined by $\delta_{ki} = 1$ if $k = i$ and $\delta_{ki} = 0$ if $k \neq i$.) We can easily arrive at a set of polynomials having this property. Let us consider ℓ_0 . It is to be a polynomial of degree n that takes the value 0 at x_1, x_2, \dots, x_n and the value 1 at x_0 . Clearly, ℓ_0 must be of the form

$$\ell_0(x) = c(x - x_1)(x - x_2) \cdots (x - x_n) = c \prod_{j=1}^n (x - x_j).$$

The value of c is obtained by putting $x = x_0$, so that $1 = c \prod_{j=1}^n (x_0 - x_j)$ y $c = \prod_{j=1}^n (x_0 - x_j)^{-1}$. Hence, we have

$$\ell_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}.$$

23. Using the functions ℓ_i defined in Section 6.1 (p. 312) and based on nodes x_0, x_1, \dots, x_n , show that for any f

$$\sum_{i=0}^n f(x_i) \ell_i(x) = \sum_{i=0}^n f[x_0, x_1, \dots, x_i] \prod_{j=0}^{i-1} (x - x_j).$$

(Continuation) Prove this formula:

$$f[x_0, x_1, \dots, x_n] = \sum_{i=0}^n f(x_i) \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n (x_i - x_j)^{-1}.$$

28. Encuentre la aproximación del polinomio lineal de cuadrados a $f(x) = x^2 + 3x + 2$ en el intervalo $[0, 1]$.

Solución

.

29. Utilice los ceros de T_3 para construir un polinomio interpolador de grado 2 para $f(x) = \exp(x)$ en el intervalo $[-1, 1]$.

Solución

.

Referencias

► Libros



Richard L. Burden, J. Douglas Faires y Annette M. Burden. *Análisis Numérico*. 10ª ed. Cengage Learning, 2017. URL: <https://latam.cengage.com/libros/analisis-numerico-2>.



Günther Hämmerlin y Karl-Heinz Hoffman. *Numerical Mathematics*. Springer New York, 1991. DOI: 10.1007/978-1-4612-4442-4.



David R. Kincaid y E. Ward Cheney. *Numerical Mathematics and Computing*. 7ª ed. Cengage Learning, 2012.



David R. Kincaid et al. *Análisis Numérico: las matemáticas del cálculo científico*. 1ª ed. Addison - Wesley Iberoamericana, 1994.



Rainer Kress. *Numerical Analysis*. Springer New York, 1998. DOI: 10.1007/978-1-4612-0599-9_1.



Alfio Quarteroni, Riccardo Sacco y Fausto Saleri. *Numerical Mathematics*. Springer Berlin Heidelberg, 2007. DOI: 10.1007/b98885.

► Artículos científicos



David Goldberg. "What Every Computer Scientist Should Know about Floating-Point Arithmetic". En: *ACM Comput. Surv.* 23.1 (mar. de 1991), págs. 5-48. ISSN: 0360-0300. DOI: 10.1145/103162.103163.

► Sitios web



Python Software Foundation. *Python 3.11.4 documentation*. URL: <https://docs.python.org/3/library/functions.html#int> (visitado 20-06-2023).