...QUE LLEVO EN MI CESTA? A01



¿QUÉ SETA ES ESTA... A01

...QUE LLEVO EN MI CESTA? A02



¿QUÉ SETA ES ESTA... A02

...QUE LLEVO EN MI CESTA? A03



¿QUÉ SETA ES ESTA... A03

...QUE LLEVO EN MI CESTA? A04



¿QUÉ SETA ES ESTA... A04

...QUE LLEVO EN MI CESTA? A05



¿QUÉ SETA ES ESTA... A05

...QUE LLEVO EN MI CESTA? A06



¿QUÉ SETA ES ESTA... A06

Amanita phalloides

(Fr.) Link, 1833 — A03

MORTAL

B Clase: Agaricomycetes
Orden: Agaricales
M Tipo: Micorrízica
B Esporada: Blanca



Sombrero verdoso, volva visible, láminas blancas, mortal

Seta altamente tóxica conocida comúnmente como «oronja verde» u «hongo de la muerte».

Sombrero inicialmente hemisférico, luego convexo y extendido, de color verde oliva o verdoso con tonos amarillentos, a veces con un brillo metálico.

Láminas libres y blancas. Pie blanco con anillo blanco, membranoso y estriado en la cara externa. Volva pronunciada y sacciforme en la base. Esporada blanca.

Carne blanca y olor débil.

Seta responsable de gran parte de los envenenamientos mortales.

Dimensiones

Sombrero 5–15 cm de diámetro; pie 8–15 cm de alto

E F M A M J **J A S O N** D

Agaricus xanthodermus

Genev., 1876 — A02

Tóxica

B Clase: Agaricomycetes
Orden: Agaricales
S Tipo: Saprófita
0 Esporada: Ocráceo negruzca



Amarillea intensamente al roce, olor desagradable a tinta

Sombrero primero hemisférico y luego convexo, de color blanco a blanquecino. Amarillea de forma muy acusada al roce, especialmente en el margen del sombrero y en la base del pie.

Láminas densas y libres, primero rosadas y después marrón chocolate. Pie cilíndrico, blanco, con anillo simple y base bulbosa que se torna amarillo intenso al cortarla.

Carne blanca con olor desagradable a fenol, tinta o yodo, que se intensifica con la cocción. Provoca intoxicaciones gastrointestinales con náuseas, vómitos y diarreas.

Dimensiones

Sombrero 6–15 cm de diámetro; pie 5–12 cm de alto, 1–2 cm de grosor

E F M A **M J J A S O N** D

Agaricus arvensis

Schaeff., 1774 — A01

Excelente comestible

B Clase: Agaricomycetes
Orden: Agaricales
S Tipo: Saprófita
0 Esporada: Ocráceo negruzca



Sombrero blanco, láminas rosadas de joven, anillo doble

Sombrero inicialmente globoso, después convexo y finalmente extendido, pudiendo llegar hasta los 15-20 cm de diámetro.

Superficie blanca que amarillea debilmente al roce y en la vejez. Láminas densas, libres, inicialmente pálidas, pasando a gris rosado y luego chocolate oscuro.

Pie robusto con anillo doble dentado. Carne blanca, olor anisado dulce, sabor suave a frutos secos, más intenso en ejemplares jóvenes. Acumula metales pesados si crece cerca de carreteras o suelos contaminados.

Dimensiones

Sombrero 8–20 cm de diámetro; pie 7–14 cm de alto, 1–3 cm de grosor

E F **M A M J** J **A S O N** D

Amanita caesarea

(Scop.) Pers., 1801 — A06

Excelente comestible

B Clase: Agaricomycetes
Orden: Agaricales
M Tipo: Micorrízica
B Esporada: Blanca



Sombrero anaranjado, láminas y pie amarillos, volva blanca

Seta muy apreciada desde la antigüedad, conocida como «oronja» o «huevo de rey».

Sombrero inicialmente globoso y luego convexo o extendido, de color anaranjado, liso y brillante, de hasta 15–20 cm.

Láminas libres, densas y de color amarillo intenso, al igual que el pie. Pie cilíndrico con anillo amplio y colgante de color amarillo. Volva blanca, sacciforme y bien visible en la base.

Carne amarillenta, olor suave y sabor delicado, muy agradable.

Dimensiones

Sombrero 8–20 cm de diámetro; pie 8–15 cm de alto

E F M A M **J J A S O** N D

Amanita muscaria

(L.) Lam., 1783 — A05

Tóxica

B Clase: Agaricomycetes
Orden: Agaricales
M Tipo: Micorrízica
B Esporada: Blanca



Sombrero rojo o rojizo anaranjado con copos blancos, anillo y volva, láminas blancas

Sombrero rojo o rojizo anaranjado cubierto de copos blancos, restos del velo universal que pueden desaparecer con la lluvia.

Sombrero inicialmente hemisférico y después convexo o extendido, de hasta 20 cm de diámetro. Láminas libres, densas y blancas.

Pie blanco, cilíndrico, con anillo amplio y persistente, y volva anillada en la base.

Carne blanca, olor débil y sabor ligeramente dulzón. Especie tóxica con efectos neurotóxicos.

Dimensiones

Sombrero 8–20 cm de diámetro; pie 10–20 cm de alto

E F M A M J J A **S O N D**

Amanita virosa

Bertill., 1866 — A04

MORTAL

B Clase: Agaricomycetes
Orden: Agaricales
M Tipo: Micorrízica
B Esporada: Blanca



Sombrero blanco, volva visible, láminas blancas, mortal

Sombrero blanco, inicialmente conico-campanulado, después convexo y finalmente convexo-extendido, asimétrico, liso y sin estrías, a veces con centro ligeramente crema o ocráceo con la edad.

Láminas densas, libres y blancas, con esporada blanca. Pie blanco, fibriloso, algo bulboso en la base, con anillo membranoso y volva sacciforme bien visible en la base.

Carne blanca y frágil, con olor débil de joven y algo desagradable en ejemplares viejos y sabor poco significativo.

Causa intoxicaciones graves y puede ser mortal.

Dimensiones

Sombrero 4–12 cm de diámetro; pie 8–15 cm de alto

E F M A M J **J A S O N** D

...QUE LLEVO EN MI CESTA? A07

¿QUÉ SETA ES ESTA... A07

...QUE LLEVO EN MI CESTA? A08

¿QUÉ SETA ES ESTA... A08

...QUE LLEVO EN MI CESTA? A09

¿QUÉ SETA ES ESTA... A09

...QUE LLEVO EN MI CESTA? A10

¿QUÉ SETA ES ESTA... A10

...QUE LLEVO EN MI CESTA? A11

¿QUÉ SETA ES ESTA... A11

...QUE LLEVO EN MI CESTA? A12

¿QUÉ SETA ES ESTA... A12

Craterellus tubaeformis
(Fr.) Quél., 1888 — A09

Excelente comestible

B Clase: Agaricomycetes
Orden: Aphyllophorales
M Tipo: Micorrízica
0 Esporada: Ocráceo anaranjada



Forma de trompeta, pie amarillo hueco, pliegues (no láminas)

Seta conocida popularmente como «angula de monte».

Sombrero pequeño y delgado, de color pardo grisáceo a marrón oscuro, con forma de embudo o trompeta, margen ondulado y a menudo lobulado.

Himenio con pliegues muy marcados, unas veces amarillentos y otras grisáceos. Pie esbelto, hueco, de color amarillo vivo.

Carne escasa, elástica, de olor débil y sabor suave.

Crece habitualmente en grupos numerosos en zonas húmedas.

Dimensiones
Sombrero 2–6 cm de diámetro; pie 4–8 cm de alto

E F M A M J J A **S O N D**

Cantharellus cibarius
Fr., 1821 — A08

Excelente comestible

B Clase: Agaricomycetes
Orden: Aphyllophorales
M Tipo: Micorrízica
A Esporada: Amarillo anaranjada



Sombrero amarillo en forma de embudo, pliegues (no láminas), olor afrutado

Seta muy apreciada conocida como «rebozuelo» o «chantarela».

Sombrero de color amarillo a amarillo anaranjado, inicialmente convexo y pronto en forma de embudo, con margen ondulado e irregular.

Himenio formado por pliegues gruesos, decurrentes y ramificados, nunca láminas verdaderas.

Pie macizo, del mismo color que el sombrero o algo más pálido. Carne firme, blanquecina o amarillenta, con sabor suave y agradable olor afrutado que recuerda al albaricoque.

Dimensiones
Sombrero 3–10 cm de diámetro; pie 3–8 cm de alto

E F M A M **J J A S O N** D

Amanita rubescens
Pers., 1797 — A07

Precaución al consumir

B Clase: Agaricomycetes
Orden: Agaricales
M Tipo: Micorrízica
B Esporada: Blanca



Enrojece en las zonas heridas o dañadas, sombrero pardo de borde liso con copos, anillo estriado

Sombrero inicialmente hemisférico y luego convexo, de color pardo rosado a marrón rojizo, cubierto de pequeños copos más claros (nunca blancos).

Láminas libres y blancas que se tiñen de tonos rosados o rojizos al dañarse. Pie blanco con anillo y volva friable (no tiene forma de saco), que también enrojece en las zonas dañadas.

Carne blanca que vira claramente al rojo vinoso al lesionarse. Anillo colgante estriado.

Olor suave y sabor agradable, comestible solo tras cocción completa; cruda es tóxica.

Dimensiones
Sombrero 6–15 cm de diámetro; pie 7–15 cm de alto

E F M A M **J J A S O** N D

Clavulina cristata
(Holmsk.) J. Schröt., 1888 — A12

Sin valor culinario

B Clase: Agaricomycetes
Orden: Aphyllophorales
M Tipo: Micorrízica
B Esporada: Blanca



Aspecto de coral blanco, ramificaciones crestadas, sin sombrero ni láminas

Hongo con aspecto que recuerda a un coral, formado por ramificaciones erectas, blanquecinas o ligeramente crema, con extremos aplanados y crestados que recuerdan a pequeñas coronas.

Ligeramente elástica, sin diferenciación entre sombrero y pie. Superficie lisa y seca, himenio distribuido en las ramificaciones.

Carne blanca, muy frágil, sin olor destacado y de sabor poco apreciable.

Crece en el suelo de bosques, generalmente en grupos dispersos.

Dimensiones
Altura 3–6 cm; anchura similar

E F M A M J J **A S O N** D

Hydnum repandum
L., 1753 — A11

Buen comestible

B Clase: Agaricomycetes
Orden: Aphyllophorales
M Tipo: Micorrízica
B Esporada: Blanca



Himenio con aguijones, sombrero irregular color crema, pie macizo

Seta conocida popularmente como «lengua de vaca» o «gamuza». Sombrero irregular, convexo y a veces lobulado, de color crema, encarnado o ligeramente ocráceo, con superficie seca y mate.

Himenio formado por aguijones o dientes frágiles, decurrentes, de color blanquecino a encarnado, rasgo característico del género.

Pie corto y robusto, macizo, del mismo color que el sombrero o algo más claro.

Carne blanca, firme y quebradiza, de olor suave y sabor agradable, ligeramente amargo en ejemplares maduros.

Dimensiones
Sombrero 5–15 cm de diámetro; pie 3–8 cm de alto

E F M A M J J **A S O N** D

Craterellus cornucopioides
(L.) Pers., 1825 — A10

Excelente comestible

B Clase: Agaricomycetes
Orden: Aphyllophorales
M Tipo: Micorrízica
0 Esporada: Ocre



Trompeta negra, hueca hasta la base, sin láminas

Seta conocida como «trompeta de los muertos».

Tiene forma de trompeta profunda, delgada y completamente hueca, de color negro a gris negruzco, a veces con tonos pardo violáceos.

Superficie externa finamente escamosa o fibrilosa.

Himenio arrugado o casi liso, de color gris oscuro.

Carne muy delgada, frágil, de olor débil y sabor agradable.

Crece en grupos numerosos en zonas húmedas de bosques de frondosas.

Dimensiones
Sombrero 3–8 cm de diámetro, altura total 5–12 cm

E F M A M J J **A S O N D**

...QUE LLEVO EN MI CESTA? A13



¿QUÉ SETA ES ESTA... A13

...QUE LLEVO EN MI CESTA? A14



¿QUÉ SETA ES ESTA... A14

...QUE LLEVO EN MI CESTA? A15



¿QUÉ SETA ES ESTA... A15

...QUE LLEVO EN MI CESTA? A16



¿QUÉ SETA ES ESTA... A16

...QUE LLEVO EN MI CESTA? A17



¿QUÉ SETA ES ESTA... A17

...QUE LLEVO EN MI CESTA? A18



¿QUÉ SETA ES ESTA... A18

Fistulina hepatica
(Schaeff.) With., 1792 A15

Comestible

B Clase Agaricomycetes
Orden Agaricales
P Tipo Parásita
R Esporada Rosa



Aspecto de hígado crudo, carne rojiza y sangrante, poros finos

Seta carnosa y gelatinosa, con forma de lengua o hígado, de color rojo oscuro a pardo rojizo, frecuentemente brillante.

Superficie superior lisa o ligeramente rugosa; himenio inferior formado por poros finos y apretados, de color blanquecino a rosado. Carne gruesa, fibrosa y muy jugosa, que al cortarla exuda un líquido rojizo semejante a sangre.

Crece adherido al tronco de árboles vivos, principalmente robles y castaños. Buen comestible cuando es joven, con sabor ácido característico.

Dimensiones
Fructificación 10–30 cm de ancho; varios cm de grosor

E F M A M **J J A S O** N D

Fomes fomentarius
(L.) Fr., 1849 A14

No comestible

B Clase Agaricomycetes
Orden Aphyllophorales
SP Tipo Saprófita / Parásita
B Esporada Blanca



Cuerpo leñoso en forma de casco, poros finos blancos, muy duro

Hongo perenne y lignícola conocido como «yesquero».

Seta grande, dura y persistente, en forma de casco o pezuña, de color gris a gris pardo con bandas concéntricas bien marcadas.

Superficie superior muy dura y lisa, himenio formado por poros finos y densos, de color blanquecino a grisáceo. Crece adherido al tronco de árboles vivos o muertos.

No comestible, pero históricamente utilizado para obtener yesca y usado en la medicina tradicional.

Dimensiones
Fructificación 5–40 cm de ancho; hasta varios años de duración

E F M A M J J A S O N D

Ramaria pallida
(Schaeff.) Ricken, 1920 A13

Tóxica

B Clase Agaricomycetes
Orden Gomphales
M Tipo Micorrízica
O Esporada Ocre



Aspecto coralino pálido, ramificaciones gruesas, base blanquecina

Hongo con aspecto que recuerda a un coral, con cuerpo ramificado, compacto y robusto.

Las ramificaciones son gruesas, cortas y densas, de color blanquecino a crema pálido, a veces con tonos rosados muy débiles.

Superficie seca y lisa, con himenio distribuido en las ramificaciones. Carne blanca, firme, sin olor destacado y de sabor un poco amargo.

Crece en el suelo de bosques, sobre todo en hayedos, en grupos o ejemplares aislados.

Dimensiones
Altura 6–15 cm; anchura similar

E F M A M J J **A S O** N D

Sparassis crispa
(Wulfen) Fr., 1821 A18

Comestible

B Clase Agaricomycetes
Orden Aphyllophorales
SP Tipo Saprófita / Parásita
A Esporada Amarillenta



Aspecto de coliflor rizada, lóbulos ondulados, gran tamaño

Hongo muy llamativo conocido como «seta coliflor».

Fructificación grande y compacta, formada por numerosos lóbulos planos, rizados y ondulados, de color crema a beige amarillento.

Practicamente sin pie, con himenio distribuido por toda la superficie de los lóbulos.

Carne blanca, firme y elástica, de olor agradable y sabor suave.

Crece al pie de coníferas, especialmente pinos.


Dimensiones
Fructificación 10–40 cm de diámetro; peso elevado

E F M A M J J **A S O N** D

Laetiporus sulphureus
(Bull.) Murrill, 1920 A17

Precaución al consumir

B Clase Agaricomycetes
Orden Aphyllophorales
P Tipo Parásita
A Esporada Amarillenta



Grandes rosetas amarillas y anaranjadas, carnoso, poros finos

Hongo lignícola muy llamativo conocido como «pollo del bosque».

Fructificaciones grandes, en forma de repisas superpuestas o rosetas, de color amarillo azufre con tonos anaranjados intensos.

Superficie superior lisa o ligeramente aterciopelada; himenio inferior formado por poros finos y apretados, de color amarillo pálido.

Carne espesa, blanda y fibrosa cuando es joven, endureciéndose con la edad. Crece sobre troncos vivos o muertos de frondosas. Comestible solo cuando es joven y bien cocinado.

Dimensiones
Fructificaciones de hasta 50 cm o más de ancho

E F M A **M J J A S O** N D

Trametes versicolor
(L.) Lloyd, 1920 A16

No comestible

B Clase Agaricomycetes
Orden Aphyllophorales
S Tipo Saprófita
B Esporada Blanca



Sombreros en abanico multicolor, bandas concéntricas, poros blancos

Hongo lignícola muy común conocido como «cola de pavo». Fructificaciones delgadas, coriáceas y semicirculares, dispuestas en rosetas o solapadas, con superficie superior cubierta de bandas concéntricas de colores variados (marrón, gris, ocre, azulado, blanquecino).

Himenio inferior formado por poros muy finos y densos, de color blanco a crema. Crece sobre madera muerta de frondosas.

No comestible, aunque muy estudiado por sus usos tradicionales y aplicaciones medicinales. Especie perenne presente todo el año.

Dimensiones
Sombreros de 3–8 cm de ancho; muy delgados

E F M A M J J A S O N D

...QUE LLEVO EN MI CESTA? A19



¿QUÉ SETA ES ESTA... A19

...QUE LLEVO EN MI CESTA? A20



¿QUÉ SETA ES ESTA... A20

...QUE LLEVO EN MI CESTA? A21



¿QUÉ SETA ES ESTA... A21

...QUE LLEVO EN MI CESTA? A22



¿QUÉ SETA ES ESTA... A22

...QUE LLEVO EN MI CESTA? A23



¿QUÉ SETA ES ESTA... A23

...QUE LLEVO EN MI CESTA? A24



¿QUÉ SETA ES ESTA... A24

Ascobolus stercorarius
(Bull.) J. Schröt., 1893 — A21

Sin valor culinario

A Clase: Pezizomycetes
Orden: Pezizales
S Tipo: Saprófita
B Esporada: Blanca



Pequeños apotecios violáceos, superficie gelatinosa, coprófila

Ascomiceto coprófilo de pequeño tamaño, formando apotecios discoidales o ligeramente convexos, de color amarillo verdoso a púrpura negruzco, con superficie mate y aspecto gelatinoso.

Himenio liso, carece de pie diferenciado o presenta uno muy corto.

Carne extremadamente delgada y frágil, sin olor ni sabor apreciables.

Crece sobre estiércol de herbívoros en praderas y pastizales, a menudo en grupos.

Dimensiones
Apotecios 1–5 mm de diámetro

E | F | **M** | **A** | **M** | **J** | **J** | **A** | **S** | **O** | **N** | D

Dasyscyphella nivea
(R. Hedw.) Raitv., 1970 — A20

Sin valor culinario

A Clase: Leotiomycetes
Orden: Helotiales
S Tipo: Saprófita
B Esporada: Blanca



Pequeñas copas blancas con pelos, apotecios diminutos, pie largo

Ascomiceto diminuto de color blanco puro, formado por pequeños apotecios en forma de copa o platillo, de apenas 0,5–2 mm de diámetro, sostenidos por un pie largo y delgado.

Himenio liso, blanco a crema muy claro. Cara externa cubierta en el margen de finos pelos blancos, especialmente visibles con lupa, a menudo con gotitas traslúcidas en ambientes húmedos.

Carne casi inexistente, sin olor ni sabor apreciables. Crece como saprófito sobre restos leñosos de frondosas, especialmente sauces, robles y hayas.

Dimensiones
Apotecios 0,5–2 mm de diámetro; pie largo y muy fino

E | **F** | **M** | **A** | **M** | **J** | **J** | **A** | **S** | **O** | **N** | **D**

Mitrula paludosa
Fr., 1816 — A19

Sin valor culinario

A Clase: Leotiomycetes
Orden: Helotiales
S Tipo: Saprófita
B Esporada: Blanca



Cabeza amarilla anaranjada, pie traslúcido esbelto, crece en agua

Hongo pequeño y llamativo de ambientes muy húmedos, conocido como «mitrula de los pantanos».

Presenta una cabeza o mitra globosa a ligeramente alargada, de color amarillo a anaranjado brillante, lisa y gelatinosa. Pie delgado, cilíndrico y traslúcido, a menudo parcialmente sumergido en el agua.

Carece de sombrero y láminas diferenciadas.

Carne gelatinosa, frágil, sin olor ni sabor destacables.

Dimensiones
Altura total 2–6 cm; cabezuela hasta 1,5 cm

E | F | **M** | **A** | **M** | **J** | J | A | S | O | N | D

Helvella crispa
(Scop.) Fr., 1822 — A24

Precaución al consumir

A Clase: Pezizomycetes
Orden: Pezizales
S Tipo: Saprófita
B Esporada: Blanca



Sombrero plegado blanco, pie acanalado hueco, aspecto de silla de montar

Sombrero irregularmente plegado, con lóbulos ondulados y retorcidos (en forma de silla de montar), de color blanco a crema, a veces con tonos ocráceos.

Pie alto, hueco y muy característico, con profundas costillas longitudinales bien marcadas.

Himenio liso distribuido por la superficie del sombrero. Carne frágil, blanca, de olor débil y sabor poco destacado. Crece en claros de bosque y bordes de caminos.

Comestible solo tras cocción prolongada; cruda es tóxica. De escaso interés culinario.

Dimensiones
Sombrero 3–10 cm de ancho; pie 5–12 cm de alto

E | F | M | A | **M** | **J** | **J** | **A** | **S** | **O** | N | D

Dissingia leucomelaena
(Pers.) K. Hansen & X.H. Wang, 2019 — A23

Precaución al consumir

A Clase: Pezizomycetes
Orden: Pezizales
S Tipo: Saprófita
B Esporada: Blanca



Sombrero en forma de copa, blanquecino por fuera hacia la base del pie y oscuro por dentro de la copa

Ascomiceto de pequeño a mediano tamaño, sombrero en forma de copa con costillas redondeadas hacia la base del pie. Cara superior (himenio) de color negro a negro parduzco, contrastando fuertemente con la cara inferior blanquecina o gris muy claro.

Pie blanco, liso o ligeramente surcado, cilíndrico y hueco. Carne frágil, de olor débil y sabor poco apreciable.

Crece en primavera y otoño-invierno, principalmente en suelos arenosos de pinares y bosques mixtos. Se desaconseja su consumo por la posible presencia de toxinas.

Dimensiones
Apotecio 2–6 cm de diámetro; pie 3–8 cm de alto

E | **F** | **M** | **A** | **M** | **J** | J | A | S | O | N | D

Gyromitra esculenta
(Pers.) Fr., 1849 — A22

MORTAL

A Clase: Pezizomycetes
Orden: Pezizales
S Tipo: Saprófita
B Esporada: Blanquecino cremosa



Sombrero cerebriforme pardo rojizo, pie blanquecino

Ascomiceto conocido como «falsa colmenilla».

Presenta un sombrero irregular, plegado y retorcido, con aspecto de cerebro, de color pardo rojizo a castaño oscuro.

Pie relativamente corto, blanquecino o crema, hueco y frágil. Himenio liso, distribuido por toda la superficie del sombrero. Carne quebradiza, de olor débil.

Crece en primavera, sobre suelos arenosos de bosques de coníferas.

Especie muy tóxica, provoca intoxicaciones graves.

Dimensiones
Sombrero 3–10 cm de diámetro; pie 3–7 cm de alto

E | F | **M** | **A** | **M** | **J** | J | A | S | O | N | D

...QUE LLEVO EN MI CESTA? A25

¿QUÉ SETA ES ESTA... A25

...QUE LLEVO EN MI CESTA? A26

¿QUÉ SETA ES ESTA... A26

...QUE LLEVO EN MI CESTA? A27

¿QUÉ SETA ES ESTA... A27

...QUE LLEVO EN MI CESTA? A28

¿QUÉ SETA ES ESTA... A28

...QUE LLEVO EN MI CESTA? A29

¿QUÉ SETA ES ESTA... A29

...QUE LLEVO EN MI CESTA? A30

¿QUÉ SETA ES ESTA... A30

Legaliana badia

(Pers.) Van Vooren, 2020 A27

Sin valor culinario

A Clase: Pezizomycetes

Orden: Pezizales

S Tipo: Saprófita

B Esporada: Blanca



Bosques todo tipo | Himenio liso

Apotecios marrón oscuro o marrón verdoso, forma de copa irregular, sin pie definido

Forma apotecios en forma de copa o cuenco irregular, a menudo con el borde ondulado o desgarrado, de color marrón oscuro, pardo castaño o marrón verdoso.

Superficie interna lisa y brillante cuando está húmeda, más mate al secarse; cara externa más clara y finamente granulosa.

Carece de pie diferenciado o presenta uno muy corto. Carne delgada, frágil, sin olor ni sabor apreciables.

Crece sobre suelos desnudos, entre restos herbáceos y en terrenos removidos.

Dimensiones

Apotecios 4–10 cm de diámetro

E F M **A M J J A S O N** D

Morchella esculenta

(L.) Pers., 1801 A26

Excelente comestible

A Clase: Pezizomycetes

Orden: Pezizales

S Tipo: Saprófita

B Esporada: Blanca



Bosques frondosas | Borde de caminos | Himenio alveolado

Sombrero alveolado, pie hueco, colmenilla verdadera

Ascomiceto muy apreciado conocido como «colmenilla». Sombrero ovoide a cónico, completamente alveolado, con cavidades profundas y regulares, de color amarillo ocráceo a pardo claro. El pie es blanquecino, hueco, relativamente grueso y completamente soldado al sombrero. Himenio liso distribuido por el interior de los alveolos.

Carne frágil, elástica, de olor agradable y sabor suave. Crece en primavera en suelos ricos, bosques de ribera o bosques de montaña.

Excelente comestible, debe deshidratarse previamente y despues consumirse bien cocinada; cruda es tóxica.

Dimensiones

Sombrero 4–12 cm de ancho; pie 3–10 cm de alto

E F **M A M J** J A S O N D

Helvella lacunosa

Afzel. ex Fr., 1823 A25

Precaución al consumir

A Clase: Pezizomycetes

Orden: Pezizales

S Tipo: Saprófita

B Esporada: Blanca



Bosques todo tipo | Borde de caminos | Zonas quemadas | Himenio liso

Sombrero negro plegado, pie hueco y acanalado

Sombrero irregularmente plegado y lobulado, de color gris oscuro a negro, con superficie mate.

Pie alto, hueco y profundamente acanalado, de color grisáceo a negruzco, rasgo muy característico.

Himenio liso distribuido por la superficie del sombrero.

Carne frágil, de color oscuro, sin olor ni sabor destacados. Crece en suelos removidos, zonas quemadas, claros de bosque y bordes de caminos.

Comestible solo tras cocción prolongada; cruda es tóxica. De escaso interés culinario.

Dimensiones

Sombrero 3–10 cm de ancho; pie 5–12 cm de alto

E F M A **M J J A S O** N D

Xylaria hypoxylon

(L.) Grev., 1824 A30

No comestible

A Clase: Sordariomycetes

Orden: Xylariales

S Tipo: Saprófita

N Esporada: Negra



Madera muerta | Superficie peritecios | Textura dura

Estructuras negras en forma de cuernos, puntas blanquecinas, crece sobre madera

Forma cuerpos fructíferos erectos, delgados y ramificados, de color negro a negro azulado, durante el otoño a menudo con las puntas blanquecinas (fase asexual).

Superficie dura y mate. Carece de sombrero y pie diferenciados, con el himenio distribuido por la superficie del estroma.

Carne muy dura y coriácea, sin olor ni sabor apreciables.

Crece sobre madera muerta de frondosas, frecuentemente en grupos densos.

Dimensiones

Estromas de 3–8 cm de altura

E F M A M J J A S O N D

Cordyceps militaris

(L.) Fr., 1818 A29

Sin valor culinario

A Clase: Sordariomycetes

Orden: Hypocreales

P Tipo: Parásita

B Esporada: Blanca



Bosques coníferas | Superficie peritecios

Aspecto de pequeños bastones anaranjados, parásita de insectos

Ascomiceto parásito muy llamativo que crece sobre pupas y larvas de insectos enterradas en el suelo (especialmente larvas de *Procesionaria*).

Forma cuerpos fructíferos alargados y claviformes, de color naranja intenso a rojo anaranjado, con superficie finamente granulosa.

Himenio con pequeños peritecios distribuidos por la superficie de la clava. Con un pie corto y más o menos diferenciado, unido en su extremo a la larva muerta. Carne fibrosa y tenaz, sin olor ni sabor destacables.

Aparece en bosques durante los meses cálidos.

Dimensiones

Cuerpos fructíferos de 2–8 cm de altura

E F M A M J J A S O N D

Aleuria aurantia

(Pers.) Fuckel, 1870 A28

Sin valor culinario

A Clase: Pezizomycetes

Orden: Pezizales

S Tipo: Saprófita

B Esporada: Blanca



Borde de caminos | Suelos arenosos | Himenio liso

Copa naranja brillante, aspecto de cáscara de naranja, sin pie

Forma apotecios en forma de copa o cuenco abierto, a menudo irregular y con el borde ondulado, de color naranja intenso muy vivo.

Superficie interna lisa y brillante; cara externa más pálida y finamente granulosa. Carece de pie diferenciado o presenta uno muy corto.

Carne fina, frágil, sin olor ni sabor apreciables.

Crece sobre suelos desnudos, arenosos o removidos, con frecuencia en bordes de caminos.

Dimensiones

Apotecios 2–10 cm de diámetro

E F M **A M J J A S O N** D

...QUE LLEVO EN MI CESTA? A31

¿QUÉ SETA ES ESTA... A31

...QUE LLEVO EN MI CESTA? A32

¿QUÉ SETA ES ESTA... A32

...QUE LLEVO EN MI CESTA? A33

¿QUÉ SETA ES ESTA... A33

...QUE LLEVO EN MI CESTA? A34

¿QUÉ SETA ES ESTA... A34

...QUE LLEVO EN MI CESTA? A35

¿QUÉ SETA ES ESTA... A35

...QUE LLEVO EN MI CESTA? A36

¿QUÉ SETA ES ESTA... A36

Boletus aereus
Bull., 1789 — A33

Excelente comestible

B Clase: Agaricomycetes
Orden: Boletales
M Tipo: Micorrízica
0 Esporada: Ocre



Sombrero muy oscuro casi negro, pie robusto reticulado, poros blancos

Sombrero grande y convexo, de color pardo muy oscuro a casi negro, con superficie seca y mate, a menudo aterciopelada.

Himenio con tubos y poros blancos de joven, luego amarillentos y verdosos (no azulea). Pie grueso y macizo, claro a pardo, con retícula bien marcada, más visible en la parte superior.

Carne blanca, firme y compacta, inmutable al corte, de olor agradable y sabor dulce.

Micorrízica principalmente con frondosas mediterráneas.

Dimensiones
Sombrero 8–25 cm de diámetro; pie 8–18 cm de alto

E F M A M **J J A S O** N D

Boletus pinophilus
Pilát & Dermek, 1973 — A32

Excelente comestible

B Clase: Agaricomycetes
Orden: Boletales
M Tipo: Micorrízica
0 Esporada: Ocre



Sombrero pardo rojizo, pie robusto reticulado, poros blancos

Sombrero grande y carnoso, primero hemisférico y luego convexo, de color pardo rojizo a castaño oscuro, a menudo con tonos vinosos. Superficie seca o ligeramente grasienta. Himenio con tubos y poros blancos de joven, después amarillentos y verdosos (no azulea).

Pie grueso y robusto, con retícula clara a rojiza, más marcada en la parte superior. Carne blanca y firme, inmutable al corte, de olor agradable y sabor dulce.

Micorrízica preferente de pinos, pero presente tambien frecuentemente en planifolios.

Dimensiones
Sombrero 8–30 cm de diámetro; pie 8–20 cm de alto

E F M A M **J J A S O N D**

Boletus edulis
Bull., 1782 — A31

Excelente comestible

B Clase: Agaricomycetes
Orden: Boletales
M Tipo: Micorrízica
0 Esporada: Ocre



Sombrero pardo, pie grueso con retícula blanca, poros blancos

Sombrero grande y convexo, de color pardo a castaño, con superficie lisa y algo untuosa en tiempo húmedo.

Himenio con tubos y poros blancos de joven, después amarillentos y verdosos, nunca azuleantes.

Pie robusto y engrosado, de color claro, con fina retícula blanquecina visible de forma mas acentuada en la parte superior.

Carne blanca y firme, inmutable al corte, de olor agradable y sabor suave y dulce. Micorrízica de numerosos árboles.

Dimensiones
Sombrero 7–25 cm de diámetro; pie 8–20 cm de alto

E F M A M J J A **S O N D**

Neoboletus erythropus
(Pers.) C. Hahn, 2015 — A36

Precaución al consumir

B Clase: Agaricomycetes
Orden: Boletales
M Tipo: Micorrízica
0 Esporada: Ocre



Poros rojo intenso, pie punteado rojo, azulea muy rápidamente

Sombrero convexo, de color pardo oscuro a castaño, con superficie seca y mate.

Himenio formado por tubos amarillos y poros rojo intenso, que azulean de forma inmediata al tacto.

Pie macizo, sin retícula, cubierto de numerosos puntitos de color rojo sobre fondo amarillento. Carne amarilla que vira intensamente al azul al corte.

Forma micorrizas con frondosas y coníferas.

Comestible solo tras cocción completa; crudo es tóxico.

Dimensiones
Sombrero 6–20 cm de diámetro; pie 6–15 cm de alto

E F M A M **J J A S O** N D

Suillellus queletii
(Schulzer) Vizzini, Simonini & Gelardi, 2014 — A35

Precaución al consumir

B Clase: Agaricomycetes
Orden: Boletales
M Tipo: Micorrízica
0 Esporada: Ocre



Sombrero pardo rojizo, poros rojizos, azulea intensamente al corte

Boletal de tamaño medio denominado anteriormente *Boletus queletii*.

Sombrero convexo, de color pardo rojizo a castaño oscuro, con superficie seca y mate. Himenio formado por tubos y poros rojizos a anaranjados, que azulean intensamente al tacto o al corte.

Pie robusto, de color amarillento a rojizo, liso, sin retículo. Carne amarillenta que vira rápidamente al azul al cortarse y rojiza en la base del pie.

Comestible solo tras cocción prolongada; crudo es tóxico. Forma micorrizas con frondosas.


Dimensiones
Sombrero 6–15 cm de diámetro; pie 5–12 cm de alto

E F M A M **J J A S O** N D

Boletus reticulatus
(Hoffm.) Pers., 1801 — A34

Excelente comestible

B Clase: Agaricomycetes
Orden: Boletales
M Tipo: Micorrízica
0 Esporada: Ocre



Sombrero pardo claro agrietado, retícula muy marcada, poros blancos

Boleto muy apreciado, conocido como «boleto reticulado» o «boleto estival».

Sombrero grande y carnoso, pardo claro a avellana, a menudo agrietado en tiempo seco. Superficie seca y mate. Himenio con tubos y poros blancos de joven, después amarillentos y verdosos, sin azulear.

Pie robusto y claro, con retícula muy marcada y extensa. Carne blanca y firme, inmutable al corte, de olor agradable y sabor dulce.

Fructifica temprano respecto a otros boletos de la sección *edules*.

Dimensiones
Sombrero 8–30 cm de diámetro; pie 8–20 cm de alto

E F M A **M J J A S** O N D

...QUE LLEVO EN MI CESTA? A37

¿QUÉ SETA ES ESTA... A37

...QUE LLEVO EN MI CESTA? A38

¿QUÉ SETA ES ESTA... A38

...QUE LLEVO EN MI CESTA? A39

¿QUÉ SETA ES ESTA... A39

...QUE LLEVO EN MI CESTA? A40

¿QUÉ SETA ES ESTA... A40

...QUE LLEVO EN MI CESTA? A41

¿QUÉ SETA ES ESTA... A41

...QUE LLEVO EN MI CESTA? A42

¿QUÉ SETA ES ESTA... A42

Suillus luteus
(L.) Roussel, 1821 — A39

Buen comestible

B Clase: Agaricomycetes — Orden: Boletales
M Tipo: Micorrízica — 0 Esporada: Ocre



Sombrero marrón muy viscoso, anillo blanco, asociado a pinos

Sombrero convexo de color marrón a castaño oscuro, muy viscoso y brillante en tiempo húmedo, con cutícula fácilmente separable. Himenio formado por tubos y poros amarillos, pequeños y redondeados, que no azulean al tacto.

Pie cilíndrico de color amarillento, provisto de un anillo membranoso de blanco a violáceo.

Carne amarillenta, blanda, de olor suave y sabor agradable. Buen comestible tras retirar la cutícula viscosa (puede resultar indigesta). Produce efectos laxantes en algunas personas

Forma micorrizas casi exclusivamente con pinos.

Dimensiones

Sombrero 4–12 cm de diámetro; pie 5–10 cm de alto

E F M A M J J A **S O N D**

Leccinum scabrum
(Bull.) Gray, 1821 — A38

Comestible

B Clase: Agaricomycetes — Orden: Boletales
M Tipo: Micorrízica — 0 Esporada: Ocre



Asociado a abedules, pie con escamas negras, carne que se oscurece

Boletal conocido como «boleto de abedul».

Sombrero convexo, de color pardo grisáceo a pardo oscuro, con superficie seca y lisa. Himenio con tubos y poros blanquecinos que se tornan grisáceos con la edad.

Pie largo y cilíndrico, sin retícula, cubierto de numerosas escamas negras. Carne blanca que al corte se vuelve grisácea o negruzca, especialmente en el pie. Olor y sabor suaves.

Forma micorrizas casi exclusivas con abedules. Comestible, debe cocinarse.

Dimensiones

Sombrero 6–15 cm de diámetro; pie 8–18 cm de alto

E F M A M **J J A S O** N D

Boletus lepidus
H. Bouchet ex Essette, 1965 — A37

Buen comestible

B Clase: Agaricomycetes — Orden: Boletales
M Tipo: Micorrízica — 0 Esporada: Ocre



Sombrero pardo, pie con escamas oscuras, oscurece al corte

Boletal robusto propio de ambientes mediterráneos, asociado principalmente a encinas y alcornoques.

Sombrero grande y convexo, de color pardo a castaño oscuro, con superficie seca y lisa. Himenio formado por tubos y poros blanquecinos a crema, que oscurecen con la edad.

Pie largo y cilíndrico, sin retícula, cubierto de numerosas escamas o granulaciones oscuras características del género.

Carne blanca que al corte se torna grisácea y posteriormente negruzca, especialmente en el pie. Olor y sabor suaves.

Dimensiones

Sombrero 8–20 cm de diámetro; pie 8–18 cm de alto

E F M A M J J A **S O N D**

Paxillus involutus
(Batsch) Fr., 1838 — A42

MORTAL

B Clase: Agaricomycetes — Orden: Boletales
M Tipo: Micorrízica — 0 Esporada: Ocre



Sombrero pardo con borde enrollado, láminas decurrentes enrojece al corte

Sombrero de tamaño medio, inicialmente convexo y luego deprimido, de color pardo amarillento a marrón oscuro, con el borde fuertemente enrollado durante gran parte de su desarrollo.

Láminas algo separadas, decurrentes, de color amarillento a pardo, que se oscurecen al presionarlas y se separan fácilmente del sombrero. Pie corto y robusto.

Carne amarillenta que enrojece al corte o al manipularla. Olor débil y sabor ligeramente ácido.

Forma micorrizas con numerosos árboles.

Dimensiones

Sombrero 5–15 cm de diámetro; pie 3–8 cm de alto

E F M A M **J J A S O N** D

Imleria badia
(Fr.) Vizzini, 2014 — A41

Buen comestible

B Clase: Agaricomycetes — Orden: Boletales
M Tipo: Micorrízica — 0 Esporada: Ocre



Sombrero pardo oscuro, poros amarillos azuleantes, pie sin retícula

Denominado anteriormente *Xerocomus badius*. Sombrero convexo, de color pardo oscuro a castaño chocolate, con superficie lisa y seca. Himenio formado por tubos y poros amarillos que azulean claramente al tacto o al corte.

Pie cilíndrico, de color pardo claro a amarillento, sin retícula ni escamas. Carne blanca a amarillenta, que vira al azul al seccionarse, especialmente bajo el himenio.

Olor suave y sabor agradable.

Forma micorrizas con coníferas y aparece con frecuencia en suelos ácidos.

Dimensiones

Sombrero 6–15 cm de diámetro; pie 6–12 cm de alto

E F M A M J **J A S O N** D

Suillus granulatus
(L.) Roussel, 1806 — A40

Comestible

B Clase: Agaricomycetes — Orden: Boletales
M Tipo: Micorrízica — 0 Esporada: Ocre



Sombrero viscoso de color crema o encarnado, sin anillo, poros con gotas lechosas

Sombrero convexo, de color amarillo ocráceo a pardo claro, muy viscoso en tiempo húmedo, con cutícula fácilmente separable.

Himenio formado por tubos y poros amarillos que exudan pequeñas gotitas blanquecinas o lechosas cuando es joven. Pie cilíndrico, sin anillo, de color amarillento, con pequeños gránulos en la parte superior.

Carne amarilla pálida, blanda, de olor suave y sabor agradable. Forma micorrizas con coníferas y con planifolios. Comestible tras retirar la cutícula viscosa.

Dimensiones

Sombrero 4–10 cm de diámetro; pie 5–9 cm de alto

E F M A M **J J A S O N** D

...QUE LLEVO EN MI CESTA? A43

¿QUÉ SETA ES ESTA... A43

...QUE LLEVO EN MI CESTA? A44

¿QUÉ SETA ES ESTA... A44

...QUE LLEVO EN MI CESTA? A45

¿QUÉ SETA ES ESTA... A45

...QUE LLEVO EN MI CESTA? A46

¿QUÉ SETA ES ESTA... A46

...QUE LLEVO EN MI CESTA? A47

¿QUÉ SETA ES ESTA... A47

...QUE LLEVO EN MI CESTA? A48

¿QUÉ SETA ES ESTA... A48

Cortinarius violaceus

(L.) Gray, 1821 — A45

Sin valor culinario

B Clase: Agaricomycetes
Orden: Agaricales
M Tipo: Micorrízica
0 Esporada: Ocre



Color violeta intenso en todo el carpóforo, aspecto aterciopelado

Toda la seta presenta un color violeta oscuro a púrpura, incluido sombrero, láminas y pie. Sombrero convexo, de superficie seca y aterciopelada.

Láminas relativamente espaciadas, adnatas, del mismo tono violeta, oscureciendo ligeramente con la madurez por la esporada ocre.

Pie robusto y fibroso, con restos de cortina más visibles en ejemplares jóvenes. Carne violácea, firme, sin cambios apreciables al corte. Olor débil y sabor suave.

Aparece con frondosas y coníferas.

Dimensiones

Sombrero 5–12 cm de diámetro; pie 6–15 cm de alto


E F M A M J J **A S O** N D

Cortinarius orellanus

Fr., 1838 — A44

MORTAL

B Clase: Agaricomycetes
Orden: Agaricales
S Tipo: Saprófita
0 Esporada: Ocre



Sombrero pardo con borde más claro, cortina de joven, tóxica

Seta muy tóxica, también conocida como «cortinario mortal».

Sombrero de tamaño medio, inicialmente hemisférico y luego plano, de color pardo a marrón con tonos amarillentos en el borde. Superficie seca, que se vuelve mate con la edad.

Himenio formado por láminas adnatas, de color crema o mostaza de joven, que se oscurecen con la edad.

Pie robusto, de color amarillo a marrón con restos de cortina solo visibles en ejemplares jóvenes. Carne amarillo pálido, que no cambia de color al corte.

Dimensiones

Sombrero 5–15 cm de diámetro; pie 7–15 cm de alto

E F M A M J **J A S O** N D

Hygrophoropsis aurantiaca

(Wulfen) Maire, 1921 — A43

Sin valor culinario

B Clase: Agaricomycetes
Orden: Boletales
S Tipo: Saprófita
B Esporada: Blanca



Color naranja intenso, láminas decurrentes

Seta conocida como «falso rebozuelo». Sombrero de tamaño medio, primero convexo y luego extendido o algo deprimido, de color naranja vivo a anaranjado ocráceo, con superficie seca y finamente tomentosa.

Láminas muy decurrentes, densas, ramificadas, facilmente separables y de color naranja (en el caso de los rebozuelos verdaderos son pliegues). Pie cilíndrico, del mismo color que el sombrero o algo más pálido. Carne blanda y amarillenta, sin olor ni sabor destacables.

Crece entre restos herbaceos y restos de madera en suelos ácidos. De escaso valor gastronomico.

Dimensiones

Sombrero 4–10 cm de diámetro; pie 3–7 cm de alto

E F M A M J J **A S O N D**

Crucibulum crucibuliforme

(Scop.) V.S. White, 1902 — A48

Sin valor culinario

B Clase: Agaricomycetes
Orden: Gasterales
S Tipo: Saprófita
B Esporada: Blanca



Forma de pequeño «nido con huevos», crece sobre madera

Hongo gasteroide conocido como «nido de pájaro».

Cuerpo fructífero muy pequeño, inicialmente cerrado y cubierto por una membrana que se rompe al madurar, dejando una estructura en forma de copa o nido.

En su interior se observan varios peridiolos lenticulares, de color blanquecino, que contienen las esporas y recuerdan a pequeños huevos.

Superficie externa pardo clara a beige, algo tomentosa. Carece de sombrero, láminas y pie diferenciados. Crece sobre madera muerta y restos vegetales en descomposición.

Dimensiones

Diámetro 5–10 mm; altura hasta 10 mm

E F M **A M J J A S O N** D

Lycoperdon perlatum

Pers., 1795 — A47

Comestible mediocre

B Clase: Agaricomycetes
Orden: Gasterales
S Tipo: Saprófita
0 Esporada: Ocre



Forma globosa, verrugas cónicas, gleba blanca de joven

Cuerpo fructífero globoso a piriforme, de color blanco a crema, cubierto de pequeñas verrugas o espinas cónicas que se desprenden con facilidad, dejando una superficie reticulada.

Sin sombrero ni láminas, con pseudopie poco diferenciado. Gleba blanca y firme en ejemplares jóvenes, tornándose parda y pulverulenta al madurar, cuando libera las esporas por una abertura apical.

Olor débil y sabor suave en ejemplares jóvenes. Crece en suelos forestales, praderas y claros. Comestible de escaso valor y solo cuando la gleba es blanca y compacta.

Dimensiones

Diámetro 3–6 cm; altura total hasta 7 cm

E F M A M **J J A S O N** D

Bovista plumbea

Pers., 1796 — A46

Sin valor culinario

B Clase: Agaricomycetes
Orden: Gasterales
S Tipo: Saprófita
0 Esporada: Ocre



Forma globosa blanquecina, sin pie visible, gleba parda al madurar

Cuerpo fructífero globoso a subglobosos, de pequeño tamaño, inicialmente blanco y luego gris plomizo.

Carece de pie diferenciado, asentándose directamente sobre el sustrato.

Superficie externa lisa o ligeramente granulosa, la primera capa de piel es separable de joven. La gleba es blanca y compacta en ejemplares jóvenes, tornándose parda y pulverulenta al madurar, liberando las esporas por una abertura apical.

Olor y sabor poco apreciables. Crece en praderas, pastizales y suelos abiertos.

Dimensiones

Diámetro 2–6 cm

E F M A **M J J A S O** N D

...QUE LLEVO EN MI CESTA? A49

¿QUÉ SETA ES ESTA... A49

...QUE LLEVO EN MI CESTA? A50

¿QUÉ SETA ES ESTA... A50

...QUE LLEVO EN MI CESTA? A51

¿QUÉ SETA ES ESTA... A51

...QUE LLEVO EN MI CESTA? A52

¿QUÉ SETA ES ESTA... A52

...QUE LLEVO EN MI CESTA? A53

¿QUÉ SETA ES ESTA... A53

...QUE LLEVO EN MI CESTA? A54

¿QUÉ SETA ES ESTA... A54

Scleroderma citrinum

Pers., 1801 — A51

Tóxica

B Clase: Agaricomycetes
Orden: Gasterales
M Tipo: Micorrízica
0 Esporada: Ocre



Peridio grueso verrugoso, gleba negra desde joven, olor fuerte

Cuerpo fructífero globoso a irregular, de tamaño medio, con peridio grueso y coriáceo, de color amarillento a pardo, cubierto de escamas o placas poligonales. Carece de pie diferenciado.

La gleba es muy oscura (gris violácea a negra) incluso en ejemplares jóvenes, compacta al principio y pulverulenta al madurar.

Olor fuerte y desagradable.

Crece de forma superficial o a veces un poco enterrada en suelos forestales, a menudo micorrizando con frondosas y coníferas.

Dimensiones
Diámetro 5–10 cm

E F M A M **J J A S O N** D

Clathrus archeri

(Berk.) Dring, 1980 — A50

Sin valor culinario

B Clase: Agaricomycetes
Orden: Gasterales
S Tipo: Saprófita
0 Esporada: Ocre



Forma de estrella o pulpo rojo, olor fétido, emerge de un huevo

Aparece como un «huevo» blanquecino del que emergen de cuatro a siete brazos alargados de color rojo intenso, que se abren en forma de estrella.

La superficie interna de los brazos está cubierta de una gleba viscosa de color verde oliva oscuro, que desprende un olor muy fuerte y desagradable a materia en descomposición que atrae a insectos que facilitan la dispersión de las esporas.

Carece de sombrero y láminas. Crece sobre suelos ricos en materia orgánica, a menudo en jardines y bosques.

Dimensiones
Diámetro extendido hasta 15 cm; huevo inicial 3–6 cm

E F M A M **J J A S O** N D

Phallus impudicus

L., 1753 — A49

Sin valor culinario

B Clase: Agaricomycetes
Orden: Gasterales
S Tipo: Saprófita
0 Esporada: Ocre



Olor fétido intenso, forma fálica, emerge de un huevo

Inicialmente aparece en forma de «huevo» blanquecino semienterrado, del que emerge el cuerpo fructífero adulto, de aspecto cilíndrico y hueco, con un sombrerillo cónico cubierto de gleba viscosa de color verdoso oliva.

Esta gleba desprende un olor muy intenso y desagradable a carne en descomposición, que atrae insectos responsables de la dispersión de las esporas.

Pie blanco, esponjoso y frágil, con volva sacciforme en la base.

Crece sobre suelos ricos en materia orgánica.

Dimensiones
Altura 10–25 cm; huevo inicial 4–6 cm de diámetro

E F M A **M J J A S O** N D

Lactarius deliciosus

(L.) Gray, 1821 — A54

Excelente comestible

B Clase: Agaricomycetes
Orden: Russulales
M Tipo: Micorrízica
B Esporada: Marfil



Color naranja, carne naranja, látex anaranjado

Seta muy apreciada conocida popularmente como «níscalo» o «robellón».

Sombrero inicialmente convexo y luego deprimido, de color anaranjado con zonas concéntricas más oscuras, superficie seca y lisa.

Láminas adnatas, densas, de color naranja, que al dañarse se manchan de tonos verdosos. Pie corto y robusto, del mismo color que el sombrero o algo más pálido. Carne compacta, de olor agradable y sabor suave.

Al corte exuda látex de color naranja zanahoria.

Micorriza casi exclusivamente con pinos.

Dimensiones
Sombrero 5–15 cm de diámetro; pie 3–7 cm de alto


E F M A M J J A **S O N D**

Lactarius rufus

(Scop.) Fr., 1838 — A53

No comestible

B Clase: Agaricomycetes
Orden: Russulales
M Tipo: Micorrízica
B Esporada: Blanca



Sombrero rojo pardo, látex blanco muy picante, láminas adnatas

Sombrero de tamaño medio, convexo y luego deprimido, de color rojizo o encarnado rojizo, con superficie seca y mate.

Láminas densas, adnatas, de color crema a ocráceo. Al corte o rotura exuda abundante látex blanco que no cambia de color, de sabor extremadamente picante y persistente.

Pie cilíndrico, del mismo color que el sombrero o algo más claro. Carne blanquecina, firme, de olor débil.

Forma micorrizas principalmente con coníferas.

Dimensiones
Sombrero 4–10 cm de diámetro; pie 4–8 cm de alto

E F M **A M** J J A **S O N D**

Astraeus hygrometricus

(Pers.) Morgan, 1889 — A52

Sin valor culinario

B Clase: Agaricomycetes
Orden: Gasterales
M Tipo: Micorrízica
0 Esporada: Ocre



Estrella de tierra con brazos gruesos, se abre y cierra con la humedad

Cuerpo fructífero inicialmente globoso que, al madurar, se abre en varios brazos o lacinias gruesos y rígidos formando una estrella.

Estos brazos reaccionan a la humedad ambiental, abriéndose en condiciones húmedas y cerrándose en tiempo seco, elevando el saco esporífero central.

El endoperidio es globoso, de color grisáceo o pardo, con una abertura apical por la que se liberan las esporas. Superficie externa dura y coriácea.

Crece sobre suelos arenosos y claros de bosque, micorriza con distintos árboles.

Dimensiones
Diámetro extendido 5–10 cm

E F M A M J **J A S O N** D

...QUE LLEVO EN MI CESTA? A55

¿QUÉ SETA ES ESTA... A55

...QUE LLEVO EN MI CESTA? A56

¿QUÉ SETA ES ESTA... A56

...QUE LLEVO EN MI CESTA? A57

¿QUÉ SETA ES ESTA... A57

...QUE LLEVO EN MI CESTA? A58

¿QUÉ SETA ES ESTA... A58

...QUE LLEVO EN MI CESTA? A59

¿QUÉ SETA ES ESTA... A59

...QUE LLEVO EN MI CESTA? A60

¿QUÉ SETA ES ESTA... A60

Lepiota brunneoincarnata

Chodat & C. Martín, 1889 — A57

MORTAL

B Clase: Agaricomycetes
Orden: Agaricales
S Tipo: Saprófita
B Esporada: Blanca



Pequeña, sombrero pardo escamoso, anillo frágil, mortal

Pequeña seta del género *Lepiota,* extremadamente peligrosa.

Sombrero de 2–6 cm, convexo a plano, de color pardo rojizo a marrón oscuro, cubierto de escamas concéntricas más oscuras sobre fondo claro. Láminas blancas, libres y densas.

Pie delgado y frágil, con anillo poco persistente, a menudo desaparecido en ejemplares adultos. Carece de volva.

Carne blanca, de olor débil. Crece en praderas, jardines y zonas herbosas a menudo en entornos urbanos.

Dimensiones
Sombrero 2–6 cm de diámetro; pie 4–7 cm de alto

E F M A M **J J A S O** N D

Lactarius torminosus

(Schaeff.) Pers., 1797 — A56

Tóxica

B Clase: Agaricomycetes
Orden: Russulales
M Tipo: Micorrízica
B Esporada: Blanca



Sombrero rosado con margen muy peloso, látex blanco muy picante

Sombrero de color rosado a rosado pálido, con zonas concéntricas (en ocasiones más oscuras) y un margen densamente cubierto de pelos largos y lanosos.

Sombrero inicialmente convexo y luego un poco deprimido. Láminas adnatas, apretadas, de color crema a rosado pálido. Al corte exuda látex blanco abundante que no cambia de color y presenta un sabor extremadamente picante e irritante.

Pie corto y robusto, del mismo tono que el sombrero. Carne blanquecina, de olor débil.

Forma micorrizas casi exclusivamente con abedules.

Dimensiones
Sombrero 5–12 cm de diámetro; pie 3–6 cm de alto


E F M A M J J **A S O N** D

Lactarius chrysorrheus

Fr., 1838 — A55

Tóxica

B Clase: Agaricomycetes
Orden: Russulales
M Tipo: Micorrízica
B Esporada: Blanca



Sombrero de color encarnado, látex blanco que amarillea, sabor muy picante

Sombrero convexo y luego algo deprimido, de color encarnado a ocráceo, superficie seca y lisa. Láminas adnatas, densas, de color crema a amarillento.

Al corte exuda látex blanco abundante que vira rápidamente a amarillo intenso al contacto con el aire.

Pie cilíndrico, del mismo color que el sombrero o algo más claro.

Carne blanquecina, de olor débil y sabor extremadamente picante. Forma micorrizas principalmente con robles y otras frondosas.

Dimensiones
Sombrero 4–10 cm de diámetro; pie 4–7 cm de alto

E F M A M J J **A S O N** D

Chlorophyllum venenatum

(Bon) C. Lange & Vellinga, 2008 — A60

Tóxica

B Clase: Agaricomycetes
Orden: Agaricales
S Tipo: Saprófita
B Esporada: Blanca



Parecida a parasol, carne que enrojece, tóxica

Seta mediana que puede confundirse con la *Macrolepiota procera*. Sombrero convexo a extendido, de color blanquecino a pardo claro, cubierto de escamas pardas irregulares que a menudo forman una estrella. Láminas blancas, libres y densas.

Pie robusto, bulboso, sin volva, con anillo amplio pero no móvil. Carne blanca que enrojece claramente al cortarse o al rozarse, especialmente en el pie. Olor débil.

Crece en bosques, jardines y zonas ricas en materia orgánica. Provoca intoxicaciones gastrointestinales en muchas personas.

Dimensiones
Sombrero 10–20 cm de diámetro; pie 10–18 cm de alto

E F M A M J **J A S O** N D

Macrolepiota procera

(Scop.) Singer, 1948 — A59

Excelente comestible

B Clase: Agaricomycetes
Orden: Agaricales
S Tipo: Saprófita
B Esporada: Blanca



Muy grande, sombrero escamoso, anillo móvil, pie atigrado

Sombrero de gran tamaño, inicialmente ovoide y luego ampliamente extendido, de color beige a pardo claro, cubierto de grandes escamas oscuras dispuestas concéntricamente, con un umbón central marcado. Láminas blancas, libres y densas.

Pie muy largo y delgado, con un característico dibujo atigrado o en zig-zag, provisto de un anillo grueso, doble y móvil. Carece de volva.

Carne blanca, blanda en el sombrero y fibrosa en el pie, de olor agradable y sabor suave. Crece en praderas, claros de bosque y zonas herbosas.

Dimensiones
Sombrero 15–30 cm de diámetro; pie hasta 30 cm de alto

E F M A M J J **A S O N** D

Lepiota cristata

(Bolton) P. Kumm., 1871 — A58

Tóxica

B Clase: Agaricomycetes
Orden: Agaricales
S Tipo: Saprófita
B Esporada: Blanca



Pequeña, olor desagradable, sombrero pardo escamoso, anillo frágil

Sombrero de 2–5 cm, convexo a plano, de color blanquecino a crema, cubierto de escamas pardas dispuestas de forma concéntrica, más densas hacia el centro.

Láminas blancas, libres y apretadas. Pie delgado y frágil, con anillo poco persistente, que suele desaparecer con la edad. Carece de volva.

Carne blanca, de olor desagradable, a veces descrito como a goma quemada o a rancio.

Crece en praderas, jardines y zonas herbosas, a menudo en ambientes urbanos.

Dimensiones
Sombrero 2–5 cm de diámetro; pie 3–6 cm de alto

E F M A M **J J A S O** N D

...QUE LLEVO EN MI CESTA? A61

¿QUÉ SETA ES ESTA... A61

...QUE LLEVO EN MI CESTA? A62

¿QUÉ SETA ES ESTA... A62

...QUE LLEVO EN MI CESTA? A63

¿QUÉ SETA ES ESTA... A63

...QUE LLEVO EN MI CESTA? A64

¿QUÉ SETA ES ESTA... A64

...QUE LLEVO EN MI CESTA? A65

¿QUÉ SETA ES ESTA... A65

...QUE LLEVO EN MI CESTA? A66

¿QUÉ SETA ES ESTA... A66

Russula sardonia
Fr., 1838 A63

No comestible

B Clase Agaricomycetes
Orden Russulales
M Tipo Micorrízica
0 Esporada Ocre


Bosques coníferas | Láminas adnatas

Sombrero púrpura violáceo, láminas amarillas, sabor muy picante

Sombrero convexo a plano, de color púrpura oscuro a violáceo, a veces con tonos marrones, superficie seca y brillante. Láminas adnatas, de color amarillento a crema, rasgo muy característico.

Pie cilíndrico, robusto, de color blanquecino a púrpura que parte como tiza.

Carne blanca, frágil, de olor débil y sabor muy picante.

Forma micorrizas principalmente con coníferas, especialmente pinos.

Dimensiones
Sombrero 5–10 cm de diámetro; pie 4–8 cm de alto

E F M A M J J **A S O N** D

Pleurotus ostreatus
(Jacq.) P. Kumm., 1871 A62

Excelente comestible

B Clase Agaricomycetes
Orden Agaricales
S Tipo Saprófita
B Esporada Blanca


Bosques frondosas | Madera muerta | Láminas decurrentes

Sombrero en forma de ostra, crecimiento en grupos, láminas decurrentes

Seta muy conocida y cultivada, llamada comúnmente «seta de ostra».

Sombrero en forma de concha u ostra, de color gris, gris azulado o pardo, con superficie lisa. Láminas de color blanco a crema, muy decurrentes sobre un pie corto o casi inexistente situado de forma excéntrica.

Crece formando grupos superpuestos sobre troncos y madera muerta de frondosas.

Carne blanca, tierna, de olor suave y sabor agradable.

Dimensiones
Sombrero 5–15 cm de diámetro; pie muy corto o ausente

E F M **A M J J A S O** N D

Pleurotus eryngii
(DC.) Quél., 1872 A61

Excelente comestible

B Clase Agaricomycetes
Orden Agaricales
S Tipo Saprófita
B Esporada Blanca


Praderas, con cardos | Láminas decurrentes

Pie corto, láminas decurrentes, asociado a cardos

Seta muy apreciada conocida como «seta de cardo».

Sombrero convexo a plano, de color pardo grisáceo a beige o marrón negruzco, con superficie lisa y seca. Láminas blancas a crema, claramente decurrentes sobre un pie robusto, carnoso, corto y excéntrico.

Carne blanca, compacta y firme, de olor agradable y sabor suave.

Crece de forma saprófita a menudo sobre las raices de los cardos del género *Eryngium*, en terrenos abiertos.

Dimensiones
Sombrero 4–12 cm de diámetro; pie 4–10 cm de alto

E F M **A M J** J A **S O N D**

Russula vesca
Fr., 1836 A66

Buen comestible

B Clase Agaricomycetes
Orden Russulales
M Tipo Micorrízica
B Esporada Blanca


Bosques frondosas | Láminas adnatas | Láminas espaciadas

Sombrero rosado carneo, margen un poco acanalado al envejecer, sabor suave

Sombrero convexo a plano, de color rosado a rosado pálido, a veces con tonos ocres, superficie seca y algo mate; margen algo acanalado en ejemplares viejos, que se retrae un poco dejando visibles las laminas, rasgo distintivo.

Láminas adnatas, blancas a crema, relativamente espaciadas. Pie cilíndrico, blanco y robusto que parte como tiza.

Carne blanca, compacta, de olor débil y sabor suave, agradable.

Forma micorrizas con frondosas, especialmente robles y castaños.


Dimensiones
Sombrero 5–12 cm de diámetro; pie 4–8 cm de alto

E F M A M **J J A S O** N D

Russula cyanoxantha
(Schaeff.) Fr., 1863 A65

Excelente comestible

B Clase Agaricomycetes
Orden Russulales
M Tipo Micorrízica
B Esporada Blanca


Bosques frondosas | Láminas adnatas

Sombrero violáceo verdoso, láminas flexibles no quebradizas

Sombrero convexo a plano, muy variable en color, con tonos verdosos, violáceos, azulados o grisáceos, superficie lisa y algo satinada.

Láminas adnatas, blancas a crema, muy flexibles, elásticas y con tacto «graso», que no se quiebran con facilidad, rasgo excepcional dentro del género Russula.

Pie cilíndrico, blanco, robusto, que parte como tiza. Carne blanca, firme, de olor débil y sabor suave.

Forma micorrizas con frondosas, especialmente robles y hayas.

Dimensiones
Sombrero 6–15 cm de diámetro; pie 5–9 cm de alto

E F M A M **J J A S O** N D

Russula virescens
(Schaeff.) Fr., 1836 A64

Excelente comestible

B Clase Agaricomycetes
Orden Russulales
M Tipo Micorrízica
B Esporada Blanca


Bosques frondosas | Láminas adnatas | Láminas espaciadas

Sombrero verde agrietado, carne firme, sabor suave

Sombrero convexo a plano, de color verde grisáceo a verde oliva, con superficie característica agrietada en placas irregulares que dejan ver la carne blanca subyacente.

Láminas adnatas, blancas a crema, relativamente espaciadas y frágiles.

Pie cilíndrico, robusto, blanco que parte como tiza. Carne blanca, compacta y más firme que en otras setas del género Russula, de olor agradable y sabor suave.

Forma micorrizas principalmente con frondosas, especialmente robles.

Dimensiones
Sombrero 5–15 cm de diámetro; pie 4–8 cm de alto

E F M A M **J J A S O** N D

...QUE LLEVO EN MI CESTA? A67

¿QUÉ SETA ES ESTA... A67

...QUE LLEVO EN MI CESTA? A68

¿QUÉ SETA ES ESTA... A68

...QUE LLEVO EN MI CESTA? A69

¿QUÉ SETA ES ESTA... A69

...QUE LLEVO EN MI CESTA? A70

¿QUÉ SETA ES ESTA... A70

...QUE LLEVO EN MI CESTA? A71

¿QUÉ SETA ES ESTA... A71

...QUE LLEVO EN MI CESTA? A72

¿QUÉ SETA ES ESTA... A72

Tricholoma equestre
(L.) P. Kumm., 1871 — A69

Tóxica

B Clase: Agaricomycetes
Orden: Agaricales
M Tipo: Micorrízica
B Esporada: Blanca



Sombrero amarillo verdoso, láminas amarillas, pinares

Conocida como «seta de los caballeros».

Sombrero convexo a plano, de color amarillo verdoso, a menudo con tonos más oscuros en el centro, superficie seca y lisa. Láminas escotadas, densas, de color amarillo intenso. Pie cilíndrico, robusto, del mismo color que el sombrero o algo más pálido.

Carne blanquecina a amarillenta, firme, de olor débil y sabor suave. Forma micorrizas con pinos en suelos arenosos.

Tradicionalmente considerada comestible, hoy se clasifica como tóxica.

Dimensiones
Sombrero 5–12 cm de diámetro; pie 4–8 cm de alto

E F M A M J J A **S O N D**

Russula aeruginea
Lindblad, 1861 — A68

Tóxica

B Clase: Agaricomycetes
Orden: Russulales
M Tipo: Micorrízica
B Esporada: Crema



Sombrero verde oliva, carne frágil, sabor suave

Sombrero de 5–10 cm, convexo a plano, de color verde oliva a verde grisáceo, a veces con zonas algo más claras, cutícula seca y separable parcialmente.

Láminas blancas a crema, relativamente espaciadas y frágiles. Pie blanco, cilíndrico, que parte como tiza. Carne blanca, quebradiza, de olor débil y sabor suave, un poco picante en las laminas.

Forma micorrizas principalmente con abedules.

Puede confundirse con *Russula virescens* o *Russula heterophylla*.

Dimensiones
Sombrero 5–10 cm de diámetro; pie 4–8 cm de alto

E F M A M **J J A S O** N D

Russula nigricans
(Bull.) Fr., 1838 — A67

Sin valor culinario

B Clase: Agaricomycetes
Orden: Russulales
M Tipo: Micorrízica
B Esporada: Blanca



Enrojece y luego ennegrece al oxidarse, sombrero gris pardo, carne muy dura

Russula robusta de sombrero grande, convexo a plano, de color gris pardo a negruzco, superficie seca y mate. Láminas adnatas, gruesas y espaciadas, inicialmente blancas y después grisáceas. Al corte o al daño, la carne primero enrojece y posteriormente se vuelve negra.

Pie corto, robusto, blanquecino que también ennegrece con el tiempo y que parte como tiza. Carne blanca, muy dura y compacta, de olor débil y sabor poco apreciable.

Forma micorrizas con frondosas, especialmente robles y castaños.

Dimensiones
Sombrero 8–20 cm de diámetro; pie 3–6 cm de alto

E F M A M J **J A S O N** D

Galerina marginata
(Batsch) Kühner, 1935 — A72

MORTAL

B Clase: Agaricomycetes
Orden: Agaricales
S Tipo: Saprófita
0 Esporada: Ocre



Pequeña seta marrón sobre madera, anillo frágil, mortal

Pequeña seta extremadamente peligrosa.

Sombrero de 2–5 cm, convexo a plano, de color pardo amarillento a marrón, con superficie higrófana que se aclara al secarse y suele mostrar un margen estriado.

Láminas adnatas, apretadas, de color ocre a marrón. Pie delgado, fibroso, con un anillo membranoso bastante persistente.

Carne parda clara, de olor débil y sabor poco notable. Crece directamente sobre madera muerta, troncos y tocones, tanto de coníferas como de frondosas.

No confundir con *Kuehneromyces mutabilis*.

Dimensiones
Sombrero 2–5 cm de diámetro; pie 3–7 cm de alto

E F M A **M J J A S O N** D

Tricholoma sulphureum
(Bull.) P. Kumm., 1871 — A71

Tóxica

B Clase: Agaricomycetes
Orden: Agaricales
M Tipo: Micorrízica
B Esporada: Blanca



Color amarillo azufre, olor desagradable a gas o azufre

Seta fácilmente reconocible por su intenso olor desagradable, descrito como a gas, azufre o huevos podridos.

Sombrero convexo a plano, de color amarillo azufre a amarillo verdoso, superficie seca y lisa. Láminas escotadas, densas, del mismo tono amarillento. Pie cilíndrico, delgado y amarillento.

Carne amarillenta, de olor muy fuerte y sabor amargo.

Forma micorrizas con frondosas y ocasionalmente con coníferas. Provoca trastornos gastrointestinales.

Dimensiones
Sombrero 4–10 cm de diámetro; pie 4–8 cm de alto

E F M A M J J **A S O N** D

Tricholoma terreum
(Schaeff.) P. Kumm., 1871 — A70

Sospechosa tóxica

B Clase: Agaricomycetes
Orden: Agaricales
M Tipo: Micorrízica
B Esporada: Blanca



Sombrero gris fibriloso, aspecto ceniciento, asociado a pinares

Seta conocida como «negrilla» o «fredolic». Sombrero convexo a plano, de color gris ceniza a gris oscuro, cubierto de finas fibrillas radiales que le dan un aspecto sedoso o aterciopelado. Láminas escotadas, blancas a grisáceas.

Pie cilíndrico, esbelto, del mismo tono grisáceo o algo más claro.

Carne blanca, fina y frágil, de olor débil y sabor suave. Forma micorrizas con pinos, creciendo frecuentemente en grandes grupos.

Tradicionalmente considerada comestible, hoy se sospecha tóxica.

Dimensiones
Sombrero 4–8 cm de diámetro; pie 3–7 cm de alto

E F M A M J J A **S O N D**

...QUE LLEVO EN MI CESTA? A73



¿QUÉ SETA ES ESTA... A73

...QUE LLEVO EN MI CESTA? A74



¿QUÉ SETA ES ESTA... A74

...QUE LLEVO EN MI CESTA? A75



¿QUÉ SETA ES ESTA... A75

...QUE LLEVO EN MI CESTA? A76



¿QUÉ SETA ES ESTA... A76

...QUE LLEVO EN MI CESTA? A77



¿QUÉ SETA ES ESTA... A77

...QUE LLEVO EN MI CESTA? A78



¿QUÉ SETA ES ESTA... A78

Clitocybe nebularis

(Batsch) P. Kumm., 1871 A75

Sospechosa tóxica

B Clase: Agaricomycetes
Orden: Agaricales
S Tipo: Saprófita
B Esporada: Blanca



Gran tamaño, color grisáceo, láminas decurrentes, olor fuerte

Seta de gran tamaño conocida como «pardilla».

Sombrero de 6–20 cm, convexo a plano, de color gris claro a gris parduzco con aspecto «escarchado». Láminas decurrentes, densas, de color blanco a crema. Pie robusto, y cilíndrico.

Carne blanca, espesa, con olor fuerte y persistente, descrito como harinoso (desagradable para algunas personas). Crece en grupos numerosos formando hileras o corros.

Tradicionalmente consumida, pero se sospecha tóxica, puede provocar trastornos gastrointestinales.

Dimensiones
Sombrero 6–20 cm de diámetro; pie 5–10 cm de alto

E F M A M J J A **S O N D**

Hygrocybe conica

(Schaeff.) P. Kumm., 1871 A74

Tóxica

B Clase: Agaricomycetes
Orden: Agaricales
S Tipo: Saprófita
B Esporada: Blanca



Sombrero cónico rojo anaranjado, ennegrece al tocarlo

Seta vistosa conocida como «higróforo cónico» o «sombrero de bruja».

Sombrero inicialmente cónico, a veces campanulado, de color rojo, anaranjado o amarillento, muy viscoso en tiempo húmedo. Láminas adnatas, cerosas, de blanquecinas a amarillentas, que también se oscurecen.

Pie esbelto, de color amarillento, sin anillo. Tanto el sombrero como el pie ennegrecen al ser manipulados o al envejecer.

Carne frágil, de olor débil y sabor poco apreciable. Crece en praderas y pastizales pobres en nutrientes.

Dimensiones
Sombrero 2–6 cm de diámetro; pie 4–10 cm de alto

E F M A M **J J A S O N** D

Hypholoma fasciculare

(Huds.) P. Kumm., 1871 A73

Tóxica

B Clase: Agaricomycetes
Orden: Agaricales
S Tipo: Saprófita
V Esporada: Violeta



Crecimiento en densos grupos, sombrero amarillo azufre, láminas verdosas

Seta tóxica muy común, conocida como «seta de azufre».

Crece en densos ramilletes sobre madera muerta, troncos y tocones. Sombrero de 2–6 cm, convexo a plano, de color amarillo azufre a encarnado, a menudo con el centro más oscuro.

Láminas adnatas, inicialmente amarillas, tornándose verdosas y finalmente grisaceo violáceas.

Pie delgado, amarillo, sin anillo. Carne amarillenta, de sabor muy amargo y olor poco apreciable.

Provoca intoxicaciones gastrointestinales.

Dimensiones
Sombrero 2–6 cm de diámetro; pie 4–10 cm de alto

E F M A **M J J A S O N D**

Coprinus comatus

(O.F. Müll.) Pers., 1797 A78

Buen comestible

B Clase: Agaricomycetes
Orden: Agaricales
S Tipo: Saprófita
N Esporada: Negra



Sombrero alargado blanco escamoso, se licua en tinta negra

Seta conocida popularmente como «barbuda» o «matacandil».

Sombrero inicialmente cilíndrico y alargado, blanco, cubierto de escamas fibrosas, que con la madurez se abre y se licua en un líquido negro semejante a tinta.

Láminas libres, blancas de jóvenes, volviéndose rosadas y finalmente negras al envejecer.

Pie blanco, alto y esbelto, con anillo móvil. Crece en praderas, bordes de caminos y zonas urbanas.

Buen comestible solo cuando es joven y antes de que comience la licuefacción.

Dimensiones
Sombrero 4–10 cm de alto; pie 10–25 cm de alto

E F M **A M J J A S O N** D

Coprinopsis atramentaria

(Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo, 2001 A77

Precaución al consumir

B Clase: Agaricomycetes
Orden: Agaricales
S Tipo: Saprófita
N Esporada: Negra



Sombrero gris estriado, se licua en tinta negra, incompatible con alcohol

Sombrero inicialmente ovoide o campanulado, de color gris a gris parduzco, con estrías radiales; al madurar las láminas se disuelven formando un líquido negro semejante a tinta.

Láminas libres, blancas de jóvenes, volviéndose negras al envejecer. Pie blanco y cilíndrico, con pequeña marca anular en la parte baja, sin volva.

Crece en grupos sobre suelos ricos en materia orgánica, jardines y zonas urbanas.

Comestibilidad desconocida, tóxica si se mezcla con alcohol (efecto «antabus»).

Dimensiones
Sombrero 3–7 cm de diámetro; pie 5–12 cm de alto

E F M **A M J J A S O N** D

Collybia rivulosa

(Pers.) Z.M. He & Zhu L. Yang, 2023 A76

Tóxica

B Clase: Agaricomycetes
Orden: Agaricales
S Tipo: Saprófita
B Esporada: Blanca



Pequeña seta blanquecina en praderas, láminas decurrentes, muy tóxica

Denominada anteriormente *Clitocybe rivulosa*.

Pequeña seta muy tóxica que crece en praderas, céspedes y zonas herbosas, en grupos mas o menos grandes.

Sombrero de 2–5 cm, convexo a plano o algo deprimido, de color blanco a crema, a veces con tonos grisáceos. Láminas decurrentes, blancas y apretadas. Pie corto y delgado, sin anillo ni volva.

Carne blanca, de olor débil y sabor suave. Puede confundirse con setas comestibles pequeñas de pradera como *Marasmius* o *Clitopilus*.

Dimensiones
Sombrero 2–5 cm de diámetro; pie 2–4 cm de alto

E F M A M **J J A S O N** D