...QUE LLEVO EN MI CESTA?

A01



¿QUÉ SETA ES ESTA...

A01

Agaricus arvensis

Schaeff., 1774 A01

Excelente comestible

B Clase
Agaricomycetes


Orden
Agaricales

S Tipo
Saprófita

0 Esporada
Ocráceo negruzca


Praderas


Láminas libres


Láminas densas


Anillo doble dentado

Sombrero blanco, láminas rosadas de joven, anillo doble

Sombrero inicialmente globoso, después convexo y finalmente extendido, pudiendo llegar hasta los 15-20 cm de diámetro.

Superficie blanca que amarillea debilmente al roce y en la vejez. Láminas densas, libres, inicialmente pálidas, pasando a gris rosado y luego chocolate oscuro.

Pie robusto con anillo doble dentado. Carne blanca, olor anisado dulce, sabor suave a frutos secos, más intenso en ejemplares jóvenes. Acumula metales pesados si crece cerca de carreteras o suelos contaminados.

Dimensiones

Sombrero 8–20 cm de diámetro; pie 7–14 cm de alto, 1–3 cm grosor

E	F	**M**	**A**	**M**	**J**	J	**A**	**S**	**O**	**N**	D

¿QUÉ SETA ES ESTA...

A02



...QUE LLEVO EN MI CESTA?

A02

Agaricus xanthodermus

Genev., 1876 A02

Tóxica

B Clase
Agaricomycetes


Orden
Agaricales

S Tipo
Saprófita

0 Esporada
Ocráceo negruzca


Praderas, jardines


Láminas libres


Láminas densas


Anillo simple


Amarillea al roce

Amarillea intensamente al roce, olor desagradable a tinta

Sombrero primero hemisférico y luego convexo, de color blanco a blanquecino. Amarillea de forma muy acusada al roce, especialmente en el margen del sombrero y en la base del pie.

Láminas densas y libres, primero rosadas y después marrón chocolate. Pie cilíndrico, blanco, con anillo simple y base bulbosa que se torna amarillo intenso al cortarla.

Carne blanca con olor desagradable a fenol, tinta o yodo, que se intensifica con la cocción. Provoca intoxicaciones gastrointestinales con náuseas, vómitos y diarreas.

Dimensiones

Sombrero 6–15 cm de diámetro; pie 5–12 cm de alto, 1–2 cm de grosor

E | F | M | A | **M** | **J** | **J** | **A** | **S** | **O** | **N** | D

...QUE LLEVO EN MI CESTA?



¿QUÉ SETA ES ESTA...

A03

Amanita phalloides

(Fr.) Link, 1833 A03

MORTAL

B Clase
Agaricomycetes

Orden
Agaricales

M Tipo
Micorrízica

B Esporada
Blanca


Bosques todo tipo


Láminas libres


Anillo estriado


Volva sacciforme

Sombrero verdoso, volva visible, láminas blancas, mortal

Seta altamente tóxica conocida comúnmente como «oronja verde» u «hongo de la muerte».

Sombrero inicialmente hemisférico, luego convexo y extendido, de color verde oliva o verdoso con tonos amarillentos, a veces con un brillo metálico.

Láminas libres y blancas. Pie blanco con anillo blanco, membranoso y estriado en la cara externa. Volva pronunciada y sacciforme en la base. Esporada blanca.

Carne blanca y olor débil.

Seta responsable de gran parte de los envenenamientos mortales.

Dimensiones

Sombrero 5–15 cm de diámetro; pie 8–15 cm de alto

E | F | M | A | M | J | **J** | **A** | **S** | **O** | **N** | D

...QUE LLEVO EN MI CESTA?

¿QUÉ SETA ES ESTA...

A04

Amanita virosa

Bertill., 1866 A04

MORTAL

B Clase
Agaricomycetes


Orden
Agaricales

M Tipo
Micorrízica

B Esporada
Blanca


Hayedos principalm.


Láminas libres


Láminas densas


Anillo membranoso


Volva sacciforme

Sombrero blanco, volva visible, láminas blancas, mortal

Sombrero blanco, inicialmente conico-campanulado, después convexo y finalmente convexo-extendido, asimétrico, liso y sin estrías, a veces con centro ligeramente crema o ocráceo con la edad.

Láminas densas, libres y blancas, con esporada blanca. Pie blanco, fibriloso, algo bulboso en la base, con anillo membranoso y volva sacciforme bien visible en la base.

Carne blanca y frágil, con olor débil de joven y algo desagradable en ejemplares viejos y sabor poco significativo.

Causa intoxicaciones graves y puede ser mortal.

Dimensiones

Sombrero 4–12 cm de diámetro; pie 8–15 cm de alto

E | F | M | A | M | J | **J** | **A** | **S** | **O** | **N** | D

...QUE LLEVO EN MI CESTA?

A05



¿QUÉ SETA ES ESTA...

A05

Amanita muscaria

(L.) Lam., 1783 A05

Tóxica

B Clase
Agaricomycetes


Orden
Agaricales

M Tipo
Micorrízica

B Esporada
Blanca


Bosques todo tipo


Láminas libres


Láminas densas


Anillo amplio


Volva anillada

Sombrero rojo o rojizo anaranjado con copos blancos, anillo y volva, láminas blancas

Sombrero rojo o rojizo anaranjado cubierto de copos blancos, restos del velo universal que pueden desaparecer con la lluvia.

Sombrero inicialmente hemisférico y después convexo o extendido, de hasta 20 cm de diámetro. Láminas libres, densas y blancas.

Pie blanco, cilíndrico, con anillo amplio y persistente, y volva anillada en la base.

Carne blanca, olor débil y sabor ligeramente dulzón. Especie tóxica con efectos neurotóxicos.

Dimensiones

Sombrero 8–20 cm de diámetro; pie 10–20 cm de alto

E	F	M	A	M	J	J	A	**S**	**O**	**N**	**D**

¿QUÉ SETA ES ESTA...

A06



...QUE LLEVO EN MI CESTA?

A06

Amanita caesarea

(Scop.) Pers., 1801 A06

Excelente comestible

B Clase **Agaricomycetes**

Orden **Agaricales**

M Tipo **Micorrízica**


B Esporada **Blanca**



Bosques frondosas



Láminas libres



Láminas densas



Anillo amplio



Volva sacciforme

Sombrero anaranjado, láminas y pie amarillos, volva blanca

Seta muy apreciada desde la antigüedad, conocida como «oronja» o «huevo de rey».

Sombrero inicialmente globoso y luego convexo o extendido, de color anaranjado, liso y brillante, de hasta 15–20 cm.

Láminas libres, densas y de color amarillo intenso, al igual que el pie. Pie cilíndrico con anillo amplio y colgante de color amarillo. Volva blanca, sacciforme y bien visible en la base.

Carne amarillenta, olor suave y sabor delicado, muy agradable.

Dimensiones

Sombrero 8–20 cm de diámetro; pie 8–15 cm de alto

E	F	M	A	M	**J**	**J**	**A**	**S**	**O**	N	D

...QUE LLEVO EN MI CESTA?



¿QUÉ SETA ES ESTA...

A07

Amanita rubescens

Pers., 1797 A07

Precaución al consumir

B Clase Agaricomycetes

Orden Agaricales

M Tipo Micorrízica

B Esporada Blanca


Bosques todo tipo


Láminas libres


Anillo estriado


Volva friable


Enrojece si se daña

Enrojece en las zonas heridas o dañadas, sombrero pardo de borde liso con copos, anillo estriado

Sombrero inicialmente hemisférico y luego convexo, de color pardo rosado a marrón rojizo, cubierto de pequeños copos más claros (nunca blancos).

Láminas libres y blancas que se tiñen de tonos rosados o rojizos al dañarse. Pie blanco con anillo y volva friable (no tiene forma de saco), que también enrojece en las zonas dañadas.

Carne blanca que vira claramente al rojo vinoso al lesionarse. Anillo colgante estriado.

Olor suave y sabor agradable, comestible solo tras cocción completa; cruda es tóxica.

Dimensiones

Sombrero 6–15 cm de diámetro; pie 7–15 cm de alto

E	F	M	A	M	**J**	**J**	**A**	**S**	**O**	N	D

...QUE LLEVO EN MI CESTA?



¿QUÉ SETA ES ESTA...

A08

Cantharellus cibarius

Fr., 1821 A08

Excelente comestible

B Clase
Agaricomycetes


Orden
Aphyllophorales

M Tipo
Micorrízica

A Esporada
Amarillo anaranjada



Bosques todo tipo



Himenio pliegues

Sombrero amarillo en forma de embudo, pliegues (no láminas), olor afrutado

Seta muy apreciada conocida como «rebozuelo» o «chantarela».

Sombrero de color amarillo a amarillo anaranjado, inicialmente convexo y pronto en forma de embudo, con margen ondulado e irregular.

Himenio formado por pliegues gruesos, decurrentes y ramificados, nunca láminas verdaderas.

Pie macizo, del mismo color que el sombrero o algo más pálido. Carne firme, blanquecina o amarillenta, con sabor suave y agradable olor afrutado que recuerda al albaricoque.

Dimensiones

Sombrero 3–10 cm de diámetro; pie 3–8 cm de alto

E	F	M	A	M	**J**	**J**	**A**	**S**	**O**	**N**	D

...QUE LLEVO EN MI CESTA?



¿QUÉ SETA ES ESTA...

A09

Craterellus tubaeformis

(Fr.) Quél., 1888 A09

Excelente comestible

B Clase Agaricomycetes

Orden Aphyllophorales

M Tipo Micorrízica

0 Esporada Ocráceo anaranjada



Bosques todo tipo



Himenio pliegues

Forma de trompeta, pie amarillo hueco, pliegues (no láminas)

Seta conocida popularmente como «angula de monte».

Sombrero pequeño y delgado, de color pardo grisáceo a marrón oscuro, con forma de embudo o trompeta, margen ondulado y a menudo lobulado.

Himenio con pliegues muy marcados, unas veces amarillentos y otras grisáceos. Pie esbelto, hueco, de color amarillo vivo.

Carne escasa, elástica, de olor débil y sabor suave.

Crece habitualmente en grupos numerosos en zonas húmedas.

Dimensiones

Sombrero 2–6 cm de diámetro; pie 4–8 cm de alto

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

...QUE LLEVO EN MI CESTA?



¿QUÉ SETA ES ESTA...

A10

Craterellus cornucopioides

(L.) Pers., 1825 A10

Excelente comestible

B Clase Agaricomycetes

Orden Aphyllophorales

M Tipo Micorrízica

0 Esporada Ocre



Bosques frondosas



Himenio liso

Trompeta negra, hueca hasta la base, sin láminas

Seta conocida como «trompeta de los muertos».

Tiene forma de trompeta profunda, delgada y completamente hueca, de color negro a gris negruzco, a veces con tonos pardo violáceos.

Superficie externa finamente escamosa o fibrilosa.

Himenio arrugado o casi liso, de color gris oscuro.

Carne muy delgada, frágil, de olor débil y sabor agradable.

Crece en grupos numerosos en zonas húmedas de bosques de frondosas.

Dimensiones

Sombrero 3–8 cm de diámetro, altura total 5–12 cm

E	F	M	A	M	J	J	**A**	**S**	**O**	**N**	**D**

...QUE LLEVO EN MI CESTA?

¿QUÉ SETA ES ESTA...

A11

Hydnum repandum

L., 1753 A11

Buen comestible

B Clase
Agaricomycetes

Orden
Aphyllophorales

M Tipo
Micorrízica

B Esporada
Blanca



Bosques todo tipo



Himenio aguijones

Himenio con aguijones, sombrero irregular color crema, pie macizo

Seta conocida popularmente como «lengua de vaca» o «gamuza». Sombrero irregular, convexo y a veces lobulado, de color crema, encarnado o ligeramente ocráceo, con superficie seca y mate.

Himenio formado por aguijones o dientes frágiles, decurrentes, de color blanquecino a encarnado, rasgo característico del género.

Pie corto y robusto, macizo, del mismo color que el sombrero o algo más claro.

Carne blanca, firme y quebradiza, de olor suave y sabor agradable, ligeramente amargo en ejemplares maduros.

Dimensiones

Sombrero 5–15 cm de diámetro; pie 3–8 cm de alto

E | F | M | A | M | J | J | **A** | **S** | **O** | **N** | D

...QUE LLEVO EN MI CESTA?



¿QUÉ SETA ES ESTA...

A12

Clavulina cristata

(Holmsk.) J. Schröt., 1888 A12

Sin valor culinario

B Clase
Agaricomycetes

Orden
Aphyllophorales

M Tipo
Micorrízica

B Esporada
Blanca



Bosques todo tipo



Himenio liso

Aspecto de coral blanco, ramificaciones crestadas, sin sombrero ni láminas

Hongo con aspecto que recuerda a un coral, formado por ramificaciones erectas, blanquecinas o ligeramente crema, con extremos aplanados y crestados que recuerdan a pequeñas coronas.

Ligeramente elástica, sin diferenciación entre sombrero y pie. Superficie lisa y seca, himenio distribuido en las ramificaciones.

Carne blanca, muy frágil, sin olor destacado y de sabor poco apreciable.

Crece en el suelo de bosques, generalmente en grupos dispersos.

Dimensiones

Altura 3–6 cm; anchura similar

E | F | M | A | M | J | J | **A** | **S** | **O** | **N** | D

...QUE LLEVO EN MI CESTA?



¿QUÉ SETA ES ESTA...

A13

Ramaria pallida

(Schaeff.) Ricken, 1920 A13

Tóxica

B Clase
Agaricomycetes

Orden
Gomphales

M Tipo
Micorrízica

0 Esporada
Ocre



Bosques todo tipo



Himenio liso

Aspecto coralino pálido, ramificaciones gruesas, base blanquecina

Hongo con aspecto que recuerda a un coral, con cuerpo ramificado, compacto y robusto.

Las ramificaciones son gruesas, cortas y densas, de color blanquecino a crema pálido, a veces con tonos rosados muy débiles.

Superficie seca y lisa, con himenio distribuido en las ramificaciones. Carne blanca, firme, sin olor destacado y de sabor un poco amargo.

Crece en el suelo de bosques, sobre todo en hayedos, en grupos o ejemplares aislados.

Dimensiones

Altura 6–15 cm; anchura similar

E | F | M | A | M | J | J | **A** | **S** | **O** | N | D

...QUE LLEVO EN MI CESTA?



¿QUÉ SETA ES ESTA...

A14

Fomes fomentarius

(L.) Fr., 1849 A14

No comestible

B Clase
Agaricomycetes

Orden
Aphyllophorales

SP Tipo
Saprófita / Parásita

B Esporada
Blanca



Bosques frondosas



Himenio poros



Superficie dura

Cuerpo leñoso en forma de casco, poros finos blancos, muy duro

Hongo perenne y lignícola conocido como «yesquero».

Seta grande, dura y persistente, en forma de casco o pezuña, de color gris a gris pardo con bandas concéntricas bien marcadas.

Superficie superior muy dura y lisa, himenio formado por poros finos y densos, de color blanquecino a grisáceo. Crece adherido al tronco de árboles vivos o muertos.

No comestible, pero históricamente utilizado para obtener yesca y usado en la medicina tradicional.

Dimensiones

Fructificación 5–40 cm de ancho; hasta varios años de duración

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

...QUE LLEVO EN MI CESTA?



¿QUÉ SETA ES ESTA...

A15

Fistulina hepatica

(Schaeff.) With., 1792 A15

Comestible

B Clase
Agaricomycetes

Orden
Agaricales

P Tipo
Parásita

R Esporada
Rosa



Bosques frondosas



Himenio poros



Tacto gelatinoso

Aspecto de hígado crudo, carne rojiza y sangrante, poros finos

Seta carnosa y gelatinosa, con forma de lengua o hígado, de color rojo oscuro a pardo rojizo, frecuentemente brillante.

Superficie superior lisa o ligeramente rugosa; himenio inferior formado por poros finos y apretados, de color blanquecino a rosado. Carne gruesa, fibrosa y muy jugosa, que al cortarla exuda un líquido rojizo semejante a sangre.

Crece adherido al tronco de árboles vivos, principalmente robles y castaños. Buen comestible cuando es joven, con sabor ácido característico.

Dimensiones

Fructificación 10–30 cm de ancho; varios cm de grosor

E	F	M	A	M	**J**	**J**	**A**	**S**	**O**	N	D

...QUE LLEVO EN MI CESTA?



¿QUÉ SETA ES ESTA...

A16

Trametes versicolor

(L.) Lloyd, 1920 A16

No comestible

B Clase
Agaricomycetes

Orden
Aphyllophorales

S Tipo
Saprófita

B Esporada
Blanca


Bosques frondosas


Madera muerta


Himenio poros


Textura dura

Sombreros en abanico multicolor, bandas concéntricas, poros blancos

Hongo lignícola muy común conocido como «cola de pavo». Fructificaciones delgadas, coriáceas y semicirculares, dispuestas en rosetas o solapadas, con superficie superior cubierta de bandas concéntricas de colores variados (marrón, gris, ocre, azulado, blanquecino).

Himenio inferior formado por poros muy finos y densos, de color blanco a crema. Crece sobre madera muerta de frondosas.

No comestible, aunque muy estudiado por sus usos tradicionales y aplicaciones medicinales. Especie perenne presente todo el año.

Dimensiones

Sombreros de 3–8 cm de ancho; muy delgados

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

...QUE LLEVO EN MI CESTA?



¿QUÉ SETA ES ESTA...

A17

Laetiporus sulphureus

(Bull.) Murrill, 1920 A17

Precaución al consumir

B Clase
Agaricomycetes

Orden
Aphyllophorales

P Tipo
Parásita

A Esporada
Amarillenta



Bosques frondosas



Himenio poros

Grandes rosetas amarillas y anaranjadas, carnoso, poros finos

Hongo lignícola muy llamativo conocido como «pollo del bosque».

Fructificaciones grandes, en forma de repisas superpuestas o rosetas, de color amarillo azufre con tonos anaranjados intensos.

Superficie superior lisa o ligeramente aterciopelada; himenio inferior formado por poros finos y apretados, de color amarillo pálido.

Carne espesa, blanda y fibrosa cuando es joven, endureciéndose con la edad. Crece sobre troncos vivos o muertos de frondosas. Comestible solo cuando es joven y bien cocinado.

Dimensiones

Fructificaciones de hasta 50 cm o más de ancho

E | F | M | A | **M** | **J** | **J** | **A** | **S** | **O** | N | D

...QUE LLEVO EN MI CESTA?



¿QUÉ SETA ES ESTA...

A18

Sparassis crispa

(Wulfen) Fr., 1821 A18

Comestible

B Clase
Agaricomycetes

Orden
Aphyllophorales

SP Tipo
Saprófita / Parásita

A Esporada
Amarillenta



Bosques coníferas



Himenio liso

Aspecto de coliflor rizada, lóbulos ondulados, gran tamaño

Hongo muy llamativo conocido como «seta coliflor».

Fructificación grande y compacta, formada por numerosos lóbulos planos, rizados y ondulados, de color crema a beige amarillento.

Practicamente sin pie, con himenio distribuido por toda la superficie de los lóbulos.

Carne blanca, firme y elástica, de olor agradable y sabor suave.

Crece al pie de coníferas, especialmente pinos.

Dimensiones

Fructificación 10–40 cm de diámetro; peso elevado

E | F | M | A | M | J | J | **A** | **S** | **O** | **N** | D

...QUE LLEVO EN MI CESTA?



¿QUÉ SETA ES ESTA...

A19

Mitrula paludosa

Fr., 1816 A19

Sin valor culinario

A Clase Leotiomycetes

Orden Helotiales

S Tipo Saprófita

B Esporada Blanca



Turberas, humedales



Himenio liso



Tacto gelatinoso

Cabeza amarilla anaranjada, pie traslúcido esbelto, crece en agua

Hongo pequeño y llamativo de ambientes muy húmedos, conocido como «mitrula de los pantanos».

Presenta una cabeza o mitra globosa a ligeramente alargada, de color amarillo a anaranjado brillante, lisa y gelatinosa. Pie delgado, cilíndrico y traslúcido, a menudo parcialmente sumergido en el agua.

Carece de sombrero y láminas diferenciadas.

Carne gelatinosa, frágil, sin olor ni sabor destacables.

Dimensiones

Altura total 2–6 cm; cabezuela hasta 1,5 cm

E | F | **M** | **A** | **M** | **J** | J | A | S | O | N | D

...QUE LLEVO EN MI CESTA?



¿QUÉ SETA ES ESTA...

A20

Dasyscyphella nivea

(R. Hedw.) Raitv., 1970 A20

Sin valor culinario

A Clase
Leotiomycetes

Orden
Helotiales

S Tipo
Saprófita

B Esporada
Blanca



Madera muerta



Himenio liso

Pequeñas copas blancas con pelos, apotecios diminutos, pie largo

Ascomiceto diminuto de color blanco puro, formado por pequeños apotecios en forma de copa o platillo, de apenas 0,5–2 mm de diámetro, sostenidos por un pie largo y delgado.

Himenio liso, blanco a crema muy claro. Cara externa cubierta en el margen de finos pelos blancos, especialmente visibles con lupa, a menudo con gotitas traslúcidas en ambientes húmedos.

Carne casi inexistente, sin olor ni sabor apreciables. Crece como saprófito sobre restos leñosos de frondosas, especialmente sauces, robles y hayas.

Dimensiones

Apotecios 0,5–2 mm de diámetro; pie largo y muy fino

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

...QUE LLEVO EN MI CESTA?



¿QUÉ SETA ES ESTA...

A21

Ascobolus stercorarius

(Bull.) J. Schröt., 1893 A21

Sin valor culinario

A Clase **Pezizomycetes**

Orden **Pezizales**

S Tipo **Saprófita**

B Esporada **Blanca**


Estiercol


Praderas


Himenio liso


Textura gelatinosa

Pequeños apotecios violáceos, superficie gelatinosa, coprófila

Ascomiceto coprófilo de pequeño tamaño, formando apotecios discoidales o ligeramente convexos, de color amarillo verdoso a púrpura negruzco, con superficie mate y aspecto gelatinoso.

Himenio liso, carece de pie diferenciado o presenta uno muy corto.

Carne extremadamente delgada y frágil, sin olor ni sabor apreciables.

Crece sobre estiércol de herbívoros en praderas y pastizales, a menudo en grupos.

Dimensiones

Apotecios 1–5 mm de diámetro

E	F	**M**	**A**	**M**	**J**	**J**	**A**	**S**	**O**	**N**	D

...QUE LLEVO EN MI CESTA?



¿QUÉ SETA ES ESTA...

A22

Gyromitra esculenta

(Pers.) Fr., 1849 A22

MORTAL

A Clase
Pezizomycetes

Orden
Pezizales

S Tipo
Saprófita

B Esporada
Blanquecino cremosa



Bosques coníferas



Suelos arenosos



Himenio liso

Sombrero cerebriforme pardo rojizo, pie blanquecino

Ascomiceto conocido como «falsa colmenilla».

Presenta un sombrero irregular, plegado y retorcido, con aspecto de cerebro, de color pardo rojizo a castaño oscuro.

Pie relativamente corto, blanquecino o crema, hueco y frágil. Himenio liso, distribuido por toda la superficie del sombrero. Carne quebradiza, de olor débil.

Crece en primavera, sobre suelos arenosos de bosques de coníferas.

Especie muy tóxica, provoca intoxicaciones graves.

Dimensiones

Sombrero 3–10 cm de diámetro; pie 3–7 cm de alto

E | F | **M** | **A** | **M** | **J** | J | A | S | O | N | D

...QUE LLEVO EN MI CESTA?



¿QUÉ SETA ES ESTA...

A23

Dissingia leucomelaena

(Pers.) K. Hansen & X.H. Wang, 2019 A23

Precaución al consumir

A Clase **Pezizomycetes**

Orden **Pezizales**

S Tipo **Saprófita**

B Esporada **Blanca**



Bosques coníferas



Suelos arenosos



Himenio liso

Sombrero en forma de copa, blanquecino por fuera hacia la base del pie y oscuro por dentro de la copa

Ascomiceto de pequeño a mediano tamaño, sombrero en forma de copa con costillas redondeadas hacia la base del pie. Cara superior (himenio) de color negro a negro parduzco, contrastando fuertemente con la cara inferior blanquecina o gris muy claro.

Pie blanco, liso o ligeramente surcado, cilíndrico y hueco. Carne frágil, de olor débil y sabor poco apreciable.

Crece en primavera y otoño-invierno, principalmente en suelos arenosos de pinares y bosques mixtos. Se desaconseja su consumo por la posible presencia de toxinas.

Dimensiones

Apotecio 2–6 cm de diámetro; pie 3–8 cm de alto

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

...QUE LLEVO EN MI CESTA?



¿QUÉ SETA ES ESTA...

A24

Helvella crispa

(Scop.) Fr., 1822 A24

Precaución al consumir

A Clase Pezizomycetes

Orden Pezizales

S Tipo Saprófita

B Esporada Blanca



Bosques frondosas



Borde de caminos



Himenio liso

Sombrero plegado blanco, pie acanalado hueco, aspecto de silla de montar

Sombrero irregularmente plegado, con lóbulos ondulados y retorcidos (en forma de silla de montar), de color blanco a crema, a veces con tonos ocráceos.

Pie alto, hueco y muy característico, con profundas costillas longitudinales bien marcadas.

Himenio liso distribuido por la superficie del sombrero. Carne frágil, blanca, de olor débil y sabor poco destacado. Crece en claros de bosque y bordes de caminos.

Comestible solo tras cocción prolongada; cruda es tóxica. De escaso interés culinario.

Dimensiones

Sombrero 3–10 cm de ancho; pie 5–12 cm de alto

E | F | M | A | **M** | **J** | **J** | **A** | **S** | **O** | N | D

...QUE LLEVO EN MI CESTA?



¿QUÉ SETA ES ESTA...

A25

Helvella lacunosa

Afzel. ex Fr., 1823 A25

Precaución al consumir

A Clase **Pezizomycetes**

Orden **Pezizales**

S Tipo **Saprófita**

B Esporada **Blanca**



Bosques todo tipo



Borde de caminos



Zonas quemadas



Himenio liso

Sombrero negro plegado, pie hueco y acanalado

Sombrero irregularmente plegado y lobulado, de color gris oscuro a negro, con superficie mate.

Pie alto, hueco y profundamente acanalado, de color grisáceo a negruzco, rasgo muy característico.

Himenio liso distribuido por la superficie del sombrero.

Carne frágil, de color oscuro, sin olor ni sabor destacados. Crece en suelos removidos, zonas quemadas, claros de bosque y bordes de caminos.

Comestible solo tras cocción prolongada; cruda es tóxica. De escaso interés culinario.

Dimensiones

Sombrero 3–10 cm de ancho; pie 5–12 cm de alto

E | F | M | A | **M** | **J** | **J** | **A** | **S** | **O** | N | D

...QUE LLEVO EN MI CESTA?



¿QUÉ SETA ES ESTA...

A26

Morchella esculenta

(L.) Pers., 1801 A26

Excelente comestible

A Clase **Pezizomycetes**

Orden **Pezizales**

S Tipo **Saprófita**

B Esporada **Blanca**



Bosques frondosas



Borde de caminos



Himenio alveolado

Sombrero alveolado, pie hueco, colmenilla verdadera

Ascomiceto muy apreciado conocido como «colmenilla». Sombrero ovoide a cónico, completamente alveolado, con cavidades profundas y regulares, de color amarillo ocráceo a pardo claro. El pie es blanquecino, hueco, relativamente grueso y completamente soldado al sombrero. Himenio liso distribuido por el interior de los alveolos.

Carne frágil, elástica, de olor agradable y sabor suave. Crece en primavera en suelos ricos, bosques de ribera o bosques de montaña.

Excelente comestible, debe deshidratarse previamente y despues consumirse bien cocinada; cruda es tóxica.

Dimensiones

Sombrero 4–12 cm de ancho; pie 3–10 cm de alto

E | F | **M** | **A** | **M** | **J** | J | A | S | O | N | D

...QUE LLEVO EN MI CESTA?

¿QUÉ SETA ES ESTA...

A27

Legaliana badia

(Pers.) Van Vooren, 2020 A27

Sin valor culinario

A Clase
Pezizomycetes

Orden
Pezizales

S Tipo
Saprófita

B Esporada
Blanca



Bosques todo tipo



Himenio liso

Apotecios marrón oscuro o marrón verdoso, forma de copa irregular, sin pie definido

Forma apotecios en forma de copa o cuenco irregular, a menudo con el borde ondulado o desgarrado, de color marrón oscuro, pardo castaño o marrón verdoso.

Superficie interna lisa y brillante cuando está húmeda, más mate al secarse; cara externa más clara y finamente granulosa.

Carece de pie diferenciado o presenta uno muy corto. Carne delgada, frágil, sin olor ni sabor apreciables.

Crece sobre suelos desnudos, entre restos herbáceos y en terrenos removidos.

Dimensiones

Apotecios 4–10 cm de diámetro

E	F	M	**A**	**M**	**J**	**J**	**A**	**S**	**O**	**N**	D

...QUE LLEVO EN MI CESTA?



¿QUÉ SETA ES ESTA...

A28

Aleuria aurantia

(Pers.) Fuckel, 1870 A28

Sin valor culinario

A Clase
Pezizomycetes

Orden
Pezizales

S Tipo
Saprófita

B Esporada
Blanca



Borde de caminos



Suelos arenosos



Himenio liso

Copa naranja brillante, aspecto de cáscara de naranja, sin pie

Forma apotecios en forma de copa o cuenco abierto, a menudo irregular y con el borde ondulado, de color naranja intenso muy vivo.

Superficie interna lisa y brillante; cara externa más pálida y finamente granulosa. Carece de pie diferenciado o presenta uno muy corto.

Carne fina, frágil, sin olor ni sabor apreciables.

Crece sobre suelos desnudos, arenosos o removidos, con frecuencia en bordes de caminos.

Dimensiones

Apotecios 2–10 cm de diámetro

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

...QUE LLEVO EN MI CESTA?

¿QUÉ SETA ES ESTA...

A29

Cordyceps militaris

(L.) Fr., 1818 A29

Sin valor culinario

A Clase
Sordariomycetes

Orden
Hypocreales

P Tipo
Parásita

B Esporada
Blanca



Bosques coníferas



Superficie peritecios

Aspecto de pequeños bastones anaranjados, parásita de insectos

Ascomiceto parásito muy llamativo que crece sobre pupas y larvas de insectos enterradas en el suelo (especialmente larvas de *Procesionaria*).

Forma cuerpos fructíferos alargados y claviformes, de color naranja intenso a rojo anaranjado, con superficie finamente granulosa.

Himenio con pequeños peritecios distribuidos por la superficie de la clava. Con un pie corto y más o menos diferenciado, unido en su extremo a la larva muerta. Carne fibrosa y tenaz, sin olor ni sabor destacables.

Aparece en bosques durante los meses cálidos.

Dimensiones

Cuerpos fructíferos de 2–8 cm de altura

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

...QUE LLEVO EN MI CESTA?

A30



¿QUÉ SETA ES ESTA...

A30

Xylaria hypoxylon

(L.) Grev., 1824 A30

No comestible

A Clase
Sordariomycetes

Orden
Xylariales

S Tipo
Saprófita

N Esporada
Negra



Madera muerta



Superficie peritecios



Textura dura

Estructuras negras en forma de cuernos, puntas blanquecinas, crece sobre madera

Forma cuerpos fructíferos erectos, delgados y ramificados, de color negro a negro azulado, durante el otoño a menudo con las puntas blanquecinas (fase asexual).

Superficie dura y mate. Carece de sombrero y pie diferenciados, con el himenio distribuido por la superficie del estroma.

Carne muy dura y coriácea, sin olor ni sabor apreciables.

Crece sobre madera muerta de frondosas, frecuentemente en grupos densos.

Dimensiones

Estromas de 3–8 cm de altura

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

...QUE LLEVO EN MI CESTA?

A31



¿QUÉ SETA ES ESTA...

A31

Boletus edulis

Bull., 1782 A31

Excelente comestible

B Clase Agaricomycetes

Orden Boletales

M Tipo Micorrízica

0 Esporada Ocre



Bosques todo tipo



Himenio poros

Sombrero pardo, pie grueso con retícula blanca, poros blancos

Sombrero grande y convexo, de color pardo a castaño, con superficie lisa y algo untuosa en tiempo húmedo.

Himenio con tubos y poros blancos de joven, después amarillentos y verdosos, nunca azuleantes.

Pie robusto y engrosado, de color claro, con fina retícula blanquecina visible de forma mas acentuada en la parte superior.

Carne blanca y firme, inmutable al corte, de olor agradable y sabor suave y dulce. Micorrízica de numerosos árboles.

Dimensiones

Sombrero 7–25 cm de diámetro; pie 8–20 cm de alto

E | F | M | A | M | J | J | A | **S** | **O** | **N** | **D**

...QUE LLEVO EN MI CESTA?



¿QUÉ SETA ES ESTA...

A32

Boletus pinophilus

Pilát & Dermek, 1973 A32

Excelente comestible

B Clase Agaricomycetes

Orden Boletales

M Tipo Micorrízica

0 Esporada Ocre



Bosques todo tipo



Himenio poros

Sombrero pardo rojizo, pie robusto reticulado, poros blancos

Sombrero grande y carnoso, primero hemisférico y luego convexo, de color pardo rojizo a castaño oscuro, a menudo con tonos vinosos. Superficie seca o ligeramente grasienta. Himenio con tubos y poros blancos de joven, después amarillentos y verdosos (no azulea).

Pie grueso y robusto, con retícula clara a rojiza, más marcada en la parte superior. Carne blanca y firme, inmutable al corte, de olor agradable y sabor dulce.

Micorrízica preferente de pinos, pero presente tambien frecuentemente en planifolios.

Dimensiones

Sombrero 8–30 cm de diámetro; pie 8–20 cm de alto

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

...QUE LLEVO EN MI CESTA?

¿QUÉ SETA ES ESTA...

A33

Boletus aereus

Bull., 1789 A33

Excelente comestible

B Clase
Agaricomycetes

Orden
Boletales

M Tipo
Micorrízica

0 Esporada
Ocre



Bosques frondosas



Himenio poros

Sombrero muy oscuro casi negro, pie robusto reticulado, poros blancos

Sombrero grande y convexo, de color pardo muy oscuro a casi negro, con superficie seca y mate, a menudo aterciopelada.

Himenio con tubos y poros blancos de joven, luego amarillentos y verdosos (no azulea). Pie grueso y macizo, claro a pardo, con retícula bien marcada, más visible en la parte superior.

Carne blanca, firme y compacta, inmutable al corte, de olor agradable y sabor dulce.

Micorrízica principalmente con frondosas mediterráneas.

Dimensiones

Sombrero 8–25 cm de diámetro; pie 8–18 cm de alto

E | F | M | A | M | **J** | **J** | **A** | **S** | **O** | N | D

...QUE LLEVO EN MI CESTA?



¿QUÉ SETA ES ESTA...

A34

Boletus reticulatus

(Hoffm.) Pers., 1801 A34

Excelente comestible

B Clase
Agaricomycetes

Orden
Boletales

M Tipo
Micorrízica

0 Esporada
Ocre



Bosques frondosas



Himenio poros

Sombrero pardo claro agrietado, retícula muy marcada, poros blancos

Boleto muy apreciado, conocido como «boleto reticulado» o «boleto estival».

Sombrero grande y carnoso, pardo claro a avellana, a menudo agrietado en tiempo seco. Superficie seca y mate. Himenio con tubos y poros blancos de joven, después amarillentos y verdosos, sin azulear.

Pie robusto y claro, con retícula muy marcada y extensa. Carne blanca y firme, inmutable al corte, de olor agradable y sabor dulce.

Fructifica temprano respecto a otros boletos de la sección *edules*.

Dimensiones

Sombrero 8–30 cm de diámetro; pie 8–20 cm de alto

E | F | M | A | **M** | **J** | **J** | **A** | **S** | O | N | D

...QUE LLEVO EN MI CESTA?



¿QUÉ SETA ES ESTA...

A35

Suillellus queletii

(Schulzer) Vizzini, Simonini & Gelardi, 2014 A35

Precaución al consumir

B Clase **Agaricomycetes**

Orden **Boletales**

M Tipo **Micorrízica**

0 Esporada **Ocre**



Bosques frondosas



Himenio poros



Azulea al corte

Sombrero pardo rojizo, poros rojizos, azulea intensamente al corte

Boletal de tamaño medio denominado anteriormente *Boletus queletii*.

Sombrero convexo, de color pardo rojizo a castaño oscuro, con superficie seca y mate. Himenio formado por tubos y poros rojizos a anaranjados, que azulean intensamente al tacto o al corte.

Pie robusto, de color amarillento a rojizo, liso, sin retículo. Carne amarillenta que vira rápidamente al azul al cortarse y rojiza en la base del pie.

Comestible solo tras cocción prolongada; crudo es tóxico. Forma micorrizas con frondosas.

Dimensiones

Sombrero 6–15 cm de diámetro; pie 5–12 cm de alto

E | F | M | A | M | **J** | **J** | **A** | **S** | **O** | N | D

...QUE LLEVO EN MI CESTA?



¿QUÉ SETA ES ESTA...

A36

Neoboletus erythropus

(Pers.) C. Hahn, 2015 A36

Precaución al consumir

B Clase Agaricomycetes

Orden Boletales

M Tipo Micorrízica

0 Esporada Ocre



Bosques todo tipo



Himenio poros



Azulea al corte

Poros rojo intenso, pie punteado rojo, azulea muy rápidamente

Sombrero convexo, de color pardo oscuro a castaño, con superficie seca y mate.

Himenio formado por tubos amarillos y poros rojo intenso, que azulean de forma inmediata al tacto.

Pie macizo, sin retícula, cubierto de numerosos puntitos de color rojo sobre fondo amarillento. Carne amarilla que vira intensamente al azul al corte.

Forma micorrizas con frondosas y coníferas.

Comestible solo tras cocción completa; crudo es tóxico.

Dimensiones

Sombrero 6–20 cm de diámetro; pie 6–15 cm de alto

E | F | M | A | M | **J** | **J** | **A** | **S** | **O** | N | D

...QUE LLEVO EN MI CESTA?



¿QUÉ SETA ES ESTA...

A37

Boletus lepidus

H. Bouchet ex Essette, 1965 A37

Buen comestible

B Clase
Agaricomycetes

Orden
Boletales

M Tipo
Micorrízica

0 Esporada
Ocre


Bosques frondosas


Himenio poros


Ennegrece al corte

Sombrero pardo, pie con escamas oscuras, oscurece al corte

Boletal robusto propio de ambientes mediterráneos, asociado principalmente a encinas y alcornoques.

Sombrero grande y convexo, de color pardo a castaño oscuro, con superficie seca y lisa. Himenio formado por tubos y poros blanquecinos a crema, que oscurecen con la edad.

Pie largo y cilíndrico, sin retícula, cubierto de numerosas escamas o granulaciones oscuras características del género.

Carne blanca que al corte se torna grisácea y posteriormente negruzca, especialmente en el pie. Olor y sabor suaves.

Dimensiones

Sombrero 8–20 cm de diámetro; pie 8–18 cm de alto

E | F | M | A | M | J | J | A | **S** | **O** | **N** | **D**

...QUE LLEVO EN MI CESTA?



¿QUÉ SETA ES ESTA...

A38

Leccinum scabrum

(Bull.) Gray, 1821 A38

Comestible

B Clase
Agaricomycetes

Orden
Boletales

M Tipo
Micorrízica

0 Esporada
Ocre


Bosques frondosas


Himenio poros


Ennegrece al corte

Asociado a abedules, pie con escamas negras, carne que se oscurece

Boletal conocido como «boleto de abedul».

Sombrero convexo, de color pardo grisáceo a pardo oscuro, con superficie seca y lisa. Himenio con tubos y poros blanquecinos que se tornan grisáceos con la edad.

Pie largo y cilíndrico, sin retícula, cubierto de numerosas escamas negras. Carne blanca que al corte se vuelve grisácea o negruzca, especialmente en el pie. Olor y sabor suaves.

Forma micorrizas casi exclusivas con abedules. Comestible, debe cocinarse.

Dimensiones

Sombrero 6–15 cm de diámetro; pie 8–18 cm de alto

E | F | M | A | M | **J** | **J** | **A** | **S** | **O** | N | D

...QUE LLEVO EN MI CESTA?



¿QUÉ SETA ES ESTA...

A39

Suillus luteus

(L.) Roussel, 1821 A39

Buen comestible

B Clase Agaricomycetes

Orden Boletales

M Tipo Micorrízica

0 Esporada Ocre


Bosques coníferas


Himenio poros


Anillo membranoso


Cutícula viscosa

Sombrero marrón muy viscoso, anillo blanco, asociado a pinos

Sombrero convexo de color marrón a castaño oscuro, muy viscoso y brillante en tiempo húmedo, con cutícula fácilmente separable. Himenio formado por tubos y poros amarillos, pequeños y redondeados, que no azulean al tacto.

Pie cilíndrico de color amarillento, provisto de un anillo membranoso de blanco a violáceo.

Carne amarillenta, blanda, de olor suave y sabor agradable. Buen comestible tras retirar la cutícula viscosa (puede resultar indigesta). Produce efectos laxantes en algunas personas

Forma micorrizas casi exclusivamente con pinos.

Dimensiones

Sombrero 4–12 cm de diámetro; pie 5–10 cm de alto

E | F | M | A | M | J | J | A | **S** | **O** | **N** | **D**

...QUE LLEVO EN MI CESTA?



¿QUÉ SETA ES ESTA...

A40

Suillus granulatus

(L.) Roussel, 1806 A40

Comestible

B Clase
Agaricomycetes

Orden
Boletales

M Tipo
Micorrízica

0 Esporada
Ocre


Bosques todo tipo


Himenio poros


Cutícula viscosa

Sombrero viscoso de color crema o encarnado, sin anillo, poros con gotas lechosas

Sombrero convexo, de color amarillo ocráceo a pardo claro, muy viscoso en tiempo húmedo, con cutícula fácilmente separable.

Himenio formado por tubos y poros amarillos que exudan pequeñas gotitas blanquecinas o lechosas cuando es joven. Pie cilíndrico, sin anillo, de color amarillento, con pequeños gránulos en la parte superior.

Carne amarilla pálida, blanda, de olor suave y sabor agradable. Forma micorrizas con coniferas y con planifolios. Comestible tras retirar la cutícula viscosa.

Dimensiones

Sombrero 4–10 cm de diámetro; pie 5–9 cm de alto

E | F | M | A | M | **J** | **J** | **A** | **S** | **O** | **N** | D

...QUE LLEVO EN MI CESTA?



¿QUÉ SETA ES ESTA...

A41

Imleria badia

(Fr.) Vizzini, 2014 A41

Buen comestible

B Clase Agaricomycetes

Orden Boletales

M Tipo Micorrízica

0 Esporada Ocre



Bosques coníferas



Himenio poros



Azulea al roce

Sombrero pardo oscuro, poros amarillos azuleantes, pie sin retícula

Denominado anteriormente *Xerocomus badius*. Sombrero convexo, de color pardo oscuro a castaño chocolate, con superficie lisa y seca. Himenio formado por tubos y poros amarillos que azulean claramente al tacto o al corte.

Pie cilíndrico, de color pardo claro a amarillento, sin retícula ni escamas. Carne blanca a amarillenta, que vira al azul al seccionarse, especialmente bajo el himenio.

Olor suave y sabor agradable.

Forma micorrizas con coníferas y aparece con frecuencia en suelos ácidos.

Dimensiones

Sombrero 6–15 cm de diámetro; pie 6–12 cm de alto

E F M A M J **J A S O N** D

...QUE LLEVO EN MI CESTA?



¿QUÉ SETA ES ESTA...

A42

Paxillus involutus

(Batsch) Fr., 1838 A42

MORTAL

B Clase
Agaricomycetes


Orden
Boletales

M Tipo
Micorrízica

0 Esporada
Ocre


Bosques todo tipo


Láminas decurrentes


Láminas espaciadas


Enrojece al corte

Sombrero pardo con borde enrollado, láminas decurrentes enrojece al corte

Sombrero de tamaño medio, inicialmente convexo y luego deprimido, de color pardo amarillento a marrón oscuro, con el borde fuertemente enrollado durante gran parte de su desarrollo.

Láminas algo separadas, decurrentes, de color amarillento a pardo, que se oscurecen al presionarlas y se separan fácilmente del sombrero. Pie corto y robusto.

Carne amarillenta que enrojece al corte o al manipularla. Olor débil y sabor ligeramente ácido.

Forma micorrizas con numerosos árboles.

Dimensiones

Sombrero 5–15 cm de diámetro; pie 3–8 cm de alto

E | F | M | A | M | **J** | **J** | **A** | **S** | **O** | **N** | D

...QUE LLEVO EN MI CESTA?



¿QUÉ SETA ES ESTA...

A43

Hygrophoropsis aurantiaca

(Wulfen) Maire, 1921 A43

Sin valor culinario

B Clase
Agaricomycetes

Orden
Boletales

S Tipo
Saprófita

B Esporada
Blanca



Bosques coníferas




Madera muerta



Himenio láminas



Láminas decurrentes



Láminas densas

Color naranja intenso, láminas decurrentes

Seta conocida como «falso rebozuelo». Sombrero de tamaño medio, primero convexo y luego extendido o algo deprimido, de color naranja vivo a anaranjado ocráceo, con superficie seca y finamente tomentosa.

Láminas muy decurrentes, densas, ramificadas, facilmente separables y de color naranja (en el caso de los rebozuelos verdaderos son pliegues). Pie cilíndrico, del mismo color que el sombrero o algo más pálido. Carne blanda y amarillenta, sin olor ni sabor destacables.

Crece entre restos herbaceos y restos de madera en suelos ácidos. De escaso valor gastronomico.

Dimensiones

Sombrero 4–10 cm de diámetro; pie 3–7 cm de alto

E	F	M	A	M	J	J	**A**	**S**	**O**	**N**	**D**

...QUE LLEVO EN MI CESTA?



¿QUÉ SETA ES ESTA...

A44

Cortinarius orellanus

Fr., 1838 A44

MORTAL

B Clase Agaricomycetes

Orden Agaricales


S Tipo Saprófita

0 Esporada Ocre


Bosques frondosas


Láminas adnatas


Tiene lamélulas


Cortina si es joven

Sombrero pardo con borde más claro, cortina de joven, tóxica

Seta muy tóxica, también conocida como «cortinario mortal».

Sombrero de tamaño medio, inicialmente hemisférico y luego plano, de color pardo a marrón con tonos amarillentos en el borde. Superficie seca, que se vuelve mate con la edad.

Himenio formado por láminas adnatas, de color crema o mostaza de joven, que se oscurecen con la edad.

Pie robusto, de color amarillo a marrón con restos de cortina solo visibles en ejemplares jóvenes. Carne amarillo pálido, que no cambia de color al corte.

Dimensiones

Sombrero 5–15 cm de diámetro; pie 7–15 cm de alto

E | F | M | A | M | J | **J** | **A** | **S** | **O** | N | D

...QUE LLEVO EN MI CESTA?



¿QUÉ SETA ES ESTA...

A45

Cortinarius violaceus

(L.) Gray, 1821 A45

Sin valor culinario

B Clase Agaricomycetes

Orden Agaricales

M Tipo Micorrízica


0 Esporada Ocre



Bosques todo tipo



Láminas adnatas



Restos de cortina

Color violeta intenso en todo el carpóforo, aspecto aterciopelado

Toda la seta presenta un color violeta oscuro a púrpura, incluido sombrero, láminas y pie. Sombrero convexo, de superficie seca y aterciopelada.

Láminas relativamente espaciadas, adnatas, del mismo tono violeta, oscureciendo ligeramente con la madurez por la esporada ocre.

Pie robusto y fibroso, con restos de cortina más visibles en ejemplares jóvenes. Carne violácea, firme, sin cambios apreciables al corte. Olor débil y sabor suave.

Aparece con frondosas y coníferas.

Dimensiones

Sombrero 5–12 cm de diámetro; pie 6–15 cm de alto

E | F | M | A | M | J | J | **A** | **S** | **O** | N | D

...QUE LLEVO EN MI CESTA?



¿QUÉ SETA ES ESTA...

A46

Bovista plumbea

Pers., 1796 A46

Sin valor culinario

B Clase
Agaricomycetes

Orden
Gasterales

S Tipo
Saprófita

0 Esporada
Ocre


Praderas


Borde de caminos


Himenio liso

Forma globosa blanquecina, sin pie visible, gleba parda al madurar

Cuerpo fructífero globoso a subgloboso, de pequeño tamaño, inicialmente blanco y luego gris plomizo.

Carece de pie diferenciado, asentándose directamente sobre el sustrato.

Superficie externa lisa o ligeramente granulosa, la primera capa de piel es separable de joven. La gleba es blanca y compacta en ejemplares jóvenes, tornándose parda y pulverulenta al madurar, liberando las esporas por una abertura apical.

Olor y sabor poco apreciables. Crece en praderas, pastizales y suelos abiertos.

Dimensiones

Diámetro 2–6 cm

E | F | M | A | **M** | **J** | **J** | **A** | **S** | **O** | N | D

...QUE LLEVO EN MI CESTA?



¿QUÉ SETA ES ESTA...

A47

Lycoperdon perlatum

Pers., 1795 A47

Comestible mediocre

B Clase Agaricomycetes

Orden Gasterales


S Tipo Saprófita

0 Esporada Ocre


Bosques todo tipo


Praderas


Borde de caminos


Superficie verrugosa

Forma globosa, verrugas cónicas, gleba blanca de joven

Cuerpo fructífero globoso a piriforme, de color blanco a crema, cubierto de pequeñas verrugas o espinas cónicas que se desprenden con facilidad, dejando una superficie reticulada.

Sin sombrero ni láminas, con pseudopie poco diferenciado. Gleba blanca y firme en ejemplares jóvenes, tornándose parda y pulverulenta al madurar, cuando libera las esporas por una abertura apical.

Olor débil y sabor suave en ejemplares jóvenes. Crece en suelos forestales, praderas y claros. Comestible de escaso valor y solo cuando la gleba es blanca y compacta.

Dimensiones

Diámetro 3–6 cm; altura total hasta 7 cm

E | F | M | A | M | **J** | **J** | **A** | **S** | **O** | **N** | D

...QUE LLEVO EN MI CESTA?



¿QUÉ SETA ES ESTA...

A48

Crucibulum crucibuliforme

(Scop.) V.S. White, 1902 A48

Sin valor culinario

B Clase
Agaricomycetes

Orden
Gasterales

S Tipo
Saprófita

B Esporada
Blanca



Madera muerta



Himenio liso

Forma de pequeño «nido con huevos», crece sobre madera

Hongo gasteroide conocido como «nido de pájaro».

Cuerpo fructífero muy pequeño, inicialmente cerrado y cubierto por una membrana que se rompe al madurar, dejando una estructura en forma de copa o nido.

En su interior se observan varios peridiolos lenticulares, de color blanquecino, que contienen las esporas y recuerdan a pequeños huevos.

Superficie externa pardo clara a beige, algo tomentosa. Carece de sombrero, láminas y pie diferenciados. Crece sobre madera muerta y restos vegetales en descomposición.

Dimensiones

Diámetro 5–10 mm; altura hasta 10 mm

E	F	M	**A**	**M**	**J**	**J**	**A**	**S**	**O**	**N**	D

...QUE LLEVO EN MI CESTA?



¿QUÉ SETA ES ESTA...

A49

Phallus impudicus

L., 1753 A49

Sin valor culinario

B Clase Agaricomycetes

Orden Gasterales

S Tipo Saprófita

0 Esporada Ocre


Bosques todo tipo


Praderas, jardines


Borde de caminos


Himenio alveolado


Volva sacciforme


Sombrero viscoso

Olor fétido intenso, forma fálica, emerge de un huevo

Inicialmente aparece en forma de «huevo» blanquecino semienterrado, del que emerge el cuerpo fructífero adulto, de aspecto cilíndrico y hueco, con un sombrerillo cónico cubierto de gleba viscosa de color verdoso oliva.

Esta gleba desprende un olor muy intenso y desagradable a carne en descomposición, que atrae insectos responsables de la dispersión de las esporas.

Pie blanco, esponjoso y frágil, con volva sacciforme en la base.

Crece sobre suelos ricos en materia orgánica.

Dimensiones

Altura 10–25 cm; huevo inicial 4–6 cm de diámetro

E	F	M	A	**M**	**J**	**J**	**A**	**S**	**O**	N	D

...QUE LLEVO EN MI CESTA?



¿QUÉ SETA ES ESTA...

A50

Clathrus archeri

(Berk.) Dring, 1980 A50

Sin valor culinario

B Clase
Agaricomycetes

Orden
Gasterales

S Tipo
Saprófita

0 Esporada
Ocre


Bosques todo tipo


Praderas, jardines


Borde de caminos


Himenio poroso


Volva sacciforme


Superficie viscosa

Forma de estrella o pulpo rojo, olor fétido, emerge de un huevo

Aparece como un «huevo» blanquecino del que emergen de cuatro a siete brazos alargados de color rojo intenso, que se abren en forma de estrella.

La superficie interna de los brazos está cubierta de una gleba viscosa de color verde oliva oscuro, que desprende un olor muy fuerte y desagradable a materia en descomposición que atrae a insectos que facilitan la dispersión de las esporas.

Carece de sombrero y láminas. Crece sobre suelos ricos en materia orgánica, a menudo en jardines y bosques.

Dimensiones

Diámetro extendido hasta 15 cm; huevo inicial 3–6 cm

E | F | M | A | M | **J** | **J** | **A** | **S** | **O** | N | D

...QUE LLEVO EN MI CESTA?



¿QUÉ SETA ES ESTA...

A51

Scleroderma citrinum

Pers., 1801 A51

Tóxica

B Clase
Agaricomycetes


Orden
Gasterales

M Tipo
Micorrízica

0 Esporada
Ocre


Bosques todo tipo


Suelos arenosos


Superficie escamosa


Textura dura

Peridio grueso verrugoso, gleba negra desde joven, olor fuerte

Cuerpo fructífero globoso a irregular, de tamaño medio, con peridio grueso y coriáceo, de color amarillento a pardo, cubierto de escamas o placas poligonales. Carece de pie diferenciado.

La gleba es muy oscura (gris violácea a negra) incluso en ejemplares jóvenes, compacta al principio y pulverulenta al madurar.

Olor fuerte y desagradable.

Crece de forma superficial o a veces un poco enterrada en suelos forestales, a menudo micorrizando con frondosas y coníferas.

Dimensiones

Diámetro 5–10 cm

E	F	M	A	M	**J**	**J**	**A**	**S**	**O**	**N**	D

¿QUÉ SETA ES ESTA...

A52



...QUE LLEVO EN MI CESTA?

A52

Astraeus hygrometricus

(Pers.) Morgan, 1889 A52

Sin valor culinario

B Clase Agaricomycetes

Orden Gasterales

M Tipo Micorrízica

0 Esporada Ocre


Bosques todo tipo


Suelos arenosos


Himenio liso


Textura dura

Estrella de tierra con brazos gruesos, se abre y cierra con la humedad

Cuerpo fructífero inicialmente globoso que, al madurar, se abre en varios brazos o lacinias gruesos y rígidos formando una estrella.

Estos brazos reaccionan a la humedad ambiental, abriéndose en condiciones húmedas y cerrándose en tiempo seco, elevando el saco esporífero central.

El endoperidio es globoso, de color grisáceo o pardo, con una abertura apical por la que se liberan las esporas. Superficie externa dura y coriácea.

Crece sobre suelos arenosos y claros de bosque, micorriza con distintos árboles.

Dimensiones

Diámetro extendido 5–10 cm

E | F | M | A | M | J | **J** | **A** | **S** | **O** | **N** | D

...QUE LLEVO EN MI CESTA?



¿QUÉ SETA ES ESTA...

A53

Lactarius rufus

(Scop.) Fr., 1838 A53

No comestible

B Clase Agaricomycetes

Orden Russulales

M Tipo Micorrízica


B Esporada Blanca



Bosques coníferas



Láminas adnatas



Láminas densas



Latex blanco

Sombrero rojo pardo, látex blanco muy picante, láminas adnatas

Sombrero de tamaño medio, convexo y luego deprimido, de color rojizo o encarnado rojizo, con superficie seca y mate.

Láminas densas, adnatas, de color crema a ocráceo. Al corte o rotura exuda abundante látex blanco que no cambia de color, de sabor extremadamente picante y persistente.

Pie cilíndrico, del mismo color que el sombrero o algo más claro. Carne blanquecina, firme, de olor débil.

Forma micorrizas principalmente con coníferas.

Dimensiones

Sombrero 4–10 cm de diámetro; pie 4–8 cm de alto

E	F	M	**A**	**M**	J	J	A	**S**	**O**	**N**	**D**

...QUE LLEVO EN MI CESTA?



¿QUÉ SETA ES ESTA...

A54

Lactarius deliciosus

(L.) Gray, 1821 A54

Excelente comestible

B Clase **Agaricomycetes**


Orden **Russulales**

M Tipo **Micorrízica**

B Esporada **Marfil**


Bosques coníferas


Láminas adnatas


Láminas densas


Latex anaranjado


Verdea al dañarse

Color naranja, carne naranja, látex anaranjado

Seta muy apreciada conocida popularmente como «níscalo» o «robellón».

Sombrero inicialmente convexo y luego deprimido, de color anaranjado con zonas concéntricas más oscuras, superficie seca y lisa.

Láminas adnatas, densas, de color naranja, que al dañarse se manchan de tonos verdosos. Pie corto y robusto, del mismo color que el sombrero o algo más pálido. Carne compacta, de olor agradable y sabor suave.

Al corte exuda látex de color naranja zanahoria.

Micorriza casi exclusivamente con pinos.

Dimensiones

Sombrero 5–15 cm de diámetro; pie 3–7 cm de alto

E	F	M	A	M	J	J	A	**S**	**O**	**N**	**D**

...QUE LLEVO EN MI CESTA?

¿QUÉ SETA ES ESTA...

A55

Lactarius chrysorrheus

Fr., 1838 A55

Tóxica

B Clase
Agaricomycetes


Orden
Russulales

M Tipo
Micorrízica

B Esporada
Blanca


Bosques frondosas


Láminas adnatas


Láminas densas


Latex blanco

Sombrero de color encarnado, látex blanco que amarillea, sabor muy picante

Sombrero convexo y luego algo deprimido, de color encarnado a ocráceo, superficie seca y lisa. Láminas adnatas, densas, de color crema a amarillento.

Al corte exuda látex blanco abundante que vira rápidamente a amarillo intenso al contacto con el aire.

Pie cilíndrico, del mismo color que el sombrero o algo más claro.

Carne blanquecina, de olor débil y sabor extremadamente picante. Forma micorrizas principalmente con robles y otras frondosas.

Dimensiones

Sombrero 4–10 cm de diámetro; pie 4–7 cm de alto

E | F | M | A | M | J | J | **A** | **S** | **O** | **N** | D

...QUE LLEVO EN MI CESTA?



¿QUÉ SETA ES ESTA...

A56

Lactarius torminosus

(Schaeff.) Pers., 1797 A56

Tóxica

B Clase
Agaricomycetes


Orden
Russulales

M Tipo
Micorrízica

B Esporada
Blanca


Bosques frondosas


Láminas adnatas


Láminas apretadas


Latex blanco


Superficie pelosa

Sombrero rosado con margen muy peloso, látex blanco muy picante

Sombrero de color rosado a rosado pálido, con zonas concéntricas (en ocasiones más oscuras) y un margen densamente cubierto de pelos largos y lanosos.

Sombrero inicialmente convexo y luego un poco deprimido. Láminas adnatas, apretadas, de color crema a rosado pálido. Al corte exuda látex blanco abundante que no cambia de color y presenta un sabor extremadamente picante e irritante.

Pie corto y robusto, del mismo tono que el sombrero. Carne blanquecina, de olor débil.

Forma micorrizas casi exclusivamente con abedules.

Dimensiones

Sombrero 5–12 cm de diámetro; pie 3–6 cm de alto

E | F | M | A | M | J | J | **A** | **S** | **O** | **N** | D

...QUE LLEVO EN MI CESTA?



¿QUÉ SETA ES ESTA...

A57

Lepiota brunneoincarnata

Chodat & C. Martín, 1889 A57

MORTAL

B Clase
Agaricomycetes

Orden
Agaricales


S Tipo
Saprófita

B Esporada
Blanca


Praderas


Borde de caminos


Láminas libres


Láminas densas


Anillo frágil


Superficie escamosa

Pequeña, sombrero pardo escamoso, anillo frágil, mortal

Pequeña seta del género *Lepiota*, extremadamente peligrosa.

Sombrero de 2–6 cm, convexo a plano, de color pardo rojizo a marrón oscuro, cubierto de escamas concéntricas más oscuras sobre fondo claro. Láminas blancas, libres y densas.

Pie delgado y frágil, con anillo poco persistente, a menudo desaparecido en ejemplares adultos. Carece de volva.

Carne blanca, de olor débil. Crece en praderas, jardines y zonas herbosas a menudo en entornos urbanos.

Dimensiones

Sombrero 2–6 cm de diámetro; pie 4–7 cm de alto

E | F | M | A | M | **J** | **J** | **A** | **S** | **O** | N | D

...QUE LLEVO EN MI CESTA?



¿QUÉ SETA ES ESTA...

A58

Lepiota cristata

(Bolton) P. Kumm., 1871 A58

Tóxica

B Clase
Agaricomycetes

Orden
Agaricales


S Tipo
Saprófita

B Esporada
Blanca


Praderas


Borde de caminos


Láminas libres


Láminas apretadas


Anillo fugaz


Superficie escamosa

Pequeña, olor desagradable, sombrero pardo escamoso, anillo frágil

Sombrero de 2–5 cm, convexo a plano, de color blanquecino a crema, cubierto de escamas pardas dispuestas de forma concéntrica, más densas hacia el centro.

Láminas blancas, libres y apretadas. Pie delgado y frágil, con anillo poco persistente, que suele desaparecer con la edad. Carece de volva.

Carne blanca, de olor desagradable, a veces descrito como a goma quemada o a rancio.

Crece en praderas, jardines y zonas herbosas, a menudo en ambientes urbanos.

Dimensiones

Sombrero 2–5 cm de diámetro; pie 3–6 cm de alto

E | F | M | A | M | **J** | **J** | **A** | **S** | **O** | N | D

...QUE LLEVO EN MI CESTA?



¿QUÉ SETA ES ESTA...

A59

Macrolepiota procera

(Scop.) Singer, 1948 A59

Excelente comestible

B Clase
Agaricomycetes

Orden
Agaricales


S Tipo
Saprófita

B Esporada
Blanca


Praderas


Borde de caminos


Láminas libres


Láminas densas


Anillo grueso y doble


Superficie escamosa

Muy grande, sombrero escamoso, anillo móvil, pie atigrado

Sombrero de gran tamaño, inicialmente ovoide y luego ampliamente extendido, de color beige a pardo claro, cubierto de grandes escamas oscuras dispuestas concéntricamente, con un umbón central marcado. Láminas blancas, libres y densas.

Pie muy largo y delgado, con un característico dibujo atigrado o en zig-zag, provisto de un anillo grueso, doble y móvil. Carece de volva.

Carne blanca, blanda en el sombrero y fibrosa en el pie, de olor agradable y sabor suave. Crece en praderas, claros de bosque y zonas herbosas.

Dimensiones

Sombrero 15–30 cm de diámetro; pie hasta 30 cm de alto

E | F | M | A | M | J | J | **A** | **S** | **O** | **N** | D

...QUE LLEVO EN MI CESTA?

A60



¿QUÉ SETA ES ESTA...

A60

Chlorophyllum venenatum

(Bon) C. Lange & Vellinga, 2008 A60

Tóxica

B Clase
Agaricomycetes

Orden
Agaricales

S Tipo
Saprófita

B Esporada
Blanca


Bosques frondosas


Jardines


Láminas libres


Anillo no móvil


Superficie escamosa


Enrojece al roce

Parecida a parasol, carne que enrojece, tóxica

Seta mediana que puede confundirse con la *Macrolepiota procera*. Sombrero convexo a extendido, de color blanquecino a pardo claro, cubierto de escamas pardas irregulares que a menudo forman una estrella. Láminas blancas, libres y densas.

Pie robusto, bulboso, sin volva, con anillo amplio pero no móvil. Carne blanca que enrojece claramente al cortarse o al rozarse, especialmente en el pie. Olor débil.

Crece en bosques, jardines y zonas ricas en materia orgánica. Provoca intoxicaciones gastrointestinales en muchas personas.

Dimensiones

Sombrero 10–20 cm de diámetro; pie 10–18 cm de alto

E | F | M | A | M | J | **J** | **A** | **S** | **O** | N | D

...QUE LLEVO EN MI CESTA?



¿QUÉ SETA ES ESTA...

A61

Pleurotus eryngii

(DC.) Quél., 1872 A61

Excelente comestible

B Clase
Agaricomycetes

Orden
Agaricales

S Tipo
Saprófita

B Esporada
Blanca



Praderas, con cardos



Láminas decurrentes

Pie corto, láminas decurrentes, asociado a cardos

Seta muy apreciada conocida como «seta de cardo».

Sombrero convexo a plano, de color pardo grisáceo a beige o marrón negruzco, con superficie lisa y seca. Láminas blancas a crema, claramente decurrentes sobre un pie robusto, carnoso, corto y excéntrico.

Carne blanca, compacta y firme, de olor agradable y sabor suave.

Crece de forma saprófita a menudo sobre las raices de los cardos del género *Eryngium*, en terrenos abiertos.

Dimensiones

Sombrero 4–12 cm de diámetro; pie 4–10 cm de alto

E	F	M	**A**	**M**	**J**	J	A	**S**	**O**	**N**	**D**

...QUE LLEVO EN MI CESTA?



¿QUÉ SETA ES ESTA...

A62

Pleurotus ostreatus

(Jacq.) P. Kumm., 1871 A62

Excelente comestible

B Clase
Agaricomycetes

Orden
Agaricales

S Tipo
Saprófita

B Esporada
Blanca


Bosques frondosas


Madera muerta


Láminas decurrentes

Sombrero en forma de ostra, crecimiento en grupos, láminas decurrentes

Seta muy conocida y cultivada, llamada comúnmente «seta de ostra».

Sombrero en forma de concha u ostra, de color gris, gris azulado o pardo, con superficie lisa. Láminas de color blanco a crema, muy decurrentes sobre un pie corto o casi inexistente situado de forma excéntrica.

Crece formando grupos superpuestos sobre troncos y madera muerta de frondosas.

Carne blanca, tierna, de olor suave y sabor agradable.

Dimensiones

Sombrero 5–15 cm de diámetro; pie muy corto o ausente

E	F	M	**A**	**M**	**J**	**J**	**A**	**S**	**O**	N	D

...QUE LLEVO EN MI CESTA?



¿QUÉ SETA ES ESTA...

A63

Russula sardonia

Fr., 1838

A63

No comestible

B Clase
Agaricomycetes

Orden
Russulales

M Tipo
Micorrízica

0 Esporada
Ocre



Bosques coníferas



Láminas adnatas

Sombrero púrpura violáceo, láminas amarillas, sabor muy picante

Sombrero convexo a plano, de color púrpura oscuro a violáceo, a veces con tonos marrones, superficie seca y brillante. Láminas adnatas, de color amarillento a crema, rasgo muy característico.

Pie cilíndrico, robusto, de color blanquecino a púrpura que parte como tiza.

Carne blanca, frágil, de olor débil y sabor muy picante.

Forma micorrizas principalmente con coníferas, especialmente pinos.

Dimensiones

Sombrero 5–10 cm de diámetro; pie 4–8 cm de alto

E | F | M | A | M | J | J | **A** | **S** | **O** | **N** | D

...QUE LLEVO EN MI CESTA?



¿QUÉ SETA ES ESTA...

A64

Russula virescens

(Schaeff.) Fr., 1836 A64

Excelente comestible

B Clase
Agaricomycetes


Orden
Russulales

M Tipo
Micorrízica

B Esporada
Blanca


Bosques frondosas


Láminas adnatas


Láminas espaciadas

Sombrero verde agrietado, carne firme, sabor suave

Sombrero convexo a plano, de color verde grisáceo a verde oliva, con superficie característica agrietada en placas irregulares que dejan ver la carne blanca subyacente.

Láminas adnatas, blancas a crema, relativamente espaciadas y frágiles.

Pie cilíndrico, robusto, blanco que parte como tiza. Carne blanca, compacta y más firme que en otras setas del género Russula, de olor agradable y sabor suave.

Forma micorrizas principalmente con frondosas, especialmente robles.

Dimensiones

Sombrero 5–15 cm de diámetro; pie 4–8 cm de alto

E | F | M | A | M | **J** | **J** | **A** | **S** | **O** | N | D

...QUE LLEVO EN MI CESTA?

¿QUÉ SETA ES ESTA...

A65

Russula cyanoxantha

(Schaeff.) Fr., 1863 A65

Excelente comestible

B Clase
Agaricomycetes

Orden
Russulales

M Tipo
Micorrízica

B Esporada
Blanca



Bosques frondosas



Láminas adnatas

Sombrero violáceo verdoso, láminas flexibles no quebradizas

Sombrero convexo a plano, muy variable en color, con tonos verdosos, violáceos, azulados o grisáceos, superficie lisa y algo satinada.

Láminas adnatas, blancas a crema, muy flexibles, elásticas y con tacto «graso», que no se quiebran con facilidad, rasgo excepcional dentro del género Russula.

Pie cilíndrico, blanco, robusto, que parte como tiza. Carne blanca, firme, de olor débil y sabor suave.

Forma micorrizas con frondosas, especialmente robles y hayas.

Dimensiones

Sombrero 6–15 cm de diámetro; pie 5–9 cm de alto

E | F | M | A | M | **J** | **J** | **A** | **S** | **O** | N | D

...QUE LLEVO EN MI CESTA?



¿QUÉ SETA ES ESTA...

A66

Russula vesca

Fr., 1836 A66

Buen comestible

B Clase
Agaricomycetes

Orden
Russulales

M Tipo
Micorrízica


B Esporada
Blanca



Bosques frondosas



Láminas adnatas



Láminas espaciadas

Sombrero rosado carneo, margen un poco acanalado al envejecer, sabor suave

Sombrero convexo a plano, de color rosado a rosado pálido, a veces con tonos ocres, superficie seca y algo mate; margen algo acanalado en ejemplares viejos, que se retrae un poco dejando visibles las laminas, rasgo distintivo.

Láminas adnatas, blancas a crema, relativamente espaciadas. Pie cilíndrico, blanco y robusto que parte como tiza.

Carne blanca, compacta, de olor débil y sabor suave, agradable.

Forma micorrizas con frondosas, especialmente robles y castaños.

Dimensiones

Sombrero 5–12 cm de diámetro; pie 4–8 cm de alto

E | F | M | A | M | **J** | **J** | **A** | **S** | **O** | N | D

...QUE LLEVO EN MI CESTA?



¿QUÉ SETA ES ESTA...

A67

Russula nigricans

(Bull.) Fr., 1838 A67

Sin valor culinario

B Clase
Agaricomycetes


Orden
Russulales

M Tipo
Micorrízica

B Esporada
Blanca


Bosques frondosas


Láminas adnatas


Láminas espaciadas


Ennegrece al oxidarse

Enrojece y luego ennegrece al oxidarse, sombrero gris pardo, carne muy dura

Russula robusta de sombrero grande, convexo a plano, de color gris pardo a negruzco, superficie seca y mate. Láminas adnatas, gruesas y espaciadas, inicialmente blancas y después grisáceas. Al corte o al daño, la carne primero enrojece y posteriormente se vuelve negra.

Pie corto, robusto, blanquecino que también ennegrece con el tiempo y que parte como tiza. Carne blanca, muy dura y compacta, de olor débil y sabor poco apreciable.

Forma micorrizas con frondosas, especialmente robles y castaños.

Dimensiones

Sombrero 8–20 cm de diámetro; pie 3–6 cm de alto

E | F | M | A | M | J | **J** | **A** | **S** | **O** | **N** | D

¿QUÉ SETA ES ESTA...

A68



...QUE LLEVO EN MI CESTA?

A68

Russula aeruginea

Lindblad, 1861 A68

Tóxica

B Clase
Agaricomycetes

Orden
Russulales

M Tipo
Micorrízica


B Esporada
Crema



Bosques frondosas



Láminas adnatas



Láminas espaciadas

Sombrero verde oliva, carne frágil, sabor suave

Sombrero de 5–10 cm, convexo a plano, de color verde oliva a verde grisáceo, a veces con zonas algo más claras, cutícula seca y separable parcialmente.

Láminas blancas a crema, relativamente espaciadas y frágiles. Pie blanco, cilíndrico, que parte como tiza. Carne blanca, quebradiza, de olor débil y sabor suave, un poco picante en las laminas.

Forma micorrizas principalmente con abedules.

Puede confundirse con *Russula virescens* o *Russula heterophylla*.

Dimensiones

Sombrero 5–10 cm de diámetro; pie 4–8 cm de alto

E | F | M | A | M | **J** | **J** | **A** | **S** | **O** | N | D

...QUE LLEVO EN MI CESTA?



¿QUÉ SETA ES ESTA...

A69

Tricholoma equestre

(L.) P. Kumm., 1871 A69

Tóxica

B Clase
Agaricomycetes

Orden
Agaricales


M Tipo
Micorrízica

B Esporada
Blanca


Bosques coníferas


Suelos arenosos


Láminas escotadas


Láminas densas

Sombrero amarillo verdoso, láminas amarillas, pinares

Conocida como «seta de los caballeros».

Sombrero convexo a plano, de color amarillo verdoso, a menudo con tonos más oscuros en el centro, superficie seca y lisa. Láminas escotadas, densas, de color amarillo intenso. Pie cilíndrico, robusto, del mismo color que el sombrero o algo más pálido.

Carne blanquecina a amarillenta, firme, de olor débil y sabor suave. Forma micorrizas con pinos en suelos arenosos.

Tradicionalmente considerada comestible, hoy se clasifica como tóxica.

Dimensiones

Sombrero 5–12 cm de diámetro; pie 4–8 cm de alto

E	F	M	A	M	J	J	A	**S**	**O**	**N**	**D**

...QUE LLEVO EN MI CESTA?

A70



¿QUÉ SETA ES ESTA...

A70

Tricholoma terreum

(Schaeff.) P. Kumm., 1871 A70

Sospechosa tóxica

B Clase
Agaricomycetes

Orden
Agaricales

M Tipo
Micorrízica

B Esporada
Blanca


Bosques coníferas


Láminas escotadas


Superficie fibrosa

Sombrero gris fibriloso, aspecto ceniciento, asociado a pinares

Seta conocida como «negrilla» o «fredolic». Sombrero convexo a plano, de color gris ceniza a gris oscuro, cubierto de finas fibrillas radiales que le dan un aspecto sedoso o aterciopelado. Láminas escotadas, blancas a grisáceas.

Pie cilíndrico, esbelto, del mismo tono grisáceo o algo más claro.

Carne blanca, fina y frágil, de olor débil y sabor suave. Forma micorrizas con pinos, creciendo frecuentemente en grandes grupos.

Tradicionalmente considerada comestible, hoy se sospecha tóxica.

Dimensiones

Sombrero 4–8 cm de diámetro; pie 3–7 cm de alto

E | F | M | A | M | J | J | A | **S** | **O** | **N** | **D**

...QUE LLEVO EN MI CESTA?



¿QUÉ SETA ES ESTA...

A71

Tricholoma sulphureum

(Bull.) P. Kumm., 1871 A71

Tóxica

B Clase
Agaricomycetes

Orden
Agaricales

M Tipo
Micorrízica


B Esporada
Blanca



Bosques frondosas



Láminas escotadas



Láminas densas

Color amarillo azufre, olor desagradable a gas o azufre

Seta fácilmente reconocible por su intenso olor desagradable, descrito como a gas, azufre o huevos podridos.

Sombrero convexo a plano, de color amarillo azufre a amarillo verdoso, superficie seca y lisa. Láminas escotadas, densas, del mismo tono amarillento. Pie cilíndrico, delgado y amarillento.

Carne amarillenta, de olor muy fuerte y sabor amargo.

Forma micorrizas con frondosas y ocasionalmente con coníferas. Provoca trastornos gastrointestinales.

Dimensiones

Sombrero 4–10 cm de diámetro; pie 4–8 cm de alto

E | F | M | A | M | J | J | **A** | **S** | **O** | **N** | D

...QUE LLEVO EN MI CESTA?

A72

¿QUÉ SETA ES ESTA...

A72

Galerina marginata

(Batsch) Kühner, 1935 A72

MORTAL

B Clase Agaricomycetes

Orden Agaricales

S Tipo Saprófita

0 Esporada Ocre


Bosques todo tipo


Madera muerta


Láminas adnatas


Anillo membranoso


Superficie higrófana

Pequeña seta marrón sobre madera, anillo frágil, mortal

Pequeña seta extremadamente peligrosa.

Sombrero de 2–5 cm, convexo a plano, de color pardo amarillento a marrón, con superficie higrófana que se aclara al secarse y suele mostrar un margen estriado.

Láminas adnatas, apretadas, de color ocre a marrón. Pie delgado, fibroso, con un anillo membranoso bastante persistente.

Carne parda clara, de olor débil y sabor poco notable. Crece directamente sobre madera muerta, troncos y tocones, tanto de coníferas como de frondosas.

No confundir con *Kuehneromyces mutabilis*.

Dimensiones

Sombrero 2–5 cm de diámetro; pie 3–7 cm de alto

E	F	M	A	**M**	**J**	**J**	**A**	**S**	**O**	**N**	D

...QUE LLEVO EN MI CESTA?



¿QUÉ SETA ES ESTA...

A73

Hypholoma fasciculare

(Huds.) P. Kumm., 1871 A73

Tóxica

B Clase
Agaricomycetes

Orden
Agaricales

S Tipo
Saprófita

V Esporada
Violeta



Madera muerta



Láminas adnatas

Crecimiento en densos grupos, sombrero amarillo azufre, láminas verdosas

Seta tóxica muy común, conocida como «seta de azufre».

Crece en densos ramilletes sobre madera muerta, troncos y tocones. Sombrero de 2–6 cm, convexo a plano, de color amarillo azufre a encarnado, a menudo con el centro más oscuro.

Láminas adnatas, inicialmente amarillas, tornándose verdosas y finalmente grisaceo violáceas.

Pie delgado, amarillo, sin anillo. Carne amarillenta, de sabor muy amargo y olor poco apreciable.

Provoca intoxicaciones gastrointestinales.

Dimensiones

Sombrero 2–6 cm de diámetro; pie 4–10 cm de alto

E	F	M	A	**M**	**J**	**J**	**A**	**S**	**O**	**N**	**D**

...QUE LLEVO EN MI CESTA?

A74



¿QUÉ SETA ES ESTA...

A74

Hygrocybe conica

(Schaeff.) P. Kumm., 1871 A74

Tóxica

B Clase
Agaricomycetes

Orden
Agaricales

S Tipo
Saprófita

B Esporada
Blanca


Praderas y césped


Láminas adnatas


Sombrero viscoso


Ennegrece al roce

Sombrero cónico rojo anaranjado, ennegrece al tocarlo

Seta vistosa conocida como «higróforo cónico» o «sombrero de bruja».

Sombrero inicialmente cónico, a veces campanulado, de color rojo, anaranjado o amarillento, muy viscoso en tiempo húmedo. Láminas adnatas, cerosas, de blanquecinas a amarillentas, que también se oscurecen.

Pie esbelto, de color amarillento, sin anillo. Tanto el sombrero como el pie ennegrecen al ser manipulados o al envejecer.

Carne frágil, de olor débil y sabor poco apreciable. Crece en praderas y pastizales pobres en nutrientes.

Dimensiones

Sombrero 2–6 cm de diámetro; pie 4–10 cm de alto

E | F | M | A | M | **J** | **J** | **A** | **S** | **O** | **N** | D

...QUE LLEVO EN MI CESTA?



¿QUÉ SETA ES ESTA...

A75

Clitocybe nebularis

(Batsch) P. Kumm., 1871 A75

Sospechosa tóxica

B Clase
Agaricomycetes

Orden
Agaricales

S Tipo
Saprófita


B Esporada
Blanca



Bosques frondosas



Láminas decurrentes



Láminas densas

Gran tamaño, color grisáceo, láminas decurrentes, olor fuerte

Seta de gran tamaño conocida como «pardilla».

Sombrero de 6–20 cm, convexo a plano, de color gris claro a gris parduzco con aspecto «escarchado». Láminas decurrentes, densas, de color blanco a crema. Pie robusto, y cilíndrico.

Carne blanca, espesa, con olor fuerte y persistente, descrito como harinoso (desagradable para algunas personas). Crece en grupos numerosos formando hileras o corros.

Tradicionalmente consumida, pero se sospecha tóxica, puede provocar trastornos gastrointestinales.

Dimensiones

Sombrero 6–20 cm de diámetro; pie 5–10 cm de alto

E	F	M	A	M	J	J	A	**S**	**O**	**N**	**D**

...QUE LLEVO EN MI CESTA?



¿QUÉ SETA ES ESTA...

A76

Collybia rivulosa

(Pers.) Z.M. He & Zhu L. Yang, 2023 A76

Tóxica

B Clase
Agaricomycetes

Orden
Agaricales


S Tipo
Saprófita

B Esporada
Blanca


Praderas


Borde de caminos


Láminas decurrentes


Láminas apretadas

Pequeña seta blanquecina en praderas, láminas decurrentes, muy tóxica

Denominada anteriormente *Clitocybe rivulosa*.

Pequeña seta muy tóxica que crece en praderas, céspedes y zonas herbosas, en grupos mas o menos grandes.

Sombrero de 2–5 cm, convexo a plano o algo deprimido, de color blanco a crema, a veces con tonos grisáceos. Láminas decurrentes, blancas y apretadas. Pie corto y delgado, sin anillo ni volva.

Carne blanca, de olor débil y sabor suave. Puede confundirse con setas comestibles pequeñas de pradera como *Marasmius* o *Clitopilus*.

Dimensiones

Sombrero 2–5 cm de diámetro; pie 2–4 cm de alto

E	F	M	A	M	**J**	**J**	**A**	**S**	**O**	**N**	D

...QUE LLEVO EN MI CESTA?



¿QUÉ SETA ES ESTA...

A77

Coprinopsis atramentaria

(Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo, 2001 A77

Precaución al consumir

B Clase Agaricomycetes

Orden Agaricales

S Tipo Saprófita

N Esporada Negra


Praderas


Borde de caminos


Láminas libres


Sombrero estriado


Láminas se licúan

Sombrero gris estriado, se licua en tinta negra, incompatible con alcohol

Sombrero inicialmente ovoide o campanulado, de color gris a gris parduzco, con estrías radiales; al madurar las láminas se disuelven formando un líquido negro semejante a tinta.

Láminas libres, blancas de jóvenes, volviéndose negras al envejecer. Pie blanco y cilíndrico, con pequeña marca anular en la parte baja, sin volva.

Crece en grupos sobre suelos ricos en materia orgánica, jardines y zonas urbanas.

Comestibilidad desconocida, tóxica si se mezcla con alcohol (efecto «antabus»).

Dimensiones

Sombrero 3–7 cm de diámetro; pie 5–12 cm de alto

E | F | M | **A** | **M** | **J** | **J** | **A** | **S** | **O** | **N** | D

...QUE LLEVO EN MI CESTA?



¿QUÉ SETA ES ESTA...

A78

Coprinus comatus

(O.F. Müll.) Pers., 1797 A78

Buen comestible

B Clase Agaricomycetes

Orden Agaricales

S Tipo Saprófita

N Esporada Negra


Praderas


Borde de caminos


Láminas libres


Anillo móvil


Sombrero escamoso


Láminas se licúan

Sombrero alargado blanco escamoso, se licua en tinta negra

Seta conocida popularmente como «barbuda» o «matacandil».

Sombrero inicialmente cilíndrico y alargado, blanco, cubierto de escamas fibrosas, que con la madurez se abre y se licua en un líquido negro semejante a tinta.

Láminas libres, blancas de jóvenes, volviéndose rosadas y finalmente negras al envejecer.

Pie blanco, alto y esbelto, con anillo móvil. Crece en praderas, bordes de caminos y zonas urbanas.

Buen comestible solo cuando es joven y antes de que comience la licuefacción.

Dimensiones

Sombrero 4–10 cm de alto; pie 10–25 cm de alto

E | F | M | **A** | **M** | **J** | **J** | **A** | **S** | **O** | **N** | D