	Medias Muestrales	Proporciones Muestrales	Varianzas Muestrales
Media	$\mu_{\bar{X}}$	$\mu_p = \pi$	$\mu_{s^2} = \frac{N}{N-1}\sigma^2$
Varianza	$\sigma^2_{\bar{X}} = \frac{\sigma^2}{n}\frac{N-n}{N-1}$	$\sigma^2_p = \frac{\pi(1-\pi)}{n}\frac{N-n}{n-1}$	$\sigma^2_{S^2} = \frac{\mu_4}{n} - \frac{\sigma^4(n-3)}{n(n-1)}$
Error Estándar	$\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$	$\sigma_p = \sqrt{\frac{\pi(1-\pi)}{n}}\sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$	$\sigma_{S^2} = \sqrt{\frac{\mu_4}{n} - \frac{\sigma^4(n-3)}{n(n-1)}}$
Distribución	$Z = \frac{\bar{X}-\mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\sqrt{\frac{N-n}{N-1}}}$	$Z = \frac{p-\pi}{\sqrt{\frac{\pi(1-\pi)}{n}}\sqrt{\frac{N-n}{N-1}}}$	$\chi^2_{(n-1)} = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$
Se requiere	Población normal n cualquiera o $n > 30$	$n \geq 30$	Población normal