Lantana *(Lantana camara)*

Taxonomía básica

Reino: Plantae

Orden: Lamiales

Familia: Verbenaceae

Género: Lantana

Especie: Lantana camara L.

Origen y distribución

Es nativa de las regiones tropicales de América (Centro y Sur), desde el sur de Estados Unidos y Caribe hasta Sudamérica, y hoy está naturalizada como ornamental en zonas tropicales y subtropicales de todo el mundo.

Morfología y fisiología relevante

Es un arbusto perenne muy ramificado que típicamente alcanza 1–2 m de altura en condiciones normales, aunque puede crecer más si se deja sin poda.







Presenta hojas opuestas, ásperas y rugosas, con margen dentado y olor fuerte al estrujarlas; las inflorescencias son capítulos hemisféricos con numerosas flores tubulares de colores variables (amarillo, naranja, rojo, rosa, blanco), que cambian de color al madurar, con floración casi todo el año en climas cálidos.

Fisiológicamente, su follaje coriáceo y la alta ramificación le confieren buena tolerancia a insolación intensa y periodos de sequía moderada; sin embargo, en algunos países se considera especie invasora y tóxica para ganado si se ingiere en grandes cantidades.

Manejo en paisajismo (≤ 2 m)

Suelo: Común pero bien drenado; evita encharcamientos prolongados. Se adapta a suelos pobres, bordes de caminos y taludes.

Luz: Pleno sol (≥6 h/día) para máxima floración; tolera algo de semisombra pero florece menos.

Riego: Una vez establecida, soporta riegos espaciados; en jardines de bajo mantenimiento se riega profundo y luego se deja secar el sustrato antes de repetir, reduciendo la frecuencia en temporada lluviosa.

Poda:

Poda de formación y recorte después de la floración para mantenerla en 1–1,5 m, ideal para parques.

Eliminación de inflorescencias secas para estimular nuevas flores.

Uso paisajístico: Macizos florales, bordes de caminos, taludes y puntos de color continuo, muy útil como banda de transición entre césped y rocallas.

Ixora *(Ixora spp.)*

Taxonomía básica

Reino: Plantae

Orden: Gentianales

Familia: Rubiaceae

Género: Ixora

Especies ornamentales frecuentes: Ixora coccinea y cultivares.

Origen y distribución

La ixora es originaria de regiones tropicales de Asia, pero se ha difundido ampliamente como arbusto ornamental en jardines tropicales de América y el Caribe, incluidos jardines urbanos en Panamá.

Morfología y fisiología relevante

Es un arbusto denso, de hojas enteras y brillantes, que en jardinería se mantiene entre 1 y 2 m por medio de podas ligeras regulares.







shutterstock.com · 2696002843

Produce inflorescencias en cabezuelas terminales (umbelas compactas) con numerosas flores tubulares de colores rojo, naranja, rosa o amarillo, con floraciones repetidas a lo largo del año en clima cálido y húmedo.

Su fisiología se adapta bien a climas tropicales húmedos: necesita suelos con algo de humedad y buena fertilidad, pero tolera sol intenso siempre que el sustrato no se seque totalmente por mucho tiempo; las hojas coriáceas resisten bien la radiación alta.

Manejo en paisajismo (≤ 2 m)

Suelo: Ligeramente ácido, fértil y drenado; responde bien a aportes de materia orgánica y fertilización suave.

Luz: Pleno sol o semisombra luminosa; para floración abundante se recomienda alta luminosidad.

Riego: Moderado: mantener el sustrato ligeramente húmedo pero sin encharcar; en parques con poca agua se puede manejar con riego profundo y espaciado, evitando estrés hídrico prolongado.

Poda:

Poda ligera de formación después de floraciones principales.

Se puede mantener fácilmente en 1–1,5 m como seto bajo o macizo central.

Uso paisajístico: Bordes de senderos, setos bajos alrededor de áreas de descanso, manchas de color frente a edificios o estructuras, combinable con lantanas y heliconias.

Aloe *(Aloe vera)*

Taxonomía básica

Reino: Plantae

Orden: Asparagales

Familia: Asphodelaceae (Aloaceae en clasificaciones antiguas)

Género: Aloe

Especie: Aloe vera (sin. Aloe barbadensis).

Origen y distribución

El aloe vera es originario de regiones áridas y semiáridas del norte de África y posiblemente la Península Arábiga; actualmente se cultiva de forma extensiva en zonas cálidas de todo el mundo como planta medicinal y ornamental.



Morfología y fisiología relevante

Es una suculenta de roseta, normalmente entre 30 y 60 cm de altura, formada por hojas carnosas, lanceoladas, con margen ligeramente espinoso, que almacenan agua en el parénquima.

Fisiológicamente está adaptada a climas secos: presenta metabolismo suculento (tipo CAM), cutícula gruesa y baja transpiración, lo que permite soportar largos periodos sin agua; el exceso de humedad en el sustrato es el principal factor de mortalidad (pudrición de raíces).

Manejo en paisajismo (≤ 0,6 m)

Suelo: Sustrato muy drenante, tipo mezcla de cactus (arena gruesa, grava, algo de materia orgánica pero poca), tanto en maceta como en rocallas.

Luz: Exterior: sol directo 4–6 h/día en climas no extremos; en tropical húmedo conviene sol de mañana y algo de protección al sol muy fuerte de la tarde.

Interior: lugar muy luminoso, cerca de ventanas orientadas al sur o suroeste.

Riego: Regla clave: dejar secar completamente el sustrato antes de regar de nuevo.

Frecuencia orientativa en exterior cálido: cada 2–3 semanas en estación seca; una vez al mes o menos en época fresca o muy lluviosa.

Siempre evitar agua estancada en plato o en el centro de la roseta.

Poda y manejo: No requiere poda, sólo retirada de hojas viejas en la base.

Se multiplica por hijuelos que emergen alrededor de la planta madre.

Uso paisajístico: Agrupaciones escultóricas en rocallas secas, bandas de suculentas en bordes de caminos, macetas decorativas en entradas de parques o miradores, combinable con portulaca, echeverias y sedums.

Lavanda *(Lavandula angustifolia)*

Taxonomía básica

Reino: Plantae

Orden: Lamiales

Familia: Lamiaceae

Género: Lavandula

Especie: Lavandula angustifolia Mill.

Origen y distribución

Es originaria de la cuenca mediterránea, extendiéndose desde el sur de Europa y norte de África hasta la Península Arábiga y regiones del oeste de Asia; se cultiva hoy ampliamente como planta aromática y ornamental.

Morfología y fisiología relevante

Es un sufrútice perenne (arbustito leñoso) que en cultivo ornamental suele alcanzar unos 60 cm de altura, pudiendo llegar cerca de 1 m según variedad y manejo.







Presenta tallos leñosos en la base, hojas estrechas, opuestas, de color verde-grisáceo, y espigas florales violetas que liberan aceites esenciales; se adapta a suelos pedregosos, pobres y secos, con alta radiación solar y muy buen drenaje.

Fisiológicamente es una especie xerófita: tolera la sequía, prospera en condiciones de secano y muestra problemas en suelos pesados o húmedos, donde aumenta el riesgo de enfermedades radiculares.

Manejo en paisajismo (≤ 0,6–1 m)

Suelo: Arenoso o franco-arenoso, incluso calcáreo, pH 6–8; exige drenaje excelente, pudiendo incorporar grava o arena gruesa para evitar encharcamientos.

Luz: Pleno sol (≥6–8 h/día); se recomienda ubicarla en los lugares más soleados del jardín.

Riego: Necesidades bajas: riego escaso, sólo cuando el suelo está seco; el exceso de agua favorece pudrición de raíz.

Poda: Poda ligera tras la floración para mantener forma compacta y estimular nuevos brotes.

Cada 2–3 años, poda de rejuvenecimiento eliminando tallos viejos, sin cortar madera sin brotes.

Uso paisajístico: Bordes aromáticos junto a senderos, taludes pedregosos, mezclas con romero y otras mediterráneas para jardines de bajo riego, bandas que aportan aroma y flor violeta en contraste con suculentas y césped.

Romero *(Salvia rosmarinus)*

Taxonomía básica

Reino: Plantae

Orden: Lamiales

Familia: Lamiaceae

Género: Salvia

Especie: Salvia rosmarinus (antes Rosmarinus officinalis).

Origen y distribución

Es una planta aromática endémica de la región mediterránea, presente en laderas secas y pedregosas, taludes y terrenos calizos; hoy se cultiva como ornamental y culinaria en múltiples países.

Morfología y fisiología relevante

Se trata de un arbusto perenne de bajo mantenimiento, con porte generalmente inferior a 1 m en jardines, aunque puede superar esta altura si se deja crecer libremente.







Posee hojas lineares, estrechas, opuestas, verde-oscuras por el haz y algo blanquecinas por el envés; emite flores azuladas o violáceas que florecen en épocas templadas, y toda la planta es rica en aceites esenciales.

Fisiológicamente requiere alta luminosidad, soporta periodos de sequía y se adapta a suelos pobres, arenosos o calcáreos, siempre con buen drenaje para evitar encharcamientos.

Manejo en paisajismo (≤ 1 m)

Suelo: Preferencia por suelos arenosos o ligeros, bien drenados; puede crecer en suelos pobres y calcáreos, pero no soporta encharcamiento prolongado.

Luz: Pleno sol; para buen desarrollo se recomienda alta radiación solar, en exterior y con algo de protección frente a vientos fuertes.

Riego: Escaso a moderado: regar sólo cuando el suelo esté seco, dejando secar el sustrato entre riegos.

Es resistente a sequía, pero mantiene mejor aspecto con riegos moderados espaciados.

Poda: Poda de formación si se usa como seto bajo (recorte de puntas tras la plantación).

Poda ligera después de floración para mantener la planta compacta y vigorosa.

Uso paisajístico: Bordes aromáticos junto a senderos, taludes secos, setos bajos que delimitan áreas de descanso, combinación con lavanda y gazania para jardines de bajo consumo hídrico y estética mediterránea adaptada al trópico.

Gazania *(Gazania rigens)*

Taxonomía básica

Reino: Plantae

Orden: Asterales

Familia: Asteraceae

Género: Gazania

Especie: Gazania rigens (sin. Gazania splendens, Gorteria rigens, etc.).

Origen y distribución

Es originaria del sur de África (Sudáfrica y Mozambique), donde habita ambientes ruderal y se ha introducido en regiones mediterráneas y atlánticas como ornamental, volviéndose subespontánea en algunos lugares.







Morfología y fisiología relevante

Es una planta herbácea perenne de porte bajo (tapizante); forma rosetas basales de hojas enteras o lobuladas, a menudo con envés blanquecino, y emite capítulos florales grandes de colores muy vistosos (amarillos, naranjas, rojos, con bandas y patrones), que se abren al sol.

Se comporta como especie heliófila: las flores se abren con la luz intensa y se cierran en ausencia de sol, lo que la hace ideal para zonas muy soleadas y secas de jardines.

Manejo en paisajismo (≤ 0,3 m)

Suelo: Ligero, arenoso o franco-arenoso, bien drenado, incluso pobre; soporta suelos secos y exposición directa al sol.

Luz: Pleno sol; cuanto más sol recibe, más abundante y espectacular es la floración.

Riego: Necesidades bajas a moderadas: se adapta bien al secano, con riegos ocasionales; ideal para zonas de bajo mantenimiento.

Poda/mantenimiento:

Retiro de flores marchitas para prolongar la floración.

Control de expansión si se usa como tapizante en bordes o taludes.

Uso paisajístico: Tapiz floral en bordes de caminos, taludes y rocallas; combina muy bien con portulaca, romero y lavanda, generando zonas de alto impacto visual con mínima demanda de agua y fácil manejo.

Portulaca *(Portulaca grandiflora)*

Taxonomía básica

Reino: Plantae

Orden: Caryophyllales

Familia: Portulacaceae

Género: Portulaca

Especie: Portulaca grandiflora.

Origen y distribución

Es nativa de Sudamérica (Brasil, Uruguay, Argentina) y se ha difundido globalmente como ornamental de temporada en jardines cálidos, especialmente para bordes y rocallas en climas soleados.

Morfología y fisiología relevante

Planta herbácea rastrera, suculenta, de 10–25 cm de altura, con tallos carnosos y hojas reducidas que almacenan agua.



Produce numerosas flores grandes de colores muy variados (rojo, rosa, blanco, amarillo, naranja, simples o dobles) que se abren con el sol y se cierran en sombra o días nublados, funcionando como indicador de luz.

Fisiológicamente se comporta como xerófita: tolera altas temperaturas, atmósfera seca y escasez de agua, pero es muy sensible al exceso de humedad en el sustrato, que provoca pudrición de raíces.

Manejo en paisajismo (≤ 0,25 m)

Suelo: Medianamente fértil y arenoso, con profundidad baja pero drenaje excelente; ideal en rocallas, bordes y parterres soleados.

Luz: Pleno sol; requiere exposición solar completa para buena floración, con mínimo 6 h/día.

Riego: Moderado y espaciado: regar en períodos cálidos, dejar secar la tierra entre riegos; mejor regar de menos que de más. En climas muy calurosos puede necesitar 1–2 riegos/semana, siempre evitando encharcamientos.

Poda / mantenimiento: Retirar flores marchitas si se busca prolongar la floración.

Controlar pulgones (áfidos), una plaga frecuente en este género.

Uso paisajístico: Tapizante de bordes y taludes, manchas de color entre rocas, jardineras colgantes y contenedores de sol, combinable con gazania, verbena y suculentas para rocallas de color.

Verbena *(Verbena hybrida)*

Taxonomía básica

Reino: Plantae

Orden: Lamiales

Familia: Verbenaceae

Género: Verbena

Especie: Verbena hybrida y cultivares.

Origen y distribución

Es una planta originaria del continente americano; los híbridos modernos se han seleccionado como ornamentales de flor en macizos y macetas, difundidos en jardines templados y cálidos.

Morfología y fisiología relevante

Perenne herbácea (a menudo usada como anual), con tallos erectos y cuadrados, pilosos y ásperos, hojas opuestas, lobuladas y de color verde oscuro.



Las flores poseen cinco pétalos, ligeramente tubulares, reunidas en umbelas terminales sobre pedúnculos largos, con amplia gama de colores según cultivar.

Es muy sensible al exceso de humedad, tanto en el sustrato como en el ambiente, por lo que los manuales de cultivo enfatizan la necesidad de buena aireación, suelo drenante y riegos controlados.

Manejo en paisajismo (≤ 0,6 m)

Suelo: Ligero, bien drenado, sin encharcamientos; tolera suelos pobres si se fertiliza suavemente.

Luz: Exposición a sol directo; la floración óptima se da con buena iluminación.

Riego: Moderado, evitando agua en exceso; dejar secar ligeramente el sustrato entre riegos y ajustar según clima.

Poda / mantenimiento: Tras la primera floración, se recomienda podar para promover nueva floración y mantener la forma compacta.

Control de oídio, botrytis, mosca blanca y trips, plagas frecuentes en verbena.

Uso paisajístico: Macizos florales bajos, borduras delante de arbustos como lantana o ixora, jardineras de sol; se integra muy bien en parterres de flores continuas en parques.

Pelargonio / Geranio de jardín *(Pelargonium hortorum, P. zonale)*

Taxonomía básica

Reino: Plantae

Orden: Geraniales

Familia: Geraniaceae

Género: Pelargonium

Híbrido principal: Pelargonium × hortorum (malvón, geranio común).

Origen y distribución

El género Pelargonium es originario de Sudáfrica; P. × hortorum es un híbrido entre P. inquinans y P. zonale, ampliamente cultivado en jardines y balcones como planta vivaz floral en climas templados y cálidos.

Morfología y fisiología relevante

Planta vivaz floral de porte subarbustivo, 30–80 cm de altura según variedad y manejo.

Tallos suculentos, hojas reniformes o orbiculares, alternas, de 5–12 cm de diámetro, verdes con banda purpúrea en forma de herradura; inflorescencias en umbelas con numerosas flores de colores intensos (rojo, rosa, blanco, salmón, crema).



Es muy resistente a la sequía relativa y se adapta bien a suelos fértiles y drenantes; sin embargo, no tolera heladas fuertes y prefiere atmósfera seca o moderada para evitar hongos.

Manejo en paisajismo (≤ 0,8 m)

Suelo: Suelto, permeable y fértil; mezclas de tierra de jardín, arena y turba con buen drenaje.

Luz: Pleno sol o semisombra ligera en climas muy calurosos; cuanto más luz, mayor floración.

Riego: Moderado: 1–2 veces por semana en época de floración, dejando secar la superficie del sustrato entre riegos; riegos muy reducidos en invierno. Sensible al exceso de agua, que favorece roya y botrytis.

Poda / mantenimiento: Eliminación sistemática de flores marchitas para estimular floraciones continuas.

Poda ligera a finales de invierno o principio de primavera para renovar tallos y mantener forma compacta.

Uso paisajístico: Parterres de flor en zonas de paso, jardineras sobre muros bajos, bordes de senderos y macizos mixtos con gazania, portulaca y verbena, aportando color prolongado en la época seca.

Ixora *(Ixora coccinea)*

Taxonomía básica

Reino: Plantae

Orden: Gentianales

Familia: Rubiaceae

Género: Ixora

Especie: Ixora coccinea L.

Origen y distribución

Es originaria de Asia tropical (sur de India, Sri Lanka, Indonesia, Malasia) y Madagascar, y se ha difundido ampliamente en jardines tropicales y subtropicales de todo el mundo.

Morfología y fisiología relevante

Es un arbusto perenne, muy ramificado, de follaje denso, que suele mantenerse entre 0,9 y 1,2 m en jardinería, aunque puede alcanzar hasta 2–2,5 m si no se poda.

Presenta hojas coriáceas, opuestas, relativamente grandes (6–10 cm), verdes y brillantes, y produce inflorescencias



globosas terminales de 5–12 cm de diámetro con numerosas flores tubulares de cuatro pétalos en colores rojo, naranja, rosa, amarillo o crema, con floración prácticamente todo el año en climas cálidos.

Manejo en paisajismo (≤ 2 m)

Suelo: Prefiere suelos húmedos, ligeramente ácidos, fértiles y bien drenados, con buen contenido de materia orgánica; pH alrededor de 5–6.

Luz: Alta luminosidad; florece mejor a pleno sol, aunque en sitios extremadamente calurosos conviene evitar el sol de las horas centrales.

Riego: Moderado: mantener el suelo ligeramente húmedo, sin encharcamientos; tolera algo de sequía una vez establecida.

Poda: Se puede mantener entre 1–1,5 m mediante podas ligeras de formación, muy apta para cercas vivas bajas y macizos.

Uso paisajístico: Macizos florales, bordes junto a muros, cercas vivas bajas y puntos focales en parques; flores visitadas por colibríes y mariposas.

Hibisco / Hibisco enano *(Hibiscus rosa-sinensis)*

Taxonomía básica

Reino: Plantae

Orden: Malvales

Familia: Malvaceae

Género: Hibiscus

Especie: Hibiscus rosa-sinensis L.

Origen y distribución

Es originaria del Asia tropical (China, sudeste asiático) y se cultiva extensamente como ornamental en regiones tropicales y subtropicales, incluyendo América tropical.

Morfología y fisiología relevante

Arbusto perennifolio muy ramificado, de rápido crecimiento, que puede alcanzar 3–4 m si se deja libre, pero que en jardinería se maneja en el rango 1–2 m mediante podas.

Presenta hojas alternas, ovadas, de margen serrado, y flores grandes, solitarias, pedunculadas, de corola campanulada de hasta 10 cm o más, en una amplia gama de colores y formas de pétalos según cultivar.



Manejo en paisajismo (≤ 2 m)

Suelo: Fértil, bien drenado, con buen aporte de materia orgánica.

Luz: Pleno sol o semisombra luminosa; en climas muy calurosos puede agradecer algo de sombra en horas centrales.

Riego: Moderado; requiere humedad regular sin encharcamientos, tolerando períodos cortos de sequía una vez bien establecido.

Poda: Podas de formación y recorte anual permiten mantenerlo en 1–1,5 m y favorecer la emisión de nuevas ramas floríferas.

Uso paisajístico: Macizos florales, pantallas bajas alrededor de áreas de descanso, puntos focales cerca de senderos, muy adecuado para parques tropicales por su floración llamativa.

Ruellia (Ruellia simplex)

Taxonomía básica

Reino: Plantae

Orden: Lamiales

Familia: Acanthaceae

Género: Ruellia

Especie: Ruellia simplex C. Wright (también conocida como Ruellia tweediana).

Origen y distribución

Es originaria de Centroamérica (México, Caribe) y norte de Sudamérica, y se ha difundido en jardines cálidos como ornamental de flor púrpura.

Morfología y fisiología relevante

Es una planta perenne, con porte de mata o pequeño arbusto, de 0,5–1 m de altura, con hojas simples, alargadas, de color verde ceniciento, y flores en forma de trompeta entre lilas y violetas muy vistosas.

Florece desde primavera hasta los primeros fríos, pudiendo tener floración casi continua en climas cálidos; en naturaleza ocupa ambientes soleados, a menudo sobre suelos periódicamente anegados.



Manejo en paisajismo (≤ 1 m)

Suelo: Se adapta tanto a suelos bien drenados como a suelos que se encharcan de forma periódica; buena opción para zonas bajas del parque.

Luz: Prefiere exposición soleada; en sombra reduce su floración.

Riego: Tolera suelos húmedos y encharcamientos temporales, por lo que puede ubicarse cerca de zonas de drenaje o cunetas ajardinadas.

Poda: Poda ligera para controlar expansión y mantener altura en torno a 0,6–0,8 m.

Uso paisajístico: Bordes de áreas más húmedas, mezcla con heliconias y alpinia en zonas de transición del parque, aportando flor púrpura entre follajes verdes.

Jazmín *(Jasminum polyanthum)*

Taxonomía básica

Reino: Plantae

Orden: Lamiales

Familia: Oleaceae

Género: Jasminum

Especie: Jasminum polyanthum.

Origen y distribución

Es originaria de China (Guizhou, Sichuan y Yunnan), donde crece en bosques entre 1400–3000 m de altitud, y se ha introducido ampliamente como trepadora ornamental en climas templado-cálidos.

Morfología y fisiología relevante

Trepadora vigorosa de rápido crecimiento, capaz de alcanzar varios metros de longitud; en parques puede conducirse sobre pérgolas, vallas o estructuras de 1,5–2 m para mantener porte bajo visual.



Tiene hojas compuestas, verde oscuras, y produce racimos muy abundantes de flores blancas fragantes, especialmente en invierno-primavera, tantas que llegan a cubrir gran parte del follaje.

Manejo en paisajismo (porte controlado)

Suelo: No es exigente; prefiere suelos fértiles y bien drenados, ligeramente ácidos o neutros.

Luz: Lugares claros con sol directo; admite ligera sombra pero reduce floración.

Riego: Regular durante el periodo vegetativo; moderar en invierno, evitando encharcamientos.

Poda: Requiere podas de guiado sobre soportes (espalderas, pérgolas) y podas intensas después de la floración para estimular brotes jóvenes y controlar el volumen.

Uso paisajístico: Pérgolas pequeñas, entradas de parque y muros bajos, generando “nubes” de flor blanca perfumada sobre estructuras, manteniendo la vegetación a una altura visual moderada.

Photinia ‘Red Robin’ *(Photinia × fraseri)*

Taxonomía básica

Reino: Plantae

Orden: Rosales

Familia: Rosaceae

Género: Photinia

Híbrido: Photinia × fraseri ‘Red Robin’.

Origen y distribución

Es un híbrido ornamental entre Photinia glabra y Photinia serrulata, originarios de Asia (China, Japón, Formosa), difundido como arbusto de follaje rojo en jardines templados.



Morfología y fisiología relevante

Arbusto perenne de crecimiento rápido, capaz de alcanzar 3–4 m si no se poda, pero utilizado con frecuencia para setos de menos de 2 m.

Presenta hojas alargadas, consistentes, con una marcada metamorfosis de color: rojo brillante en brotes nuevos, violáceas en verano y verdes en invierno, siendo de los pocos arbustos de hoja perenne con follaje rojo.

En primavera emite inflorescencias con pequeñas flores blanco-crema.

Manejo en paisajismo (≤ 2 m)

Suelo: Se adapta a suelos calizos y fértiles, bien drenados.

Luz: Prefiere climas templados y exposición soleada o semisombra; no le van bien las temperaturas muy altas en verano prolongadas.

Riego: Moderado; necesita cierta humedad pero sin exceso.

Poda: Podas frecuentes (recortes) favorecen la emisión de brotes nuevos rojos y permiten mantener setos densos de 1–2 m de altura.

Uso paisajístico: Setos bajos de separación, fondos de parterres y pantallas visuales con fuerte componente de color de follaje, muy útil para estructurar espacios dentro del parque.

Sansevieria / Lengua de suegra *(Sansevieria trifasciata / Dracaena trifasciata)*

Taxonomía básica

Reino: Plantae

Orden: Asparagales

Familia: Asparagaceae

Género: Dracaena (antes Sansevieria)

Especie: Dracaena trifasciata (conocida como Sansevieria trifasciata).

Origen y distribución

Es originaria de África tropical occidental (Nigeria, cuenca del Congo), donde habita zonas secas y rocosas; se cultiva globalmente como planta ornamental muy resistente.

Morfología y fisiología relevante

Es una suculenta perenne con hojas verticales, lineales o lanceoladas, de 30–120 cm de largo y 2–10 cm de ancho, verde oscuro con bandas horizontales gris-verdosas.



Almacena agua en sus tejidos, tolera bien la sequía y requiere muy pocos cuidados; el principal riesgo es el exceso de agua y el frío extremo.

Manejo en paisajismo (≤ 1 m)

Suelo: Sustrato ligero y muy drenante, similar al de cactus y suculentas, con mezcla de materiales minerales (perlita, arena) para evitar encharcamientos.

Luz: Desde baja iluminación a luz brillante filtrada; puede tolerar sol directo algunas horas, pero en climas muy calurosos conviene semisombra.

Riego: Muy moderado: dejar secar completamente el sustrato antes de volver a regar; típicamente cada 2–4 semanas en verano y cada 4–8 semanas en invierno.

Poda / propagación: Se elimina hojas dañadas y se multiplica fácilmente por división de rizomas o esquejes de hoja.

Uso paisajístico: Macizos de follaje vertical para bordes modernos, alineaciones en entradas y puntos de contraste arquitectónico en zonas de muy bajo mantenimiento, incluso en contenedores.

Alpinia *(Alpinia zerumbet)*

Taxonomía básica

Reino: Plantae

Orden: Zingiberales

Familia: Zingiberaceae

Género: Alpinia

Especie ornamental frecuente: Alpinia zerumbet.

Origen y distribución

Es originaria de Asia tropical y se cultiva como ornamental en regiones tropicales y subtropicales, incluidas América tropical.

Morfología y fisiología relevante

Herbácea perenne rizomatosa, de 1–2 m de altura según manejo, con hojas largas, lanceoladas, de aspecto tropical, y racimos colgantes de flores blanco-rosadas con garganta amarilla que aportan gran valor ornamental.



Prefiere suelos relativamente húmedos y fértiles, con buena aireación, y se adapta bien a climas cálidos.

Manejo en paisajismo (≤ 2 m)

Suelo: Rico en materia orgánica, con buen drenaje pero con humedad moderada; ideal en zonas de transición algo más húmedas del parque.

Luz: Sol filtrado o semisombra luminosa; tolera sol directo si dispone de suficiente humedad.

Riego: Moderado, manteniendo el suelo ligeramente húmedo sin encharcar.

Poda: Eliminación de tallos florales secos y hojas viejas; división de matas cada cierto tiempo para controlar expansión.

Uso paisajístico: Macizos tropicales en zonas de transición, detrás de ruellias y delante de heliconias, aportando volumen de follaje y flor aromática.

Heliconias *(Heliconia spp.)*

Taxonomía básica

Reino: Plantae

Orden: Zingiberales

Familia: Heliconiaceae

Género: Heliconia.

Origen y distribución

La mayoría de las especies de Heliconia son nativas de América tropical (Centro y Sudamérica) y algunas de las islas del Pacífico; se usan extensamente como ornamentales de flor estructural en jardines tropicales.

Morfología y fisiología relevante

Son herbáceas perennes rizomatosas, con porte entre 1–3 m según especie y manejo, hojas grandes tipo banano y espectaculares inflorescencias con brácteas rojas, amarillas, anaranjadas o combinadas.

Requieren suelos fértiles y relativamente húmedos, con buen drenaje, y climas cálidos sin heladas.



Manejo en paisajismo (≤ ~1,5–2 m en tu proyecto)

Suelo: Rico en materia orgánica, húmedo pero no encharcado; apto para zonas de transición del parque donde el riego sea algo mayor.

Luz: Pleno sol o semisombra; muchas especies florecen mejor con alta luminosidad.

Riego: Moderado-alto, especialmente en épocas secas; nunca dejar secar completamente el suelo.

Poda: Eliminación de inflorescencias y hojas secas, división de rizomas para renovar macizos.

Uso paisajístico: Macizos tropicales de alto impacto visual al fondo de la zona de transición, detrás de ruellias y alpinia, creando un telón de flor roja/amarilla en parques tropicales.

Adelfa (Nerium oleander)

Taxonomía básica

Reino: Plantae

Orden: Gentianales

Familia: Apocynaceae

Género: Nerium

Especie: Nerium oleander L.

Origen y distribución

Es una especie monotípica originaria de la cuenca mediterránea, extendiéndose desde el Mediterráneo hasta China y difundida como ornamental en numerosas zonas cálidas del mundo.

Morfología y fisiología relevante

Es un arbusto perenne que en condiciones naturales puede superar los 4–5 m de altura, con tallos leñosos de corteza pardo-cenicienta y hojas lanceoladas, coriáceas, de color verde intenso.



Produce inflorescencias terminales con abundantes flores en tonos rosas, blancos, rojos o crema, de primavera a otoño, lo que explica su amplio uso ornamental.

Fisiológicamente, muestra alta resistencia a la sequía, al calor, al viento y a suelos calcáreos o salinos; se adapta a muchos tipos de suelo y granulometrías, pero no tolera encharcamientos prolongados.

Manejo en paisajismo (≤ 2 m en tu proyecto)

Suelo: Indiferente, pero con buen drenaje; se desarrolla muy bien en suelos arenosos y pedregosos.

Luz: Pleno sol; es un arbusto típico de ramblas y barrancos con mucha insolación.

Riego: Muy resistente a la sequía: en suelo puede vivir sólo con agua de lluvia, aunque se logra floración más espectacular con riegos moderados.

Poda: Se recomienda podar tras la última floración (final de verano-otoño), recortando el tercio superior de los tallos floridos para estimular brotes nuevos y abundancia de flores en la primavera siguiente.

Uso paisajístico: En tu caso, variedades enanas o manejo con poda para mantenerla en 1,5–2 m como macizo florífero resistente en zonas secas del parque (taludes, medianas internas).

Advertencia: Toda la planta es tóxica (ingestión), por lo que en parques conviene ubicarla lejos de áreas de juego infantil y señalizar si es necesario.

Echeveria *(Echeveria elegans)*

Taxonomía básica

Reino: Plantae

Orden: Saxifragales

Familia: Crassulaceae

Género: Echeveria

Especie: Echeveria elegans.

Origen y distribución

Es originaria de regiones semiáridas de México (hábitats semi-desérticos de Hidalgo y otras zonas), y es una de las suculentas ornamentales más populares en jardines de rocalla y colecciones.

Morfología y fisiología relevante

Planta suculenta en forma de roseta compacta, de 5–10 cm de altura y rosetas de 10–15 cm de diámetro; hojas gruesas, carnosas, de color azul-grisáceo o blanco-plateado, dispuestas en forma de “alcachofa”.



Produce tallos florales arqueados de 10–25 cm con pequeñas flores acampanadas rosadas y amarillas en primavera-verano.

Fisiológicamente se comporta como suculenta típica de clima seco: almacena agua en las hojas, prefiere atmósfera seca, tolera temperaturas altas (≈30 °C) y puede soportar descensos puntuales hasta alrededor de −4 °C.

Manejo en paisajismo (≤ 0,15 m de altura)

Suelo: Fértil pero suelto, con mezcla de tierra negra, arena y, si se desea, resaca de río; siempre muy drenante, tipo sustrato de cactus y suculentas.

Luz: Pleno sol o semisombra muy luminosa; requiere al menos 4–6 h de luz intensa al día para mantener su forma y color.

Riego: Moderado, dejando secar completamente el sustrato entre riegos; no mojar las hojas para evitar pudrición.

Propagación y mantenimiento: Se multiplica muy fácil por esqueje de hoja o por hijuelos de la roseta madre.

Evitar riegos excesivos y atmósfera muy húmeda para prevenir hongos y cochinilla.

Uso paisajístico: Tapices de rosetas en rocallas secas, bordes de caminos, jardineras de sol; excelente para combinar con aloe, sedums y portulaca en la zona muy seca del parque.

Portulacaria afra (árbol de la abundancia)

Taxonomía básica

Reino: Plantae

Orden: Caryophyllales

Familia: Didiereaceae (a veces Portulacaceae en clasificaciones antiguas)

Género: Portulacaria

Especie: Portulacaria afra.

Origen y distribución

Es originaria del sur de África (Cabo Oriental y KwaZulu-Natal), donde forma parte de matorrales secos, y se cultiva en todo el mundo como suculenta ornamental y bonsái.



Morfología y fisiología relevante

Arbusto craso de hasta 3 m en estado natural, pero en maceta suele mantenerse entre 30–80 cm; presenta tronco marrón-grisáceo, ramas carnosas y hojas pequeñas, redondeadas, de 1–2 cm, muy carnosas.

Produce flores rosadas pequeñas en racimos, aunque en cultivo ornamental no siempre florece.

Fisiológicamente es muy tolerante a la sequía, capaz de almacenar agua en hojas y tallos, pero sensible al exceso de riego y al encharcamiento prolongado.

Manejo en paisajismo (≤ 1 m en tu proyecto)

Suelo / sustrato: Bien drenante, similar al de cactus: mezcla de tierra para cactus con 20–30% de perlita o grava volcánica; en bonsái se usan sustratos aún más minerales (akadama + grava).

Luz: Pleno sol o luz muy brillante; soporta 4–6 h de sol directo y es de las pocas suculentas que tolera sol fuerte sin quemarse, siempre que el sustrato esté bien drenado.

Riego: Bajo: regar abundantemente sólo cuando el sustrato esté seco en profundidad, luego dejar secar bien antes de la siguiente vez.

Orientativamente: cada 10–14 días en verano, cada 3–4 semanas en invierno, según clima.

Poda / formación: Se presta muy bien a podas frecuentes para formar matorrales compactos o bonsáis: dejar crecer 6–8 hojas y luego recortar, lo que induce nuevas ramificaciones.

Uso paisajístico: Macizos suculentos tipo “matorral” en zonas muy secas del parque, bordes de rocalla, contenedores de entrada; puedes manejarla en 0,6–1 m de altura como arbusto de estructura en la hidrozona de mínimo riego.